

Electronic Appendix 2. Images of type specimens of selected names in *Rubus* ser. *Sylvatici*.

Holotype of *Rubus maureri* Király, Trávníček & Žila (“Hungary, Zala County, Surd, 1,8 km N of the village, forest fringes”, G. Király, BP 00013210) – Part 1, inflorescence



Holotype of *Rubus maureri* Király, Trávníček & Žíla (“Hungary, Zala County, Surd, 1,8 km N of the village, forest fringes”, G. Király, BP 00013209) – Part 2, first-year stem with leaves



Lectotype of *Rubus ferox* Vest ("Steiermark", Ch. Vest, s. d., GJO 91345)



Neotype of *Rubus apum* Fritsch (= *Rubus ferox* Vest) ("Steiermark. Auf der Platte bei Graz auf tertiärem Schotterboden, gegen 600 m", K. Fritsch, VII 1908, Flora Stiriaca Exsiccata 753, Lief. 16, GJO 93571)



A - 8
Abteilung für Botanik
Klasse 10

Synonyme:
R. ferox Vest 1821,
R. lastaxon Bob. et
Wurb. 1895
Hann 1963

Joanna
19 Jun
1908
GR

Dr. A. v. Hayek, Flora stiriaca exsiccata
16. Lieferung, Jänner 1909.

753. Rubus apum
Fritsch, Floristische Notizen III. Rubus apum nov. sp. in
Oesterr. bot. Zeitschr. LV. p. 85 (1906).
Stiria media: In fruticetis in colle Platte prope urbem Graz;
solo argilloso („tertiärer Schoter“), 580 m. s. m. (Locus classicus!)
Julio 1908. leg. K. Fritsch.

Rec. 3353/9/1
3353

Lectotype of *Rubus lasiaxon* Borb. & Waisb. (= *Rubus ferox* Vest) ("Waldschläge in Czák bei Güns", A. Waisbecker, 8 VII 1892, WU 0103773)



Lectotype of *Rubus macrophyllus* var. *acanthosepalus* Borb. & Waisb. (= *Rubus ferox* Vest)
("Waldrand in Czák, West Ungarn", A. Waisbecker, 10 VII 1890, BP 83486)




Isotype of *Rubus juennensis* Leute & W. Maurer ("SE-Kärnten. Jauntal: an der Straße zwischen Rückersdorf und Proboj, Waldschlag am Rande eines Rotföhrenbestandes, 540 m", Leute, Maurer & Müller, 16 VII 1980, WU 068027) – Part 1



Isotype of *Rubus juennensis* Leute & W. Maurer ("SE-Kärnten. Jauntal: an der Straße zwischen Rückersdorf und Proboj, Waldschlag am Rande eines Rotföhrenbestandes, 540 m", Leute, Maurer & Müller, 16 VII 1980, WU 068028) – Part 2



Holotype of *Rubus salzmannii* W. Maurer ("Feuchter Mischwald bei Kirchbach in Steiermark, an der Straße nach Glatzau, 340 m", W. Maurer & A. Neumann, 24 VI 1967, GZU 000280897)



Holotype of *Rubus venosus* W. Maurer ("Weststeiermark, auf einem Holzschlag an der Straße zwischen Muttendorf und Purgstall, Gemeinde Tobisegg, 350 m", W. Maurer, 16 VIII 1974, GZU 000280781)



Lectotype of *Rubus wimmerianus* (Sprib. ex Sudre) Sprib. ("Ratibor. Brzezie. Weg nach der Aussicht", Spribille s. n., 29 VII 1899, KOR 22739) (photo: P. Kosiński)

