

JOS. ROHLÉNA:

Nachträge zur Flora von Böhmen.

Im verfloßenen Decenium widmete ich mich wieder der floristischen Durchforschung Böhmens. Zu diesem Zwecke sammelte ich in verschiedenen Gegenden, namentlich in Mittel- und Ostböhmen, dann in den Grenzgebirgen. Ausserdem erhielt ich jedes Jahr ein reichliches Pflanzenmaterial von meinen zahlreichen botanischen Freunden. Resultate meiner Studien veröffentlichte ich alljährlich in der Zeitschrift »Časopis Národního Muzea« v Praze 1922—1931. In diesem kurzen Résumé sind nur die wichtigsten Funde (neu beschriebene Pflanzenformen, Bastarde, adventive, verwilderte oder seltene Arten) angeführt worden.

Agrimmonia odorata Mill. — Auf dem Dürrberge bei Schwarzbach im Böhmerwalde.

Agropyrum intermedium (Host.) subsp. *glaucum* (Desf.) f. *eciliatum* Rohl. l. c. 1931. — Vaginis foliorum margine levibus non ciliatis. — Běchovice (Schaffere.) Libeň bei Prag.

Agrostis alba L. var. *gigantea* Meyer. f. *scabriculumis* Rohl. apud Pöppera Schedae ad Fl. exsicc. 1926. — Culmo sub panicula scabrido.

A. canina L. var. *mutica* Gaud. f. *planifolia* Rohl. l. c. 1931. — Culmo elatiore 60—70 cm alto, foliis omnibus planis ca 3 mm latis saturate viridibus, nec glaucescentibus. — Auf Torfwiesen bei Gottesgab im Erzgebirge.

A. tenuis Sibth. (A. vulg. With.) f. *variiflora* Rohl. l. c. 1931. — Glumae fertiles nonnullae longe aristatae (arista in $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ parte exiens), ceterae muticae (forma analogica *A. caninae* var. *variiflorae* Waisb.) — Sehr häufig am Heideteich nächst Ostrov unter dem Erzgebirge.

Alopercurus pratensis L. var. *breviaristatus* Beck Fl. N. Ö. 56. — Sehr häufig auf Wiesen bei Třeběchovice nächst Königgrätz.

† *A. myosuroides* Huds. — In den letzten Jahren in der Umgebung von Prag vielfach und oft in grosser Menge eingeschleppt.

† **Amaranthus albus** L. — In den letzten 10 Jahren hat sich diese Art in der Umgebung von Prag sehr verbreitet; manchmal kommt sie so massenhaft vor, dass sie grosse Flächen bedeckt.

† *A. crispus* N. Terr. — Holešovice bei Prag, eingeschleppt.

- Anthemis arvensis** L. f. *crassifolia* Rohl. l. c. 1930. — Foliorum laciniis multo latioribus, dentibus obtusiusculis, rachi late alata. Auf einem Felde bei Dejvice nächst Prag sehr häufig.
- A. austriaca* Jacq. var. *brachyglossa* Rohl. l. c. 1926. — Ligulis multo minoribus ellipticis vel elliptico-oblongis, involuero dimidio brevioribus. Ziemlich häufig bei Kralupy a. d. Moldau.
- — f. *discoidea* Rohl. l. c. 1930. — Ligulis nullis. — Dejvice bei Prag.
- — f. *erythrosperma* Rohl. l. c. 1930. Acheniis (maturis) fuscioribus. Häufig mit der vorigen.
- A. cotula* L. × *Matricaria chamomilla* L. = **Anthe-Matricaria Domini** Rohl. l. c. 1930. Unter den Eltern bei Zlíchov nächst Prag.
- Apera spica venti** P. Beauv. f. *longearistata* Maloch apud Rohl. l. c. 1931. — Floribus minoribus, aristis 2—2½ × longioribus ac in typo. Bei Pilsen (M a l o c h.)
- Arrhenatherum elatius** M. K. f. monstr. *viviparum*. Bei Pilsen (M a l o c h.)
- — var. *vulgaris* Fries. f. *subverticillatum* Rohl. Sborník klubu přírod. Brno 1922. — Ramis paniculae brevibus verticillum simulantibus. Chuchle bei Prag.
- † **Anthoxanthum aristatum** Boiss. — Bei Zlíchov nächst Prag auf dem Eisenbahndamm eingeschleppt.
- Astragalus danicus** Retz. f. *brevidens* Rohl. l. c. 1926. — Dentes calycini tubo 4—5 × breviores. Zwischen Oužice und Neratovice in Mittelböhmen. (R o z u m.)
- A. glycyphyllos* L. f. *stenostipulata* Maloch in schedis 1928. — Stipulis anguste lanceolatis, basi ad summum 2½ mm latis. Bei Pilsen. (M a l o c h.)
- † **Avena sterilis** L. — In Miehle bei Prag (Veselý.) Hinter dem Smichover Bahnhof bei Prag. Aus dem Süden eingeschleppt.
- Barbarea stricta** × *vulgaris*. — Unter den Eltern bei Rožtoky nächst Prag.
- Brachypodium silvaticum** R. Sch. f. *strictum* Rohl. l. c. 1931. — Culmis rigidioribus, spicis erectis (nec nutantibus). Forma locorum apricorum. Am Smichover Hafen bei Prag.
- † **Bromus macrostachys** Desf. Auf dem Eisenbahndamm bei Zlíchov nächst Prag eingeschleppt. —
- † *Br. madritensis* L. — Mit der vorigen Art bei Zlíchov; auch bei dem Zollamt auf dem Smichover Bahnhof in Prag eingeschleppt.
- † *Br. villosus* Forsk. A) *maximus* (Desf.) Asch. Gr. — Hinter dem Smichover Bahnhof in Prag eingeschleppt.
- Br. secalinus* L. f. *simplex* Rohl. l. c. 1931. — Die Rispe ist arm nur mit 1—2 (—3) Ähren. — Sehr häufig am Wege zwischen Trčkov und Friedrichswald im Adlergebirge.
- Br. erectus* Huds. f. *pilosissimus* Rohl. Sborník klubu přírod. Brno 1922. — Foliis omnibus, vaginis et culmis longe patule hirsutis. — Bei Prag und Opočno.

- Br. erectus* Huds. f. *obtusiflorus* Rohl. Sborník klubu přírod. Brno 1922. — Glumae apice obtusiusculae vel obtusae et brevius aristatae (arista 2—3 mm longa.) Dejvice und Chuchle bei Prag.
- Calamagrostis epigeios** Roth. var. *densiflora* Ledeb. — Bei Pilsen (M a l o c h.)
- — var. *princeps* Podpěra Květena Moravy VI. 2. 306. — Culmis etiam sub panicula levibus nec scabris. Auf der Schwarzenberger Insel bei Prag. Bisher nur aus Südmähren bekannt.
- C. epigeios* L. f. *albescens* Rohl. l. c. 1931. Glumis (praeter carinam viridem) albescentibus. Im Walde bei Přepychy in Ostböhmen.
- C. epigeios* × *arundinacea*. — Im Walde bei Albrechtice nächst Týniště in Ostböhmen; auch bei Písek in Südböhmen.
- † **Callistephus chinensis** Nees. — Bei Stará Boleslav häufig verwildert (G ü t t l e r.)
- Campanula Rapunculus** L. — Bei Trautenau auf einem Felsen (W i h a n.) Aus Böhmen bisher nicht bekannt.
- Cardamine pratensis** × *dentata*. (Rohl. l. c. 1925.) Unter den Eltern in mehreren Exemplaren bei Falkenau a. d. Eger.
- Carex pilosa** Scop. f. *angustifolia* Rohl. l. c. 1926. Foliis multo angustioribus, ca 2—3 mm latis. Am Waldrande auf dem Hügel Chlum nächst Jungbunzlau (K r a u s k o p f.)
- C. caryophyllea* Lat. f. *gracilis* Jílek apud Rohl. l. c. 1930. — Culmus ca 30 cm altus gracilis levis interdum sub inflorescentia subscaber, folia angustiora breviora ad tertiam solum partem culmi attinentia. Bei Písek. (V e s e l ý.)
- Centaurea austriaca** Willd. — Meziměstí bei Broumov in Ostböhmen. In Böhmen selten!
- C. Scabiosa* L. f. *angustisecta*. Rohl. l. c. 1922. Eine Form mit auffallend schmalen und langen Blattabschnitten. Um Prag nicht selten.
- Cerastium arvense** L. var. *adenophorum* Hayek. — Bei Trčkov im Adlergebirge ziemlich häufig.
- † **Chenopodium carinatum** R. Br. — Sehr häufig bei Zlíchov nächst Prag in 3 Formen: a) *typicum* Rohl. l. c. 1928. Der Hauptstengel aufrecht, die unteren Äste niederliegend; b) *prostratum* Rohl. l. c. 1928. — Der Stengel sehr reichlich verzweigt, alle Äste niederliegend; c) *erectum* Rohl. l. c. 1928. — Der Stengel aufrecht, reichlich verzweigt, aber alle Äste aufrecht; diese Form ist seltener.
- † **Chrysanthemum coronarium** L. — Bei Radava und Velký Vír nächst Orlik in Südböhmen verwildert. (G ü t t l e r.) Bei dem Bahnhof in Königgrätz. (K r č a n.)
- † *Chr. corymbosum* L. f. *microcephalum* Rohl. l. c. 1929. — Capitulis multo minoribus ca 1½—2 cm diametro. — Bei Kytín nächst Mníšek. (G ü t t l e r.)
- † *Chr. Myconis* L. — Bei Zlíchov auf dem Bahndamm nächst Prag eingeschleppt.
- † *Chr. segetum* L. — Hinter dem Smichover Bahnhofs bei Prag.
- † **Citrullus colocynthis** L. — Auf Ruderalorten um Prag häufig verwildert.

- Corydalis cava** (L.) Schw. et K. f. *bicolor* Maloch in sch. 1928. — Petala exteriora rosea, interiora alba. Bei Pilsen. (M a l o c h.)
- Crepis succisaefolia** Tausch. f. *elata* Rohl. l. c. 1928. — Folia radicalia longissime petiolata. Bei Kostomlaty im Mittelgebirge. (Š i m r.)
- † **Cynodon Dactylon** Pers. — Bei Zlíchov, Libeň und Troj nächst Prag eingeschleppt.
- — f. *septentrionalis* Asch. Gr. — Am Klárovo in Prag sehr häufig.
- † **Cynosurus echinatus** L. — In mehreren Exemplaren auf dem Eisenbahndamm bei Zlíchov nächst Prag aus dem Süden eingeschleppt.
- Deschampsia flexuosa** Trin. f. *flavescens* Rohl. l. c. 1931. — Spiculis flavescentibus. Bei Spindelmühle im Riesengebirge.
- Digitalis purpurea** L. — Sehr häufig auf dem Berge »Maternice« bei Hronov an der Mettau in nordöstl. Böhmen (B a u d y š.)
- Dorycnium herbaceum** Vill. — Auf einer sonnigen Lehne zwischen Přepychy und Vojenice in Ostböhmen in der Gesellschaft von *Lathyrus latifolius*, *Astragalus danicus*, *Inula hirta*, *Trifolium ochroleucum* und *Anthericum ramosum*.
- Epilobium collinum** Gmel. f. *ternatum* Rohl. 1922. Die Blätter in 3-gliedrigem Quirlen. — Bei Želnavá im Böhmerwalde.
- Erigeron acer** L. subsp. *angulosus* Gaud. (= *E. Droebachiensis* Koch.) — Bei Želnavá im Böhmerwalde.
- E. acer* × *canadensis*. — Bei Josefstadt in Ostböhmen (T r a x l e r.)
- Eriophorum gracile** Koch. — Auf einer sumpfigen Wiese bei Štoky nächst Iglau (C i m p r i c h t.)
- Euphrasia curta** (Fr.) Wettst. — Bei Chodov nächst Karlsbad häufig.
- Festuca ovina** L. subsp. *supina* Schur. Im Tale unter dem Riesengrund bei Peer im Riesengebirge in zwei Formen: »Plantae e locis apricis habent folia glauco-pruinosa (= f. *pruinosa*), e locis umbrosis folia viridia (= f. *viridis*)« Rohl. l. c. 1931.
- F. rubra* L. var. *genuina* Hackel f. *loliacea* Rohl. l. c. 1931. — Culmo elato (60 cm alto), tenuissimo, sed stricto, panícula simplici, ramis infimis 2—3 spiculosis, spiculis ceteris solitariis breviter pedunculatis paucifloris (2—3), floribus minoribus. Auf einer feuchten Bergwiese bei Friedrichswald im Riesengebirge sehr häufig.
- Galium Hercynicum** Weigel. (A. saxatile.) — Auch im Adlergebirge an quelligen Stellen unter Hohemense.
- G. Schultesii* Vest. — Im feuchten Walde »Chropotin« bei Opočno mit der Varietät *polonicum* (Blocki.)
- † **Glaucium corniculatum** Curt. — Auf dem Smíchover Bahnhof in Prag eingeschleppt.
- † **Gnaphalium margaritaceum** L. — Auf einer Waldlichtung bei Albrechtice nächst Týniště sehr zahlreich.
- Gypsophila paniculata** L. — Im sandigen Walde bei Lysá n. Lab. Wahrscheinlich nur eingeschleppt. (R o z u m.)
- † **Hesperis tristis** L. — Bei Königgrätz verwildert oder eingeschleppt (P r o k e š.)
- Hieracium laevigatum** Willd. f. *tubulosum* Rohl. l. c. 1922. — Flosculis omnibus tubulosis. Sehr zahlreich am Bulovka oberhalb Prag-Libeň.

- Hierochloe australis** (Schrad.) R. et Sch. f. *breviaristata* Rohl. l. c. 1931. — Arista multo brevior e spiculis non exserta. — Bei Davle nächst Prag (Polák.) Přeštice bei Pilsen (Maloch.) Auch bei Třebenice (Kudláček.)
- † **Hirschfeldia nasturtiifolia** Fritsch. — Bráník und Libeň bei Prag (Rohlena.) Auch bei Blešno nächst Königgrätz (Křan.) Wahrscheinlich eingeschleppt.
- † **Hordeum jubatum** L. — Auf Ruderalorten in der Umgebung von Prag öfter verwildert.
- † *H. maritimum* With. — Hinter dem Smíchover Bahnhof in Prag eingeschleppt.
- † *H. secalinum* Schreb. — Auf dem Eisenbahndamm hinter dem Smíchover Bahnhof in Prag eingeschleppt.
- Hydrocharis morsus ranae** L. f. *microphylla* Rohl. l. c. 1922. — Forma terrestris foliis multo minoribus, 5—10—(15) mm latis. In einem feuchten Walde bei Třebchovice in Ostböhmen.
- Hypericum perforatum** × *maculatum* (quadrangulum.) — Unter den Eltern in 2 Individuen bei Bleistadt im Erzgebirge.
- Impatiens parviflora** DC. f. *albescens* Rohl. l. c. 1926. — Corolla albescens, solum fauce macula aurantiaca ornata. Sehr häufig bei Zadní Třebáň nächst Prag.
- Juncus effusus** L. f. *elatus* A. Gr. — In einem feuchten Walde bei Ondřejov nächst Prag.
- J. effusus* × *glaucus*. — An einer quelligen Wiese bei Ondřejov nächst Prag.
- J. tenuis* Willd. f. *bicornis* E. Mayer. — Im Walde bei Opočno in Ostböhmen.
- var. *laxiflorus* Fiek. — Mit dem vorigen bei Opočno.
- J. squarrosus* L. — Auf einer feuchten Wiese bei Volary (Wallern) im Böhmerwalde.
- J. compressus* Jacq. b. *umbrosus* Rohl. l. c. 1923. — Culmus tenuis usque ad 5 dm altus, foliis tenuioribus, perigonii phyllis praeter carinam viridem albis, margine scariosis. — Im Kokořín-tale bei Mělník sehr häufig.
- J. atratus* Krock. — In einem Waldtümpel bei Rožďalovice. (Vilhelm, Kašpar.) In Böhmen sehr selten!
- J. bulbosus* L. f. *viviparus*. — Häufig bei Jince nächst Příbram.
- Knautia drymeia** Heuff. f. *microcephala* Rohl. l. c. 1926. — Capitulis multo minoribus diametro ca 12—14 mm, floribus (eum calycibus) solum 5—6 mm longis. Im Walde Hájek bei Vysoké Mýto (Rozum.)
- † **Lathyrus aphaca** L. f. *brevistipularis* Rohl. l. c. 1930. — Stipulae parvae (8—10 mm × 6—9 mm) ut in var. *laetus* Posp., sed florum pedunculi stipulas parum superant. — Hinter dem Smíchover Bahnhof bei Prag, eingeschleppt.
- † *L. Ochrus* DC. — Bei Zlíchov nächst Prag mit der Bahn aus dem Süden eingeschleppt.

- Lepidium** *Draba* L. f. *angustana* Rohl. l. c. 1923. (*Cardaria* Dr. f. *angustana* Rohl. l. c.) Foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis multo angustioribus (ca 1 cm latis) basin versus angustatis; color totius plantae pallidior. — Sehr häufig und ohne Übergänge oberhalb Smichover Bahnhof in Prag.
- † *L. densiflorum* Schrad. f. *microcarpum* Thellung. — In der letzten Zeit in der Umgebung von Prag häufig eingeschleppt.
- Linaria** *vulgaris* Mill. f. *salicifolia* Rohl. l. c. 1924. — Folia latiora (usque 1 cm lata), ad apicem et ad basin angustata, bracteae maiores et latiores. Bei Jablonec a. d. Iser in Nordböhmen.
- Lolium** *perenne* × *multiflorum*. — Bei Břevnov und Žižkov nächst Prag.
- † *L. rigidum* Gaud. — Auf dem Eisenbahndamm hinter dem Smichover Bahnhof in Prag. Aus dem Süden eingeschleppt.
- L. multiflorum* Lam. (*L. italicum*) f. *oppositiflorum* Rohl. in Sborník klubu přír. Brno 1922.) — Spiculis plurimis oppositis. — Bei Opočno in Ostböhmen.
- † **Lupinus** *luteus* L. — Bei Pardubice eingeschleppt. (K r ě a n.) Auch bei Častolovice. (S o u ě k.)
- Lycopodium** *complanatum* L. f. *patulum* Rohl. l. c. 1929. — Foliis exterioribus longius protractis et magis patulis. Bei Louňovice unter dem Berge Blaník. (V o d á k.)
- Matricaria** *inodora* L. var. *anthemiformis* Rohl. l. c. 1926. — Ligulis latioribus et brevioribus ac in typo, elliptico-oblongis, longitudine involucri non superantibus vel eo subduplo brevioribus. Sehr häufig bei Holešovice nächst Prag.
- M. inodora* L. var. *coronata* Marsson. — Bei Zlíchov nächst Prag.
- M. inodora* L. var. *disciflora* Fries. — Bei Dejvice und Zlíchov nächst Prag häufig.
- M. inodora* L. f. monstr. *microcephala* Rohl. l. c. 1930. Ramosissima, capitulis numerosis minimis (illis Achilleae millefolii similibus), floribus disci nullis, radii paucis. — Auf Ruderalplätzen bei Zlíchov nächst Prag.
- M. inodora* × *chamomilla*. — In einigen Exemplaren unter den Eltern bei Zlíchov und Dejvice nächst Prag.
- Melampyrum** *nemorosum* L. f. *lilacinum* Rohl. l. c. 1928. — Bracteis lilacinis. — Am Waldrande bei Bolehošť nächst Opočno in Ostböhmen.
- — f. *trifoliatum* Rohl. l. c. 1929. — Foliis ternato-verticillatis. — Bei Reichenau a./Kn. (S v o b o d a.)
- Melandryum** *album* × *rubrum*. — Einige Exemplare unter den Stammeltern oberhalb Kunštát im Adlberggebirge.
- M. album* Garcke var. *denudatum* (*M. prat. v. denud.*) Rohl. l. c. 1930. — Caule glaberrimo, foliis glabris solum ad marginem minute puberulis, calycibus glabris solum ad nervos scabris. Bei Zlíchov nächst Prag.
- M. rubrum* Garcke f. *maculatum* Rohl. l. c. 1925. — Petalis roseis albo-maculatis. Bergwiesen auf dem Keilberge im Erzgebirge.

- Mentha pulegium** L. var. *nummularioides* Pérard. — Am Hafen bei Libeň in Prag; auch bei Poříčí n./Sáz.
- † **Monolepis trifida** Schrad. (*M. asiatica* Ledebour.) In Dejvice bei Prag eingeschleppt.
- † **Myagrum perfoliatum** L. — Bei Střešovice und Dejvice nächst Prag eingeschleppt.
- † **Nicandra physaloides** (L.) Gärtn. — In Vamberk in Ostböhmen verwildert. (H r o b a ř.)
- Onopordon acanthium** L. f. *glabrescens* Rohl. l. c. 1926. — Foliis obscure viridibus glabratis. — Maniny bei Prag.
- Orchis maculata** L. f. *brevicalcarata* Rohl. l. c. 1930. — Calcare brevissimo, ovario suo 5—8 × brevior. Bei Elbecken im Erzgebirge. (P o d h a j s k á.)
- † **Panicum colonum** L. — Am Hafen in Prag-Libeň eingeschleppt.
- † *P. Scribnerianum* Lam. (= *P. pauciflorum* Ell.) — Am Rande des militärischen Exerzierplatzes bei Milovice nächst Lysá a d. E.; aus Nord-Amerika eingeschleppt. (R o z u m.)
- † **Phalaris paradoxa** L. — Bei Košíře und Zlíchov nächst Prag eingeschleppt.
- † *Ph. coeruleascens* Desf. — Bei Zlíchov nächst Prag auf dem Eisenbahndamm eingeschleppt.
- Phleum pratense** L. B. *nodosum* Schreb. f. *glaucescens* Rohl. l. c. 1931. — Tota planta, praesertim folia inferiora glaucescentia. Sehr häufig auf einem dünnen Grasplatze in Dejvice nächst Prag.
- — f. *coloratum* Rohl. l. c. 1931. — Spiculis minoribus, glumis vix 3 mm longis ± intense violaceis ut in var. *fallax* Klingg., sed vaginis foliorum superiorum haud vel vix inflatis. Dürre Grasplätze bei Dejvice nächst Prag.
- † **Plantago psyllium** L. — Hinter dem Smichover Bahnhof in Prag. Aus dem Süden eingeschleppt.
- Poa compressa** L. f. *flavescens* Rohl. l. c. 1931. — Spiculis intensive flavoviridibus. Bei Pecr im Riesengebirge.
- P. nemoralis* L. f. *racemosa* Rohl. (Věstník klubu přírod. Brno, 1922.) — Panicula simplex racemosa pauciflora, spiculis (3—5) solitariis longe pedunculatis erecto-patulis. Bei Trčkov im Adlergebirge. (A var. *rariflora* A. Gr. differt culmo elatiore (5—6 dm), foliis supra scabridis et colore totius plantae cano-viridi.)
- P. nemor.* f. *uniflora* Mert. Koch discedit spiculis unifloris, planta nostra autem gaudet spiculis 5—7 floris.
- P. trivialis* L. f. *gracilis* Rohl. l. c. 1931. — Gracilis, culmo et vaginis superioribus levibus (nec scabris), paniculae ramis infimis paucis 1—3, (—4), spiculis minoribus 2—3 floris. Bei Choceň.
- Polystichum lonchitis** Roth. — Unweit von Eisenstein. Aus dem Böhmerwalde bisher unbekannt. (G ü t t l e r.)
- Potentilla Opicüi** Domin. — Am Valdrande bei Hradiště nächst Königinhof. (T r a x l e r.) Aus Ostböhmen bisher nicht bekannt.
- P. procumbens* × *silvestris*. Bei Mrklov nächst Jilemnice in Nordböhmen. (T r a x l e r.)

- P. procumbens* × *reptans*. — Bei Bohdaneč in Ostböhmen. (V o d á k.)
Eine schöne Mittelform!
- P. thyrsoflora* Willd. — Sehr häufig auf der Bahnstrecke bei Račice
nächst Königgrätz. (K r ě a n, T r a x l e r.)
- Prenanthes** *purpurea* L. var. *pseudopetiolata* Rohl. l. c. 1924. — Foliis
omnibus multo angustioribus (3)—5—8—(12) mm latis longissi-
me lanceolatis integerrimis, non solum ad apicem, sed etiam in
basin longe attenuatis, longum petiolum simulantibus, basi non vel
obsolete amplexicaulibus. Forma haec verosimiliter sine transitu
mutatione orta et cum var. *angustifolia* Koch (= Pr. tenuifolia L.)
non identica. — Ziemlich häufig in einem feuchten Walde oberhalb
Spindelmühle im Riesengebirge.
- Pulmonaria** *angustifolia* × *officinalis*. Auf dem Berge Kajba im Mittel-
gebirge. (Š i m r.)
- † **Rapistrum** *rugosum* All. — Nächst Bahnhof in Josefstadt. (T r a x-
l e r.) Smichover Bahnhof in Prag. (R o h l e n a.)
- † **Rhagadiolus** *stellatus* (L.) Gärtner. — Hinter dem Smichover Bahn-
hof in Prag häufig. Aus dem Süden eingeschleppt.
- Roripa** *silvestris* Bess. f. *brevipetala* Rohl. l. c. 1925. — Petalis minori-
bus calycem aequantibus. Sehr häufig bei Falkenau an der Eger.
- R. austriaca* (Crantz) Bess. f. *scabrifolia* Rohl. l. c. 1928. Tota planta den-
sissime pilis brevissimis tecta. — Bei Prag und Choceň.
— — f. *glaberrima* Rohl. l. c. 1928. — Tota planta glaberrima. Selte-
ner bei Prag.
- ? **Rumex** *odontocarpus* Sándor. — Auf einer Lehne »Na květníku«
bei Jabkenice nächst Nymburk (V i l h e l m.) Da die Pflanze nicht
komplet gesammelt wurde, ist die Bestimmung nicht sicher, aber
die Früchte sind dieselben wie an den Pflanzen aus Ungarn.
- † **Scorpiurus** *subvillosus* L. — Auf dem Eisenbahndamm bei Zlíchov
nächst Prag — aus dem Süden eingeschleppt.
- Scrophularia** *nodosa* L. f. *subverticillata* Rohl. l. c. 1924. — Foliis
mediis verticillum ± irregulare (3—4) formantibus. — In mehre-
ren Exemplaren bei Jablonec an der Iser.
- Secale** *cereale* L. f. *pauciflorum* Beck Fl. N. Ö. — Sehr häufig auf einer
Torfwiese unter dem Plöckenstein im Böhmerwalde.
- Senecio** *Jacobaea* L. f. *incisiflorus* Rohl. l. c. 1922. — Ligulis ± pro-
funde incisivis vel in 2—4 laciniis partitis. Zahlreich bei Modřany
und Ondřejov nächst Prag.
- S. vernalis* × *vulgaris*. — Sehr häufig am Holešovicier Hafen in Prag.
- Sedum** *spurium* M. B. f. *albiflorum* Rohl. l. c. 1926. — Bei Jáchymov
im Erzgebirge (P o d h a j s k á.)
- † **Sisymbrium** *orientale* L. — Dejvice bei Prag, eingeschleppt.
- † **Sorghum** *halepense* Pers. — Am Hafen bei Libeň in Prag verwildert.
- Stachys** *annua* L. var. *adenocalyx* (C. Koch) Vandas. Vršovicier Anla-
gen in Prag (S c h a f f e r.)
- † **Tragopogon** *porrifolius* L. — Im Schlossgarten in Černikovice nächst
Reichenau a. d. Kněžna eingeschleppt (S o u č e k.)

- Trifolium alpestre** L. f. *latifolium* Rohl. l. c. 1922. — Foliolis brevioribus et latioribus quam in typo, ellipticis vel oblongo-ellipticis, eis Tr. medii similibus. — Im Walde »Horka« bei Ondřejov nächst Prag.
- Tr. alpestre* L. f. *subochroleucum* Rohl. l. c. 1929. — Corollis pallide ochroleucis. — Bei Bohdaneč nächst Pardubice (V o d á k.)
- † *Tr. angustifolium* L. — Auf einem Felde bei Stračov nächst Nechanice eingeschleppt.
- Tr. arvense* L. var. *alopecuroides* Rouy et Fouc. — Zahlreich bei Holešovice nächst Prag.
- † **Trinia glauca** (L.) Dum. — In Třeboň (Wittingau) verwildert (P r o k e š.)
- † **Turgeneia latifolia** Hoffm. — Bei Roztoky nächst Prag eingeschleppt (R o z u m.)
- Ventenata dubia** F. Schultz f. *scabriculum* Rohl. l. c. 1931. — Culmo sub panicula scabro. — Bei Kaaden an der Eger sehr häufig.
- Veronica Dillenii** Crantz. f. *exilis* Rohl. l. c. 1925. — Gracilis, caulis tenuis, habitu *V. campestris* similis, sed capsulae forma et stylo exserto cum *V. Dillenii* congruens. Sehr häufig bei Lodenice nächst Prag.
- V. chamaedrys* L. f. *suborbiculata* Rohl. l. c. 1925. — Folia media et inferiora suborbiculata. Bei Lodenice nächst Prag.
- V. spicata* L. f. *perglandulosa* Rohl. l. c. 1925. — Caulibus (etiam in parte inferiore) foliisque minute sed densissime glandulosis. Bei Čimice nächst Prag häufig.
- V. teucrium* L. f. *brevibracteata* Rohl. l. c. 1928. — Bracteis minimis, pedicello fructifero 2—4plo brevioribus. Prácheň bei Horažďovice (M a l o c h.)
- — f. *incisifolia* Rohl. l. c. 1928. — Corolla laciniis obtusis et calycibus glabris ut in var. *pseudochamaedrys* Jacq., sed folia profunde incisia. — Auf dem Hofe der Burg Rábí bei Horažďovice (M a l o c h.)
- Vicia dumetorum** L. f. *angustistipulata* Rohl. l. c. 1922. — Stipulis anguste lanceolatis integris, solum nonnullis majoribus basi 1—2 dentibus obsitis. — Am Waldrande bei Ondřejov nächst Prag.
- V. sepium* L. f. *leiocalyx* Rohl. l. c. 1928. — Calyx glaberrimus. Sehr häufig bei Friedrichswald im Riesengebirge (R o h l e n a.) Auch bei Pilsen (M a l o c h.)
- V. tetrasperma* (L.) Mönch. f. *luxurians* Rohl. l. c. 1925. — Pedunculis saepissime usque 4floris, leguminibus 5spermis. Leguminibus quinquespermis revocat f. *Papali-Pontificalem* A. Gr., sed haec forma omnibus partibus maior est; planta nostra a typo habitu non differt. — Auf dem Hügel Horka bei Kostomlaty im Mittelgebirge (Š i m r.)
- † **Vulpia ciliata** (Danth.) Lk. — Hinter dem Smíchover Bahnhof eingeschleppt.
- Woodsia ilvensis** R. Br. — Bei Ober-Reichenstein im Böhmerwalde (H r o b a ř.) In Böhmen sehr selten!