

## CONSPECTUS FLORÆ MONTENEGRINÆ

*Auctore  
Josef Rohlena,  
Praha*

In meis sex viis botanicis, quas in Montenegro (a. 1900—1906) feci et quae plus duodecim mensibus erant, hos fines, qui nos plantarum copia maxime tenent, huc illuc peragravi et maximam vim plantarum, quam multorum monographorum auxilio pertractavi, collegi.

Hic labor initio difficilimus erat, quia litterae botanicae, quae ad terras Balcanicas pertinent, in innumerabiles fontes, qui saepe vix sunt assequendi, diffusae sunt. Quae res autem novissime in melius commutatae sunt, cum dr. Aug. Hayek, illustris ille botanicae disciplinae investigator Vindobonensis, opus gravissimum quidem, sed praemio dignum suscipere ausus esset, quo studiorum effectus frequentium botanicae disciplinae investigatorum in unum opus contulit, quod inscribitur: „Pros dromus Florae peninsulae Balcanicae. Post mortem auctoris edendum curavit F. Markgraf“ (in Fedde Repertor.). Quod est certe novum in Balcanicis floribus explorandis spatium. Quo praestanti opere factum est, ut et ipse, cum me multi mei eius-

dem disciplinae sodales et amici hortarentur, hunc librum scribere auderem, quo iam prima fundamenta horum, quibus delectamur finium circumscriptionis offeruntur.

Mihi imprimendis libris gravibus temporibus coacto curandum erat, ut liber quam astrictissimus esset, quare commemorationes aliorum auctorum quam paucissimas induxi, et diagnoses et adnotationes tantum eas praebeo, quae ad celerem rerum cognitionem praecipue in iis regionibus peregrinantibus prosint. Induxi etiam nonnulla indicia (localitates) dubia, ut in suis scriptis Beck et Hayek fecerunt, sed errores manifestos omisi. Confinium, cuius flora hoc libro tractatur, idem est atque ante annum 1913. Adhibui tantum ad septentriones spectans fastigium montium Prokletija et loca, quae ad Gusinje, Plav et Berane oppida circumiacent. Postremo omnibus, qui me in meo labore adiuvabant, maximas ago gratias. Hi sunt viri doctissimi: Pragae: M. Deyl, K. Domin, J. Dostál, K. Kavina, I. Klášterský, F. A. Novák, M. Pulchart, J. Velenovský. Vin-dobonae: A. Ginzberger, H. de Handel-Mazzetti, †A. Hayek, E. Janchen, H. Neumayer, K. Rechinger fil., K. Ronniger, J. Stadelmann et A. Baldacci (Bononiae), W. Becker (Rosian pr. Magdeburg), Fr. Fedde (Berolinensi), †B. Horák (Rokycany — Bohemia), St. Horvatić (Ljubljana), J. Hruba (Brunae), K. Malý (Sarajevo), Sw. Murbeck (Lund), Fr. Petrak (Hranice — Moravia), Z. de Szabó (Budapestini), G. Širjaev (Bru-nae), †Th. Wolf (Dresden), C. H. Zahn (Karlsruhe).

Optime autem de meo opere meriti sunt: „Kuratorium českého badatelského fondu při Národní radě badatelské“ (Pragae) et excellens Ministerium instructionis publicae (Pragae), qui me aliquantis impensis foventes effecerunt, ut hoc opus edere possem, denique „Societas Botanica Bohemica“ (Pragae), quae hunc librum edendum curavit.

Pragae mense Maio a. MCMXLI.

## ABBREVIATIONES

Abbreviationes nominum collectorum:

Ad	= Adamović L.	Ko	= Košanin N.
Ba	= Baldacci A.	Kš	= Kašpar A.
B	= Beck v. Mannagetta G.	Ld	= Lindberg fil.
Bo	= Bornmüller J.	Lo	= Loschnigg Vil.
Boš	= Bošnjak K.	Ma	= Malý K.
Če	= Čelakovský fil.	No	= F. A. Novák
Čer	= Černjavskí P.	Pč	= Pančić J.
De	= Deyl M.	Pej	= Pejović Kr.
Df	= Dörfler Ign.	Pt	= Pantocsek J.
Do	= Dostál J.	Ro	= Rohlena J.
Eb	= Ebel Wilh.	Sa	= Sagorski E.
Gi	= Ginzberger A.	Si	= Sillinger P.
Ho	= Horák B.	Sk	= Skřivánek V.
Ht	= Horvat I.	Sz	= Szyszlowicz Ign.
Ja	= Janchen Erv.	To	= Tommasini Jos.
Ki	= Kindt E.	Vh	= Vierhapper Friedr.
Kn	= Kneucker A.		

Abbreviationes ceterae:

alp. = alpinus; calc. = calcareus; cal. = calidior; coen. = coenobium; dic. = dicio; distr. = districtus = nahija; glar. = glareosus; gram. = graminosus; fin. = fines; fl. = flumen; inf. = inferior; lac. = lacus; lapid. = lapidosus; medit. = mediterraneus; nah. = nahija = districtus; m. = mons; mont. = montanus; pr. = prope; reg. = regio; riv. = rivus, rivulus; rup. = rupestris; sax. = saxosus; subalp. = subalpinus; spec. = species; sup. = superior; territ. = territorium; v. = vallis; verg. = vergens.

Adnotatio: Plantae \* asterisco designatae non sunt in Hayek: „Prodromus Florae peninsulae Balcanicae“ e Montenegro indicatae. — Numeri ante nomina specierum sunt iidem ut in HAYEK: Prodromus Florae peninsulae Balcanicae.

## **Lycopodiaceae**

*Lycopodium* L.

1. *L. selago* L. — In silvis et rupestr. reg. subalp. et alpi-  
næ. — Kom Kučki (Ba), Kom Vasojevički, Vojnik, Sjekirica  
planina (Ro), ca 1600—2200 m.

## **Selaginellaceae**

*Selaginella* SPRING.

6. *S. selaginoides* (L.) LK. (= *S. ciliata* OPIZ). — In  
pascuis alp. — Circa lacum Riblje jezero infra m. Durmitor  
(Pt); Barno jezero et Valoviti do in monte Durmitor (Ro).

7. *S. helvetica* (L.) LK. — In rupestr. montis Kom  
(Pt); Rijeka (Kn); Carine sub monte Kom (Ba).

8. *S. denticulata* (L.) LK. — Folia inferiora acuminata  
superioribus parum (nec duplo) maiora, spicae sporangiiferae  
sessiles. — In rupibus et muris dic. medit. ad Ulcinj (Ro).

## **Equisetaceae**

*Equisetum* L.

9. *E. telmateia* EHRH. — In irriguis silvestr. vallis  
Morača sup. (Pč); in valle fl. Piva ad coenob. Piva et Mratinje  
sub monte Maglić (Ro); inter Spuž et Danilovgrad (Ro).

- f. *comosum* MILDE. — In valle fl. Tara sub monte  
Kom, Nižin luk pr. Kolašin, Šavnik (Pt); in fossis ad Ulcinj,  
Vir, Podgorica et Andrijevica (Ro).

- f. *humile* ASCH. GR. (Syn. I:127). — Ad Vir (Ro).

10. *E. arvense* L. — In agris, incultis et ad vias non  
frequens. — Šavnik, Barno jezero sub m. Durmitor, Lijeva  
rijeka (Ro).

11. *E. sylvaticum* L. — In silvis reg. subalp. sub monte  
Durmitor (Pč, Ro).

— — subf. *capillare* (HOFFM.) MILDE. — Circa Lipovo pr. Kolašin (Pt).

12. *E. palustre* L. — In paludosis ad Viruša dol sub monte Kom (Pt); Mokro sub m. Dziebeze (Sz); Barno jezero sub monte Durmitor, Lukavica planina et circa Andrijevica (Ro).

— — f. *simplicissimum* A. BR. — Barno jezero sub monte Durmitor.

13. *E. limosum* L. — In paludosis reg. alp. et subalp. — Mokro sub m. Dziebeze (Sz); ad lac. Rikavac distr. Kuči (Sz); Lukavica planina (Ro).

14. *E. ramosissimum* DESF. — In arenosis, lapid. et incultis ad Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica, Danilovgrad dic. mediter.; rarius ad Andrijevica reg. subalp. (Ro).

— — f. *altissimum* A. BR. — Cum typo ad Bar et Ulcinj (Ro).

15. *E. hiemale* L. — In silvis sub monte Durmitor: Crno jezero (Pč); Barno jezero (Ro); etiam in valle fl. Zeta pr. Danilovgrad dic. medit. (Ro); Vučji potok pr. Vermoš planina ad confines Albaniæ in f. *maius* MILDE (Df).

## Ophioglossaceæ

*Ophioglossum* L.

22. *O. vulgatum* L. — In pratis humidis ad Ulcinj et Danilovgrad reg. medit. (Ro).

*Botrychium* SW.

24. *B. lunaria* (L.) SW. — In pascuis alpinis frequens: montes Maglić, Bioče, Ledenača distr. Piva (Ro); Durmitor (Pč, Ht); Kom (Pt, Ho, Ro); Sinjavina (Pt, Ba, Ro); Sjekirica, Želatin, Štavna, Krivi do, Bjelastica, Javorje, Štirni do, Lola planina; etiam in m. Lovčen (Ro).

## Polypodiaceæ

*Polyodium* L.

29. *P. vulgare* L. var. *boreale* BECK. — In saxosis et silvis reg. subalp.: Skrobotuša sub m. Vila (Sz); Perućica sub m. Kom (Sz); Javorje planina et supra coen. Morača (Pč);

Andrijevica, Kolašin (Ja); ad latera montis Lovćen, in valle fl. Piva, Lukavica planina, Jerinja glava et Sjekirica planina (Ro). — — f. *rotundatum* MILDE. — Cum typo ad Njeguši (Ro). — — var. *serratum* WILLD. — In fissuris rupium dic. mediter. ad Dobra Voda pr. Bar et circa Podgorica (Ro).

*Pteridium* SCOP.

33. *P. aquilinum* (L.) KUHN. — In silvis, fruticetis et incultis ubique frequens. Saepe cum f. *lanuginosum* (BORY) LUERS.

— — f. *pinnatilobum* WARNST. — Ad Ulcinj et Bar; inter Nedajno et Crkvica distr. Piva (Ro).

— — var. *Gintlii* (ROHL.) KUEMM. [= *Pteris aquilina* var. *Gintlii* ROHL. (SBGW. XXXIX: 35, 1902)]. — Laciniis angustis, linearis-lanceolatis, 5—7-plo latitudine longioribus, in parte inferiore pinnatisectis (saepissime tantum unilateraliter), dimidio superiore in lobum angustum abeuntibus. — Cum typo in fruticetis ad Bar (Ro).

*Adiantum* L.

34. *A. capillus-Veneris* L. — In saxis madentibus dic. mediter. frequens. — Ad coenob. Morača (Ba, Pč); circum Rijeka (Pt, Ho, Ba, Kn, Ro); Bioče (Ja); Ulcinj, Bar, Vir, Boljevići, Podgorica et Danilovgrad (Ro).

*Cheilanthes* SW.

37. *Ch. fragrans* (L.) WEBB. et BERTH. — Pinnulae foliorum margine glabrae vel breviter ciliatae. — In rup. calc. ad Bar dic. medit. (Ro).

38. *Ch. persica* (BORY) METT. — Pinnulae foliorum margine dense longeque ciliatae. — Ad rupes et muros dic. mediter., ad Vir, Podgorica, Bioče (Ro); in valle fl. Morača usque ad Vilac (Ja); circa Bar (Ro, Do).

*Blechnum* L.

41. *B. spicant* (L.) WITH. — In silva montis Sjekirica planina supra Andrijevica, ca 1600 m.; sub monte Žijovo, distr. Kuči (Ba); in valle flum. Biogradska rijeka pr. Kolašin (Muravjev).

*Phyllitis* HILL.

42. *Ph. scolopendrium* (L.) NEWM. — In saxosis umbrosis sub monte Lovćen (Pč, Ba, Ro); Riječani (Ho); Andrijevica (Ro, Ja); Vir (Ro); etiam in m. Ranisava pr. Durmitor (Ro).

— f. *angustum* (ROSSI) HAY. — Mali Šavnik in monte Lovćen (Ro).

*Asplenium* L.

46. *A. viride* HUDS. — In rupestr. reg. subalp. et alpinæ frequens, etiam ad Andrijevica, ca 900 m.

— f. *incisocrenatum* MILDE. — In monte Lovćen cum typo (Ro).

48. *A. trichomanes* L. — Ad rupes et muros frequens. — In reg. mediter. ad Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Rijeka, Danilovgrad ubique vulgaris (Ro); ad Njeguši (Sz, Ro); Cetinje, Ostrog (Pč); Andrijevica, Kolašin (Ro, Ja); ad Šavniki, coen. Piva (Ro); etiam in reg. subalpina et alpina: Javorje planina (Pč); Hum Orahovski, m. Dziebeze et Kostića distr. Kuči (Sz, Ba); in decliv. m. Kom (Pt, Ho). (An etiam in m. Durmitor? ipse non vidi).

— f. *Harovii* MILDE. — Cum typo ad Ulcinj (Ro).

— f. *umbrosum* MILDE. — Ad Podgorica (Ro).

— var. *pseudadulterinum* ROHL. (SBGW. XXXIX:36, 1902). — Rachis apice viridis. — In calcareis inter Kotor et Njeguši (Ro).

— var. *microphyllum* MILDE. — Valać rupe in monte Lovćen (Ro).

53. *A. adiantum-nigrum* L. subsp. *onopteris* HEUFL. — In rupest. calc. reg. mediter.: Rijeka (Pt); Mali Lonac in m. Sutorman (Pč); ad Ulcinj, Bar, Vir, Danilovgrad (Ro); etiam in valle flum. Lim pr. Andrijevica solo calc. legit JANČHEN (an ad subsp. *nigrum* HEUFL. pertinens?).

54. *A. fissum* KIT. — In glareosis calcareis alpinis. — In monte Kom et Durmitor (Pt, Ro, De, Si); Velka Jastrebica (Pč); Lovćen (Ho, Ro); sub cac. montis Vila et Rupa Konjska distr. Kuči (Sz); supra lac. Rikavac distr. Kuči (Ba); Lukavica planina (Ho); Maglić ad fines Bosniae, Ledenica, Vojnik, Bjelastica, Jablan vrh et Gradište in Sinjavina planina (Ro).

— f. *tenuissimum* BECK. — Cum typo in m. Maglić (Ro).

55. *A. ruta-muraria* L. — In saxosis et ad muros in tota dizione vulgaris.

— f. *Matthiolii* (GASP.) HEUFL. — Ad Bioče pr. Podgorica (Pt).

— f. *Brunfelsii* HEUFL. — Ad latera m. Rumija supra Bar (Do).

57. *A. septentrionale* (L.) HOFFM. — In rupestr. vallis Tara pr. Kolašin (Ja) et in m. Bjelastica planina, 2100 m (Ro). Stirps in territ. rara.

### *Ceterach* GARS.

58. *C. officinatum* DC. — In rupestr. et ad muros frequens. — In dic. mediter.: Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Rijeka, Danilovgrad etc. vulgaris (Ro); ad Cetinje, Njeguši (Pč, Pt, Ho, Ro); Monastir Duga (Pt); Orlova skala sub monte Kom (Pt, Ho); Medun, m. Dziebeze et Hum Orahovski distr. Kuči (Sz); Bioče, Vjetrnik, Jablan, Lopate et coenob. Morača (Ja); circa Andrijevica et ad pedem m. Jerinja glava et Balj rarius in sax. calc. (Ro); Mali Durmitor (Pt); Vermoš ad fines Albaniæ (Df).

— f. *platylobum* GEYSENH. — Cum typo in m. Lovćen (Ro).

— f. *crenatum* MOORE. — Rarius cum typo.

### *Athyrium* ROTH.

59. *A. filix-femina* (L.) ROTH. — In silvis et ad rivulos reg. alp. et subalpinae. — Viruša dol infra Crna planina (Pt); ad latera m. Sutorman (Pč); Perućica sub monte Kom, Jerinja glava et in valle Jelovica pr. Andrijevica (Ro); in valle fl. Tara inter Han Garančić et Kolašin; supra coenob. Morača, in valle fl. Lim ad Andrijevica (Ja).

— var. *fissidens* MILDE. — Crno jezero ad ped. m. Durmitor (Ro) et ad latera m. Lovćen (Ro).

\*60. *A. alpestre* (HOPPE) RYLANDS. — In saxosis m. Kom (Pt). E penins. Balc. solum e Bosnia notum.

### *Nephrodium* RICH.

61. *N. dryopteris* (L.) MICHX. — In silvis et saxosis reg. subalp. et alpinae. — Pašina Voda sub m. Durmitor,

m. Maglić ad fin. Bosniae, Kom Vasojevički, Lovćen (Ro); Vučji potok in Vermoš planina ad fines Albaniae (Df).

62. *N. Robertianum* (HOFFM.) PRANTL. — In sax. calc. reg. subalpinae. — In valle flum. Lim pr. Andrijevica (Ba, Ro, Ja); supra coen. Morača (Ja); in m. Lovćen (Ro); Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro); in valle fl. Piva pr. Mračtinje, m. Ranisava et Durmitor (Ro).

64. *N. thelypteris* (L.) STREMP. — In arundinetis ad Sinjac pr. Vir (Pč).

66. *N. filix-mas* (L.) RICH. — In silvestr. et saxosis reg. subalp. et alpinae. — Ad ped. m. Durmitor et in valle fl. Tara (Pč); in m. Maglić et Hum Orahovski distr. Kuči (Sz); supra Cetinje (Ba); circa Kolašin et Andrijevica (Ja, Ro); ad latera m. Lovćen (Ro, Pej).

— f. *deorsolobatum* MILDE. — Dubovički krši et Trešnja in m. Lovćen (Pej, Ro).

— f. *crenatum* MILDE. — In valle fl. Perućica sub m. Kom (Pt); Trešnja et Zalazi supra Njeguši (Ro, Pej); ad latera m. Maglić (Ro).

67. *N. Villarsii* (BELL.) BECK. subsp. *rigidum* (HOFFM.) HAY. — In glareosis alp. et subalpinis. — Crvena Stijena sub m. Durmitor (Pč, Ro); in m. Dibala distr. Kuči (Ba); Jezerski vrh, Mali Šavnik et Štirovnik in m. Lovćen (Ho, Ro); Korita rovačka et Štirni do pr. Lukavica planina, Ledenica, Javorje et Ranisava (Ro); Čirova pećina in m. Durmitor (De, Si).

— f. *fallax* (MILDE) HAY. — Piperska Lukavica, cca 1900 m (Ro).

— f. *nivale* BECK. — In cacumine montis Lovćen (Ro).

— subsp. *pallidum* (BORY) HAY. — In dumetis et saxosis calcar. reg. infer. pr. Bar, Ulcinj, Rijeka, Boljevići, Vir et Podgorica frequens (Ro); ad latera m. Vila (Sz); in m. Vjetnik inter Podgorica et Kolašin (Ja), in monte Pej supra coenob. Morača (Ja); ad Cetinje (Kn, Ld) et Njeguši (Ro, Ld); ad latera montis Lovćen (Ro, Ki, Gi).

Folia sunt aut bipinnatisecta [f. *meridionale* (MILDE) HAY.], aut tripinnatisecta [f. *australe* (TEN.) HAY.]

— f. *eglandulosum* ROHL. sub *Aspidium rigidum* var. *australe* (SBGW. XXXIX: 36, 1902). — „Folia fere eglandulosa“. — Rarius cum typo ad Vir (Ro).

68. *N. spinulosum* (MUELL.) STREMPEL. — In silva<sup>re</sup>  
ticis humidis raro. — Ad Njeguši sub monte Lovćen (Sz); in  
valle flum. Lim pr. Berane, in valle fl. Jelovica pr. Andrijevica  
et in m. Bjelastica supra Kolašin (Ro).

*Polystichum* ROTH.

69. *P. lonchitis* (L.) ROTH. — In rupestr. reg. alp.  
et subalp.: m. Maglić, Ledenica, Lovćen, Balj, Sjekirica, Želetin,  
Bjelastica, Sinjavina; Piperska Lukavica, Durmitor, Kom, Pivljan,  
Žijovo, Gradište, Hum Orahovski etc. (Pt, Pč, Ba, Sz,  
Ja, Ro, De, Si).

× *P. lobatum* × *lonchitis* MURB. (= *Aspidium illyricum* BORB.). — Zakamen sub Ledenica planina cum parentibus (Ro).

70. *P. lobatum* (HUDS.) PRESL. — In rupestr. silvat.  
reg. subalp. et alp. — In m. Hum Orahovski (Sz), Skroboča  
sub m. Kom (Sz), Planinica distr. Kuči (Ba), Varda sub m.  
Kom Vasojevički (Ba, Ho, Ja); in calcar. vallis flum. Lim pr.  
Andrijevica (Ja, Ro); Lovćen, Velki Krš pr. Andrijevica, Želetin,  
Jerinja glava et Balj (Ro); in reg. infer. etiam ad Rijeka  
et Cetinje (Ro).

— subf. *auriculatum* (MILDE) HAY. — Inter Cetinje et  
Rijeka (Ro).

— subf. *longilobum* (MILDE) HAY. — Crno jezero infra  
Mali Durmitor (Pt).

71. *P. setiferum* (FORSK.) WOYNAR et

72. *P. Braunii* (SPENN.) FÉE. A cl. PANTOCSEK e  
Montenegro indicatum, sed sine loco natali.

*Cystopteris* BERNH.

74. *C. fragilis* (L.) BERNH. — Ad muros et rupes per  
totam dicionem frequens. — In m. Hum Orahovski et Dziebeze  
distr. Kuči (Ba); Kom Kučki (Ho); Lovćen (Pč, Ro); Andrijevica,  
Kolašin (Ro, Ja); coenob. Morača (Ja); m. Pivljan (Ja);  
Njeguši, Vir, Bar, Ulcinj etc. (Ro).

— f. *anthriscifolia* (HOFFM.) KOCH. — Cum typo ad Bar,  
Vir, Njeguši, Ulcinj et Andrijevica (Ro).

— f. *cynapiifolia* (HOFFM.) KOCH. — In alp. mont. Že-

letin pr. Andrijevica et in m. Gradište supra Kolašin, Valač rupe in m. Lovćen (Ro).

— — f. *angustata* (HOFFM.) KOCH. — In sax. Velki Krš supra Andrijevica (Ro).

75. *C. regia* (L.) DESV. — In rupestr. reg. alpinae non frequens. — In m. Kom, Durmitor, V. Maglić distr. Kuči, Crna planina, Gradište supra Kolašin (Pt, Pč, Sz, Ba, Ho, Ro); in reg. media etiam ad Milušina pećina (nahija Katunska) ca 900 m (Ro); in m. Prokletija ad fin. Albaniae (Df); etiam in m. Lovćen cum f. *subfragilis* (MILDE) HAY. (Ro).

### **Salviniacae**

*Marsilea* L.

79. *M. quadrifolia* L. — In lacu Scodrano (Skadarsko blato) ad Plavnica (Ro, Ja).

### **Coniferae**

*Taxus* L.

81. *T. baccata* L. — In rupestr. silvat. m. Durmitor (Pt, Pč); m. Kom (Pt, Ho); in valle Skrobotuša distr. Kuči (Sz); m. Lovćen, Vojnik (Ro); circa Andrijevica et Šavnik (Ro).

\* — — var. *ericoides* CARR. — Ad latera m. Lovćen cum typo, a quo foliis angustioribus apice longius attenuatis differt (Pej, Ro).

*Juniperus* L.

83. *J. communis* L. subsp. *eucommunis* HAY. — In rupestr. et silvis. — Ad ped. m. Durmitor pr. pagum Kovčice (Pt); circa Grahovo (Pč); ad Medun distr. Kuči (Sz); Njeđuši (Ro); in m. Pivljan (Ja); circa Andrijevica et Kolašin (Ro, Ja); in societ. *J. nana* WILLD, sed sine formis intermed. (Ja).

— — — var. *intermedia* (SCHUR) SANIO. — Srablje jezero sub m. Durmitor, ca 1700 m.

— — subsp. *nana* (WILLD.) HAY. — In rupestr. reg. subalp. et alpinae frequens. — In m. Kom (Pt, Ho, Ro); m. Durmitor (Pt, Pč, Ro); m. Hum Orahovski et m. Dziebeze distr. Kuči (Sz); Sinjavina planina (Ba, Ro); m. Zeletin, Jerinja glava,

Sjekirica, Bjelastica et Lovćen (Ro); supra Rikavac ad fines Albaniae (Df).

84. *J. oxycedrus* L. — In rupestr. reg. calidioris. — Ad latera m. Lovćen (Pč, Pej, Ro); circa Njeguši, Ulcinj, Vir (Ro); ad Rijeka (Ho, Ro); in valle flum. Piva sub Goransko et Borškovići (Ro); Bioče pr. Podgorica (Ja); ad latera m. Vjetrenik usque ad Klopot (Ja); Crna planina distr. Bratonožići (Ba); Boljevići pr. Vir (Do).

88. *J. sabina* L. — In rup. reg. alpinae et subalp. raro. — In m. Durmitor (Pt, Pč); m. Kom (Pt); m. Smrekovac et Oštari Kuk pr. Maglić ad fines Hercegovinae; in valle fl. Piva supra Mratinje, m. Visitor supra Andrijevica (Ro); Buni jezerce in m. Prokletija ad fin. Albaniae (Df).

### *Cupressus* L.

90. *C. sempervirens* L. var. *pyramidalis* (TARG. TOZZ.) NYM. — In reg. medit. ad Bar, Ulcinj, Podgorica et in Crmnicka nahija culta et subspont.

### *Abies* MILL.

91. *A. alba* MILL. — In silvis subalpinis. — In m. Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ba, Ro); in m. Dziebeze et in v. Skroboštuša distr. Kuči (Sz); in m. Maglić ad fin. Bosniae; Ledenica et Sjekirica planina (Ro).

### *Picea* DIETR.

94. *P. vulgaris* LK. (= *P. excelsa* LK.). — In reg. subalp. constituit vastas silvas. — In Durmitor (Pč, Ba, Ro); m. Kom, Sjekirica planina, Vojnik (Ro); in v. fl. Tara usque ad Kolašin (Ro, Ja); circa Gusinje et Plav sub Prokletija (Sz).

### *Larix* MILL.

95. *L. decidua* MILL. — In silva ad ped. m. Kom versus vallem Perućica in declivibus supra Konjuhe raro; forsitan culta (Ro).

### *Pinus* L.

96. *P. sylvestris* L. — In silvis reg. subalp. m. Kom et Durmitor (Pt, Ro); Maglić, Ledenica, Hasanac, Zeletin (Ro).

97. *P. halepensis* MILL. — Circa Vir, Bar et Ulcinj dic. medit. non frequens (Eb, Ro, Ba).

100. *P. mughus* SCOP. — In reg. alpina in m. Durmitor (Pt, Pč, Ba, Ro); m. Maglić ad confines Bosniae et in m. Vojnik (Ro).

101. *P. Heldreichii* CHRIST. (= *P. leucodermis* ANT.) In m. Dziebeze, Hum Orahovski, Širokar et in v. fl. Perućica (Sz); ad latera m. Kom Vasojevički (Ro, Lo); in m. Lovćen (Ad, Pej, Ro), Fuša Rudnices sub m. Prokletija ad fin. Albaniae (Df); Sinjavina planina sub m. Jablanov vrh (Reiser, Bš); Gornja Morača (Reiser fide Bš); Durmitor: m. Žuta greda supra Dobri do (Bš).

102. *P. nigra* ARNOLD. subsp. *nigra* (ARN.) HAY. — Sub m. Kom (Pt); circa Andrijevica (Ja, Ro); Ledénica planina (Ro); Sinjavina planina (Ba). E m. Lovćen a cl. PANČIĆ indicata potius ad *P. Heldreichii* pertinet.

103. *P. pinaster* SOL. — In dic. mediter. ad Vir raro culta (Eb).

105. *P. peuce* GRIS. — In silv. reg. subalp. distr. Vasojeviči: m. Hasanac, Zeletin, Sjekirica (Pč, Ba, Ro); inter Plav et Dečani (Df); confer ROHLENA (Allg. bot. Zeit. 1907).

## Ephedraceae

*Ephedra* L.

106. *E. campylopoda* C. A. MEY. (= *E. fragilis* b) *campylopoda* STAPF — In sax. et frutic. dic. medit. non frequens. — Ad Ostrog, Rijeka, Drušići, Bioče, Medun, Dukla et Podgorica (Ba, Ro, Ja); circa Bar et Ulcinj (Ro). E valle flum. Perućica ad Konjuhe pr. Andrijevica a cl. BALDACCI (Altre notizie 59.) indicata. Ego non vidi. Probandum sit!

\*107. *E. distachya* L. — In arenosis marit. ad Pristan Bar; in rup. Pestingrad supra sinum Rhizonicum (Ba).

\*108. *E. maior* HOST. — In arenosis maritimis ad Toplica prope Bar (Do).

## Betulaceae

*Betula* L.

109. *B. pendula* ROTH. — In silvis et ad rivulos reg. subalp. — In valle flum. Perućica; ad Lipovo sub Sinjavina

planina (Ba, Pt); Javorje planina et sub monte Kom (Pč, Ba); in valle fl. Tara pr. Kolašin (Ja, Ro); Rudo brdo versus Kralje pr. Andrijevica (Ja, Ro); Zakamen sub Ledenica planina distr. Piva (Ro); Tušina pr. Šavniki (Ba).

110. *B. pubescens* EHRH. — In silvis et turfosis m. Vojnik, Ledenica planina et circa Viljuša et Andrijevica (Ro).

### *Alnus* HILL.

112. *A. incana* (L.) WILLD. — Ad ripas. — In valle fl. Tara (Pt, Pč, Ja, Ro); in silva Skrobotuša et sub Crna planina distr. Kuči (Ba); circa Andrijevica (Ho, Ro, Ja) et ad Podgorica (Ba).

— f. *hypochlora* CALLIER. — In subalp. Vermoš ad fin. Albaniae (Df).

113. *A. glutinosa* (L.) GAERTN. — In palud. et ad ripas reg. infer. et mediae. — Ad rivulum Plašnica supra pag. Lipovo pr. Kolašin (Pt); ad rip. fl. Zeta et Morača (Pč); in valle fl. Lim pr. Andrijevica (Ba, Ja, Ro); circa Vir et Plavnica (Ro); supra coen. Morača (Ja); Crmnicka nahija (Eb).

### *Carpinus* L.

114. *C. betulus* L. — In silvis reg. infer. et mediae. — In m. Vjetnik (Pt); ad latera m. Lovćen (Pč, Ro); in valle fl. Zeta et Morača (Pč, Ro); Lješanska et Katunska nahija (Ro); circa Kolašin (Ja); Lijeva Rijeka (Sz); Crmnicka nahija (Eb).

115. *C. orientalis* MILL. — In dumetis et silvis regionis calidioris. — Ad Cetinje, Grahovo, Ostrog (Pč, Ba); circa Dujevo (Ho); in valle fl. Morača usque ad coen. Morača (Ba, Ja); in m. Vjetnik decl. merid. (Ja); circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica (Ro); Crmnicka nahija (Eb).

### *Ostrya* SCOP.

116. *O. carpinifolia* SCOP. — Involucrum saccatum indivisum maturum flavescens, strobili ovales iis *Humuli lupuli* similes, gemmae obtusae; folia iis *Carpini orientalis* similia. — In dumetis regionis calid. — Ad coen. Ostrog (Pč); ad lat. m. Sutorman (Ba, Do); supra Njeguši (Ro, Gi); Zagarač supra Danilovgrad (Ro); Simunj et Lastva Čevska in nahija

Katunska; Kokoti, nahija Lješanska (Ro); supra coen. Morača, ad lat. m. Pej et in valle fl. Tara et riv. Svinjača pr. Kolašin; in valle fl. Lim pr. Andrijevica (Ja); Lukovo sub m. Vojnik (Ba); Rumija supra Bar (Do).

### Corylus L.

117. *C. colurna* L. — Petiolis foliorum et pedunculis amentorum glandulosis, foliis subtus ad nervos velutinis; involucro nuce ovato-globosa duplo longiore, infra medium sub-pinnatifido. — In dumetis regionis calidioris non frequens. — Košarica pr. Cetinje, Čeklici et Cuci in nahija Katunska (Pč); Ostrog (Ba); Dubovik inter Njeguši et Cetinje, Čevski Lisac (Ro).

118. *C. avellana* L. — In silvis et dumetis reg. mont. et subalp. — In valle fl. Morača, Zeta, Tara, Perućica et riv. Bistrica (Pt, Pč, Ja, Ro, Sz); ad pedem m. Durmitor supra pag. Kovčice (Pt); Viruša dol sub Crna planina (Sz); circa Cetinje (Pč); Njeguši, Velestovo (nahija Katunska, Ro) et Andrijevica (Ro, Ja).

— var. *schizophlamys* SPACH. — Involucro fructu multo longiore *C. colurnam* revocat, sed non in lobos lineares fisso. — Cum typo ad Šavniki et in valle flum. Perućica (Ro).

### Fagaceae

#### *Fagus* L.

120. *F. sylvatica* L. — Constituit silvas vastas in reg. subalp. totius dicionis.

— f. *moesiaca* K. MALÝ. — Folia maiora brevissime petiolata late ovata basi rotundata. — In silvis ad Biogradsko jezero pr. Kolašin (Čer). Verosimiliter etiam alibi.

#### *Castanea* HILL.

122. *C. sativa* MILL. — In silv. reg. calidioris non frequens. — Ad Dujevo (Ho), circa Vir, Ulcinj, Danilovgrad et Bar dic. medit. (Ro); etiam in valle fl. Lim pr. Andrijevica loco Vinička (Ja); Velki Mikulići sub m. Rumija, cca 780 m (Do).

*Quercus* L.

123. *Q. cerris* L. — In silvis et dumetis reg. calidioris. — Circa Martiniči, coenob. Duga, Lukovo et Šavniki (Pt, Ro); ad latera m. Sutorman (Pč); supra coen. Morača (Pč, Ja); circa Viljuša et Andrijevica (Ro); etiam in valle fl. Piva sub Borkovići et Goračko (Ro); Njeguši (Ro, Gi); ad latera m. Sutorman et Kosa supra Bar (Do).

— var. *austriaca* (WILLD.) LOUD. — Lobis foliorum brevioribus integerrimisque differt. — Njeguši, Lukovo supra Nikšić, Ceklin; Gvozd sub m. Vojnik; mons Lisinj et Sutorman supra Bar (Ba).

124. *Q. macedonica* ALPH. — Folia brevissime petiolata oblonga, basi rotundata, matura coriacea, denticulata vel breviter pinnatiloba, lobis triangularibus, supra lucida, subtus subglabra; stipulae lanceolatae deciduae, fructus sessiles. — In dumetis regionis calid. — Ad Martiniči in valle Zašlap (Pt); Pišine Strane — Župa nikšićka; Dobre Strane distr. Čeklići (Pč); Uble et Medun distr. Kuči (Ro, Sz); ad latera m. Rumija et Lisinj (Ba); Bogetići distr. Katunska (Ba, Ro); Malo brdo pr. Podgorica (Ro); distr. Bratonožići (Ro); Velki Mikulić supra Bar (Do).

\*127. *Q. coccifera* L. — In dumetis dic. mediter. ad Ulcinj (Ba).

128. *Q. ilex* L. — In dumetis dic. mediter. — Bar, Ulcinj, Donja Zeta (Ro); Crmnicka nahija (Eb).

— f. *oblongifolia* LAM. et DC. — Bar (Do).

— f. *serrata* VIS. — Ad latera m. Rumija supra Bar (Do).

130. *Q. conferta* KIT. — In silvis et dumetis regionis calid. — Bratonožići, Danilovgrad, Šavica (Pč); Boljevići pr. Vir, Bar, Ulcinj (Ro); in decliv. supra coenob. Morača (Ja, Ba); Drušići pr. Rijeka; Konjuhe pr. Andrijevica (Ba).

131. *Q. lanuginosa* (LAM.) THUILL. subsp. *Dalechampii* (TEN.) HAY. (= *Q. pubescens* var. *australis* BECK et SZ. Pl. Crnag. 59.). — In silvis reg. calidioris. — Martiniči (Pt); sub m. Sutorman, Jastrebica et ad Ostrog (Pč, Ba); in valle fl. Zeta circa Danilovgrad et circa Simunj in nahija Katunska (Ro); circa Medun distr. Kuči (Sz); Crmnicka nahija (Eb).

— — subsp. *eulanuginosa* HAY. var. *congesta* (PRESL)  
GUERKE. — Cum typo ad Medun distr. Kuči (Sz).

136. *Q. sessilis* EHRH. — In silvis regionis calidioris.  
— In valle fl. Morača supra coenob. (Pč, Ba, Ja); ad latera m. Rumija (Ba); Krstac pr. Njeguši (Ba).

137. *Q. robur* L. — In dumet. vallis Zeta sub Danilovgrad (Pč); Crmnicka nahija (Eb).

### **Juglandaceae**

*Juglans* L.

139. *J. regia* L. — In declivibus m. Pej supra coenob. Morača (Ba, Ja); ad Podgorica culta (Ro).

### **Salicaceae**

*Populus* L.

140. *P. alba* L. — Ad ripas fl. Morača (Pč); Crmnicka nahija (Eb).

142. *P. tremula* L. — In silvis vallis fl. Perućica et in Sinjavina planina (Pt, Ba); ad ped. m. Durmitor et in valle fl. Morača et Tara (Pč, Ba, Ro); supra lac. Rikavac distr. Kuči (Ba); in valle fl. Piva supra coen. (Ro); circa Podgorica (Ro); Crmnicka nahija (Eb).

143. *P. nigra* L. — In silvis sub pag. Borkovići in valle fl. Piva (Ro); Crmnicka nahija (Eb).

— — var. *italica* DUROI. — Circa Podgorica (Ro); Crmnicka nahija (Eb).

*Salix* L.

144. *S. amygdalina* L. — In valle fl. Zeta et ad Sinjac (Pč).

145. *S. pentandra* L. — In paludosis ad lacum Barno jezero sub m. Durmitor; etiam ad Pošćensko jezero pr. Šavnik (Ro).

146. *S. fragilis* L. — Ad ripas flum. Zeta et Morača (Pč); ad rivulum sub Sjekirica planina pr. Andrijevica (Ro).

147. *S. alba* L. — Ad ripas flum. Zeta pr. Danilovgrad (Pč); circa Grahovo (Pč); ad rip. lac. Skodrani pr. Plavnica

(Sz); circa Podgorica, Bar et Ulcinj (Ro); Mikulići sub m. Rumija (Do); Crmnicka nahija (Eb).

148. *S. cinerea* L. — In paludosis ad Rijeka et Mokro pr. Bijela distr. Šavnik (Pt); Pošćensko jezero pr. Šavnik; in valle Jelovica sub Bjelastica plan. distr. Vasojevići; Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro).

— f. *rotundifolia* DOELL. — Pašina Voda sub monte Durmitor (Pt).

149. *S. silesiaca* WILLD. — In alpinis m. Ranisava pr. Durmitor et in m. Jablan in Sinjavina planina (Ro).

150. *S. grandifolia* SÉR. — Ad latera m. Lovćen supra Njegusi (Pč, Ba).

152. *S. caprea* L. — In silvis reg. subalpinae. — In valle fl. Perućica et Tara sub m. Kom (Pt, Ro); ad latera m. Lovćen supra Njegusi; in valle fl. Piva pr. Mratinje; in valle fl. Jelovica distr. Vasojevići; in m. Jerinja glava, Mali et Velki Krš pr. Andrijevica; Ranisava pr. m. Durmitor; Varda supra coen. Piva (Ro); in m. Žijovo distr. Kući (Ba).

— f. *rotundifolia* GAUD. — Rarius cum typo (Ro).

— f. *diversifolia* ROHL. — Folia nonnulla ut in typo (ovata, elliptica vel oblonga, apice ± acuminata), alia rotundata, apice obtusissima. — In m. Jerinja glava et Mali Krš pr. Andrijevica (Ro).

154. *S. arbustula* L. — In regione alpina. — Volujačko jezero distr. Piva (Ma). E m. Sinjavina planina a cl. PAN-TOCSEK et BALDACCI „*Salix Weigeliana*“ WILLD. indicata spectat aut huc, aut ad *S. silesiacam*.

159. *S. elaeagnos* SCOP. — In saxosis et ad ripas reg. infer. et mediae. — In valle fl. Tara (Pt); ad Rijeka Crnojevička (Pt, Ho); Grahovo, Rijeka Gračanicka (Pč); ad latera m. Lovćen (Pej, Ro); circa Ulcinj, Bar, Podgorica, Nikšić et Andrijevica (Ro); Mikulići sub m. Rumija (Do).

160. *S. viminalis* L. — E Montenegro a cl. HAYEK in Prodr. fl. penin. Balc. I:86 indicata; verosimil. solum in locis udis in vineis culta. Non vidi.

\*161. *S. repens* L. var. *rosmarinifolia* (L.) W. GR. — In spong. ad lacus sub m. Durmitor (Pč); lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt sub *S. viminalis* × *repens*). A. cl. HAYEK

in Prodr. fl. penins. Balc. I:87 e Montenegro non est indicata, sed in montibus Serbiae occurrit.

162. *S. purpurea* L. subsp. *eupurpurea* HAY. — Ad ripam lac. Scodrani pr. Vir et Sinjac (Pč); in valle fl. Lim pr. Andrijevica et ad Bijela rijeka pr. Šavniki (Ro).

— — f. *Lambertiana* (SM.) KOCH. — Cum typo ad Šavniki et Bar (Ro).

— — subsp. *amplexicaulis* (BORY et CHAUB.) BOISS. — In lapid. mobil. ad Vunsaj pr. Plav ad fines Albaniae (Df).

163. *S. retusa* L. subsp. *euretusa* HAY. — In saxosis glareosis et pascuis reg. alpinae. — Ex omnibus montibus dic. septentr. et orient. indicata: Kom, Durmitor, Maglić, Vojnik, Mokra planina, Sjekirica, Lukavica, Vila, Sinjavina, Bjelastica, Jablan, Gradište, Planinica etc. (Pt, Pč, Sz, Ba, Ht, Ro). E monte Lovćen non vidi.

— — f. *Kitaibeliana* (WILLD.) RCHB. — F. foliis majoribus, basi cuneatis apice obtusis vel emarginatis. — In alp. jugo Štulac et sub Crvena Stijena in m. Durmitor (Pč, Ba); in m. Kom, Žijovo et Suhi vrh distr. Kuči (Ba).

— — f. *pilosula* BECK. — Savin kuk in m. Durmitor (De, Si).

\*— — subsp. *serpyllifolia* (SCOP.) SEEM. — In alpinis m. Planinica et Mojan ad fines Albaniae (Ba). Foliis multo brevioribus et angustioribus a typo differt.

## Moraceae

### *Morus* L.

166. *M. alba* L. — Culta et subsppontanea in reg. calidiore. — Medun (Sz); Njeguši, Cetinje, Rijeka, Vir, Bar, Ulcinj, Podgorica, Danilovgrad etc. (Ro); Crmnicka nahija (Eb).

167. *M. nigra* L. — Ut praecedens, sed rarer.

### *Ficus* L.

168. *F. carica* L. — Culta et subsppontanea in reg. calidiori, praecipue dic. mediterranea. — Circum Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Medun, Danilovgrad, Nikšić, coen. Morača etc. (Pt, Eb, Pč, Sz, Ho, Ja, Ro); etiam in valle fl. Piva supra coenobium (Ro).

## **Cannabinaceae**

*Humulus* L.

169. *H. lupulus* L. — In fruticetis, ad ripas reg. infer. et submont. frequens. — Circa Bar, Ulcinj, Rijeka, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Kolašin, Andrijevica (Eb, Pt, Pč, Sz, Ja, Ro).

*Cannabis* L.

170. *C. sativa* L. — Culta et subsppontanea. — Velika et Andrijevica distr. Vasojevići (Ba, Ro); Goračko distr. Piva, Bukovica sub m. Durmitor, Šavniki (Ro).

## **Ulmaceae**

*Ulmus* L.

171. *U. foliacea* GILIB. — In silvis et dumetis. — Ad latera m. Lovćen; circa Danilovgrad et Vir (Pč); Velestovo et Milušina pećina distr. Katunska (Ro).

\*— var. *suberosa* (MCH.) C. K. SCHNEIDER. — Cum typo circa Podgorica (Ro).

\*— f. *glanduligera* ROHL. IX:19. (= *U. glabra* b. *glanduligera*). — Folia supra parce, subtus densius puberulo-scabra et praeterea subtus in reti venoso glandulis rubris obsita. — Circa Podgorica et in campo Donja Žeta (Ro).

173. *U. scabra* MILL. — In silvis reg. montanae supra coenob. Piva (Ro).

174. *U. laevis* PALL. — In silvis sub m. Durmitor et in Javorje planina (Pč).

*Celtis* L.

176. *C. australis* L. — In fruticetis reg. mediterraneae. — Coenob. Ostrog, Šavica, distr. Komani (Pč); circa Dujevo Ba); circa Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica et Danilovgrad (Ro); nahija Lješanska (Ba).

## **Urticaceae**

*Urtica* L.

179. *U. dioica* L. — In silvis, ruderatis et ad sepes reg. infer. et mediae frequens.

— — subvar. *glabrata* (CLEM.) WEDD. — In subalp. Viruša dol sub Crna planina (Pt).

180. *U. membranacea* POIR. — Annua, flores monoici, folia ovata acuta anguste serrata, longe petiolata, stimulis paucis obsita, stipulae connatae; axis spicarum mascul. dilatata. — In incul. ad Vir dic. medit. (Pč).

181. *U. urens* L. — In ruderatis reg. infer. et mediae. — Vir (Pč, Ro); Kostiča distr. Kuči (Ba); Ulcinj, Bar, Podgorica, Danilovgrad, Njeguši (Ro). Etiam in valle fl. Piva ad coenobium (Ro).

182. *U. pilulifera* L. — Annua, monoica; inflorescentia feminea in capitula globosa congesta; folia longe petiolata. — In ruderatis dic. mediter. circa Bar et Ulcinj (Ro).

### *Parietaria* L.

184. *P. officinalis* L. — In saxosis, silvis humidis et ad sepes. — Circa Cetinje, Vir (Pč, Ro); Medun distr. Kuči (Sz); Njeguši, Rijeka, Boljevići, Podgorica (Ro); in valle fl. Morača ad coenob. (Ja).

185. *P. vulgaris* HILL. — Ad muros, rupes et in incultis reg. infer., praecipue dic. medit. frequens. — Circa Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Njeguši etc. (Eb, Ro, Ho); etiam ad pag. Kovčice ad ped. m. Mali Durmitor in reg. subalp. (Pt).

— — var. *microphylla* (BACH.) HAY. (= *P. Judaica* var. *brevipetiolata* HAL. Consp.) — Folia multo minora et breviter petiolata. — Cum typo ad Bar (Ro).

186. *P. lusitanica* L. — Annua, caulis ramosissimus prostratus decumbens; lamina foliorum rhombeo-ovata obtuse acuminata basi late cuneata, petiolo longiora; glomeruli pauci-flori. — In fissuris murorum et rupestr. dic. medit. ad Rijeka et Podgorica raro (Ro).

### *Santalaceae*

#### *Osyris* L.

189. *O. alba* L. — In sax. et dumosis reg. mediter. circa Bar et Ulcinj (Ro).

*Thesium* L.

191. *Th. alpinum* L. — In gram. et pascuis subalp. et alp. — Crna planina, Durmitor, Kom (Pt, Pč, Ro); Ledenica planina, Barno jezero sub m. Durmitor, Bjelastica, in valle Perućica et Jelovica, Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro); in valle fl. Tara inter Han Garančić et Kolašin (Ja); in m. Kostića distr. Kuči (Ba).

194. *Th. linophyllum* L. — In gram. reg. subalpinae raro. — Ad Borkovići distr. Piva, cca 1400 m, et in valle flum. Perućica sub m. Kom, ca 1000 m (Ro).

195. *Th. divaricatum* JAN. — In rupibus et gram. reg. calidioris, praec. dic. mediterraneae. — Bogeticī (Pt); Šavnik sub m. Ivica (Pč); circa Rijeka et Bar (Ba, Ro); Ulcinj, Podgorica, Danilovgrad, nahija Lješanska, Čevski Lisac, Njeguši et alibi (Ro); supra Vunsaj pr. Plava ad fines Albaniae (Df).

— subsp. *Vandasii* ROHL. SBGW. I: 107, 1911; (an *Th. divaricatum* × *ramosum*?). — Perenne; radice lignosa multi-cauli estolonosa, caulibus sat rigidibus ca 20 cm altis erectis vel adscendentibus a medio ramosis, ramis erecto-patulis rameosis, ramulis subunifloris (ut in *Th. ramoso*), sed hinc inde 2—3 floris (ut in *Th. divaricato*), foliis linear-lanceolatis univel subtrinerviis unacum bracteis, bracteolis et ramulis asperulo-scabris (ut in *Th. ramoso*), bracteis et bracteolis aliis fructu brevioribus (ut in *Th. divaricato*), aliis eum aequantibus, bractea media plerumque eum multo superante (ut in *Th. ramoso*), nuce ellipsoidea pedicello suo 2—3 plo longiore, perigonio fructus involuto nuce duplo breviore. — In gramin. ad Viljuša ad fin. Hercegovinae cca 1000 m (Ro).

196. *Th. ramosum* HAYNE. — In pratis ad Ulcinj dic. medit. et ad Andrijevica reg. subalp. raro (Ro).

198. *Th. Parnassi* A. DC. — In pratis et pasc. alpinis. — In monte Javorje et Velka Jastrebica (Pč); in alp. Ledenica, Vojnik, Maglić, Lovćen, Gradište et Jablan vrh in Sinjavina planina, inter Nedajno et Crkvica in Pivska planina (Ro); Mali Bostur in m. Lovćen (Kš), 1600—2200 m s. m. (Ro); in m. Čafa Velja ad lac. Rikavac et in m. Vila distr. Kuči ad fin. Albaniae (Df).

200. *Th. auriculatum* VANDAS SBGW. I: 279. 1890.

— Perennis; caules tenues numerosi procumbentes vel adscendentes ramis erectis; racemi pluriflori ramis unifloris; lobi disci inter perianthii segmenta valde prominentes hemisphaericci vel patelliformes (rarius ± obsoleti = f. *bosnense* MALÝ); fructus non reticulato-venosus solum longitudinaliter costatus; folia linearia uninervia; bractea fructu aequilonga vel parum longiora, bracteolae eo breviores. — In pascuis et gramin. alp. et subalp. raro. — Dobri do et Valoviti do in monte Durmitor; supra Poščensko jezero pr. Šavnik, 1200—2300 m (Ro).

## Polygonaceae

*Rumex* L.

213. *R. alpinus* L. — In pratis et pascuis subalp. et alp. praecipue ad casas et circa ovilia frequens. — In m. Kom, Durmitor, Sinjavina, Štirni do, Maglić, Lola planina, Crna planina et alibi (Pt, Pč, Ba, Ho, Ro); conf. ROHLENA IV. Beitr. p. 81.

\*216. *R. Kernerii* BORB. apud RECH. fil. in FEDDE Repert. XXXI: 240/640. (= *R. patientia* aut. monten. nec L.) — In incul. ad Andrijevica (Ho); ad Medun distr. Kući; in novalibus ad Plavnica (Sz); Milušina pećina in distr. Katunska nahija (Ro).

217. *R. crispus* L. — Ad vias, in fossis et ruder. reg. infer. et mediae. — Circa Medun et Plavnica (Sz, Ro); ad Sinjac et Vir (Pč); Viljuša, coen. Piva, Ulcinj, Njeguši, Bar, Vir, Rijeka et Podgorica (Ro); in valle fl. Tara inter Han Garančić et Maštošev (Ja).

× *R. crispus* × *obtufolius* (= *R. pratensis* M. K.). — Sub m. Lovćen (Ba); ad Šavnik (Ro).

× *R. crispus* × *pulcher* (= *R. pseudopulcher* HAUSSK.) — Prope pagum Sušunja ad viam e Podgorica ad Plavnica (Ro).

\*219. *R. conglomeratus* MURR. — In fossis et locis humidis. — Jezerski vrh in m. Lovćen (Ho); ad ripam lac. Šcodrani pr. Plavnica et ad rivulum supra Šavnik (Ro); ad Bar (Do); Sutorman supra Bar (Eb).

220. *R. sanguineus* L. — In silvis vallis fl. Piva inter coen. Piva et Goraňsko ca 700—800 m (Ro); Sutorman supra Bar (Eb).

221. *R. obtusifolius* L. subsp. *silvester* (LAM.) RECH. — In silvis, ruderatis, incultis et ad vias reg. infer. et submont. frequens.

— subsp. *Friesii* (GREN. GODR.) RECH. (= *R. obtusifolius* var. *agrestis* FR.) — In muris diruti oppidi Bar (Ro).

224. *R. pulcher* L. — In ruder. reg. calidioris. — Circa Cetinje et Danilovgrad (Pč); circa Bar, Ulcinj, Vir, Plavnica, Podgorica et Viljuša; etiam in val. fl. Lim inter Andrijevica et Berane (Ro); Njeguši (Sz); Ivanova korita et Blatište in m. Lovćen (Bierbach).

226. *R. palustris* SM. — In paludosis ad Rijeka crnojevička (Pt); ad ripam fl. Bojana pr. Sct. Nikola ad fines Albaniae (Ba).

229. *R. acetosella* L. — In gramin., lapidosis et incultis. — In m. Mali Maglić distr. Kuči (Sz); in valle fl. Tara et Morava (Pč); circa Viljuša et ad latera m. Lovćen et Lastva Čevska (Ro).

— f. *tubropunctatus* BECK. — Cum typo et sequente ad Podgorica (Ro).

— subvar. *multifidus* (L.) DC. — Cum typo ad Danilovgrad (Pt, Ro) et circa Podgorica (Ro).

— var. *angiocarpus* (MURB.) ČEL. — Ad Ulcinj distr. Primorje et in subalp. Konjsko plan. (Ho, Ro); in valle fl. Tara ad Kolašin et circa Kralje pr. Andrijevica (Ja); ad lat. m. Lovćen (Ro); ad Pišće distr. Piva (De, Si).

230. *R. scutatus* L. — In glareosis alpinis. — In m. Kom, Javorje, Durmitor (Pt, Pč, Ro), Maglić, Crna planina, Pošćensko jezero supra Šavnik; Lovćen, Štirni do pr. Lukavica et Lola planina; in valle fl. Bijela pr. Šavnik (Ro); etiam in m. Prokletija ad fines Albaniae (Df).

— f. *glaucus* (JACQ.) GAUD. et f. *pubescens* (C. KOCH) FIORI rarius cum typo (Ro).

232. *R. nivalis* HEG. — In glar. alpinum Kom, in Sinjava vina pl. et Mali Durmitor (Pt, Ba).

233. *R. acetosa* L. — In pratis reg. subalpinae. — Visuša dol sub Crna planina, ad ped. m. Durmitor (Pt, Pč, Ro); Ledenica planina, Lastva čevska, Zagarać, Viljuša et Velestovo distr. Katunska (Ro); supra lacum Crno jezero et Savin kuk in monte Durmitor (De, Si).

235. *R. arifolius* ALL. — In pratis alpinis sub m. Kom loco Carine (Pt); Valoviti do in m. Durmitor (Ro).

*Oxyria* HILL.

\*238. *O. digyna* (L.) HILL. — In glar. alp. ad nivem deliquesc. m. Kom Kučki (Ba) et Maglić ad fines Bosnae raro (Ro); in m. Durmitor, loco Savin kuk (De, Si).

*Polygonum* L.

242. *P. maritimum* L. — In arenos. maritimis ad Bar et Ulcinj (Ba, Ro).

245. *P. aviculare* L. — In ruder., incultis et ad vias reg. infer. et subalp. in tota dictione frequens.

— subsp. *aequale* (LINDM.) A. GR. f. *procumbens* (GILIB.) HAYNE subf. *argyroclada* NADJI. — Ochreæ elongatae argenteæ. — In aren. marit. ad Bar (Do).

\*258. *P. persicaria* L. f. *angustifolium* BECKH. (= var. *longeciliata* OPIZ). — Foliis anguste lanceolatis utrimque longe ciliatis. — Ad viam pagi Kunji do pr. Njeguši (Pej, Ro).

— f. *bitense* F. SCHULTZ. — In incultis ad Bar (Ro).

259. *P. lapathifolium* L. — In fossis et ruderatis.

— subsp. *verum* SCHUST. f. *nodosum* (PERS.) GUENTH. — Circa Podgorica et Njeguši (Ro); Topolica pr. Bar (Do); in lacu sub m. Lovćen (Pej).

— subsp. *tomentosum* SCHRK. (= *P. incanum* SCHM.) — Ad ripam lac. Scodrani pr. Plavnica (Sz); in valle fl. Piva sub Mratinje et in valle fl. Lim inter Andrijevica et Berane, Gornje polje pr. Njeguši (Ro).

261. *P. amphibium* L. — In fossis et aquis stagnantibus. — Rijeka (Pt), lac. Rikavac sub m. Vila distr. Kuči, Mokro sub m. Dziebeze (Sz, Ba); Bar (Do); in lacu Scodrano (Pč, Ro, Eb).

— f. *terrestre* LEERS. — In fossa ad Topolica pr. Bar (Do).

262. *P. bistorta* L. — In irriguis, in pratis alpinis et subalp. frequens. — Viruša dol sub Crna planina, vallis Perućica, Sinjavina planina, m. Durmitor (Pt, Ro); Margarita et Varda sub m. Kom (Pč, Ro), Lukavica planina (Ho, Ro);

Ledenica, Lastva čevska et Velki Garać in nahija Katunska (Ro).

— f. *griseum* BECK. — Folia subtus dense griseo-pilosa. — In pasc. alp. in m. Javorje et Sinjavina planina (Ro); Krivi do distr. Piva (De, Si).

263. *P. viviparum* L. — In pratis et pascuis alpinis montium territ. septentr. et orient. frequens. — In m. Kom, Sinjavina, Durmitor (Pt, Pč, Sz, Ba, Ro); in m. Vila et Kunj Kostića distr. Kući (Sz, Ba); Maganik (Ho); Sjekirica, Zeletin, Bjelastica (Ro). E m. Lovćen adhuc non vidi.

264. *P. alpinum* ALL. — In gram. alp. et subalp. in Sjekirica planina in societ. *Wulfeniae carinthiaca* (Ro).

### *Fagopyrum* MILL.

265. *F. convolvulus* (L.) H. GROSS. — In arvis et ruderatis reg. infer. et mediae frequens. — Ad pag. Kovčice sub m. Durmitor (Pt); circa Orahovo distr. Kući (Ba); in valle fl. Piva sub Šavnik et Mratinje; circa Viljuša, Njeguši, Rijeka, Spuž, Danilovgrad, Bar et Andrijevica (Ro); circa Kolašin (Ja).

266. *F. dumetorum* (L.) SCHREB. — In dumetis ad Sinjac pr. Vir (Pč); circa Danilovgrad in valle fl. Zeta et circa Njeguši (Ro).

— var. *falax* ROHL. nomen novum (=var. *convolvuloides* ROHL. SBGW. I:104. 1912 nec BRUEGGER). — Fructus rugosostriatus non lucidus. — In dumosis ad Bjelice, Trešnja et Dubovik pr. Njeguši (Pej, Ro). Meo sensu haec planta non est *F. convolvulus* × *dumetorum*.

267. *F. vulgare* HILL. — In agris cultum et saepe subspont. (Ro).

### *Euphorbiaceae*

#### *Chrozophora* NECK.

\*269. *Ch. tinctoria* (L.) RAF. (= *Crozophora tinctoria* aut.) — In arenosis et lapidosis ad Podgorica (Ba); in fossa ad Bar (Do).

#### *Mercurialis* L.

271. *M. perennis* L. — In silvis reg. montanae et subalpinae. — Inter Cetinje et Njeguši; circa Šavnik sub m.

Ivica; in m. Balj et circa Andrijevica (Ro); in valle fl. Tara inter Matošev et Han Garančić (Ro, Ja); Sutorman supra Bar (Eb).

— f. *saxicola* BECK. — Ad viam e Njeguši ad Cetinje (Pej, Ro).

272. *M. ovata* STERNB. et HOPPE. — In silvis et dumetis reg. subalpinæ. — In m. Durmitor sub Crvena Stijena (Pč); Pirlitor pr. Žabljak distr. Drobniaci (Pej); in m. Balj et Žoljevica pr. Andrijevica; circa Viljuša et Šavnik; in valle fl. Piva sub Goraško; Lastva čevska distr. Katunska (Ro); Sinjavina planina (Ba).

— f. *angustior* VOLLM. — Rarius cum typo (Ro).

273. *M. annua* L. — In agris et ruder. reg. infer. frequens. — Circa Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Rijeka etc. (Ro).

### *Euphorbia* L.

275. *E. dendroides* L. — In rupestr. dic. mediter. ad Vir, coenob. Ostrog et coenob. Morača (Pč, Ba); Vrojca distr. Kući (Ba); Limljani pr. Vir (Do).

\*276. *E. palustris* L. — In salicetis ad ripam lac. Scodrani pr. Plavnica (Ro, Ja).

277. *E. lingulata* HEUFF. — In dumetis ad Rapša pr. Han grabom, sed ultra fines Albaniæ, ca 750 m. (Df).

278. *E. polychroma* KERN. — In sax. et dumetis reg. calidioris. — Ad Boljevići, Vir et Danilovgrad dic. medit.; etiam in m. Čevski Lisac distr. nahija Katunska, ca 1000 m (Ro); Sutorman supra Bar (Eb).

— f. *denticulata* ROHL. — Folia apice serrulato-denticulata. — Cum typo ad Boljevići pr. Vir (Ro).

280. *E. fragifera* JAN. — In rupestr. vallis Perućica sub m. Kom (Pt); supra pag. Kovčice ad ped. m. Durmitor (Pt). An spec. sequens?

281. *E. montenegrina* (BALD.) MALÝ. (= *E. verrucosa* var. *m.* BALD.; *E. epithymoides* L. var. *serratifolia* ROHL. SBGW. XVII: 55. 1903). — Habitu similis *E. verrucosae* L., sed capsulae majores verrucis filiformibus purpureis dense obsiae, semina tenuiter punctatoscabra, caules sparse pilosi, folia

tenuiter serrata et ciliata, floralia orbiculata basin versus subpetiolata. — In rupestr. alp. et subalp. in m. Balj pr. Andrijevica (Ba, Ro), Jablan vrh in Sinjavina planina, Štirni do pr. Lukavica planina et in m. Durmitor (Ro).

282. *E. glabriflora* VIS. — In lapidosis ad lat. m. Vrh suta distr. Crmnica; Bijela Skala in Medjurečka planina pr. Bar (Ba); in m. Kosa et in angustiis Sutorman supra Bar (Do).

284. *E. spinosa* L. — In saxosis et lapidosis reg. merid. calidioris, praecipue dic. medit. frequens et vulgaris. — Viljuša, Njeguši, Cetinje, Rijeka, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Veles tovo et Lastva čevska in nahija Katunska, Ulcinj, Bar etc.

— f. *intercedens* ROHL. SBGW. I: 109. 1912. — Umbellae radii pauci (1—3), radii foliis floralibus breviores. — In lapid. mobil. ad ped. m. Maglić pr. Mratinje in valle fl. Piva (Ro).

288. *E. carniolica* JACQ. f. *strictior* ROHL. SBGW. XXXVIII: 83, 1905. — Rami umbellae etiam fructiferi erecti. — In silva vallis Jelovica sub m. Bjelastica planina distr. Vasojevići, ca 1300 m (Ro); Volujačko jezero (forma typica); leg. MALÝ.

292. *E. capitulata* RCHB. — In glareosis, saxosis et lapid. mobil. reg. alpinae. — In m. Velka Jastrebica (Pč); m. Kom, Durmitor (Pt, Pč, Ba, Ro, Ja, De, Si), m. Maglić ad fin. Bosniae, m. Vojnik, Gradište et Jablan in Sinjavina planina (Ro); Fuša Rudnices et ad sept. latera m. Prokletija ad fines Albaniae (Df); in m. Velki Maglić distr. Kuči (Ba).

295. *E. stricta* L. — In ruderatis et lapidosis reg. infer. et mediae. — In valle fl. Piva supra coenobium Piva, circa Šavnik, Spuž et Danilovgrad (Ro); in m. Vermoš planina distr. Kuči ad fines Albaniae ca 1100 m (Df).

296. *E. platyphyllos* L. — In cultis, ad vias et in fossis in reg. calidore non frequens. — Circa Vir et Bar (Pč, Ro).

— var. *literata* (JACQ.) RCHB. (= *E. lanuginosa* THUILL.) — Cum typo ad Bar (Ro, Do).

298. *E. Domini* ROHL. SBGW. XXXVIII: 83, 1905. — Annua, a basi multicaulis, caulis simplicibus prostratis vel arcuato-ascendentibus pusillis, foliis sparsis estipulatis oblongo-cuneatis apice truncatis vel rotundatis a basi usque ad medium integris ceterum dentato-serratis, floralibus eis caulinis

subsimilibus, umbellae radiis 2—3 brevibus; involucri glandulis exapendiculatis transverse ovalibus ecornutis, capsulae globosae coccis dorso rotundatis, seminibus oblongo-ovatis areo- latim rugosis, caruncula transverse ovali, fere verticali. — In lapidosis ad Podgorica dic. mediterranea (Ro).

299. *E. helioscopia* L. — In cultis, ruderatis et ad vias reg. infer. et mediae frequens. — Circa Cetinje, Njeguši, Šavniki, Podgorica, Vir, Rijeka, Bar, Ulcinj, Andrijevica etc.; etiam ad Bukovica ad ped. m. Durmitor, ca 1400 m.

— var. *perramosa* BORB. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

305. *E. Ničićiana* BORB. — In graminosis ad Nikšić, ca 800 m. (Ro).

306. *E. Seguierana* NECK. — In rupestr. circa Bosnici et Rijeka (Pt).

308. *E. characias* L. — In saxosis reg. infer. m. Rumija supra Bar (Ba); insula Lesandra in lacu Scodrano (Eb). Secundum cl. HAYEK dubia.

309. *E. veneta* WILLD. — In rupestr. et dumetis dic. mediter. — Circa Ulcinj, Bar et Vir; inter Cetinje et Rijeka supra pag. Dobrsko selo (Ro); in valle fl. Morača ad Bioče (Ja).

312. *E. amygdaloides* L. — In silvis et dumetis e dic. mediter. usque ad reg. subalp. frequens.

— var. *glaberrima* KUEMM. et JÁVORKA. — In monte Durmitor loco Savin kuk (De, Si).

— var. *Chaixiana* (TIMB.-LAGR.) BOISS. f. *pachyphylla* PANT. — In silvis cca Kovčice ad pedem m. Mali Durmitor, ca 1450 m (Pt).

\*— var. *fissicornis* HAY. (= *E. orjeni* BECK.) — In alp. m. Vermoš ad fines Albaniæ (Df); in m. Orjen (fide BECK).

313. *E. salicifolia* HOST. — In fruticetis vallis fl. Lim pr. Andrijevica ca 800 m raro (Ro).

315. *E. imperatifolia* VIS. — In rupestr. reg. mont. ad Bjelice pr. Njeguši; Trešnja et Presjeka sub m. Lovćen (Pej, Ro).

\*318. *E. virgata* W. K. — In gramin. decliv. septentr. m. Lovćen versus Njeguši, reg. subalp. (Pej, Ro).

319. *E. cyparissias* L. — Ad vias, in lapidosis et sa~~x~~  
xosis reg. infer. et mediae. — Ad Grahovo et Cetinje (Pč);  
circa Njeguši, Velestovo in nahija Katunska, Danilovgrad et  
Andrijevica; etiam in valle fl. Piva sub Goraňsko (Ro).  
— f. *aurea* BECK. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

\**E. cyparissias* L. var. *aurea* BECK × *E. esula* L. —  
Inter parentes ad Njeguši (Pej, Ro).

320. *E. esula* L. — In agris et ad vias. — Krstac et Gra~~s~~  
bov vrh pr. Njeguši (Pej, Ro); etiam in valle fl. Zeta pr.  
Danilovgrad (Ro).

\*— f. *colorata* ROHL. VIII. Beitr. pag. 13. — Folia flo-  
ralia pulchre aurea. — Cum typo ad Krstačko polje in m. Kra~~s~~  
čeva glavica pr. Njeguši (Pej, Ro).

— var. *maglićensis* ROHL. SBGW. I: 111, 1912. — Rhizoma  
longe repens; caulis simplex humilior, folia crassiuscula; radii  
umbellae pauci (3—) 5 (—6); glandulae cyathii breviores et  
obtusiores. — In lapid. mobil. m. Maglić ad fines Bosniae (Ro).

323. *E. Barrelieri* SAVI var. *hercegovina* (BECK)  
HAY. — In rupibus calc. ad Njeguši (Ad).

328. *E. paralias* L. — In aren. marit. ad Bar et Ulcinj  
(Ho). Planta a cl. PANTOCSEK in sax. circa pagum Kovčice  
ad ped. m. M. Durmitor lecta et sub *E. paralias* indicata, vero~~s~~  
similiter ad aliam speciem pertinet.

332. *E. segetalis* L. subsp. *pinea* (L.) HAY. — In  
sax. ad Limljani prope Vir dic. medit. (Pč).

— var. *ragusana* (RCHB.) HAY. — In sax. et aren.  
maritimis ad Bar et Ulcinj (Ro).

333. *E. graeca* BOISS. et SPR. — In agris et ruderatis  
reg. infer. et mediae non frequens. — Circa Njeguši, Kokoti  
in Lješanska nahija, Dragovoljići pr. Nikšić, Boljevići pr. Vir;  
etiam sub m. Žoljevica et in valle fl. Zlorječica pr. Andrije-  
vica (Ro).

334. *E. peplus* L. — In agris et ad vias reg. infer. circa  
Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica et Rijeka (Ro).

337. *E. falcata* L. — In cultis et lapidosis reg. infer. et  
mediae frequens. — Šavniki sub m. Ivica (Pč, Ro); circa Vir  
(Ho, Ro); ad Njeguši, Viljuša, Podgorica, Danilovgrad, Bar,

Rijeka; ad ped. m. Balj pr. Andrijevica; etiam in valle fl. Piva prope coenob. et sub Goraško (Ro); circa Ulcinj (Ro, Ba).

338. *E. exigua* L. — In agris, ad vias et in ruder. reg. infer. — Circa Bar, Vir, Podgorica et Danilovgrad (Ro). — — f. *trunctata* KOCH (= f. *retusa* NEILR.). — Cum typo ad Boljevići pr. Vir (Ro).

340. *E. lathyris* L. — Ad Krstac pr. Njeguši (Gi).

341. *E. myrsinoides* L. — In rupestr. reg. mont. subalpinae, rarius alpinae. — In valle fl. Perućica sub m. Kom (Pt, Ro); Bašina Voda sub coen. Ostrog (Pč); circa Njeguši et ad lat. m. Lovćen (Pej, To, Ro); in m. Balj, Jerinja glava et Žoljevica pr. Andrijevica; Ledenica pl. distr. Piva; in sax. supra Crno jezero in m. Durmitor (Ro); in m. Rumija supra Bar; Konjuhe pr. Andrijevica; Crvena Stijena et Bukovica sub m. Durmitor (Ba); Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

\*342. *E. biglandulosa* DESF. — A praeced. differt statura robustiore, foliis lanceolatis (nec obovatis), capsulis elevatim punctatis (nec levibus) seminibus levibus (nec rugosiss.). — In fruticetis reg. infer. ad litora maris pr. Ulcinj (Ba).

\*344. *E. pepulis* L. — Ad litora maris pr. Bar et Ulcinj (Ba, Do, Ro).

346. *E. chamaesyce* L. — In cultis, ad vias pr. Rijeka dic. mediter. (Pt, Pč).

— — f. *canescens* (L.) ROEP. — Cum typo ad Rijeka (Pt).

### ***Chenopodiaceae***

#### *Polygonum* L.

352. *P. arvense* L. — In arenosis et agris ad Rijeka (Pt) et Podgorica (Ro).

353. *P. majus* A. BR. — In agris et arenosis reg. inf. et mediae. — Ad Njeguši (Ba); circa Cetinje (Kn); in valle fl. Piva sub Goraško et Borkovići; circa Podgorica et Bogetići; Kralje pr. Andrijevica (Ro); ad litora maris pr. Bar (Do).

#### *Chenopodium* L.

359. *Ch. botrys* L. — In arenosis, lapid. et ruderatis reg. inf. et mediae. — Vir (Pč, Ro); Vranja (Ba); Crveno ždri-

jelo (Ho); ad Podgorica et Plavnica; Kralje sub m. Kom; in valle fl. Lim inter Andrijevica et Berane (Ro).

361. *C. polyspermum* L. — In cultis et ruder. — Distr. Vasojevići (Ba, Ro); in valle fl. Piva ad Šavniki, coenob. Piva et Mratinje (Ro).

362. *C. vulvaria* L. — In otiosis et ruderatis reg. infer. et med. — Lješko polje pr. Podgorica, Čevo in nahija Katunska, in valle fl. Piva ad Šavniki et Mratinje; circa Bar (Ro).

363. *C. hybridum* L. — In ruderatis et ad vias. — Ad Klopot distr. Bratonožići (Pč); Čevo, Njeguši, Viljuša et Veles-tovo distr. Katunska nahija; in valle fl. Piva ad Mratinje et Šavniki (Ro).

365. *C. opulifolium* SCHRAD. — In ruder. reg. calidioris ad Rijeka (Pt); circa Viljuša, Šavniki et Podgorica (Ro).

366. *C. album* L. — In ruderatis, ad vias et in otiosis in reg. infer. et subalp. frequens.

367. *C. murale* L. — In ruderatis et fossis reg. infer. — Circa Bar, Ulcinj et Podgorica non frequens (Ro).

370. *C. glaucum* L. — In fossis ad Vir reg. infer. (Pč).

371. *C. bonus-Henricus* L. — In omn. montibus ad casas et circa ovilia vulgaris. — In reg. infer. non vidi; ad Matoševo in valle fl. Tara legit Janchen (Ro).

#### *Atriplex* L.

375. *A. hortensis* L. — Ad Šavniki in valle fl. Piva subspont. (Ro).

379. *A. patula* L. — In cultis et ruderatis. — Circa Gra-hovo et Cetinje (Pč); ad Njeguši, Viljuša, Borkovići et Andrijevica frequens (Ro).

382. *A. tatarica* L. — E Montenegro a cl. HAYEK in Prodr. Fl. penins. Balc. I:151. indicata. Ipse non legi.

\*384. *A. portulacoides* L. — Ad litora maris pr. Ulcinj (Ba).

#### *Kochia* ROTH.

\*393. *K. scoparia* (L.) SCHRAD. — In pago Kralje culta et subspont. (Ro).

*Salsola* L.

413. *S. kali* L. — In aren. et lapid. ad Cetinje (Pč).

— var. *Matteji* BALD. — In aren. marit. ad Pristan-Bar (Ba). — Humilis, hirsuta, simplex vel subsimplex, floribus solitariis, bracteis perigonio dimidio longioribus.

\*— var. *brevimarginata* KOCH. — In aren. marit. ad Bar (Do).

**Amarantaceae**

*Amarantus* L.

421. *A. retroflexus* L. — In ruder. et ad vias. — Circa Cetinje, Vir, Rijeka, Čevo, Velestovo, Viljuša, Njeguši et Nikšić (Pč, Ba, Ro).

423. *A. angustifolius* LAM. var. *silvester* (VILL.) THELL. — In cultis et ruder. reg. infer. — Ad Rijeka (Pt), Spuž (Ho).

424. *A. deflexus* L. — In lapidosis reg. infer. — Ad Podgorica et in valle fl. Morača pr. Bioče (Ro).

425. *A. lividus* L. var. *adscendens* (LOIS.) THELL. — In ruder. ad Šavica distr. Komani reg. inf. (Pč); ad Rijeka (Ba).

**Theligonaceae**

*Thelionum* L.

426. *T. cynocrambe* L. — In rupestr. et lapid. reg. mediter. — Circa Vir, Ulcinj et Bar non frequens (Ro).

**Phytolaccaceae**

*Phytolacca* L.

427. *Ph. americana* L. — In dumet. et saxosis reg. infer. — Circa Rijeka (Pt, Kn); infra Boljevići pr. Vir (Pč); Ulcinj (Ho); Bar et Spuž (Ro).

**Aizoaceae**

*Glinus* L.

429. *G. lotoides* L. — In ruderatis dic. medit. ad Rijeka (Kn).

## *Portulacaceae*

*Montia* L.

439. *M. verna* NECK. — In spongiosis sub m. Trešnjevik supra Andrijevica, ca 1400 m (Ro, Df).

*Portulaca* L.

440. *P. oleracea* L. subsp. *silvestris* (MONT.) THELL. — In agris et ad vias reg. infer. — Circa Rijeka (Pt); ad Cetinje et Vir (Pč); circa Podgorica (Ro).

## *Caryophyllaceae*

*Herniaria* L.

442. *H. hirsuta* L. — In arenosis et lapidosis reg. infer. et subalp. — Ad lat. m. Rumija et Lisinj supra Bar (Ba); sub m. Jerinja glava et Balj pr. Andrijevica; in valle fl. Perućica in pago Konjuhe; circa Podgorica et Drušići in nahija Lješanska (Ro).

— var. *pauciflora* ROHL. SBGW. XXXVIII: 50, 1905. — Stipulis majoribus, foliis margine ciliatis ceterum glabris, glosmerulis paucifloris, saepissime 3-fl. (Vix cum var. *leiophylla* GRIS. identica). — In aren. et lapid. ad Drušići et Podgorica reg. infer. (Ro).

443. *H. incana* LAM. — In rupestr. et lapid. reg. calid. mediae. — In decliv. m. Javorje (Pč); ad Viljuša, Velestovo, Čevo et Lastva čevska in nahija Katunska; in valle fl. Piva pr. Šavniki, coenob. Piva et Goraško; in valle fl. Lim pr. Andrijevica (Ro); Vrojca distr. Kuči; Bijela pr. Šavniki; Nikšić (Ba); sub m. Lovćen (Ro).

- \*444. *H. cinerea* DC. — Ad Rijeka in ponte supra fl. Crnojevićka rijeka (Ba). E Dalmatia merid. etiam in ASCH. GRAEB. Syn. V/1: 882 indicata.

446. *H. glabra* L. — In arenosis et ad vias reg. infer. et mediae. — Circa Cetinje, Grahovo et Rogami (Pt, Pč); in subalp. loco Korita sub m. Hum Orahovski (Ba); supra Jablan jezero sub m. Durmitor (Pč); circa Viljuša et coenob. Piva (Ro); in valle fl. Lim et Zlorječica pr. Andrijevica (Ro, Ja); Sinjavina planina (Ba).

— f. *ciliata* WIRTG. — Ad Cetinje (Kn).

- — f. *subciliata* BAB. — Trešnja sub m. Lovćen. (Ro).  
— — var. *scabrescens* R. ROEM. — Ad Viljuša, Šavniki, Ostrog, Drušići, Kokoti et Podgorica cum f. *praeced.* (Ro); etiam ad lat. m. Lovćen (Kš).

### *Paronychia* MILL.

449. *P. kapela* (HACQ.) KERN. — In rupestr. e reg. infer. usque ad alp. — In m. Lovćen (Pč, Ba, Kš, Vh, Ho), in distr. Bratonožići (Pč); circa Njeguši (Ba, Pej, Ro); in m. Rumija supra Bar (Ba, Lo, Do); Gradište supra Kolašin (Ba, Ho); Žurim (Ho); Farmaki distr. Lješanska (Ro); ad ripas fl. Morača et Ribnica pr. Podgorica dic. medit. (Ro); in subalp. m. Lukavica planina, ca 1600—1800 m (Ro).

— — f. *rotundifolia* BECK. — Lovćen (Ro) cum formis intermediis.

— — f. *durmítoreae* ROHL. SBGW. XVII: 30, 1903. — Capitulis minoribus (5—7 mm latis), calycis laciniis minoribus (ca 1—1.5 mm), foliis oblongo-lanceolatis densius imbricatis. — Ad lat. m. Durmitor supra Crno jezero, ca 2000 m (Ro).

### *Polycarpon* LOEFL.

- \*457. *P. tetraphyllum* L. var. *typicum* HAL. — In rupestr. et incultis reg. mediter. — Circa Bar et Drušići (Ro); ad Ulcinj (Ba).

— — var. *alsinefolium* (MILL.) ARC. — In rupestr. et arenosus reg. medit. — Circa Bar (Ho, Ro); ad Ulcinj et Danilovgrad (Ro).

### *Spergularia* PERS.

- \*460. *S. salina* J. et C. PRESL. — In maritimis ad Novi Bar (Do).

462. *S. rubra* (L.) PERS. (= *S. arvensis* ASCH.) — In pascuis reg. subalp. raro. — Štavna sub m. Kom, ca 1700 m (Ro); Kolašin in valle fl. Tara (Ja); ad Andrijevica (Df).

### *Spergula* L.

465. *S. arvensis* L. — In agris et arenosis. — Circa Grašovo (Pč); Gvozd sub m. Vojnik (Ba); Mratinje in valle fl. Piva (Ro); Kralje et Trešnjevik pr. Andrijevica (Ro, Ja); Kolašin (Ja).

*Scleranthus* L.

468. *S. neglectus* ROCH. — In pascuis subalp. et alp. — Kom, Carine, Planinica (Ba, Ja); in alp. m. Sjekirica (Ro).

\*470. *S. uncinatus* SCHUR. — In pascuis subalp. et alp. in omnibus fere montibus frequens.

\*— f. *rectisepalus* ROHL. in FEDDE Rep. 1937. pag. 201. — Sepala pro maxima parte erecta, tantum nonnulla parum uncinato-incurva. — Inter typum ad Krivi do supra Aftovac distr. Piva (De, Si).

472. *S. annuus* L. subsp. *annuus* (L.) THELL. — In cultis, in arenosis et ad vias e dizione mediter. usque ad reg. subalp. frequens et vulgaris.

— subsp. *polycarpus* (TORN.) THELL. — In cultis ad Dedići pr. Bar (Ba).

— f. *imbricatus* BECK. — Cum typo ad Njeguši sub m. Lovćen (Ro, Pej).

*Minuartia* L.

\*477. *M. fasciculata* (L.) HIERN. — Ad vias et in locis apricis reg. infer. et subalp. — Pivska planina: pr. Pišće versus Nedajno (De, Si).

— var. *pubescens* KOCH. — Crmnicka nahija (Eb).

479. *M. bosniaca* (BECK.) DEG. — In rupibus reg. subalp. et alpinae. — Ad ped. m. Balj et Jerinja glava pr. Andrijevica (Ba, Ro, Ja); Treblješ luka (Ho); in alp. Jasvorje, Korita rovačka, Lukavica planina et Durmitor (Ro); in valle fl. Tara pr. Kolašin (Ja); inter Andrijevica et Plav (Df); Krivi do et Pošće distr. Piva (De, Si). Huc spectat verosimiliter „*Alsine mucronata*“ a PANTOCSEK e Sinjavina planina indicata et „*A. rostrata*“ a HORÁK in m. Kom Kučki lecta.

480. *M. setacea* (THUILL.) HAY. — In m. Kom, loco Orlova Skala et circa Šavniki (Pt); ad Ostrog et in m. Javorje (Pč); in sax. m. V. Štirovnik-Lovćen (Ba); in m. Kom; Sinjavina planina supra Vratlo (Ba). Verosimiliter loca hic enumerata ad *M. bosniacam* pertinent.

485. *M. Velenovskýi* (ROHL.) HAY. — Affinis *M. tenuifoliae*, sed ab ea bene distincta. Antherae violaceae, sepala ovata breviter acuminata et concava; petala latiora magis obtusa calyce tertia vel quarta parte breviora, semina tenuiter tuberculata.

lata. — In lapidosis et arenosis ad rip. lac. Scodrani pr. Vir (Ro, Do); ad Hani Grabom in valle fl. Cijevna ad fines Albaniae (Df).

487. *M. viscosa* (SCHREB.) SCHINZ et THELLUNG. — In aridis reg. medit. frequens. — Circa Vir, Ulcinj, Rijeka et Podgorica (Ro); ad Bar (Ro, Do).

488. *M. mediterranea* (LED.) K. MALÝ. — In lapisdosis apricis reg. calid. — Circa Cetinje et Grahovo (Pč); ad Bar et Ulcinj (Ro).

— var. *confertiflora* (WILLK.) BRIQ. — Cum typo ad Bar (Ro).

492. *M. verna* (L.) HIERN. subsp. *montana* (FNZL.) HAY. — In rupestr. et lapid. reg. subalp. et alp. in tota dizione frequens.

— subsp. *Gerardii* (WILLD.) GRAEBN. — In pascuis et lapid. reg. alpinae. — In m. Crna planina, Kom, Sinjavina, Durmitor (Pt, Pč, Ro).

— f. *media* (PANT.) GRAEB. cum typo in m. Kom (Pt).

— f. *scardica* (GRIS.) GRAEB. — In m. Kom (Pt); Durmitor (Čurčić fide MALÝ).

494. *M. hirsuta* (M. B.) HAND. MAZZ. subsp. *falcata* (GRIS.) MATTF. var. *denudata* (FENZL) GRAEB. — In rupestr. alp. m. Kom et Mali Durmitor (Pt).

496. *M. recurva* (ALL.) SCHINZ. et THELL. subsp. *eurecurva* MATTF. — In pasc. alp. m. Lukavica planina (Ro).

— var. *nivalis* BOISS. — In alp. m. Kunj Kostiča distr. Kuči (Ba); in rupestr. m. Mali Durmitor (Pt). Loca hic enumerata potius ad subsp. *eurecurvam* pertinent.

498. *M. graminifolia* (ARD.) JÁV. subsp. *clandestina* (PORT.) MATTF. — In rupestr. et gramin. alp. in omnibus montibus frequens. Occurrunt formae: f. *dinarica* (BECK.) GRAEBN., subf. *subglabra* (BECK) HAY., f. *semi-glabra* (VIS.) HAY. et f. *glaberrima* (VIS.) HAY. Omnes saepe in eodem loco cum formis intermediis. In reg. media vidi ad Pošćensko jezero pr. Šavnik ca 900—1000 m.

\*502. *M. capillacea* (ALL.) GR. — In rupestr. alp. m. Lovćen loco Jezerski vrh (Ho); distr. Kuči (Ba).

503. *M. Baldaccii* (HAL.) MATTF. (= *Alsine liniflora* BALD. N. G. B. It. VI: 34, 1896.) — E Monten. a cl. HAYEK indicata; locus mihi ignotus (a cl. BALDACCI in m. Čukali pr. Skadar in Albania lecta).

505. *M. sedoides* (L.) HIERN. — In rupestr. et lapidos. reg. alpinae. — In m. Kom et Mali Durmitor (Pt); in m. Durmitor jugo Šljeme (Pč, Ba); Suhi vrh pr. m. Kom (Ba); Maglić Pivski (Murbeck); Bobotov et Savin Kuk in m. Durmitor (Ht, De, Si).

### *Arenaria* L.

512. *A. Halacsyi* BALD. Malpighia V: 64. — Perennis, caespitosa; folia parvula ovata, spathulata vel lanceolata, carinato-uninervia, glanduloso pilosa, vel subglabra in ramis sterilibus approximata; caules 1—2-flori, pedunculi longi villosi eglandulosi; sepala herbacea oblongo-lanceolata obtusa margine membranacea glanduloso-pilosa; petala late spathulata calycem vix superantia staminibus aequalia; capsula ovata calyce paulo longior; semina alata levia: — In rupestr. m. Kom Kučki ca 2350 m (Ba).

514. *A. gracilis* W. K. — In rupestr. subalp. et alp. — In m. Jastrebica (Pč); Dobri do in m. Durmitor; in m. Maglić ad fines Bosniae, usque ad 2200 m (Ro); in m. Kom; Gradište supra Kolašin (Ba).

516. *A. rotundifolia* M. B. var. *Pančićii* DEG. et BALD. „A typo differt foliis non orbiculatis sed ovatis, pedicellis calyce 2—3plo longioribus, sepalis lanceolatis vel acutissimis uninerviis, petalis calycem excedentibus.“ — In herbidis et lapid. mobilibus reg. alpinae frequens. — In m. Durmitor, Maglić, Kom, Sinjavina, Jablan vrh et Gradište supra Kolašin; etiam in montibus in distr. Kuči ad fines Albaniæ: Kariman, Planinica, Mojan, Rikavac, Kostića, Rogam (Pč, Ba, Ro); in m. Visitor pr. Andrijevica (Sk).

518. *A. serpyllifolia* L. — In cultis, lapidosis et ruaderatis in tota ditione e reg. mediter. usque ad alpinam (hic rarius) frequens. Forma *viscida* DC. et subf. *patula* (MARTR. DON.) ROUY et FOUC. cum typo.

— var. *alpina* GAUD. f. *alpicola* BECK. — In lapid. alp. Vermoš planina ad fines Albaniæ (Df).

519. *A. leptoclados* GUSS. — In lapid. et arenosis. — Inter Krstac et Njeguši ca 900 m (Ro).

— f. *viscidula* (ROUY et FOUC.) HAY. — Ad Cetinje et Rijeka (Ro); Han Grabom in valle fl. Cijevna ad fines Albaniæ (Df); ad Bar (Do).

*Moehringia* L.

525. *M. trinervia* (L.) CLAIRV. — In silvis et dumosis reg. superioris. — Viruša dol sub Crna planina (Pt); Javorje planina supra coenob. Morača (Pč); in pascuis pinguibus Mokre distr. Kuči (Sz), Kamenjak (Ho); in m. Vojnik, Lovćen, Varda sub Ledenica planina, supra coenob. Piva et circa Andrijevica (Ro); Kralje sub m. Kom, in valle fl. Tara inter Han Garančić et Kolašin (Ja); Vermoš planina ad fines Albaniæ (Df); Rikavac distr. Kuči (Ba); Rumija (Do).

533. *M. muscosa* L. — In rupestr. et umbr. reg. alpinae et subalp. — In tota ditione frequens.

*Sagina* L.

534. *S. subulata* (SW.) PRESL. — In pascuis alpinis m. Sjekirica planina supra Andrijevica (Ro), sub m. Kom Kučki (Lo).

535. *S. sагinoides* (L.) DT. — In pascuis subalp. et alp. — Korita sub m. Hum Orahovski distr. Kuči (Ba); Bukovica sub m. Durmitor; Vališnica in m. Durmitor; Piperska Luskavica, Zeletin supra Andrijevica; m. Maglić ad fines Bosniae, 1300—2200 m (Ro); Mliječni Dolovi in m. Durmitor (Ht).

537. *S. apetala* L. — In pascuis reg. infer. praecipue dic. mediter. circa Danilovgrad (Pt, Ro), Bar, Ulcinj, Vir et Rijeka (Ro); etiam in valle fl. Lim ad Andrijevica, circa 800 m (Ro); in pascuis Rogam sub m. Kom (Ba).

538. *S. procumbens* L. — In arenosis humidis, in pascuis et ad vias reg. subalp. et alpinae. — In m. Vjetnik distr. Bratonožići, Viruša dol sub Crna planina et in m. Kom (Pt); in sax. herbidis m. Javorje et Kukuraj; Crvena Stijena in m. Durmitor (Pč, Ba); Konjsk planina (Ho); inter Cetinje et Njeguši (Ki); in m. Lovćen (Pej, Ro), Velki Maglić et Crna planina distr. Kuči (Ba).

*S. nodosa* FENZL. a cl. PANTOCSEK e valle Viruša dol sub m. Crna planina indicata („forma apetala“) certissime ad aliam spec. pertinet.

*Holosteum* L.

540. *H. umbellatum* L. — In gramin. et cultis ad Nješguši et Cetinje (Pč).

*Moenchia* EHRH.

543. *M. manticaria* (TORN.) BARTL. — In campis asperis, in graminosis regionis infer. et mediae. — Circa Cetinje (Pč), ad lat. m. Rumija (Ba), inter Šavniki et Nikšić loco Krnovo; in valle fl. Piva ad coenob. et sub Goraňsko, circa Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica, Rijeka, Kokoti, Andrijevica et Berane (Ro); Kralje, Matoševo et Kolašin (Ja, Ro).

*Cerastium* L.

544. *C. dinaricum* BECK et SZ. — In glareosis alpinis m. Kom et Žijovo (Pč, Sz, Ba, Ho).

547.\* *C. grandiflorum* WK. — Per aprica et saxosa reg. mediae et alpinae fere in omn. montibus frequens.

— subf. *lasiostemon* CORR. — Cum typo in m. Lovćen (Ro), Savin kuk in m. Durmitor (De, Si); etiam in valle fl. Lim prope Andrijevica; supra coenob. Ostrog in valle fl. Zeta et supra Pošćensko jezero prope Šavnik; in m. Lovćen, Mavralnik, Vojnik, Durmitor, Maglić Pivski, Maganik, Lukavica, Košrita rovačka, Štirni do, Pavlova livada, Maglić Kučki, Javorje, Konjsk planina (Pč, Ba, Ho, Ro, Ja); Rumija (Do).

550. *C. lanigerum* CLEM. var. *Dollineri* BECK. — In rupestr. et glareosis reg. alp. et subalp. — In montibus Hum Orahovski, Kunj Kostiča, Vila, Planinica, Maglić Kučki, Dibala et Strunga distr. Kuči ad fines Albaniae; Kom, Pivljan; Građište pr. Kolašin; etiam in valle fl. Lim pr. Andrijevica (Sz, Ba, Ho, Ro, Ja); etiam in Bijela Skala et Medjurečka planina supra Bar (Ba); in m. Rumija (Do).

— f. *semiglabrum* BECK. — In lapid. mobil. m. Kom Vasojevički (Ja).

— f. *pilosiviscidulum* (BALD.) HAY. — In m. Kariman supra lac. Rikavac et in m. Vila distr. Kuči (Ba).

\* In HAYEK, Prodr. Fl. penins. Balc. I:204 erronee „C. grandifolium“.

— var. *decalvans* (SCHLOSS. VUK.) HAL. — In m. Hum Orahovski distr. Kuči et in m. Rumija supra Bar (Ba); in cacumine m. Lovćen cum f. *pauciflora* BECK (Ro); in m. Žijovo distr. Kuči (Ba).

— var. *durmitureum* ROHL. SBGW. XXXVIII: 31, 1904. — Caulis cum pedunculis sepalisque dense glandulosopilosus; folia decalvantia. — In alpibus m. Durmitor, circa 2200 m; in m. Lovćen (formae ± verg., Ro); Savin Kuk in m. Durmitor (De, Si).

552. *C. arvense* L. subsp. *ciliatum* (W. K.) HAY. f. *alpicolum* FNZL. — In m. Durmitor jugo Šljeme (Pč, Ba).

— subsp. *rigidum* (VITM.) HEGI. f. *Beckianum* (HAND. MAZZ. et STÄDLM.) GRAEB. — In glar. summi m. Maglić Pivski (Ro); Krivi do distr. Piva (De, Si).

— var. *Thomasii* (TEN.) ASCH. et KAN. — E m. Gradište supra Kolašin a cl. BALDACCI et e m. Mali Durmitor a cl. PANTOCSEK indicatum. Planta dubia (cf. ASCH. GRAEB. Syn. V. 1: 608.)

553. *C. moesiacum* FRIV. — In pascuis et herbidis reg. subalp. et alpinae frequens. — In montibus dicionis septentr. et orient.: Kom, Sinjavina, Gradište, Vojnik, Durmitor, Lukavica, Konjsk planina, Božur planina distr. Piva; etiam in omn. mont. ad fines Albaniae distr. Kuči: Mali Maglić, Hum Orahovski, Kunj, Kostića Dibala, Pešinjak, Vila, Planinica etc.; in valle fl. Perućica et circa Andrijevica; Trešnjevik, Štavna, Rudo Brdo et Pivlan pr. m. Kom, in valle fl. Tara ad Han Garančić (Pt, Pč, Sz, Ba, Ho, Ro, Ja); Piva planina pr. Nedajno (De, Si).

556. *C. lanatum* LAM. f. *glutinosum* (KOCH) HAY. (= *C. gnaphalodes* PANT.). — In glareosis m. Kom loco Orlova Skala (Pt, Ho); Crna planina pr. Kom Kučki (Ba); in m. Štirovnik (Ba); Jablan vrh in Sinjavina planina (Ba); Lovćen (Ba). (An ad spec. praeced. pertinens?)

\*557. *C. silvaticum* W. K. — In silvis reg. mont. ad lat. montis Maglić Pivski (Ro).

558. *C. caespitosum* GILIB. — In gram. reg. mediae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt); ad Cetinje (Pč, Ba), sub m. Kom Kučki (Ho); Krstac pr. Njeguši (Ro).

\*— var. *canescens* GUERKE. — Tota planta breviter densissime cano-hirsuta. — Cum typo ad Njeguši et in monte Lovćen (Pej, Ro).

559. *C. brachypetalum* DESP. var. *eglandulosum* FZL. — In gramin. reg. calid. frequens. — Circa Bar, Ulcinj, Rijeka, Podgorica, Njeguši; etiam ad Andrijevica (Ro).

— var. *glandulosum* KOCH. (= *C. tauricum* SPR.). — Ad Andrijevica (Ro). Verosim. huc spectat (vel ad var. praec.) planta „in m. Kom.“ a cl. PANTOCSEK lecta. Ad viam inter Cetinje et Belveder (Ld, Ki).

\*— subsp. *luridum* (GUSS.) BOISS. var. *Roeseri* (BOISS. HELDR.) BOISS. — In m. Jezerski Vrh supra Njeguši (Ho).

560. *C. viscosum* L. — In gramin. cultis, ad vias reg. infer. frequens. — Circa Rijeka (Pt, Ro); ad Njeguši et Cetinje (Pč, Ro); circa Bar, Ulcinj, Vir et Podgorica (Ro).

\*563. *C. glutinosum* FRIES. — In gramin. et ad vias. — Circa Bar, Ulcinj, Boljevići et Vir in dic. mediter.; etiam in valle fl. Rijeka et in m. Jerinja glava supra Andrijevica reg. subalp. usque ad 1400 m (Ro).

— subsp. *palens* (SCHULT.) SCHINZ et KELL. — Krivi do distr. Piva (De, Si), Bar (Do).

566. *C. semidecandrum* L. — In gramin. et lapid. reg. mont. et subalp. — Kovčice sub m. Durmitor cca 1400 m (Pt); Njeguši (Ro); Golo Brdo inter Cetinje et Njeguši 900—1200 m (Gi).

568. *C. campanulatum* VIV. — In rupestr. et incultis reg. calid. — Krstac pr. Njeguši (Ld, Ki, Pej), circa Bar et Ulcinj (Ro); in m. Lovćen (To, Ro, Pej).

570. *C. rectum* FRIV. — In silvis et herbidis reg. subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt). In valle fl. Tara et sub m. Kom (Pč); Ledenica planina distr. Piva, in valle fl. Perućica sub m. Kom; in m. Balj, Jerinja glava et Sjekirica planina pr. Andrijevica; in valle Jelovica sub Bjelastica planina (Ro); in m. Trešnjevik pr. m. Kom (Ja); in pascuis Rogam sub m. Kom (Ba); in m. Visitor (Sk).

578. *C. cerastioides* (L.) BRITTON — In sax. humidis, in pasc. udis ad nivem liquesc. reg. alpinae. — In m. Kom (Pt, Ba); supra lac. Rikavac distr. Kuči (Ba); in m. Maglić

Pivski, m. Durmitor, Zeletin et Sjekirica (Ro); inter Plav et Dečani ad fines Albaniæ (Df).

*Myosoton* MCH.

579. *M. aquatum* (L.) MCH. (= *Malachia aquatica* FR.). — In fruticetis humidis ad ripas reg. infer. et mediae. — Circa Rijeka, Sinjac et Vir (Pt, Pč), in valle fl. Piva sub Mratinje et in valle fl. Tara ad Matoševu (Ro).

*Stellaria* L.

580. *S. nemorum* L. subsp. *montana* (PIER.) MURB. — In silvis humidis et in fossis reg. subalpinae. — Crna planina distr. Kući (Pt); sub monte Durmitor (Pč, Ro); Rupa Konjska sub m. Vila et in silva Skrobotuša distr. Kući (Sz); in monte Maglić Pivski et m. Vojnik; in valle fl. Perućica sub monte Kom, in valle Lijeva rijeka (Ro). Verosimiliter loca hic enumerata partim ad subsp. sequentem pertinent.

— subsp. *glochidispermum* MURB. — „Folia superiora longius petiolata basi cordata latitudine saepissime duplo longiora; bractae subito decrescentes, superiores perparvae submembranaceae; semina margine glochidiato-papillosa.“ — In monte Cura prope Han Garančić in valle fl. Tara (Ja).

581. *S. media* (L.) VILL. — In cultis et ruderatis reg. infer. et mediae. — Ad Njeguši (Pč, Ro); circa Bar, Ulcinj, Podgorica, Šavniki, Andrijevica et verosimiliter alibi frequens (Ro).

582. *S. holostea* L. — In silvis reg. subalp. — In monte Javorje (Pč); ad Šavniki; in valle fl. Piva ad coenobium et sub Mratinje, circa Andrijevica et Sjekirica planina (Ro).

— var. *orientalis* VELEN. — Tota planta minute scabrida, folia latiora (media 5—6 cm longa et cca 1 cm lata) imprimis subtus dense pilosa; calycis laciniis ovato-lanceolatis, latioribus. — Varda planina supra coenobium Piva; in dumetis ad Andrijevica, cca 800—1400 m (Ro).

583. *S. graminea* L. — In graminosis, ad sepes et in dumetis reg. subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina, sub monte Kom et Durmitor (Pt); circa Cetinje (Pč), ad latera m. Lovćen (Ba, Kš, Ro); sub m. Balj pr. Andrijevica (Ba, Ro); ad pagum Staniefto (Pichler).

— f. *grandiflora* PETERM. — Cum typo ad Andrijevica (Ro).

\*— f. *glaucescens* GAUD. — Flores maiores, folia et caulis glaucescentes. — Cum typo ad Bukovica prope Njeguši (Ro).

\*585. *S. alsine* GRIMM. — In uliginosis vallis fl. Lim et Zlorječica prope Andrijevica, cca 800 m (Ro).

### *Saponaria* L.

586. *S. bellidifolia* SM. — Folia basalia spathulata, cauſina linearia omnia glabra; flores parvi lutei, dense capitati. — In monte Što et Gradište supra Kolašin (Ba, Ro); Ledenica planina et Borkovići distr. Piva; Maglić Pivski; Korita rovačka, Sinjavina planina (Ro); in monte Pej et Glave supra Kralje pr. Andrijevica (Ja).

589. *S. officinalis* L. — Ad ripas in dumetis humosis reg. infer. et mediae in tota dicione.

— f. *hirsuta* WIERZB. — Tota planta pilis brevibus densissime obsita. — Cum typo et formis interm. ad Njeguši (Ro).

### *Vaccaria* MED.

592. *V. pyramidata* MED. — Inter segetes reg. calidioris.

— subsp. *parviflora* (MCH.) HAY. — Ad Njeguši et Vir (Pč); circa Bar, Boljevići, Podgorica dic. medit. (Ro); etiam in valle fl. Tara prope Kolašin reg. mediae (Ro).

— subsp. *grandiflora* (FISCH.) HAY. — Inter Njeguši et Četinje loco Bukovica (Ro); Možur planina infra Kruči et Krula prope Bar (Ba).

### *Tunica* SCOP.

609. *T. illyrica* (L.) FISCH. et MEY. — In rupestr. et gramin. m. Jerinja glava prope Andrijevica cca 1200 m (Ro).

611. *T. saxifraga* L. — In rupestr. in tota dicione frequens.

### *Kohlrauschia* KUNTH.

\*616. *K. velutina* (GUSS.) RCHB. — Vaginae foliorum latitudine caulis 2—3plo longiores; caulis internodiis mediis velutino-pubescentibus; petala rosea bifida. — In gramin. siccis

reg. infer. — Ad Podgorica; etiam ad Zagarać supra Danilovgrad (Ro); in m. Rasovatac supra Vir (Eb).

617. *K. prolifera* (L.) KUNTH. — In arenosis et lapisdosis. — In valle fl. Lim et Zlorječica prope Andrijevica (Ho, Ro); ad Boljevići et Limljani prope Vir (Eb).

618. *K. glumacea* (CHAUB. et BORY) HAY. — In lapid. et rupestr. reg. calidioris. — Ad coenob. Duga (Pt), Gračanička rijeka in Nikšićka župa (Pč); circa Bar et Podgorica (Ro); in pratis sub m. Vojnik; in saxosis supra coenob. Morača; circa Nikšić; Konjuhe prope Andrijevica (Ba).

### *Dianthus* L.

619. *D. armaria* L. — In silvis et rupestr. dumosis reg. infer. et mediae. — Ad Danilovgrad (Pt); Njeguši (Pč, Ho, Ro); Konjsk planina (Ho); ad latera montis Vojnik et in valle fl. Piva supra coenobium (Ro); Konjuhe pr. Andrijevica; Nikšić, Bar (Ba).

— f. *leiocalyx* DEG. — Calyx glaber. — Ad Topolica pr. Bar (Do).

621. *D. armastrum* WOLFN. — In graminosis et silvis reg. subalpinæ. — Circa Lukovo (Pt); in monte Vjetrenik (Sz, Ja); in valle fl. Lim et ad Kralje pr. Andrijevica (Ho, Ro, Ja); Pošćensko jezero pr. Šavnik; in valle fl. Piva supra coenobium Piva; Nedajno in Pivska planina; Gornje polje pr. Njeguši (Ro); supra coenobium Morača et in valle fl. Tara inter Han Garančić et Kolašin (Ja); ad Vunsaj pr. Plav ad fines Albaniæ (Df).

628. *D. barbatus* L. — Sub monte Durmitor jugo Štulac (Pč); ad Bar (Ho).

631. *D. liburnicus* BARTL. — In herbidis ad latera montis Rumija supra Bar, cca 1500 m (Ba); in monte Velki Maglić distr. Kuči (Ba).

633. *D. Knappii* (PANT.) ASCH. et KAN. — In lapisdosis et graminosis reg. montanae calid. — Inter Grahovo et Bijela Gora (Pč); circa Viljuša (Ro); in monte Sutorman supra Bar (Ba). — Habitu *D. liburnico* similis sed flores citrini subimberbes ad faucem subtiliter purpureo-punctati, capitula pauciflora; caules undique scabri, foliorum vaginae breviores, 3—5 mm, involucri folia membranacea in apicem herbaceam attenuata.

637. *D. croaticus* BORB. — In pratis subalpinis. — In monte Jastrebica (Ad); Lovćen (Bierbach); Ledenica planina; Pivska et Sinjavina planina (Ro).

— subvar. *levis* BECK. — In graminosis subalpinis montis Balj pr. Andrijevica (Ro).

638. *D. Haynaldianus* BORB. — Ad basim summi jugi montis Lovćen (Ba).

642. *D. sanguineus* VIS. — In graminosis et locis saxosis. — In valle fl. Perućica sub monte Kom (Pt); Sustaš pr. Bar (Ba sub *D. carthusianorum*); Bukovica pr. Cetinje (Ro); Velki Bostur in monte Lovćen (Kš); Krstac et Vališta pr. Njeguši (Gi, Ro); Velki Maglić distr. Kuči, Rogam sub monte Kom, mons Lisa supra Kolašin; Crvena Stijena sub monte Durmitor (Ba).

645. *D. cruentus* GRIS. — In pratis subalpinis sub monte Durmitor (Pt, Pč); Sinjavina planina, Viruša dol sub Crna planina, Perućica sub monte Kom (Pt); Njeguši (Ho); Velestovo in nahija Katunska; supra coenob. Piva, Zakamen sub Ledenica planina et Andrijevica (Ro); Suhi vrh pr. Kom; Ječmeni do in Sinjavina planina (Ba).

\* — var. *Baldaccii* (DEG.) BECK. — Squamae involucri et calycinae tenuiter puberulo-scabrae. — Bežovo distr. Kuči (Ba); Rudo Brdo distr. Vasojevići (Ja); inter Plav et Dečani ad fines Albaniae (Df); Krivi do distr. Piva, in valle fl. Tara pr. Lever Tara (De, Si).

— f. *fastigiatus* (PANT. Adnot. 105) F. M. WILL. — A typo differt caule apice in cymam trifasciculatam diviso, calycis tubo breviore (1–1,2 cm). — In pratis vallis Viruša dol sub monte Kom (Pt). Sec. HAYEK planta hybrida aut monstrosa videtur.

648. *D. tristis* VELEN. — Caudiculo tenui longe repente, caule acute tetragono glabro, foliis difformibus eis rosularum vix 1 mm latis, caulinis triplo latioribus 5–7 nerviis internodio brevioribus, vaginis diametro caulis 3–4 plo longioribus squamis involucri et calycis obscure fuscis, calyce cca 1,2 cm longo atropurpureo, petalorum lamina 5–6 mm longa purpurea. — In graminosis et fruticetis alpinis vel subalpinis. — In montibus ad fines Albaniae distr. Kuči: Planinica, Dibala et Koštica (Ba); in montibus Ranisava, Durmitor, Ledenica, Maglić, Sinjavina, Štirni do, Piperska Lukavica (Ro); in valle

fl. Tara supra Han Garančić (Ja); Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si); Kom Kučki (Lo).

\*— f. *alpinus* BOŠNJAK in Glasnik Zagreb 1938, p. 23. — Caulis ad 13 cm altus. — In alp. montis Prokletija (Boš).

649. *D. lateritius* HAL. — In monte Kom, Durmitor, Lovćen et Žijovo (Pt, Pč, Ba). Loca enumerata verosimiliter ad aliam spec. pertinent.

657. *D. Pancićii* VELEN. — Involuci phyllis totis scariosis eximie ferrugineo-fuscis, aristis curvatis calyce brevioribus, petalis pallide roseis, vaginis caulis diametro 4plo longioribus, inferioribus lilacino-purpureis. — In herbidis alpinis et subalpinis montis Maganik (Ho) et montis Jerinja Glava supra Andrijevica (Ro).

683. *D. deltoides* L. — In herbidis regionis subalpinae et alpinae montium dic. septentr. et septentr.-orient. frequens. — E regione infer. tantum ad Vir a cl. PANTOCSEK indicatus. E monte Lovćen adhuc non vidi.

— var. *serpyllifolius* BORB. (= *D. Degenii* BALD.). — Folia surculorum sterilium elliptica obtusa subtus elevatim nervosa dense imbricata, flores minores. — In valle fl. Lijeva rijeka (Ba).

690. *D. ciliatus* GUSS. subsp. *dalmaticus* ČELAK. — In rupestribus regionis calidioris. — Ad Vir, Ostrog, Nikšićka župa, mons Jastrebica (Pt); circa Njeguši, Bar, Rudine nikšićke, Borkovići (Ro), sub monte Vojnik (Ro, Ba).

— var. *medunensis* (BECK et SZ.) HAY. — A typo differt praesertim petalis inciso-dentato-fimbriatis. — In rupestr. dic. orient. — Circa Medun (Sz, Ba, Ho); Fundina (Ba), Duklja, Bioče et Klopot Vilac (Ja); Podgorica (Ro olim sub *D. dalmatico*).

× *D. ciliatus* subsp. *dalmaticus* × *Nikolai* (ROHL. Magy. Bot. Lap. VI: 152, 1907) HAY. (= *D. Kašpari* ROHL.). — Inter parentes sub mont. Vojnik (Ro).

\*×*D. sanguineus* × *silvestris* (= *D. Caroli-Malyi* ROHL. IX. Beitr. 1933, p. 5). — Inter parentes ad Njeguši loco Kunji do (Pej, Ro).

693. *D. silvestris* WULF. subsp. *tergestinus* (RCHB.) HAY. — In calcareis ad Krstac et Prševa glavica

prope Njeguši (Pej, Ro); in monte Rumija supra Bar et ad Vratnica prope Njeguši in var. *brevicalyx* (BECK) HAY. (Do, Ro).

— — subsp. *nodosus* (TSCH.) HAY. et

— — subsp. *eusilvestris* HAY. — Subspecies ambae in saxosis asperis reg. inferior. et submontan. in tota dizione frequentes.

— — subf. *micropetalus* RCHB. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

\*— — f. *scaber* ROHL. in FEDDE Repert. 1937, p. 202. — Caulis scaber. — Cum typo rarius.

— — f. *elatior* (BARTL) HAY. subf. *papillosum* (VIS. et PANČ.) BECK. — In monte Lovćen (Pč); Krstačko polje pr. Njeguši (Ho).

— — subvar. *uniflorus* GAUD. — In pascuis alpinis omnium montium frequens. (Planta a cl. PANTOCSEK et PANČIĆ a Rijeka dic. medit. sub var. *uniflorus* GAUD. verosimiliter ad aliam formam pertinet.)

— — — f. *transiens* HAY. — In monte Durmitor loco Savin Kuk (De, Si).

— — — var. *longicaulis* (TEN.) HAY. — In graminosis ad Podgorica reg. infer. raro (Ro).

— — — f. *viperinus* (VANDAS) HAY. — „Gracilior, calyces longiores gracilioresque, squamae calycinae in apicem viridem sensim attenuatae.“ — Ad Andrijevica raro (Ho).

\*— — subsp. *bertisceus* RECH. fil. in FEDDE Repert. XXXVIII: 150). (= *D. inodorus* L. var. *brevicalyx* BECK et SZYSZ. Plantae Cernag. p. 64; *D. caryophyllus* L. var. *brevicalyx* BALD.). — A praeced. dignoscitur squamis calycinis sensim in acumen foliaceum breve vel elongatum, semper autem squarroso-distans angustatis. — In monte Vjeternik inter Podgorica et Kolašin; in valle fl. Lim pr. Andrijevica (Ja); in dumetis circa Orahovo; pr. Njeguši, sub monte Kom Kučki et in monte Lovćen loco Štirovnik (Sz). In formis appropinquis in monte Jablan vrh pr. Vojnik et in decliv. montis Rumija (Ba); in monte Durmitor et Maglić Pivski (De, Si, Ro). Verosimiliter etiam alibi.

695. *D. strictus* S. S. subsp. *bebius* (VIS.) HAY. — In rupestribus subalpinis et alpinis in monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz); Rogam sub monte Kom Kučki cca 2100 m rarissime; in valle fl. Tara pr. Lever Tara cca 700—1300 m

(De, Si); Kostića distr. Kuči; Crvena ploča in Sinjavina planina (Ba).

696. *D. integer* VIS. — Laxe caespitosus surculis partim elongatis, caules superne quadranguli uniflori, folia brevia marginē scabra, petalorum lamina obovata integerrima 3—4 mm longa alba, subtus virescentia. — In lapidosis et rupestribus alpinis non frequens. — In monte Tičnjak pr. Lukavica planina (Ho); Dobri do et Mali Štulac in monte Durmitor; mons Maglić Pivski usque ad 2200 m (Ro); Margarita et mons Pivjan distr. Vasojevići (Ja); Nedajno sub monte Durmitor (De, Si).

698. *D. Nicolai* BECK et SZ. Pl. crnag. 56. — Petalis albis 3—4 mm longis et integerrimis *D. integrō* similis, sed differt floribus fasciculatis, bracteis latissimis truncatis cuspis datis adpressis earum paribus 2—3. — In sax. subalpinis. — Ad latera montis Dziebeze (Sz); Fundina distr. Kuči (Ba); sub monte Kom Kučki (Ho); ad latera montis Lovćen (Pej, Ro); Jasenovo polje sub monte Vojnik (Ro); in montibus distr. Kuči ad fines Albaniae: Hum Orahovski, Kostića, Dibala, Pešinjak et Planinica (Ba), in monte Vjetnik distr. Bratonožići (Ja).

707. *D. hyssopifolius* JUSL. f. *rigidus* (PANT. sub *D. monspessulanus*) HAY. — In rupestr. ad Lukovo prope Nikšić, cca 900 m (Pt). Huc pertinet verosimiliter planta a cl. PANČIĆ et BALDACCI in sax. silvestr. campi Lukovsko Polje ultra Nikšićka Župa lecta et sub *D. plumario* indicata „differt petalorum fimbriis brevioribus.“ *D. plumarius* in penins. Balc. non crescit.

709. *D. petraeus* W. K. — In rupestr. montis Durmitor sub Crvena Stijena (Pč); ad coenobium Ostrog; sub monte Lisinj pr. Bar; ad Medun distr. Kuči (Ba).

— var. *Novakovićii* BALD. Malpighia V:64. — „Squamae calycinae exteriores oblongae, apice longa herbacea, interiores repando acuminatae.“ — In rupestr. collis Jablan ad montem Vojnik, cca 1950 m (Ba).

### *Drypis* L.

\*717. *D. spinosa* L. subsp. *Linnaeana* MURB. — In glareosis et saxosis regionis subalp. et alpinae. — In montibus Durmitor, Maglić, Kom et Lovćen (Pt, Ba, Ho, Ro, De, Si, Ja); etiam ad Pošćensko jezero pr. Šavnik, cca 1000 m (Ro).

*Silene* L.

726. *S. vulgaris* (MCH.) GARCKE subsp. *angustifolia* (GUSS.) HAY. — In saxosis ad Cetinje (Pč), ad litora maris pr. Ulcinj et Bar (Ro, Do).  
— subsp. *vulgaris* (GAUD.) HAY. — In regione infer. et media vulgaris.  
— f. *vesicaria* (RCHB.) FIORI subf. *minor* BECK. — In gramin. ad Rijeka (Ro).  
— subsp. *antelopum* (VEST.) HAY. f. *puberula* (VAND.) HAY. — In dumetis et silvis regionis subalpinae et alpinae. — Kom Kučki (Ho), Božur planina distr. Piva, in monte Vojnik, Balj et Sjekirica planina, in valle fl. Jelovica sub Bjelastica planina; Štirni do pr. Lukavica planina et ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro), circa Kolašin et in monte Pivljan (Ja), supra lacum Lokva sub monte Durmitor (De, Si).  
— f. *latifolia* (GUSS.) HAY. — Orlova Skala in monte Kom (Pt).  
— subsp. *marginalata* (KIT.) HAY. — „A typo differt foliis inferioribus et mediis oblongo-lanceolatis cartilagineo-marginatis, superioribus tantum tuberculatis, cyma multiflora, floribus parvis vel mediocribus.“ — In valle fl. Perućica sub monte Kom et circa pag. Kovčice ad ped. montis Durmitor (Pt), in monte Vila distr. Kući (Ba), in lapid. mobil. sub monte Kom Vasojevički (Ro, Ja).  
— f. *hirtella* HAY. — Sub monte Prokletija ad fines Albaniæ (Df).  
— subsp. *prostrata* (GAUD.) SCHINZ et THELL. — In sax. et glareosis ad nivem deliquesc. montis Kom et Durmitor (Ho, Ro).  
— var. *Baldaccii* A. TERR. in Malpighia VII: 168. — „Caule repente gracili vix indurato, foliis lanceolatis vel ellipticis ac interdum ovatis apice acutis et poene nigro-mucronatis basi attenuatis connatisque, omnino tenuiter albo-marginatis et ciliatis; floribus parvis solitariis.“ — Ad Rogam sub monte Kom (Ba).

734. *S. conica* L. — In arenosis et lapidosis ad Podgorica reg. mediter. (Ro).

739. *S. gallica* L. — Inter segetes ad Mratinje sub monte Maglić; in arenosis ad Bar et Ulcinj (Ro).

741. *S. nocturna* L. — In incultis et lapidosis reg. infer. mediter. — Circa Bar et Ulcinj (Ro).

743. *S. trinervia* SEB. MAUR. — In herbidis regionis calidioris. — Circa Danilovgrad et Rogami (Pt), Lukovsko polje pr. Nikšić; ad Grahovo (Pč), Seljani Čukojevići (Ho), in planicie circa Podgorica (Ba, Ro), sub monte Vojnik (Ba), ad Novi Bar (Do).

750. *S. quadridentata* (MURR.) PERS. subsp. *albanaica* (K. MALY) NEUM. (= *Heliosperma pusillum* aut. monten.: PČ, PT, BA, HO, SZ non W. K.; *H. monachorum* ROHL. non VIS. PANČ.). — In saxosis et graminosis alpinis omnium montium dicionis septentr. et septentr.-orientalis: Sjekirica planina, Kom, Sinjavina planina, Vojnik, Ranisava, Durmitor, Ledenica, Maglić (Ro). In omn. montibus ad fines Albaniae distr. Kuči: Čafa Mala, Kariman Pešinjak, Rikavac, Hum Orahovski, Vila, Planinica (Ba). In monte Pivljan et in valle fl. Svinjača prope Kolašin (Ja), Krivi do distr. Piva (De, Si).

\*— — — f. *rosastra* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Flores pallide rosei; semina ex maxima parte sine papillis radiantibus et color florum rosaster, in sicco evanescens. — In alp. Prokletija (Boš).

— — subsp. *pusilla* (W. K.) NEUM. — Volujačko jezero (Ma).

\*— — subsp. *Tomasinii* (VIS.) NEUM. — In rupestr. calcareis reg. calidioris. — Circa Njeguši, Cetinje, Rijeka, Vir, Ostrog et in monte Lovćen, Lonac et Kamenjak (Pč, Ho, Ro, Ba).

751. *S. macrantha* (PANČ.) NEUM. — Petalis magnis roseis rarius albis, parum bipartitis vel truncatis 20—30 nerviis a praeced. primo aspectu diversa; folia elliptica, inferiora parva in petiolum attenuata, reliqua sessilia; capsula carpophoro 4-plo longior. — In lapid. mobil. reg. ad nivem deliquesc. in montibus ad fines Albaniae: Dibala supra Kostiča, Miočev do supra lac. Rikavac, Kom Kučki et Vasojevički (Pč, Sz, Ba, Ro, Ja). In rupestr. supra Fuša Rudnices et ad Vunsaj sub monte Prokletija ad fines Albaniae (Df).

757. *S. Waldsteinii* GRIS. (= *S. clavata* ROHRB.). — Similis spec. sequenti a qua differt praecipue calyce longiore (25—28 mm), petalorum virescenti-albidorum unguibus exser-

tis. — In rupestr. montis Lovćen, Bijela Gora, Javorje et Kom (Pč). — Meo sensu loca hic enumerata partim (vel omnia?) ad spec. sequentem pertinent.

\*758. *S. multicaulis* GUSS. (= *S. dalmatica* SCHEELE, *S. Kitaibelii* VIS.) — Calyx 14—18 mm longus, petala albida subtus olivacea, unguibus parum exsertis, capsula carpophoro aequilonga calyce inclusa. — In rupestribus reg. submont. et montanae. — In monte Štirovnik-Lovćen (Vh), mons Kom, Ledenica planina et Maglić Pivski (2000 m, Ro), Volujačko jezero (Ma).

— var. *serbica* (ADAM et VIERH.) HAY. — Capsula carpophoro brevior calyce longior. — In montibus ad fines Albaniæ distr. Kuči: Vila, Strunga, Pešnjak, Kariman, Planinica (Ba); in valle fl. Lim prope Andrijevica, in valle Svinjača prope Kolašin; prope Lopate; in valle fl. Tara ad Han Garančić et Kolašin; in monte Pej supra coenob. Morača et in monte Pivljan prope montem Kom (Ja); in monte Prokletija et ad Fuša Rudnices ad fines Albaniae (Df).

759. *S. saxifraga* L. subsp. *eusaxifraga* HAY. — In rupestr. subalp. et alp. — In omnibus montibus dicionis septentr.: Kom, Sinjavina, Lukavica planina, Vojnik, Durmitor, Maglić Pivski et cet. frequens; etiam in monte Lovćen. Saepissime in var. *macrocarpa* BECK Fl. Bosne III: 155.

— var. *petraea* (W. K.) J. MALY. — Mokre sub monte Dziebeze, mons Maglić et Hum Orahovski distr. Kuči ad fines Albaniae (Sz). Verosimil. partim ad plantam typ. vel ad subsp. sequentem pertinens.

— subsp. *parnassica* (BOISS. et SPRUN.) HAY. (= *S. fruticulosa* aut. monten. non SIEB.). — Capsula 8—9 mm longa carpophoro brevior calycem superans. — In rupestr. alpinis. — Javorje planina (Pč), Tursko Ždrijelo et Piperska Lukavica (Ho, Ro); in monte Kom et circa Andrijevica (Ro); Savin Kuk in monte Durmitor; in valle fl. Tara prope Lever Tara (De, Si). (Conf. ROHLENA V. Beitr. p. 16.)

767. *S. graminea* VIS. — In rupestr. reg. alp. in monte Durmitor jugo Šljeme (Pa, Ba).

\*768. *S. flavesiensis* W. K. — In rupestr. ad coenob. Ostrog et in monte Javorje a cl. PANČIĆ et ad Andrijevica a cl. BALDACCI indicata.

769. *S. acaulis* L. subsp. *norica* VIERH. subvar. *balcanica* HAY. et VIERH. (= var. *excapa* PANČ.). — Densissime caespitosa surculis basi lignescentibus, pedunculi breves (5 mm), parum asperati. — In pascuis et lapidosis alpinis frequens. — In monte Durmitor et Kom (Pt, Pč, Sz, Ba, Ro), Sjekirica planina, Mokra planina, Štit, Zeletin (Ro), inter Plav et Dečani (Df).

772. *S. armertia* L. — In glareosis sub monte Durmitor (Pč).

789. *S. cretica* L. — In gramin. et lapidosis ad Duklja prope Podgorica reg. mediter. (Ro).

794. *S. noctiflora* L. — In arvis et incultis reg. calid. — Circa Njeguši et Cetinje (Pč); ad Rijeka (Ho).

796. *S. Sendtneri* BOISS. — Flores numerosi in capitulum terminale subglobosum dispositi, calyx campanulatus 3 mm longus glaber, petala indivisa obovata apice rotundata vel emarginata (= var. *emarginata* BECK), ochroleuca, calyce duplo longiora. — In pascuis et pratis subalp. et alp. in omnibus montibus reg. septentr. et orient. frequens. — E monte Lovćen adhuc non vidi.

\*— f. *humilior* BOŠNJAK in Glasnik Zagreb 1938, pag. 22. — Caulis ad 10 cm altus. — In alp. montis Prokletija, Gjeravica (Boš).

797. *S. otites* (L.) SM. subsp. *eurotites* GRAEBN. — In arenosis, lapidosis et graminosis reg. infer. et subalpinae. — In monte Vjeternik distr. Bratonožići (Pt), sub monte Jastrešića (Pč), in nahija Katunska (Ba), circa Podgorica, Spuž, Danilovgrad, Nikšić, Šavnik, Njeguši; in reg. subalpina ad Bukovica sub monte Durmitor et sub Ledenica planina loco Črtov do (Ro), ad Medun distr. Kuči (Ba), Sutorman supra Bar (Eb), in valle rivi Piva et Sušica et ad Krivi do distr. Piva (De, Si).

— var. *Baldaccii* ROHL. IV. Beitr. 29. — Capsulis maioribus (6—8 mm long.), seminibus duplo maioribus pallidis, calyce sub flore fere cylindrico apice minime dilatato (nec campanulato). — In calcareis ad ped. montis Balj prope Andrijevica, ca 900 m (Ro).

\*798. *S. densiflora* URV. — A praeced. caule usque ad medium dense foliato, pedunculis calyce pubescenti-scabro

longiores, petalis spathulato-oblongis ochroleucis, seminibus testu  
nuiter rugosis differt. — In rupestr. ad coenob. Ostrog a cl.  
PANČIĆ et BALDACCI sub *S. otites* var. *exaltata* FRIV.  
indicata. (Num ad hanc vel praeced. speciem pertinet?)

805. *S. Reichenbachii* VIS. — Ad latera montis Lovćen et circa Grahovo (Pč), supra Njeguši, in monte Lastva čevska et alibi per aprica dicionis nahija Katunska frequens (Ro, Kn), ad Medun distr. Kuči; sub monte Vojnik (Ba).

814. *S. viridiflora* L. — Ab affini *S. nutans* L. praesertim foliis breviter pubescentibus, inferioribus spathulatis, mesidiis ovatis acutis, ramis inflorescentiae paucifloris, inferioribus elongatis, calyce longiore (15–20 mm), basi non umbonato, petalis virescentibus differt. — In dumetis et grassinosis reg. infer. et mediae. — Ad Rijeka, Strajnići et Danilovgrad (Pt), in monte Javorje et ad Kolašin (Pč), ad Šavniki sub monte Ivica planina (Ro), Krivi do distr. Piva (De, Si).

815. *S. nutans* L. — In dumetis et silvis reg. subalpinæ. — Ad Lukovo prope Nikšić (Pt), sub monte Lovćen (Pč), in pascuis Mokre sub monte Dziebeze (Sz), in monte Soko, Širokar, Vila distr. Kuči (Ba), Štirni do prope Lukavica planina (Ho), Velestovo in Katunska nahija (Ro), Durmitor, Krivi do distr. Piva (De, Si).

— subf. *livida* (WILLD.) OTTH. — Petala subtus olivacea. — Krstac prope Njeguši; Čevski Lisac et Lastva čevska in nahija Katunska, Ledenica planina distr. Piva (Ro), circa Andrijevica et Kolašin (Ro, Ja), in monte Trešnjevik, Pej, Glave et Pivljan inter Kolašin et Andrijevica (Ja).

— f. *simplex* PANT. Adnot. 107. — Caulis simplex; petala atrorubra, calyx rubro striatus. — In pratis ad pagum Kovčice sub monte Durmitor (Pt).

816. *S. paradoxa* L. — In dumetis et saxosis reg. infer. et mediae raro. — In valle fl. Tušina supra Buan distr. Šavniki (Pč), in valle fl. Piva prope coenob. et sub Mražinje; Drežnica prope Nikšić (Ro); supra coenob. Morača (Ja).

818. *S. italica* (L.) PERS. — In dumetis et ad marg. silvarum reg. infer. et mediae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), Šavnikи sub monte Ivica (Pč, Ro), ad latera montis Lovćen et ad Njeguši (Ho, Ro), circa Bar, Ulcinj et Bioče prope Podgorica (Ro), ad Andrijevica (Ro, Ja), Crvena Sti-

jena sub monte Durmitor (Ba), Sutorman supra Bar (Eb), in valle rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

*Melandrium* ROEHL.

828. *M. nemorale* (HEUFF.) A. BR. — In silvis et dumetis reg. subalp. et alp. mont. dicionis septentr. frequens. Crna planina, Kom, Durmitor (Pt, Ro), Sjekirica planina, Balj, vallis Jelovica et Perućica etc. (Ro). E monte Lovćen adhuc non vidi.

829. *M. album* (MILL.) GARCKE subsp. *e u = a l b u m* HAY. (= *M. pratense* ROEHL.). — In dumosis, ruderatis et ad sepes reg. infer. et subalpinae frequens et vulgaris.

830. *M. silvestre* (SCHK.) ROEHL. — In pratis montanis et subalp. — In monte Durmitor sub Crvena Stijena (Pč), in monte Trešnjevik sub monte Kom, in valle fl. Tara inter Han Garančić et Matoševo (Ja), Konjuhe prope Andrijevica (Ba).

*Lychnis* L.

831. *L. viscaria* L. — In graminosis et pratis subalpinis. — Viruša dol sub Crna planina, vallis Perućica sub monte Kom (Pt), sub monte Durmitor (Pč, Ro), Borkovići et Ledensica planina distr. Piva; Lastva Čevska et Čevski Lisac in našnija Katunska (Ro); in monte Trešnjevik et Rudo brdo prope montem Kom; in valle fl. Tara inter Han Garančić et Matoševo (Ja), Vermoš planina ad fines Albaniæ (Df).

\*— var. *prokletiae* BOŠNJAK in Glasnik L. pag. 22. — Calyx villosulus. — In alp. montis Prokletija (Boš).

833b. *L. coronaria* L. — In graminosis et dumetosis reg. infer. et subalp. frequens. — Komani, Danilovgrad, vallis Perućica (Pt), ad Čevo et Šavnik (Pč, Ro), ad Viljuša, Borkovići, coenob. Piva, Ledensica planina, Vojnik, Medun, Podgorica, Spuž, Kokoti et in monte Balj et Jerinja glava (Ro), circa Andrijevica et sub monte Kom (Ho, Ba, Ro, Ja), supra coenob. Morača et in valle Bistrica prope Kolašin (Ja).

834. *L. flos-cuculi* L. — In pratis udis reg. infer. — Circa Rijeka et Danilovgrad (Pt), Plavnica (Ro), Crmnica (Eb).

*Agrostemma* L.

835. *A. githago* L. — In agris reg. infer. et subalp. frequens.

## Lauraceae

*Laurus* L.

838. *L. nobilis* L. — In dione medit. culta (Eb).

## Aristolochiaceae

*Asarum* L.

839. *A. europaeum* L. — In silvis totae dicionis montanae et subalpinae usque ad 1800 m frequens.

— var. *intermedium* C. A. MEY. — Folia triangulare-reniformia conspicue late attenuata. — Ad Njeguši, Viljuša et sub monte Čevski Lisac in nahija Katunska cum formis intermediis (Ro, Kn).

— subvar. *patens* DOMIN (confer ROHL. V. Beitr. 108). — Sinus basalis foliorum apertus. — Cum typo raro (Ro).

## *Aristolochia* L.

844. *A. clematitis* L. — In saxosis, dumosis et vineis reg. inferioris, praecipue mediterr. — Ad Danilovgrad (Pč, Ro), Plavnica (Sz, Ro), Vir, Rijeka, Ulcinj, Podgorica, Kokoti (Ro), Bioče in valle fl. Morača (Ja); etiam in valle fl. Lim prope Andrijevica in calcareis rarius (Ro); Bar (Do).

846. *A. pallida* WILLD. — In saxosis, lapidosis et dumosis reg. infer. et subalp. usque ad 1700 m. — Ad Cetinje (Pč), inter Cetinje et Rijeka (Gi), Krstac prope Njeguši (Ld, Ro), ad latera montis Lovćen, Viljuša, Zagarać, Lješanska nahija, in monte Javorje; in monte Žoljevica et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro), Sinjavina planina (Ba).

848. *A. rotunda* L. — In herbidis et dumetis reg. infer. mediterr. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Danilovgrad et Kokoti (Ro); ad Cetinje (Ba); in monte Troica et Rasovatac prope Vir (Eb).

## Berberidaceae

*Berberis* L.

851. *B. vulgaris* L. — In saxosis reg. alpinae et subalpinae. — Ad Cevo, Čeklići, Grahovo, Viljuša et Njeguši (Pt, Pč, Ro); ad latera montis Lovćen, Vojnik, Maglić Pivski

et in Sinjavina planina (Ro); ad pedem montis Mali Durmitor (Pt), Korita rovačka prope Lukavica planina (Ho).

— f. *subrotunda* C. K. SCHNEIDER, f. *heterophylla* WIERZB. et f. *horrida* BECK. — Cum typo supra Njeguši (Ro).

— f. *macrophylla* ROHL. IV. Beitr. p. 18. — Foliis coriaceis maioribus, usque ad 8 cm longis et  $3\frac{1}{2}$  cm latis. — Cum typo ad ped. montis Lovćen (Ro).

## Ranunculaceae

### Paeonia L.

857. *P. corallina* RETZ. — Folia biternata foliolis ovatis vel oblongo-ovatis indivisis, integerrimis acutis. — In silv. sax. sub Klopot distr. Bratonožići (Pč), Korita rovačka (Ho); ad Vunsaj sub monte Prokletija (Df).

858. *P. officinalis* L. — Folia ternata foliolis trifidis laciiniis lanceolatis integris vel 2—3fidis integerrimis subtus glaucescentibus. — In dumetis saxosis supra Grahovo (Pč), Korita rovačka prope Lukavica planina (Ro).

### Helleborus L.

864. *H. odoratus* W. K. subsp. *eudodoratus* HAY. — In rupestr., dumetosis et ad marg. silvarum reg. mediae. — Nikšićka župa (Pč), Viljuša, Lastva čevska, Drežnica prope Nikšić et Andrijevica (Ro).

— f. *angustifolius* BECK. — Ad Njeguši (Pej, Ro).

— var. *istriacus* SCHIFFNER. — In valle fl. Lim et ad Kralje prope Andrijevica (Ja).

— subsp. *multifidus* (VIS.) HAY. — Ad Vrojca distr. Kući; Širokar sub monte Velki Maglić; mons Gradište supra Kolašin (Ba); Crna planina et Hum Orahovski distr. Kući (Pt, Sz), Grahovo (Pč); sub monte Kom Kučki (Ho); Viljuša, Lastva čevska, Drežnica prope Nikšić (Ro); circa Kolašin (Ja); in alp. Vermoš ad fin. Albaniæ (Df).

— var. *violascens* (BECK) HAY. — Cum typo in Crna planina (Pt).

867. *H. purpurascens* W. K. — In dumetis sub monte Kom (Pt), ad Andrijevica (Ro).

*Trollius* L.

869. *T. europaeus* L. — In pratis udis reg. subalp. et alpinae frequens. — In valle fl. Perućica sub monte Kom, Sinjavina planina, Pašina Voda, Bukovica, Vrelo jezero et Kovčice sub monte Durmitor (Pt, Ro), in monte Durmitor jugo Štulac (Pč); in monte Lovćen (Ba), Pavlova livada (Ho), Maglić Pivski, Štavna sub monte Kom, mons Jablan in Sinjavina planina, Zeletin, Jerinja glava, Sjekirica, Bjelastica planina distr. Vasojevići (Ro); Žijovo et Velki Maglić distr. Kuči; supra Kolašin (Ba).

— — f. *medius* WEND. — Cum typo non raro.

*Caltha* L.

871. *C. cornuta* SCH. N. K. var. *latifolia* SCH. N. K. — Capsulae sigmoideo-curvatae in stylum 2—2,5 mm longum sensim attenuatae. — In pratis humidis et ad rivulos sub monte Kom (Pt, Ba); ad riv. Svinjača prope Kolašin (Ja).

872. *C. palustris* L. subsp. *laeta* (SCH. N. K.) HAY. var. *alpina* (SCHUR) HAY. — Capsulae 9—11 mm longae dorso rectae tantum basi curvatae margine ventrali curvatae in stylum rectum subito attenuatae, ambitu semi-orbiculares. — In pratis humidis ad ripas reg. superioris. — In valle fl. Tara (Pč); in valle fl. Perućica sub monte Kom, Mokre sub monte Dziebeze (Sz); in montibus distr. Kuči ad fines Albaniae: Vila, Maglić, Planinica usque ad Kom (Ba); in monte Balj, Sjekirica planina, in valle fl. Jelovica et ad Andrijevica (Ro); inter Vermoš planina et Širokar ad fines Albaniae (Df); in monte Lisa supra Kolašin (Ba).

*Isopyrum* L.

874. *I. thalictroides* L. — In silvis reg. subalp. (1400 m) in Sjekirica planina (Ro).

*Aquilegia* L.

880. *A. vulgaris* L. var. *alpestris* KITT. — In rupestr. subalp. et alp. montis Kom et Durmitor (Ro).

— — var. *glanduloso-pilosa* SCHUR. — In dumetis, ad marg. silv. reg. submont. — Vallis Tara prope Matoševo et in valle Perućica sub monte Kom (Ro); in alp. Vermoš ad fines Albaniae (Df).

*Nigella* L.

883. *N. arvensis* L. — In agris et herbidis reg. infer. et mediae. — Ad Cetinje, Ostrog et Limljani (Pč), ad Kralje et Andrijevica (Ro, Ja), Medun, Nikšić (Ba).

— — f. *verruculosa* BECK. — Carpella verruculosa. — In aren. ad Bar (Do).

889. *N. damascena* L. — In lapid., arenosis, scopolis calcareis dicionis infer. mediterr. — Piperi et Danilovgrad (Pt, Ro), Medun (Sz), Cetinje, Podgorica, Kokoti, Krstac prope Njeguši (Ro), Bioče (Ja), Bar (Ro, Do).

*Aconitum* L.

892. *A. vulparia* RCHB. subsp. *Pantocsekianum* (DEG. BALD.) HAY. — Axes inflorescentiae dense villosae, flores ochroleuci tenuiter crispule pubescentes et sparse pilosi, casside 18—23 mm alta, basi 12—13 mm lata, ambitu quasi parabolica, superne rotundato-obtusa apice parum dilatata; folia sicut in subsp. *eu-vulparia*. — In silvaticis reg. superioris. — Vallis Perućica sub monte Kom (Pt, Ba, Ro), in fagetis montis Balj prope Andrijevica, Varda sub monte Kom Vasojevićki (Ba, Ro), vallis Jelovica sub Bjelastica planina, Javorje planina, Treblješ luka prope Lukavica planina, montes Vojnik, Durmitor, Ledenica et Božur planina distr. Piva usque ad 1700 m (Ro), Vermoš planina ad fines Albaniae (Df), in monte Visitor prope Andrijevica (Sk), Krivi do distr. Piva (De, Si).

893. *A. anthora* L. — In rupestr. et silvis montis Maglić Pivski (Ro). — Flores citrini, cassis humilis hemisphaerica fornicate, antice basi rostrata, margine inferiore sinuata.

897. *A. Pentheri* HAY. f. *violaceum* BOŠNJAK in Glasnik Zagreb 1938, pag. 23. — Omnes flores obscure violacei. — In alp. montis Prokletija (Boš).

— — f. *bicolor* BOŠNJAK l. c. — Omnes flores bicolores, albi et violacei. — Cum praeced. (Boš).

898. *A. divergens* PANČ. — Caulis superne patule glandulosovallosus; flores violacei casside semiorbiculari basin versus longe attenuata, semina levia ad angulos anguste alata. — In subalp. m. Balj et Piševo pr. Andrijevica (Ro).

900. *A. variegatum* L. subsp. *judenbergense* (RCHB.) GÁY. — In subalp. Kukuraj brdo sub monte Kom (Pč). An ad spec. sequent. pertinet?

901. *A. toxicum* RCHB. var. *bosniacum* BECK (confer ROHLENA V. Beitr. 8). — Inflorescentia pyramidatim ramosa axibus dense patule pilosis et glandulosis; flores coeruleo-violacei; cassis antice vix sinuata nec pronus curvata, margine inferiori leviter concavo; stamina pilosa, carpella glabra; semina transverse undulato-rugosa; folia superiora in bracteas lanceolatas sensim transeuntia. — In dumetis reg. subalp. montis Ranisava prope montem Durmitor, mons Balj supra Andrijevica (Ro).

### *Delphinium* L.

904. *D. fissum* W. K. — In herbidis subalpinis usque ad 1500 m. — Goraňsko, Borkovići, Varda et Ljut distr. Piva; mons Jerinja glava prope Andrijevica; Šavnik supra Njeguši (Ro).

— f. *pubescens* HEUFF. — In silva Skrobočuša ad ped. montis Kukura distr. Kuči (Sz), ad Medun (Ba).

— subf. *variegatum* (SAG.) HAY. — Flores albi, coeruleo-variegati. — Ad Njeguši (Sa).

— f. *dinaricum* (BECK et SZYSZ.) HAY. — Planta glabrescens, carpella glabra. — In pascuis alp. montis Hum Orahovski distr. Kuči (Sz).

908. *D. peregrinum* L. — In lapid. et cultis reg. infer. mediterr. — Ad Cetinje et Grahovo (Pč, Ba); circa Vir (Ba) et Rijeka (Ho), in monte Lisinj supra Bar, in monte Žijovo distr. Kuči (Ba), Volovica prope Bar (Do) et Vela Zabja; in saxosis ad Boljevići (Pč).

### *Consolida* S. F. GRAY.

913. *C. aiacis* (L.) SCHUR. — In lapid. et incultis reg. infer. mediterr. — Sindžon (Pt); in glareosis sub monte Sutorman (Pč), circa Ulcinj, Bar et Rijeka (Ba), inter Kotor et Njeguši (Pej), in monte Rumija (Do), Limljani prope Vir (Do).

915. *C. Uechtritziana* (PANČ.) SOÓ ÖBZ:236, 1922. — A cl. HAYEK e Montenegro indicata; locus mihi ignotus.

919. *C. regalis* S. F. GRAY subsp. *arvensis* (OPIZ)  
SOÓ. — In agris, incultis reg. infer. et mediae frequens.  
— subsp. *paniculata* (HOST) SOÓ. — Caulis ± patule pu-  
bescens; flores minores, capsula latitudine duplo longior saepe  
semilunaris. — Cum praeced. in reg. mediterr.

*Actaea* L.

922. *A. spicata* L. — In silvis et umbrosis reg. subalp.  
et alp. — In silva Skrobotuša distr. Kuči (Sz), Miočev do  
supra Rikavac ad fin. Albanae (Ba), Lukavica planina (Ho),  
in monte Durmitor, Vojnik, Balj, Jerinja glava, Kom, Sjekirica;  
circa Viljuša, Borkovići, Bukovica sub monte Durmitor, Andrijevica;  
Ravno distr. Piva, Štirni do prope Lukavica planina,  
Velestovo et Njeguši in nahija Katunska, Matoševo in valle  
fl. Tara et ad lat. montis Lovćen (Ro).

*Anemone* L.

924. *A. hepatica* L. — In silvis reg. subalp. usque ad  
1700 m. — In dizione montis Hum Orahovski distr. Kuči, Kom,  
Balj, Zeletin, Sjekirica, Javorje planina et Durmitor; etiam  
circa Andrijevica et Kolašin (Pt, Pč, Sz, Ho, Ro, Ja).

925. *A. apennina* L. subsp. *eua-pennina* HAY. —  
In dumetis et saxosis reg. infer. et mediae calid. — Circa  
Cetinje et Njeguši (Pč, Ba, Če, Gi, Ro), ad lat. montis  
Lovćen (Pej, Heider), sub monte Sutorman et Rumija (Pč,  
Ba, Ro), circa Bar et Ulcinj (Ro).

926. *A. nemorosa* L. — In silvis et dumetis reg. subalp.  
non frequens. — Viruša dol sub Crna planina (Pt); in monte  
Lovćen (Pč); Varda sub monte Kom Vasojevički (Ba); Sjekirica  
planina cca 1400 m (Ro); sub monte Durmitor (Ht).

- var. *bosniaca* BECK. — Foliorum segmenta angusta basi  
longe cuneata, profunde partita omnia petiolulata. — In fagetis  
alp. Vermoš planina ad fines Albanae (Df).

928. *A. ranunculoides* L. — Cum praeced. in silva  
reg. subalp. montis Sjekirica planina (Ro); Biogradsko jezero  
prope Kolašin (Čer).

929. *A. narcissiflora* L. — In pratis et pascuis subalp.  
et alp. — In monte Kom et Durmitor (Pt, Ba, Ro), Maglić

Pivski, Bjelastica planina, Krivi do, Mokra planina et Sjekirica planina, 1600—2200 m (Ro).

931. *A. baldensis* L. — Flores solitarii, perigonii phylla 8—12, alba, acuta, carpella dense lanato-villosa; folia involucralia (saepe infra medium caulibus inserta) basalibus conformia. — In pascuis et glareosis reg. alpinae. — In monte Durmitor, montes Vojnik et Maglič Pivski, mons Gradište supra Kolašin usque ad 2300 m (Pt, Ro, Ht, De, Si).

932. *A. hortensis* L. var. *stellata* (LAM.) GRENN. GODR. — Flores solitarii rosei, carpella dense lanato-villosa, folia involucralia indivisa vel apice triloba, folia basalia trisecta heteromorpha, exteriora segmentis latis inciso-crenatis, interiora segmentis profunde pinnatifidis. — In gramin. et dumosis reg. infer. mediterr. — In decliv. montis Rumija (Ba), circa Bar et Vir (Ro), Ulcinj (Ba).

936. *A. vernalis* L. — In pascuis reg. alp. in monte Kom (Pt, Ba, Ro).

938. *A. pulsatilla* L. var. *grandis* (WEND.) GUERCKE (= *Pulsatilla vulgaris* Aut.). — Ad latera montis Lovčen (Pč), Crkvica (Pej), in monte Kljuć supra Kolašin (Ba).

### *Clematis* L.

941. *C. vitalba* L. — In dumetis ad marg. silv. reg. infer. et subalp. locis calidior. — In valle fl. Zeta (Pč), Obod supra Rijeka (Ho), Dobrsko selo prope Cetinje (Kš), Viljuša, Borkovići, Šavnik, Goraňsko, vallis Sušica in Pivska planina sub monte Durmitor; in monte Balj supra Andrijevica usque ad 1450 m (Ro), in valle fl. Tara et Morača (Ja), Limljani et Boljevići prope Vir (Eb).

— f. *syriaca* BOISS. (= var. *taurica* BESSER). — Foliola circumcirca crenato-serrata. — Cum typo ad Medun supra Podgorica (Sz), inter Bukovica et Cetinje (Ro), Sutorman prope Bar (Do).

— f. *subdentata* BECK. — Foliola parce dentata vel + lobata. — Cum typo ad Bar (Do).

943. *C. flammula* L. — In dumetis reg. infer. mediterr. — Rijeka (Pt), Cetinje (Pč, Kn), Sinjac, Vir (Pč, Ro), Podgorica (Ho, Ro), nahija Lješanska, Danilovgrad, Bogetići (Ro), Bioće et in monte Trešnjevik usque ad Peljev Brijeg (Ja), ad Nikšić (Ba, Ro).

— f. *maritima* (L.) KOCH. — Ad Rijeka, Danilovgrad et coenob. Duga (Pt); Podgorica (Ro).

— f. *stenophylla* (HELD.R.) HAY. — Podgorica (Ho).

946. *C. viticella* L. — In fruticetis reg. infer. mediterr. — Ad Rijeka (Pt, Ro), Cetinje (Pč, Kn), Vir (Pč), Bar et Ulcinj (Ba, Ho, Ro, Do), Danilovgrad, Podgorica et Lješanska nahija (Ro), Plavnica (Ja), Njeguši (Ro), insula Lešandra (Eb).

— f. *revoluta* (O. KTZE) HAY. — Perigonii phylla tota margine alata. — Ad Plavnica (Sz).

### *Thalictrum* L.

948. *T. aquilegifolium* L. — In dumetis et silvis in tota dicione e regione inferiore mediterr. usque in reg. alpinam (cca 2000 m) frequens. In VISIANI Fl. dalm. et in HAYEK Prodr. Fl. pen. Balc. solum e regione subalpina indicatum. — In Montenegro etiam in dicione mediterr. circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica etc. frequens.

— f. *atropurpureum* (JACQ.) DC. — Circa Podgorica et Vir (Ro).

951. *T. minus* L. — In rupestr. et dumosis. — Orlova skala et Varda sub monte Kom (Pt, Ba), Kom Kučki (Ho). Verosimiliter loca hic enumerata (partim vel omnia?) ad spec. sequentem pertinent.

— var. *glandulosum* (WALLR.) KOCH. — In sax. montis Javorje (Pč). Potius ad *T. elatum* b. *glandulosum* VELEN. pertinet.

952. *T. elatum* JACQ. — In monte Dziebeze distr. Kući? (Sz), in monte Durmitor, Maglić Pivski et Lovćen (Ro); in monte Sutorman et Kosa supra Bar (Do).

\*— f. *longipes* ROHL. VIII. Beitr. pag. 27. — Panicula (sub fructu) laxissima pedunculis fructibus multoties ( $2\frac{1}{2}$ —5plo) longiores. — In dumetis ad Mratinje sub monte Maglić (Ro).

— var. *collinum* (WALLR.) HAY. — In fruticetis et saxosis. — Lukić prope Bijela Skala distr. Primorje (Ba), Varda sub monte Kom, Dragovoljići prope Nikšić (Ro), vallis Svinjača prope Kolašin (Ja), ad latera montis Lovćen; Borkovići distr. Piva; Ranisava sub monte Durmitor; montes Vojnik,

Maglić Pivski; in montibus Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

— f. *neglectum* (WALLR.) HAY. (= *T. Jacquinianum* KOCH). — Hum Orahovski distr. Kuči (Sz, Ba).

— f. *vestitum* ROHL. sub *T. flexuoso*. — Folia subtus glandulosa. — Simunj, Miljkovi dolovi et Dugi do prope Nješuši (Ro).

— f. *puberulum* (SCHUR) HAY. — Caulis solum in parte infer. glandulosos-pilosus. — Non raro cum typo.

— var. *glandulosum* (VELEN.) HAY. (= var. *Arpadianum* BORB. sp.). — Tota planta dense glandulosos-pubescentes. — In monte Lovćen et Durmitor (Ro).

954. *T. simplex* L. — In pratis humidis Mokro prope Bijela (Pt), ad Danilovgrad (Ro).

— f. *glanduligerum* ROHL. — Folia subtus glandulosa. — Ad coenob. Piva; Lastva čevska in nahija Katunska; Bukovica sub monte Durmitor (Ro), Lovćen (Ks) 900—1400 m. — In monte Lovćen occurrunt formae intermediae: solum folia superiora subtus glandulis pellucidis obsita sunt, folia cetera eglan-dulosa (= f. *transiens* ROHL. VIII. Beitr. 27).

957. *T. lucidum* L. — In pratis uligin., in salicetis ad ripas. — Ad lacum Scodranum (Pč, Ro, Ja), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica et Danilovgrad reg. infer. mediterr. (Ro); etiam in valle fl. Perućica prope Andrijevica in reg. subalp. (Ro); ad Nikšić (Ba).

— f. *peucedanifolium* (GRIS. et SCHK.) HAY. — In frutic. ad Strajnići (Pt).

— f. *glandulosum* (LECOY.) HAY. — In pratis ulig. ad Plavnica (Ro, Ja), circa Kolašin et in monte Pej prope Ko-lašin cca 1450 m (Ja).

958. *T. flavum*. — In pratis et dumetis humidis reg. infer. et mediae. — Ad Rijeka; Nižin luk prope Kolašin (Pt), Plavnica (Ja), sub monte Lisa prope Andrijevica (Ba).

— f. *microphyllum* ROHL. — Foliola multo minora ad maximum 10 mm longa. — In dumetis ad Andrijevica, cca 800 m (Ro).

### *Ficaria* ADANS.

\*961. *F. verna* HUDS. subsp. *euverna* HAY. — Ad Danilovgrad et in valle fl. Crmnica (Pč), ad Andrijevica (Ro), circa Ulcinj (Ba).

— — subsp. *calthifolia* (RCHB.) VELEN. — Inter Cetinje et Njeguši (Ki), Njeguši (Pej, Ro), in monte Zeletin prope Andrijevica (Ro), usque ad 1700 m!, in monte Lovćen (Bo).

*Ranunculus* L.

965. *R. crenatus* W. K. — In pascuis alp. ad nives deliques. — Supra Kostiča prope Širokar et in monte Velki Maglić distr. Kuči (Ba), Bjelastica planina cca 2100 m (Ro).

— — var. *magellensis* (TEN.) FIORI et PAOL. — Folia basalia triloba, lobo medio tridentato. — Sub monte Prokletija ad fines Albaniæ (Df).

967. *R. Seguieri* VILL. var. *montenegrinus* HAL. sp. — Tomentosus, foliis basalibus longe petiolatis, flores minores, fructus ovati sulcati. — In glareosis montis Kom Kučki supra Rogam cca. 2200 m (Ba).

968. *R. aconitifolius* L. — Folia tripartita, segmento medio basi libero breviter petiolulato, pedunculi adpresso pilosi, rostrum carpellorum hamatum vel spiraliter involutum. — Crna planina distr. Kuči, Kom et Durmitor (Pt, Ba), in silva Skroboša ad fin. Albaniæ (Sz). An ad spec. sequent. pertinet?

969. *R. platanifolius* L. — Folia profunde trifida lobo medio basi lateralibus conjuncto, pedunculi glabri, rarius ut calyces ciliati (= var. *ciliatus* BECK), rostrum carpellorum circulariter curvatum. — Sub monte Durmitor (Pč, Ro), Kostića distr. Kuči (Ba), Kom, Sjekirica, Bjelastica planina, Jasvorje planina, vallis Jelovica, vallis Perućica, mons Balj supra Andrijevica, Ledenica planina distr. Piva (Ro), Trešnjevik sub monte Kom (Ja), Vermoš planina ad fin. Albaniæ (Df), Volujačko jezero (Ma).

971. *R. thora* L. var. *scutatus* (W. K.) WAHLENB. — In gramin. et pascuis reg. subalp. et alp. — Vučji Zub — Bijela Gora (Pč), Kom Vasojevićki, Sjekirica, Bjelastica, Jablan vrh supra Kolašin usque ad 2200 m (Ro), in monte Gradište supra Kolašin (Ba).

973. *R. brevifolius* TEN. — Ad nives dehiscentes in glareosis montis Kom (Pt), Crvena ploča in Sinjavina planina (Ba).

975. *R. flabellatus* DESF. — In gramin. apricis reg. infer. prope Bar (Ro).

985. *R. millefoliatus* VAHL. — In lapidosis et graminis  
siccis reg. infer. et mediae calid. — Ad Cetinje (Pč, Ba), Čes-  
kanje inter Cetinje et Njeguši (Ki), circa Bar, Ulcinj, Vir,  
Podgorica, Kokoti, Lijeva Rijeka et Njeguši (Ro), etiam ad  
Andrijevica (Ro); in monte Lovćen (To).

— var. *Spreizenhoferi* (HELD.R.) HAL. — Calyx hirsutus,  
petala calyce aequilonga, rostrum apice vix curvatum fructu fere  
aequilongum. — Cum typo ad Podgorica (Ro).

\*— var. *hirsutior* ROHL. var. n. — Planta elata 40—60 cm  
alta pluriflora, sepala pilis longis adpressiusculis vel subpatenti-  
bus hirta, foliorum segmenta margine hirto-aspera. — Krstačko  
polje pr. Njeguši (Ro).

986. *R. illyricus* L. — In graminis siccis reg. mediae cali-  
doris. — Ad lat. montis Sutorman (Pč), circa Njeguši et in  
monte Lovćen (Ld, Kš, Pej, Ro), in monte Balj supra  
Andrijevica; Varda sub Ledenica planina distr. Piva; Božur  
planina supra Borkovići; in valle fl. Perućica sub monte Kom  
usque ad 1600 m (Ro); sub monte Rumija prope Bar; Suhi  
vrh prope montem Kom (Ba), in monte Rasovatac prope Vir  
(Eb).

987. *R. psilostachys* GRIS. Spicil. I: 304. — Affinis  
*R. illyrico*, a quo differt: grumae fusiformes, folia basalia tri-  
secta segmentis cuneato-rhombeis 2—3fidis acute lobatis, fructus  
sparse verrucosus rostro aequilongo. — In gram. reg. subalp. —  
In valle Zlorječica et in monte Jerinja glava supra Andrijevica  
800—1500 m (Ro).

994. *R. flammina* L. — In fossis et in paludosis reg.  
infer. mediterr. — Circa Bar, Ulcinj, Danilovgrad (Ro).

995. *R. ophioglossifolius* VILL. — Ad rivulum  
Sušica prope Danilovgrad reg. infer. (Pt). — A *R. flammina*  
dignoscitur: foliis infer. ovatis vel suborbicul. longe petiol.,  
petalis calyce subaequilongis.

998. *R. auricomus* L. — In pratis subalp. ad Vrelo  
jezero sub monte Durmitor cca 1460 m (Ro).

1001. *R. serbicus* VIS. — Folia sericea ternata; basalia  
segmentis longe petiolatis trilobis inciso-lobato-dentatis; caulina  
petiolata segmentis 2—3fidis dentatis; pedunculi teretes, sepala  
non reflexa; fructus glabri rostro subbreviore fere recto. — In  
pratis subalpinis in monte Balj, Piševo, Sjekirica et in valle  
Jelovica sub Bjelastica planina, cca 1000—1700 m (Ro).

1002. *R. lanuginosus* L. — In silvis humidis reg. subalp. in valle Viruša dol sub Crna planina (Pt), Vermoš planina ad fines Albaniae (Df), Crvena stijena sub monte Durmitor (Ba).

1004. *R. acer* L. — In pratis et herbidis reg. subalp. — Kovčice sub monte Durmitor (Pt), Mokre sub monte Dzibaze distr. Kuči (Sz, Ro), ad Andrijevica (Ro), prope Orak distr. Piva (De, Si).

— f. *fallax* ROHL. IV. Beitr. 15. — Rhizoma elongatum verticale. — In valle Zlorječica prope Andrijevica (Ro).

— f. *parvulus* CLAIRV. — In pascuis Rogam sub monte Kom, in monte Velki Maglić distr. Kuči (Ba).

— subvar. *alpinus* HEUFF. — Flores minores, caulis humilior pauciflorus. — In monte Kom (Pč).

1006. *R. oreophyllus* M. B. subsp. *concinatus* (SCHOTT) HAY. — In herbidis alp. montis Lovćen (Ma, Pichler, Pej, Ro).

\*— f. *grandiflorus* F. A. NOVÁK in sch. — Foliorum basium ambitu rotundato, dentibus ovato-lanceolatis, caulis humilioribus cca 17 cm altis, floribus ad 45 mm latis differt. — In alp. montis Durmitor (No).

— subsp. *croaticus* (SCHOTT) HAY. — In monte Durmitor jugo Šljeme (Pč), sub monte Kom (Ba), in valle fl. Tara prope Matoševo (Ro), sub monte Lovćen in formis appropinquatis (Pej, Ro).

— subsp. *euroreophyllus* M. B. — In pascuis et pratis alpinis montium dicionis septentr. — Kom, Durmitor, Šinjavina, Bjelastica, Sjekirica, Zeletin, Gradište, Jablan, Hasanac planina, Rudo brdo etc. (Pt, Pč, Ba, Ro, Ja).

— var. *velatus* HAL. — In valle fl. Perućica sub monte Kom; in monte Lovćen loco Mirkovi dolovi (Ro).

1007. *R. montanus* WILLD. subsp. *eumontanus* HAY. (= *R. nivalis* CR.). — In pascuis et pratis alpinis. — In monte Hum Orahovski? (Sz); Jezerski vrh (Ho); in monte Durmitor supra Crno jezero (Ro); Rogam sub monte Kom (Ba).

— subsp. *carinthiacus* (HOPPE) HEGI. — In graminosis summi montis Velki Maglić distr. Kuči (Sz); in montibus Durmitor, Maglić Pivski, Vojnik, Ledenica planina (Ro).

— var. *Sartorianus* (BOISS. et HELDR.) BECK. — In monte Kom (Pt, Ba, Ro); Čafa Velja prope Rikavac distr. Kuči (Df).

1008. *R. demissus* DC. var. *graecus* BOISS. — Ad nives deliquescentes montium distr. Kuči ad fines Albaniae: Kostića, supra Rikavac, Maglić, Planinica, Kom (Ba).

\*1010. *R. velutinus* TEN. — Similis *R. lanuginosus*, a quo dignoscitur sepalis reflexis, fructus rostro brevissimo recto. — In locis humidis et ad ripas. — Circa Bar et Ulcinj; etiam in valle fl. Piva sub Mratinje (Ro); sub monte Žijovo distr. Kuči; in monte Lisa supra Andrijevica; Sinjavina planina (Ba).

— f. *strigosus* PANT. Adnot. 86. — Planta pube strigosa tecta. — Viruša dol sub Crna planina, ad pagum Kovčice sub monte Mali Durmitor (Pt).

\*1012. *R. polyanthemus* L. subsp. *eupolyanthesmus* HAY. — In graminosis ad latera montis Lovćen (Ro); in alp. Vermoš planina distr. Kuči (Df); ad Rijeka et Vir (Ro).

— subsp. *breyningius* (CR.) HEGI. — In silvis regionis subalp. et alp. — Crna planina et sub monte Dziebeze distr. Kuči (Pt, Sz).

— f. *sublanuginosus* (SCHUR) BECK. — Caulis cum pedicellis patule hispidus. — Barno jezero sub monte Durmitor, Štirni do, Andrijevica (Ro); Varda sub monte Kom (Ba); Sjekirica planina; in valle fl. Perućica sub monte Kom (Ro); in monte Durmitor (No).

— var. *aureus* (SCHLEICH.) HEGI Flora III: 560. — Sub monte Durmitor (Pt).

1013. *R. repens* L. — In pratis humidis, ad ripas. — Danilovgrad (Pt); Mokre sub monte Dziebeze (Sz); Andrijevica, Ljeva Rijeka, Kolašin, Srablje jezero sub monte Durmitor (Ro); Kralje et in monte Pivljan (Ja); Vermoš planina (Df); in pascuis Rogam sub monte Kom (Ba).

1014. *R. bulbosus* L. — In herbidis et agris regionis infer. et mediae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), Plavnica (Sz), Bar (Do), Cetinje (Kš), Andrijevica (Ro).

— f. *hirsutus* SAUT. — Njeguško polje (Ro), Volovica prope Bar (Do).

— var. *meridionalis* MALINV. — Radices fusiformi-incrassatae. — In pascuis elatioribus montis Hum Orahovski (Sz).

1015. *R. neapolitanus* TEN. — Pedunculi sulcati; sepala reflexa; radices fusiformi-incrassatae; caulis cum petiolis patule pilosus; folia basalia tripartita segmento medio cuneato-obovato lateralibus bilobis obtuse dentatis; carpella levia rostro brevissimo triangulari. — In graminosis ad Podgorica reg. infer. mediterr. (Ro).

1017. *R. sardous* CR. — In locis humidis. — Mokro prope Bijela (Pt), Cetinje (Pč), Velki Mikulić sub monte Rumija (Ba), Nedajno in Pivska planina, Šavnik, coenob. Piva, Mratinje sub monte Maglić, Bar (Ro).

— f. *parvulus* LGE. — Cum typo ad Ulcinj (Ro).

1018. *R. marginatus* URV. var. *leiodiscus* (BOISS.) HAY. — In locis humidis, in inundatis, ad ripas regionis inferioris frequens. — Ad Cetinje (Ba, Kš), Njeguši, Nikšić (Ba, Ro), Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Danilovgrad et Plavnica (Ro), etiam ad Kolašin et sub Crna planina (Ba). — A precedente vix specifice diversus.

1021. *R. muricatus* L. — Annuus; calyx reflexus, petala oblonga calyce sublongiora, folia trifida grosse crenato-serrata; carpella ovata compressa marginata disco muricata, rostro parum curvato. — In graminosis et ruderatis regionis infer. mediterr. frequens. — Circa Rijeka (Pt), Bar, Ulcinj, Vir, Danilovgrad et Podgorica (Ro), ad Cetinje (Če), insula Vranina (Eb).

1024. *R. arvensis* L. — Inter segetes regionis infer. et mediae. — Cetinje, Rijeka, Danilovgrad (Pt), supra Njeguši (Ho, Ro), Čevo in nahija Katunska, Podgorica, Kokoti, Danilovgrad, Vir et Andrijevica (Ro).

— f. *stagnalis* ROHL. IV. Beitr. 16. — Caulis flacidus fistulosus, foliis flacidis segmentis elongatis. — In fossa ad Bar (Ro).

— f. *micranthus* UECHTR. — Cum typo ad Kokoti distr. Lješanska (Ro).

\*1029. *R. aquatilis* L. — In lacu Scodrano (Eb).

1033. *R. paucistamineus* TSCH. — In aquis regionis infer. et subalp. — Sub monte Durmitor versus Štulac (Pč), in lacu Scodrano (Sz), lacus Rikavac distr. Kući (Ba), Rijeka (Ho), Lovćen, Srablje jezero sub monte Durmitor, ad coenob.

Piva, Podgorica (Ro), Riblje jezero sub monte Durmitor; Žijovo distr. Kuči; sub monte Suhi vrh prope Kom (Ba), Volujačko jezero (Ma). Huc pertinet verosim. planta a cl. PANTOCSEK in flum. Viruša sub Crna planina et in lacu Riblje jezero sub monte Durmitor lecta et sub *R. capillaceus* HOFFM. indicata.

1034. *R. Drouetii* F. SCHLTZ. — In lacu Rikavac sub monte Vila distr. Kuči (Sz). An ad spec. praeced. pertinens? (Conf. BALDACCI „Contributo“ pag. 2).

*Adonis* L.

1041. *A. autumnalis* L. var. *Preslii* (TOD.) HAY. — Sepala pilosa. — In cult. reg. infer. ad Bratica prope Ulcinj (Ba), Bar et Podgorica (Ro, sub *A. microcarpa*).

**Nymphaeaceae**

*Castalia* SALISB.

1046. *C. alba* (L.) WOOD. (= *Nymphaea alba* L.). — In lacu Scodrano in Rijeka Crnojevička frequens cum f. *minor* BESL.

*Nuphar* SM.

1048. *N. luteum* (L.) SM. — Rijeka Crnojevička et in lacu Scodrano frequens (Pt, Pč, Ro, Ja); etiam in reg. superiori: in lacustr. sub monte Durmitor, Crno jezero (Pt), Baro et Zmijino jezero; Pošćensko jezero supra Šavnik; Vukomirsko jezero distr. Kuči (Ro).

\**N. luteum* × *pumilum* (= *N. intermedium* LED.). — Inter parentes in flum. Rijeka Crnojevička (Pej, Ro).

1049. *N. pumilum* (TIMM.) DC. — Flores subdimidio minores, stigma stellatum planum radiis ad marginem excurrentibus. — In lacu Scodrano ad Plavnica (Ja) et sub Rijeka (Pej).

**Ceratophyllaceae**

*Ceratophyllum* L.

\*1050. *C. demersum* L. — In lacu Scodrano ad Plavnica (Ja).

## Papaveraceae

### *Chelidonium* L.

\*1053. *Ch. maius* L. — In ruderatis, ad sepes regionis calid. — Ad Cetinje (Pč, Kn), Njeguši, Ulcinj, Plavnica et sub Goraško distr. Piva (Ro), in monte Lovćen (To).

\*— f. *micropetalum* MURR. — Petala fere duplo minora cca 5—6 mm longa. — In monte Lovćen loco „Goli rti“ (Pej, Ro).

— f. *hypotrichum* AZN. — Folia subtus ± pubescentia, sepalae saepe superne pilis longis flexuosis sparse villosula. — Cum typo ad Njeguši loco Kučista, Donja Dolina et Ljeskova rupa sub monte Lovćen (Pej, Ro).

### *Glaucium* HILL.

1056. *G. flavum* CR. — In aren. et saxosis maritimis ad Bar (Do).

### *Papaver* L.

1060. *P. rhoeas* L. — In agris et ruder. regionis infer. et mediae. — Ad Njeguši et Cetinje (Pt), Medun (Sz), sub monte Kom Vasojevički (Ho), coenob. Piva, Plavnica et Podgorica (Ro), inter Andrijevica et Kralje (Ja), circa Bar (Do).

— var. *glabellum* ELKAN. f. *montenegrinum* ROHL. IV. Beitr. 18. — A typo differt foliis coriaceis rigidis glauco-viridisibus glabris solum apice vel ad dentes setosis minus divisis, segmento terminali valde elongato serrulato-dentato. — In campo Donja Zeta prope Podgorica reg. infer. (Ro).

1063. *P. dubium* L. — In asperis, lapidosis et incultis reg. infer. calid.

— var. *collinum* (BOGENH.) FEDDE. — Njeguši et Vir (Pč), ad Andrijevica, Kolašin et Podgorica (Ro).

— subvar. *albiflorum* ELK. — Circa Andrijevica (Ro, Ja, Sk).

1069. *P. argemone* L. — In arvis et incultis. — Vir (Pč), Cetinje (Ba), sub monte Ključ prope Kolašin (Ba), in monte Lovćen (To).

\*1071. *P. apulum* TEN. — A specie praeced. dignoscitur alabastris late ovoideis, petalis obovatis coccineis, capsula

**ellipsoidea.** — In lapidosis et gramin. ad Podgorica reg. mediterr. (Ro).

1073. *P. somniferum* L. — Cultum et saepe subspontaneum.

1075. *P. alpinum* L. subsp. *Kernerii* (HAY.) FEDDE: — In glareosis excelsis montis Kom (Pč, Ba, Lo, Ro), in monte Gradište supra Kolašin, in monte Lisinj supra Bar (Ba).

### Corydalis MED.

1083. *C. ochroleuca* KOCH. subsp. *eurochroleuca* HAY. — Ad muros et rupes. — Šavniki (Pč), Crvena greda in monte Durmitor, mons Balj supra Andrijevica, Sutorman supra Bar, coenob. Piva, Božur planina distr. Piva (Ro); in monte Vjetrenik (Ja). Verosimiliter loca hic enumerata saltem partim ad subsp. sequentem pertinent.

— subsp. *leiosperma* (CONR.) HAY. (= *C. ochroleuca* var. *longibracteata* ROHL. I. Beitr. p. 7). — „Bractae pedicello aequilongae vel longiores; flores apice vitellini; semina levia sublucida.“ (HAY. Prodr. I: 362). — Sutorman supra Bar, sub monte Lovćen, in monte Vjetrenik (Ro), Medjed in monte Durmitor (Winneguth fide MALÝ), Krivi do supra Aftovac ad confines Hercegovinae, Ledena pećina in monte Durmitor 2300 m, in valle flum. Piva supra vicum Krstac (De, Si).

1086b. *C. pseudocava* PANT. Adnot 88. — Tubere solido, caule spithameo esquamato; foliis binternatisectis, segmentis omnibus oblongis incisis; racemo erecto; bracteis ovato-oblongis integris, floribus purpureis, calcare corollam subaequante apice suberecto inflato obtuso; capsula pedunculum superante. — In pratis alp. montis Kom (Pt). — Species non satis nota; a cl. HAYEK (Prodr. I: 363) sub *C. cava* subsp. *blanda* (SCHOTT) HAYEK cum „?“ citata. A *C. cava* differt tubere solido, foliis caulinis brevius petiolatis, calcare apice suberecto, a *C. solidago* SM. caule esquamato, foliorum segmentis incisis et bracteis integris. — Quid haec planta sit, futuri scrutatores eruant.

1090. *C. solidago* (L.) SW. subsp. *densiflora* (PRESL) HAY. — In rupestr. subalp. et alp. in monte Kom (Pt, Ba) usque ad 2400 m (Ro), etiam sub monte Lovćen (Ro), Vermoš et Širokar distr. Kuči (Df).

*Fumaria* L.

1092. *F. rostellata* KNAF. — In cultis et ruder. reg. infer. — Ad Andrijevica, cca 800 m; Kokoti in nahija Lješanska, 200 m (Ro), Žuta greda sub monte Lovćen (Pej, Ro).

1097. *F. officinalis* L. — In cultis et ruderatis regionis infer. et mediae frequens. — Cetinje (Pč), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Bogetići, coenob. Piva, Njeguši; etiam sub monte Durmitor ad Žabljak cca. 1450 m (Ro).

1104. *F. Thuretii* BOISS. — Foliorum laciniae linearilanceolatae, acutae, flores rosei apice atropurpurei, sepala late ovata corolla sublatiora et 2—3plo breviora, pedunculi fructiferi deflexi, fructus ovato-globosi acuminati rugulosi. — In herbis et in dumetis regionis calid. — Circa Gradac (Pt), Kokoti in nahija Lješanska (Ro).

1105. *F. flabellata* GASP. — Flores magni (10—12 mm) albi apice purpureo-fusci, laciniae foliorum obtusae, sepala corolla latiora, fructus rugulosus. — In dumetis ad Ulcinj dic. mediterr. (Ro).

1106. *F. capreolata* L. — A praecedenti praesertim fructibus levibus et pedunculis fructiferis omnibus deflexis dig noscitur. — In saxosis et dumetis regionis calid. — Inter Koštor et Njeguši (Pej, Ro), circa Bar et Ulcinj (Ba, Ro).

*Capparidaceae*

*Capparis* L.

1108. *C. rupestris* S. S. — In rupestr. circa Bar dic. medit. (Ba, Do, Ro), Crmnica (Eb).

*Cruciferae*

*Sisymbrium* L.

1113. *S. Loeselii* JUSL. — In silvaticis circa Kolašin (forma *glabrata* Pt), in cultis pagi Medun distr. Kući (Sz), in dumetis prope coenob. Morača (Pč), sub monte Starac in Sinjavina planina (Ba).

1115. *S. orientale* TORN. — In hortulanis et ad aggeres circa Cetinje (Pč).

*Chamaeplium* WALLR.

1118. *Ch. officinale* (L.) WALLR. — In ruder. et ad vias regionis infer. et mediae totae dicionis frequens.

1120. *Ch. polyceratum* (L.) WALLR. — A praeced. dignoscitur floribus axillaribus sessilibus, siliquis e basi incrassata sensim attenuatis patulis. — In ruderatis ad Bar et Ulcinj dic. mediterr. (Ro).

*Erysimum* L.

1122. *E. pusillum* CH. et B. subsp. *eupusillum* HAY. (= *E. Boryanum* BOISS.). — In saxosis alp. montis Kom (Pt). Potius ad *E. helveticum* DC. (1130) pertinet.

1127. *E. graecum* BOISS. et HELDR. — Ad latera montis Dziebeze distr. Kuči (Sz).

1129. *E. silvestre* (CR.) SCOP. subsp. *cheiranthus* (PERS.) SCHINZ et THELL. — In rupestr. alp. et subalp. — Mali Durmitor (Pt), Grahovo; Šavniki sub monte Ivica (Pč), ad Bukovica sub monte Durmitor; in monte Lisinj supra Bar (Ba).

— — — subvar. *pumilum* (MURITH) BECK. — Durmitor (No).

— — — subvar. *dinaricum* BECK. — In monte Maglić Pivski (Ro), in monte Durmitor (No).

— — — subsp. *linearifolium* (TSCH.) HAY. — In rupestr. montis Kom loco Orlova Skala (Pt), Šavniki (Pt), Bar (Ba, Ro), Njeguši (Ho, Ki, Ro), Borkovići distr. Piva (forma stylis usque ad 2 mm longis), Ledenica planina, Goračko, Andrijevica, Vir, Varda supra coenob. Piva; in valle fl. Peručica sub monte Kom; in monte Jerinja glava supra Andrijevica, Rijeka, Velestovo distr. Katunska, Trešnja sub monte Lovćen, Bukovica prope Cetinje (Ro olim sub *E. Boryano* et *helveticum*); Lopate in monte Vjetrenik, Jablan et Han Garančić in valle fl. Tara (Ja), ad Vrojca distr. Kuči (Ba), Sutor man (Do), in monte Lovćen (To, Ro).

— — — f. *Ianchenii* (FRITSCH) HAY. — Cum typo ad Njeguši loco Žanovetni brije (Pej, Ro), in valle Vrbnica prope Orak et in Krivi do supra Aftovac ad confines Hercegovinae (De, Si).

1130. *E. helveticum* DC. — In glareosis Valoviti do et Crvena Stijena in m. Durmitor (Ro), Pirlitor prope Žabljak

distr. Drobnjaci; in monte Gradište supra Kolašin (Ro), Savin Kuk in monte Durmitor cca 2000—2300 m (De, Si).

1131. *E. erysimoides* (L.) FRITSCH. var. *pannonicum* (CR.) BECK. — In saxosis et gramin. regionis subalp. et alp. — Lukovo prope Nikšić (Pt), Javorje planina (Pč), Pavlova livada (Ho), Varda supra coenob. Piva (Ro), in valle rivuli Vrbanica distr. Piva (De, Si).

— f. *Pantocsekii* BECK. — Perućica sub monte Kom, Sinjavina (Pt), Piperska Lukavica et Štirni do sub Lola planina usque ad 1950 m (Ro).

— var. *carniolicum* (DOLL.) BECK. — In alp. supra Andrijevica in monte Balj, Piševo et Sjekirica planina; Pirlitor prope Žabljak sub monte Durmitor (Ro), Podgora et Brčeli prope Vir (Eb).

1132. *E. pectinatum* CH. et B. — In saxosis subalp. sub monte Kom Kučki versus Mojan (Ba).

### *Barbara* R. BR.

1144. *B. vulgaris* R. BR. subsp. *euvulgaris* HAY. — In locis humidis, ad ripas. — Circa Vir (Pč) et Njeguši (Ro). — subsp. *arcuata* (OP.) HAY. — In alp. Ječmeni do in Sinjavina planina (Ba).

1149. *B. intermedia* BOR. — A *Barbara vulgaris* dignoscitur praesertim foliis superioribus profunde pinnatifidis segmentis lateralibus utrimque 3—5 linearibus, siliculis parum longioribus (25—40 mm) et brevius (3—4 mm) pedunculatis. — In herbidis aquosis Viruša dol sub Crna planina; in silvicis vallis Perućica sub monte Kom (Pt), Kopilje (Ho).

1153. *B. bracteosa* GUSS. — A praecedentibus dignoscitur pedunculis inferioribus et mediis bracteatis. — In glaeriosis, pascuis et circa ovilia in tota regione alpina et subalpina frequens; etiam in monte Lovćen.

### *Roripa* SCOP.

1155. *R. austriaca* (CR.) BESS. — In pratis ad lacum Scodranum (Pč).

\*— f. *scabrida* ROHL. Čas. Nář. Mus. Praha 1928. — Tota planta pilis brevibus densissime tecta. — Ad Njeguši (Ro).

1156. *R. amphibia*  $\times$  *silvestris* = *R. barbataeoides* (TSCH.) ČEL. — Ad Kolašin in valle fl. Tara (Ja in Oe. B. Z. 1919).

1157. *R. islandica* (OED.) SCHINZ et THELL. — In paludosis, ad fossas. — Lacus Crno jezero sub monte Durmitor (Pt, Ro), in recessibus lacus Scodrani prope pagum Dodoš (Pč), Vukomirsko jezero sub monte Kom (Ro), Ljut supra coenob. Piva (Ro), sub monte Kom (Ba).

1159. *R. silvestris* (L.) BESS. — In ruderatis, ad vias et in cultis in reg. infer. et media. — Ad Cetinje (Pč, Ba), Grahovo (Pč), Plavnica, Danilovgrad, Spuž, Bogetići, Nikšić, Viljuša, Njeguši, Lovćen, Andrijevica; etiam ad Žabljak sub monte Durmitor (Ro), Bar; Sutorman (Do), Crmnica (Eb). — f. *dentata* (KOCH) HAY. subf. *tenuifolia* (LASCH) BECK. — Ad viam e Cetinje ad Bukovica (Ro).

\*— var. *arcuata* BAGN. — Siliculis longioribus arcuatis. — Cum typo in campo Krstačko polje prope Njeguši (Pej, Ro).

1161. *R. pyrenaica* (L.) RCHB. — Folia basalia rosula lata lobo terminali suborbiculari, lateralibus multo brevioribus; folia caulina basi auriculata.

— subsp. *eupyrenaica* HAY. — Siliculae latae ellipsoideae. — In saxosis sub monte Velka Jastrebica — Biela Gora (Pč).

— subsp. *lippizensis* (WULF.) HAY. — A *Roripa eu-pyrenaica* dignoscitur siliculis linear-lanceolatis 10—16 mm longis pedunculo longioribus. — In graminosis ad vias et in cultis in tota dizione e regione mediterr. usque ad alpinam frequens.

### *Armoracia* G. M. SCH.

1162. *A. lapathifolia* GILIB. — Culta et non raro ad ripas vel in pratis subspontanea.

### *Nasturtium* R. BR.

1164. *N. officinale* R. BR. — Ad rivulos, ad ripas regionis inferioris. — Coenob. Morača (Pč), Rijeka (Ho), circa Bar et Ulcinj (Ro).

\*— var. *asarifolium* KRALIK (HEGI Flora Mitteleur. IV/1: 320). — Cum typo ad Topolica prope Bar (Do).

*Cardamine* L.

\*1167. *C. acris* GRIS. — Rhizoma obliquum; folia caulina segmento orbiculari vel ovato terminata; flores etiam siccati saturate violacei. — Ad rivulos et fontes regionis alp. vel subalp. raro. — Viruša dol sub Crna planina et in monte Kom ad rivulum Bijela supra vallem Perućica (Pt), Sjekirica planina (Ro), sub monte Kom Kučki (Ja).

1168. *C. pratensis* L. subsp. *Matthiolii* (MOR.) HAY. — A typo dignoscitur caulibus plerumque pluribus a medio vel a basi ramosis, segmentis foliorum caulinorum horizontaliter patentibus. — In pratis montis Lastva čevska reg. subalp. supra pagum Vojnići (Pt).

1169. *C. glauca* SPRENG. — In saxosis et glareosis e regione mediterr. usque ad reg. alp. frequens.

— f. *tenuis* BECK Fl. Bosne II: 242. — Cum typo raro.  
— f. *longirostris* ROHL. — Stylus 4—4,5 mm longus. — Cum typo ad latera montis Lovćen (Ro), ad Cetinje (Če).  
— var. *scutariensis* ROHL. in FEDDE Rep. III: 145. — Folia minora foliolis inferioribus saepe petiolulatis; flores minores petalis 4—5 mm longis, siliqua 10—20 mm longa, 1 mm lata, stylo 2 mm longo tenuissimo. — In saxosis ad Boljevići et Godinje prope Vir cca 100 m (Ro).

× *C. glauca* × *maritima* (?) = *C. rupestris* K. MALÝ Glasn. XXIII. — Lješanska nahija cca. 200—300 m (Ro).

1170. *C. carnosa* W. K. — Ovarium 4—8ovulatum dense albopilosum, folia carnosa. — In monte Lovćen leg. Fr. Malý.

1171. *C. maritima* PORTEN. — Folia caulina inferiora basi auriculata, foliola petiolulata. — In rupestr. regionis calidioris. — Lastva čevska supra pagum Vojnići (Pt), Drušići in nahiija Lješanska, circa Bar (Ro), in monte Rasovatac prope Vir (Eb).

— var. *maglićensis* ROHL. in FEDDE Rep. III: 145. — Tota planta pilosa, foliola lata crenato-dentata, flores 4—6 mm longi, siliquae 20—26 mm longae, 1,8 mm latae, stylo tantum 1,5—2 mm longo in pedunculis 5—6 mm longis erecto-patentes. — In glareosis sub monte Maglić in valle fl. Piva sub Martinje 600—800 m (Ro).

1172. *C. graeca* L. — In rupestr. regionis calidioris. — Čeklići prope Njeguši (Pej, Ro), circa Bar, Ulcinj, Vir et

Rijeka (Ro), in monte Kosa supra Bar cca. 1000 m (Do), Cetinje (Biasoletti).

1175. *C. impatiens* L. — In dumetis et silvis regionis subalp. — Viruša dol sub Crna planina, vallis Perućica sub monte Kom, Kovčice sub monte Mali Durmitor (Pt), in valle fl. Tara et circa Kolašin (Pt, Ja), ad coenob. Morača (Pt), Ponikvica, Leberšnik (Ho), Šavniki, Bukovica sub monte Durmitor, Andrijevica, mons Balj (Ro), Lovćen (Kš, Pej), Han Garančić, Matoševo, mons Pivljan (Ja).

1178. *C. hirsuta* L. — In graminosis et dumetis regionis inferioris et mediae. — Njeguši, Danilovgrad, coenob. Duga (Pt), circa Bar et Ulcinj (Ro, Ba), in valle fl. Tara ad Matoševo (Ro), circa Andrijevica (Ro, Ja).

1183. *C. enneaphyllos* (L.) CR. — In silvis regionis subalp. — Viruša dol sub Crna planina, Perućica sub monte Kom (Pt), sub monte Durmitor (Pt, Pč, Ro), Rupa Końska sub monte Vila distr. Kuči (Sz), Sjekirica planina, Maglić Pivski, supra coenob. Piva loco Zakamen (Ro), supra Rikavac distr. Kuči (Df), Dobri do in monte Durmitor (Ba).

1187. *C. bulbifera* (L.) CR. — In silvis regionis subalp. — In monte Vjetnik distr. Bratonožići, in valle fl. Perućica (Pt, Ro), in monte Lovćen (Pč, Ro, To), circa Andrijevica (Ho, Ro), in monte Jerinja glava, Balj, Sjekirica planina (Ro), coenob. Piva, Maglić Pivski, in valle fl. Tara et sub monte Durmitor (Ro), sub monte Kom et Pivljan (Ja), Vermoš planina (Df), in monte Žijovo distr. Kuči (Ba).

— subf. *grandiflora* O. E. SCHULZ. — Petala usque ad 22 mm longa. Cum typo in monte Lovćen (Ro).

— f. *pilosa* O. E. SCHULZ. — Cum typo ad Matoševo in valle fl. Tara (Ro).

— f. *ptarmicifolia* O. E. SCHULZ. — Vermoš planina (Df), Lovćen (formae transeuntes, Ro).

#### *Cardaminopsis* (C. A. MEY.) HAY.

1190. *C. Halleri* (L.) HAY. subsp. *ovirensis* (WULF.) HEGI. — In rupestr. alp. Sjekirica planina loco Štit 1800—1900 m (Ro).

#### *Arabidopsis* HENYH.

1191. *A. Thaliana* (L.) SCHUR. — In ruder. et cultis regionis inferioris et subalp. — Viruša dol sub Crna planina,

Perućica sub monte Kom (Pt), circa Bar, Ulcinj et Podgorica vulgata; etiam in Sjekirica planina cca. 1200 m (Ro), Njeguši (Pč).

*Turritis* L.

1192. *T. glabra* L. — In lapidosis et dumetis regionis inferioris et mediae. — Vratlo prope Kolašin (Pt), coenobium Morača et Ostrog (Pč), ad latera montis Lovćen (Pč, Ro), in monte Balj et Jerinja glava supra Andrijevica, Nikšić; Jasenovo polje sub monte Vojnik, Poščensko jezero supra Šavnik, coenobium Piva (Ro).

*Arabis* L.

1196. *A. turrita* L. — In silvis et lapidosis regionis inferioris et subalp. — Brotnik (Ho), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Cetinje, Njeguši frequens, in valle fl. Piva sub Mratinje (Ro), ad latera montis Lovćen (Kš), in valle fl. Tara (Ro, Ja), in monte Rumija supra Bar loco „Dolinka“ (Do), insula Lesandra et Vranina (Eb).

— f. *lasiocarpa* UECCHTR. — Bostur in monte Lovćen (Kš), Komani et Seljani prope Vir (Ro).

1198. *A. alpina* L. subsp. *eualpina* BRIQU. — In rupestr. regionis subalp. et alpinae in tota dizione etiam in monte Lovćen (Ro); in regione inferiori supra coenob. Morača (Ja). — Saepissime in var. *crispata* (WILLD.) VIS., rarius in subforma *macrantha* BECK et in formis ad subsp. *caucasica* (WILLD.) BRIQU. transeuntibus.

\*— var. *mairioriflora* ROHL. in FEDDE Rep. 1937: 201. — Petala 11—14 mm longa, pro maxima parte sensim in unguem calycem parum superantem attenuata; folia (florendi tempore) viridia, sparsissime stellato-pubescentia, pedunculi tenues fere glaberrimi. — Habitat in alp. montis Durmitor loco Ledena pećina et Savin kuk 2000—2300 m (De, Si).

— subsp. *flavescens* GRIS. — In alp. Vernoš planina ad confines Albaniæ (Df).

\*— var. *decalvans* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938: 23. — Inflorescentia glabra, caules subglabri. — In alp. montis Prokletija (Boš).

1200. *A. verna* (L.) R. BR. — In saxosis et incultis dicionis infer. mediterr. — Circa Sindžon (Pt), Bar, Ulcinj,

Vir, Podgorica, Danilovgrad, Zagarać, Rijeka et inter Kotor et Njeguši (Ro).

1202. *A. auriculata* LAM. — In graminosis et dumetis in monte Jerinja glava et Žoljevica prope Andrijevica cca 900—1400 m (Ro).

1204. *A. hirsuta* (L.) SCOP. subsp. *euhirsuta* HAY. — In herbidis et saxosis regionis infer. et mediae. — In monte Vjetrnik distr. Bratonožići (Pt), Grahovo (Pč), Perućica (Sz), ad Njeguši (Ro, Gi), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Danilovgrad et Andrijevica frequens (Ro), Cetinje (Eb, Ro), insula Vranina (Eb).

— f. *cordata* DC. subf. *subglabrata* DC. — In valle rivi Vrbnica prope Orak distr. Piva forma + ad var. *sagittatum* (BERT.) RCHB. vergens (De, Si).

— var. *sagittata* (BERT.) RCHB. — Ad Šavniki, Cetinje, Bar, Rijeka et in monte Žoljevica prope Andrijevica 1200 m! (Ro), in monte Kosa supra Bar (Do).

— f. *etrusca* TUZS. — In monte Sutorman supra Bar (Do).

— subsp. *planisiliquosa* (PERS.) THELL. (= *A. Gerardii* BESS.). — Ad Cetinje (Pč, Kn), Nikšić (Ba).

1205. *A. constricta* GRIS. (= *A. hirsuta* var. *subglabra* ROHL. IV. Beitr. 20). — Foliis caulinis ovatis basi leviter cordatis glabris solum margine ciliatis, petalis parum longioribus (6—7 mm), siliquis brevioribus (2—3 cm) sed latioribus, pedunculis longioribus (5—12 mm) ab affini *A. hirsuta* differt (an specificē?). Meo sensu potius subspecies regionis alpinae. — Crna planina distr. Kuči; mons Kom (Pt), Valoviti do in monte Durmitor, Sjekirica planina 1600—2200 m (Ro), supra Rikavac ad fines Albaniæ (Df).

1206. *A. corymbiflora* VEST. — In pascuis et lapidosis regionis alpinae raro. — Javorje planina (Pč), Dobri do in monte Durmitor, Ledenica planina distr. Piva, Carine sub monte Kom Kučki, Zeletin supra Andrijevica (Ro, olim sub *A. vochinensis* et *ciliata*), Crvena ploča in Sinjavina planina (Ba).

— f. *incana* (GAUD.) HAY. — In alp. Ledenica planina; Maglić Pivski, Sjekirica planina (Ro).

? 1207. *A. nivalis* GUSS. — In rupestr. montis Kom et circa lacum Crno jezero infra Mali Durmitor (Pt). — Ab affini *A. serpyllifolia* VILL. distincta videtur radice perenni, foliis glabris vel parce ad marginem pube ramosa adspersis, superioribus angustis, pedicellis siliquisque brevioribus, his saepe subsecundis (PANT. Adnot. 89.) An ad 1206 pertinens?

1208. *A. muralis* BERT. — In saxosis, ad muros. — In monte Kom (Pt), ad coenob. Morača (Pč, Ba), in monte Lovćen (Ho), inter Cetinje et Njeguši (Ld, Gi, Ki, Ro), in monte Vojnik, Ledenica planina, Borkovići, Kom Vasojevićki, Sjekirica planina, vallis Jelovica et circa Andrijevica (Ro).

#### *Aubrieta* ADANS.

1215. *A. croatica* SCH. N. KY. — In saxosis alp. montis Kom Kučki (Sz), in monte Žijovo distr. Kuči (Ba).

1219. *A. deltoidea* (L.) DC. — A praecedente dignoscitur siliculis non solum stellato-tomentosis, sed etiam pilis longioribus hirtis; foliis dense stellato pilosis cuneato-obovatis utrimque dentibus 1—2 instructis; racemis 1—6floris; siliculis ellipsoideis valvis convexis fere enerviis. — In rupestr. regionis alpinae. — In m. Kom (Pč, Pt, Ba), in m. Durmitor jugo Šljeme (Ba), Gradište supra Kolašin (Ba).

#### *Alliaria* ADANS.

1220. *A. officinalis* ANDRZ. — In fruticetis, ad sepes et muros regionis calid. — Ad coenob. Piva; Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica et Andrijevica (Ro), in monte Lovćen (To, Kš).

#### *Myagrum* L.

1221. *M. perfoliatum* L. — In agris ad Doljani prope Podgorica regionis inferioris mediterr. (Ro).

#### *Isatis* L.

1224. *I. praecox* KIT. — Silicula obovata pedicello subaequilonga utrimque rotundata. — In saxosis ad Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro).

\*1225. *I. tinctoria* L. var. *vulgaris* KOCH. — In rupestr. ad Njeguši (Ro), supra Andrijevica (Ba), in valle rivi Piva prope Krstac (De, Si).

— — — f. *villosa* (ROUY. et FOUC.) THELL. — Siliculae tomentosae. — Cum typo (Ro).

\*1226. *I. canescens* DC. — In rupestr. subalp. — Varda planina distr. Piva (Ro, V. Beitr. pag. 14 sub *I. tinctoria*).

### Bunias L.

1229. *B. erucago* L. — In lapidosis, agris et ruderatis regionis infer. et mediae calid. frequens. — Cetinje (Pt, Pč, Ro), Njeguši, Grahovo (Pč, Ro), ad Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica et Rijeka (Ro).

— — subf. *integrifolia* KOCH. — Cum typo ad Bajce prope Cetinje (Kš).

### Cheiranthus L.

1230. *Ch. cheiri* L. — In saxosis et ad muros prope Ulcinj dic. mediterr. (Ro, Ba).

### Hesperis L.

1232. *H. dinarica* BECK. — Petalorum lamina obovata alba, caulis cum foliis copiose glandulosopilosus. — In silvis regionis subalp. et alp. septentr. — In monte Balj supra Andrijevica in valle Jelovica sub Bjelastica planina, Sinjavina planina, Crvena Greda, Ledena pećina et supra lacum Crno jezero (Ro, De, Si).

1233. *H. silvestris* CR. — Petalis lilacinis, foliis infimis lyrato-lobatis, caulinis basi subcordatis a praeced. dignoscitur. — In silvis et dumetis regionis subalpinae. — Grahovo (Pč), Korita rovačka (Ho), Crno jezero sub monte Durmitor (Ro), Sutorman supra Bar (Eb).

\*— — var. *siliquo-glandulosa* ROHL. IX. Beitr. pag. 7. — Etiam siliquae dense breviterque glandulosae. — In silva ad latera montis Lovćen versus Njeguši (Ro).

\*1237. *H. matronalis* L. — In silvis et dumetis. — In valle fl. Perućica sub monte Kom (Pt, Ho), Sinjavina (Pt), ad pedem montis Balj sub Andrijevica (Ro).

\*— — subsp. *eumatronalis* HAY. var. *glabra* (BOISS.) GRISEB. in PANT. Adnot. — Glabriuscula, ramis diffusis patens, foliis inferioribus in petiolum attenuatis denticulatis, superioribus ovato-oblongis, pedicellis calyce duplo longioribus. — In silv. vallis Perućica dol infra Kom (Pt).

- \* — — var. *adenopoda* BORB. — Ad Vir reg. infer. (B).
- \* — — subsp. *sibirica* (L.) HAY. — In silvis vallis Vrbnica inter Orak et rivum Piva cca 800 m (De, Si).
- \* — — subsp. *cladotricha* (BORB.) HAY. f. *psilocalyx* BECK. — Mirkov do prope Njeguši; Mratinje sub monte Maglić (Ro).
- — — var. *lapsanifolia* BORB. — Zalazi prope Njeguši (Pej, Ro).
- \* — — — f. *glanduligera* ROHL. X. Beitr. p. 9. — Caulis pars superior, pedunculi et calyx non setosus, sed solum dense brevissime glandulosus; etiam folia superiora ad marginem (praes- ter pilos furcatos) ± glandulosa; caulis pars inferior et folia media et inferiora ± dense pilis furcatis obsita; petala apice ro- tundata (nec emarginata). — In subalp. montis Vojnik; etiam ad pedem montis Balj in forma appropinquata (Ro).

1239. *H. glutinosa* VIS. — Lamina petalorum lanceo- lata flavescentia ± sordide violaceo-suffusa vel venosa.

— — var. *Visianii* (FOURN.) HAY. — Patule villosa et bre- viter glanduloso-pilosa. — Inter Kotor et Njeguši (Pej, Ro).

— — — f. *montenegrina* JANCH. Oe. B. Z. 1919: 98. — Sili- quae breviter setulosae et insuper longe setoso-hispidae. — In monte Pej supra coenob. Morača cca. 1500 m (Ja).

— — var. *secundiflora* (BOISS. et SPR.) BORB. — Patule villosa eglandulosa, siliquae glabrae. — In herbidis alp. Sinja- vina planina sub Jablan vrh (Ba).

### *Malcolmia* R. BR.

1242. *M. maritima* (JUSL.) R. BR. var. *serbica* (PANČ.) BECK (= *M. Orsiniana* Aut.). — In saxosis regionis calid. — Ad latera montis Lovćen supra Njeguši (Pč, Ho), in monte Ru- mija supra Bar (Ba, Do), Krstac prope Njeguši (Pej, Ro, Ki, Ja), in valle rivi Svinjača prope Kolašin (Ja).

### *Matthiola* R. BR.

1251. *M. sinuata* (L.) R. BR. subsp. *glandulosa* (VIS.) VIERH. — Folia inferiora sinuato-dentata vel pinnati- loba, flores pedunculati, axes inflorescentiae et siliquae pilis brevibus crassis flavescentibus glanduligeris obsitae. — In are- nosis marit. ad Pristan Bar dic. mediterr. (Ba, Do).

\*1253. *M. tristis* (L.) R. BR. var. *italica* CONTI. — Flores subsessiles; folia integra, inflorescentia non glandulosa. — In saxosis et collibus apricis dic. inferioris mediterr. — Gradjani prope Vir; supra Bar (Ba), Golubovci prope Plavnica; ad Podgorica (Ro).

*Lunaria* L.

1260. *L. rediviva* L. — In silvis regionis subalpinae. — Ad ripas rivi Skrobotuša ad pedem montis Drekalova Skala distr. Kuči (Sz), in valle fl. Jelovica sub Bjelastica planina (Ro), Bukovica sub monte Durmitor; Konjuhe prope Andrijevica (Ba sub *L. biennis*.)

1261. *L. annua* L. subsp. *pachyrhiza* (BORB.) HAY. — In fruticetis et saxosis regionis infer. mediterr. — Ad Vir, Boljevići et Bar (Ro). Formae: *elliptica* (SCHUR) BECK, *dalmatica* BECK et *fallax* BECK cum typo.

*Bitterea* DC.

1267. *B. incana* (L.) DC. — In arenosis et lapidosis. — Sub monte Kom Kučki (Ho), circa Andrijevica (Ja), insula Vranina (Eb). Verosimil. ad var. sequent. pertinet.

— var. *trichocarpa* ROHL. — Siliculae praeter pubem stellatam pilis longioribus simplicibus tectae. — Circa Andrijevica et Berane (Ro), Konjuhe sub monte Kom (Ba).

1269. *B. Gintlii* ROHL. IV. Beitr. p. 24. (*Alyssum* G. ROHL.). — Siliculae ovali-ellipticae 5—6 mm longae, 3—4 mm latae inflatae, juveniles stellato-canescentes adultae glabrae virides, stylo brevissimo  $\frac{1}{2}$ —1 mm longo, pedunculi fructiferi fere horizontaliter repandi dein saepe arcuato-adscendentes seminibus alatis. — In saxosis calcareis ad Njeguši cca 1000 m (Ro).

1270. *B. obliqua* (S. S.) HAL. — A. sp. sequente siliculis stellato-pilosis, pedunculis fructiferis erectis differt (an specific?). — In aridis ad Njeguši et Ulcinj (Ba).

1272. *B. mutabilis* (VENT.) DC. — In lapidosis, ruideratis, ad vias regionis calidioris infer. et submont. frequens. — Ad Njeguši (Pt, Pč, Ro), coenob. Duga, Komani, Lukovo (Pt), Cetinje (Ba, Pč, Kn), Krstac supra vallem rivi Piva (De, Si), ad Ostrog, Vir (Pč), Medun et Orahovo (Sz), circa Šavniki, Viljuša, Ulcinj, Bar (Ro); etiam sub monte Durmitor prope

Žabljak cca 1450 m verosim. introducta (Ro); in monte Vjetnik (Ja), Nikšić, Kolašin, Andrijevica (Ba).

— var. *cyclocarpa* (BECK) HAY. — Siliculae minores suborbicularis. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

— var. *viridis* (TSCH.) HAY. — Siliculae ellipticae utrimque acuminatae. — Cum typo ad Bar; formae transeuntes etiam ad Njeguši (Ro).

*Alyssum* L.

1275. *A. sinuatum* L. — In rupestr. montis Velka Jastrebica-Bijela Gora (Pč).

1276. *A. corymbosum* (GRIS.) HAY. — A praeced. siliculis minoribus (4—5 mm longis), foliis integris vel paucе dentatis (non sinuato-dentatis), inflorescentia paniculato-ramosa dignoscitur. — In saxosis regionis subalp. et alp. — Vallis Perućica (Pt, Ro), Sinjavina planina (Pt), Skrobotuša sub monte Kukura distr. Kuči (Sz), Kom Kučki (Ba), Durmitor, Ledenica, Maglić Pivski, Vojnik, Ljut supra coenob. Piva, Mali et Velki Krš supra Andrijevica (Ro olim sub *A. goemonense*), in valle Svinjača prope Kolašin (Ja), supra vallem Piva prope Krstac (De, Si).

\*1277. *A. microcarpum* VIS. — A praecedente dignoscitur siliculis parum marginatis loculis dispermis, stylo breviore (cca 1 mm longo). — In subalp. Sinjavina planina supra Vratlo (Ba).

1279. *A. petraeum* ARD. var. *edentulum* (W. K.) HAY. — Siliculis margine compressis solum medio inflatis, siliculis suborbiculatis (nec globosis), loculis 1—2spermis a simili *A. corymboso* dignoscitur. — In rupestr. alp. Pavlova livada (Ho).

1290. *A. ovirens* A. KERN. — Habitu *A. montano* L. similis, sed floribus multo maioribus, foliis adultis viridibus glabrescentibus et caulis procumbentibus dignoscitur. — In glareosis regionis alpinae. — In montibus Kom (Ba, Ro sub *A. Wulfeniano* BERNH.), Zeletin, Sjekirica, Jablan in Sinjavina planina, Bjelastica planina supra Kolašin (Ro).

1293. *A. montanum* L. — In rupestr. regionis infer. et mediae. — Ad coenob. Ostrog (Pč), Kopilje (Ho), inter Šavniki et Bukovica (Ro), Andrijevica (Ro), in monte Rasovatac prope Vir (Eb), in valle rivuli Vrbnica prope Orak (De, Si).

— — subsp. *eumontanum* (BAUMG.) HAY. var. *molluscum* RCHB. — Krivi do supra Aftovac distr. Piva (De, Si), in monte Rumija (Do).

— — subsp. *scardicum* (WETTST.) HAY. — A typo dignoscitur: pedunculi non solum stellato-pilosii sed etiam pilis furcatis longioribus immixtis, folia non canescentia, sed demum virescentia, flores et siliculae maiores, stamina utroque latere alata. — In montibus Durmitor, Kom, Margarita, Pivljan, Hum Orahovski, Dibala, Planinica, Vila, Pešnjak; etiam in monte Rumija supra Bar (Pt, Pč, Sz, De, Si, Ba, Ro, Ja), in gla- reosis alp. montis Prokletija ad fines Albaniae (Df).

1297. *A. repens* BAUMG. — In rupestribus alp. montis Durmitor jugo Šljeme cca 2500 m et in monte Kom (Ba). An ad *A. montanum* subsp. *scardicum* pertinet?

1299. *A. desertorum* STAPF. — Ab affini *A. campestre* dignoscitur silicula glabra et caule cum foliis pube sublepidota canescente obsito. — In arenosis ad Vir (Pč).

1309. *A. campestre* L. — Annua; siliculae orbicularis 4—5 mm longae adpresso stellato-pilosae, sepala post anthesin decidua; petala dilute flava, folia pube stellata hirta. — Circa Bar, Ulcinj, Podgorica reg. meditter.; etiam ad Njeguši (Ro).

1311. *A. alyssoides* L. — A praeced. dignoscitur sepalis post anthesin non deciduis; foliis stellato-lepidotis; petalis sulcatis phureis demum albis. — In lapidosis, arenosis et incult. reg., infer. et mediae. — Lijeva rijeka prope Jablan (Pt), ad Cetinje (Pč, Ba), circa Njeguši, Šavnik, coenob. Piva, Andrijevica, Podgorica et Bratonožići (Ro), sub monte Lisinj prope Bar (Ba).

— — f. *perdurans* (ULLEP.) HAY. — Radix perennis lignosa. — Ad Bratonožići prope Podgorica (Ro).

1312. *A. murale* W. K. — Habitu *A. corymboso* similis, dignoscitur petalis integris loculis siliculae monospermis, foliis subtus dense incano-lepidotis. — In rupestribus regionis mediae raro. — Borkovići distr. Piva, Ljut sub monte Ledenica planina; ad pedem montis Balj prope Andrijevica (Ro), in valle rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

\* — — f. *pachyphyllum* BECK Fl. Bosne II: 304. — Folia usque 10 mm lata. — Supra vallem rivi Piva prope vicum Krstac (De, Si).

*Alyssoides* ADANS.

1327. *A. utriculatum* (L.) MED. — In saxosis regionis calid. — In monte Gradište supra Kolašin, Korita rovačka prope Lukavica planina (Ro).

— var. *graecum* (REUT.) HAY. — Folia caulina longe ciliata, laminis petalorum ellipticis dilutius flavis, siliculis pedicello aequilongis. — Cum formis intermediis ad coenob. Ostrog (Pč, Ba), coenob. Morača (Pč, Ba, Ja), ad Ulcinj et Medun (Ba), Podgorica (Ro), Krstac prope Njeguši (Gi).

*D r a b a* L.

1333. *D. elongata* HOST. (= *D. lasiocarpa* var. *elongata* HAY. Prodr.). — In rupestr. regionis subalp. et alpinae. — In monte Velki Maglić distr. Kuči et in monte Kom Kučki (Sz), in montibus Planinica, Mojan, Vila, Pešinjak distr. Kuči (Ba), in monte Lovćen cum formis ad var. *bosniacam* BECK transeuntibus (Ro, Bo), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja).

— f. *semiglabra* BECK. — Siliculae tantum margine setulosae faciebus glabrae. — Cum priore, ut videtur frequentior. — In monte Lovćen, Mokra planina, Durmitor, Lukavica planina, Pošćensko jezero supra Šavnik, Banjani, Crkvica, Pivska planina (Ro), Volujačko jezero (Ma). Loca hic enumerata verosimiliter (saltem partim) ad subsp. sequentem pertinent.

\* — subsp. *balcanica* O. E. SCHULTZ Pflanzenreich IV. vol. 105 pag. 44 (= *D. aizoides* aut. monten. non L.). — Petala usque 5,5 mm longa, stamina longiora petala plerumque aequantia vel parum superantia, siliculae angustiores in stylum 2—4 mm longum attenuatae, ubique vel ad marginem hispidae. — In regione alp. et subalpina. — In monte Lovćen (Bo, Vh, Pichler fide O. E. SCHULTZ), Kom et Jastrebica (Pt), Vermoš ad confines Albaniae (Df); in monte Durmitor loco Savin Kuk (De, Si). Planta ex hoc loco foliis anguste linearibus (cca 1—1,5 mm latis) et racemo sub anthesi densiusculo (nec elongato) valde *A. aizoides* L. revocat et plantis ex Alpibus Europae mediae valde similis est, sed secundum cl. O. E. SCHULTZ *Dr. aizoides* in peninsula Balcanica non crescit (f. *subaizoides* ROHL. in FEDDE Rep. 1937 pag. 201).

\* — var. *Skřivánekii* ROHL. XI. Beitr. pag. 8 (= *D. athoa* ROHL. olim non GRIS.). — Scapus humilis (0,5—1,5 cm altus)

pauci(2—4)florus, flores maiores, petala usque 7—8 mm longa, siliculae glabrae, styli 4—5 mm longi. — In cacumine montis Kom Vasojevički (Ro).

?1335. *D. scardica* (GRIS.) DEG. et DOERFL. — Folia rosularia late lanceolata vel elliptica latitudine 3—5 plo longiora. — In rupestr. regionis alp. — In montibus Kom et Durmitor (Pt), Sinjavina planina supra Ječmeni do (Ba). A cl. O. E. SCHULTZ e Montenegro non indicata.

1336. *D. longirostris* SCH. N. KY. — Siliculae fere ellipsoideo-conicae turgidae ad basin cito attenuatae acutae glabrae vel parce setosae. — In rupestr. regionis alpinae frequens. — var. *eriocarpa* (GUSS.) O. E. SCHULTZ. — Siliculae pilis simplicibus tenuibus sursum curvatis vel subpatulis dense hirtae. — In alp. montis Durmitor loco Šljeme (Ba), Savin Kuk eca 2300 m (De, Si), in monte Planinica distr. Kuči (Ba), in monte Kom (Sz).

\* — var. *erioscapa* (CARNEL) O. E. SCHULTZ (= var. *montenegrina* BECK et SZYSZ. Pl. cernag. p. 75). — Scapi et saepe pedicelli pilis rigidis simplicibus (nonnullis stipitato-bifurcatis) ± tecti, siliculae ± hispidae, rarius glabrae (f. *psilocarpa* O. E. SCHULTZ). — In alp. montis Planinica distr. Kuči et in monte Kom Kučki et Vasojevički (Ba, Sz).

\* — var. *capsularis* (LOJAC.) ARANG. — Siliculae valde inflatae basi globoso-rotundatae. — Cum typo (fide O. E. SCHULTZ).

?1338. *D. parnassica* B. H. — Caule crispule lanato, siliculis patule velutino-hispidis dignoscitur. — In rupestr. alp. montium Kom et Durmitor (Pt, Pč). Planta dubia, a cl. O. E. SCHULTZ e Montenegro non indicata. Verosimiliter ad *D. longirostris* var. *erioscapa* pertinet.

\*1338b. *D. Bouéana* ZAHLBR. apud O. E. SCHULTZ in Pflanzenreich IV. vol. 105. pag. 47). — Ex affin *D. aizoon*. Planta exigua, nana; folia lanceolata vel linguliformia obtusiuscula 2—1,5 mm lata glauco-viridia, racemus 5—12florus, pedicelli 1,5—3 mm longi, sepala 1,5—2 mm, petala 3—4 mm longa, siliculae ad marginem brevissime hispidulae in pedicellis subrectangule patentibus 9—3 mm longis ovoideae, 4—5 mm longae, 2—2,5 mm latae stylo brevi tenui vix 1 mm longo coronatae. — In regione alpina. — In monte Durmitor loco Šljeme

(Boué, Ba), in monte Kunj Kostiča et Dibala distr. Kuči (Ba), Čafa Velja distr. Krajina prope Rikavac (Df).

1342. *D. muralis* L. — In graminosis, ruderatis regionis infer. et mediae. — Ad Njeguši (Pt, Ro), inter Njeguši et Cetinje (Ld, Če, Bo), circa Ulcinj, Vir, Bar, Podgorica, Matoševići in valle fl. Tara et Andrijevica, Zakamen supra coenob. Piva (Ro), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), Piva planina supra Nedajno (De).

1343 et seq. *D. verna* L. — In arvis, incultis, ad vias. — In tota dizione frequens; in regione alp. circa casas et ovilia.  
— subsp. *spathulata* (LANG.). — Cum typo.  
— subsp. *obconica* (DE BARY) HAY. — Krstac prope Njeguši, Ulcinj (Ro).

#### *Diplotaxis* DC.

1353. *D. tenuifolia* (JUSL.) DC. — In ruderatis et lapidosis regionis calid. — Kamenjak (Ho), circa Bukovica prope Cetinje et Podgorica (Ro), ad Bar (Ro, Ba, Do).

1354. *D. muralis* (L.) DC. — In lapidosis, arenosis et incultis regionis infer. frequens. — Circa Bar, Ulcinj, Rijeka, Podgorica, Spuž, Danilovgrad et inter Bogetići et Nikšić (Ro).

#### *Brassica* L.

1358. *B. nigra* (L.) KOCH. — In cultis et ruderatis. — In valle fl. Zeta prope Danilovgrad (Pč).  
— var. *laevigata* (BURM.) ALEF. — Caulis cum foliis glaberrimus. — In ruderatis ad Njeguši (Pej, Ro).

*B. oleracea* L. — Non raro cultura.

1362. *B. campestris* L. — Ad viam inter Njeguši et Koštor; Bukovica prope Cetinje (Pej, Ro).  
— var. *rapa* (L.) HARTM. — Culta et subsppontanea.

1363. *B. fruticulosa* CYR. — In arenosis maritimis ad Ulcinj. Verosimiliter introducta, nam vidi tantum specimen unicum; posterius non inveni (Ro).

#### *Sinapis* L.

1369. *S. arvensis* L. — Inter segetes, in ruderatis regionis infer. et mediae frequens. — In valle Viruša dol; ad pagum Kovac

čice sub monte Durmitor (Pt), ad Cetinje (Pč), ad Viljuša, Njeguši, Šavniki, Podgorica et Andrijevica (Ro), in valle fl. Tara (Ja).

— f. *orientalis* (JUS.) KOCH. — Rarius cum typo.

— f. *Schkuhriana* (RCHB.) HAGENB. — A typo differt siliquis tenuioribus, longioribus valde torulosis. — Krstac et Dubovik prope Njeguši (Pej, Ro), Sutorman supra Bar (Do).

### *Eruca* ADANS.

\*1372. *E. sativa* L. var. *longirostris* (UECHTR.) ROUY.

— In cultis ad Njeguši, loco Krstačko polje (Pej, Ro).

### *Cakile* DC.

1376. *C. maritima* SCOP. — In arenosis et lapidosis marit. ad Ulcinj (Ro).

### *Rapistrum* DESV.

1378. *R. rugosum* (L.) ALL. — Pedunculi fructiferi 2–6 mm longi incrassati suberecti. — Ad litora maris prope Ulcinj (Ro).

1379. *R. hispanicum* (L.) CR. — A praeced. dignoscitur praesertim pedunculis fructiferis longioribus (6–10 mm) tenuibus saepe recurvis, articulo siliculae superiore leviter striato (nec sulcato). — In campo ad Bar dic. mediterr. (Ro).

### *Calepina* ADANS.

1384. *C. irregularis* (ASSO) THELL. — In agris et incultis regionis infer. mediterr. frequens. — Circa Bar, Ulcinj (Ro, Ba), ad Vir, Podgorica, Plavnica et Rijeka (Ro).

### *Raphanus* L.

1388. *R. raphanistrum* L. — In satis et ruderatis regionis calid. — Ad Grahovo (Pč), circa Podgorica et Plavnica (Ro).

1389. *R. sativus* L. — Cultus et subspontaneus.

### *Conringia* ADANS.

1391. *C. orientalis* (L.) ANDRZ. — In fruticetis ad Borkovići dist. Piva cca 1400 m raro (Ro).

### *Goniolobium* BECK.

1392. *G. austriacum* (JACQ.) BECK. — In lapidosis et dumet. ad pedem montis Balj prope Andrijevica cca 900 m raro (Ro).

### *Lepidium* L.

1397. *L. graminifolium* L. — In hortis, ruderatis et ad aggeres regionis calid. — Njeguši et Cetinje (Pč), Bar (Ro, Ba, Do).

1398. *L. ruderale* L. — In ruderatis, otiosis et ad vias regionis infer. et mediae. — Cetinje, Vir (Pč), Bar (Ba).

\*1399. *L. virginicum* L. — In arenosis maritimis ad Novi Bar (Do).

1402. *L. campestre* (L.) R. BR. — In ruderatis et lapi-  
dosis regionis infer. et mediae. — Ad Njeguši, Bar, Andrijevica (Ro), Kralje sub monte Kom (Ja).

### *Cardaria* DESV.

1405. *C. draba* (L.) DESV. — In ruder. et ad vias. — Cetinje, Grahovo (Pč), Njeguši (Ro).

### *Coronopus* CRAM.

1406. *C. procumbens* GILIB. — In lapid. et otiosis regionis infer. mediterr. — Ad Danilovgrad (Pt), circa Ulcinj, Plavnica, Bar, Vir et Podgorica (Ro).

### *Biscutella* L.

1408. *B. laevigata* L. subsp. *eulaevigata* THELL.  
subvar. *vulgaris* GAUD. — In graminosis et pascuis subalp.  
et alpinis. — Sinjavina planina, Durmitor (Pt, Pč, Ba), in monte  
Gradište supra Kolašin (Ba), Treblješ prope Lukavica planina (Ho).

— f. *integrata* GR. GODR. — In monte Durmitor (Ro).

— var. *glabra* GAUD. — Foliis et caulibus glabris ± lucidis. — Cum typo in monte Gradište supra Kolašin cca 2100 m (Ro).

— var. *montenegrina* ROHL. III. Beitr. 17. — Petalis spathulato-oblongis angustioribus (1,3—1,5 mm latis, 5 mm

longis), foliis rigidioribus sparsius sed grossius hirtis integris vel minute denticulatis, fructibus omnino maioribus (13—15 mm longis, 9 mm latis), stylo crasso 6 mm longo, seminibus 5 mm longis. (Vix cum var. *macrocarpa* KOCH identica.) — In herbidis alp. montis Durmitor et Štirni do prope Lukavica planina cca 1900—2000 m (Ro).

1410. *B. cichoriifolia* LOIS. var. *hispida* (DC) FIORI et PAOL. — A praec. dignoscitur petalis maioribus (cca 15 mm) sulphureis, sepalis erectis, exterioribus basi saccato-calcaratis, foliis caulinis basi cordato-auriculatis. — In rupestr. inter Gorańsko et coenob. Piva (Ro), ad Nikšić (Ba).

— — f. *paucidentata* ROHL. V. Beitr. 13. — Folia paucidentata, caulina basi fere rotundata sessilia. — Gorańsko supra coenob. Piva (Ro).

#### *Hutchinsia* R. BR.

1411. *H. alpina* (TORN.) R. BR. — In glareosis summi montis Durmitor locis Vališnica, Valoviti do et Savin Kuk (Ro).

1412. *H. brevicaulis* HOPPE. — A praecedente dignoscitur praesertim petalis angustioribus (1—1,5 mm latis) in unguem sensim attenuatis, racemo fructifero densiore, siliculis minoribus (cca 4 mm) stigmate sessili. — In pascuis regionis alpinae in monte Durmitor (Pt, Pč, Ro) et Maglić Pivski (Ro).

#### *Iberis* L.

1414. *I. sempervirens* L. — In rupestribus regionis subalp. et alpinae in tota dizione frequens.

— — subf. *rosea* BOISS. — Floribus roseis. — Non raro cum typo.

1418. *I. umbellata* L. — In lapidosis et saxosis sub monte Lisinj et ad Volubica prope Bar (Ba, Ro, Do).

— — var. *tenuifolia* VIS. f. *roseo-purpurea* SAG. — Mala Rijeka et Brskuti prope Podgorica (Pej, Ro).

1420. *I. amara* L. — Ad Rijeka advena (Ba).

#### *Aethionema* R. BR.

1425. *Ae. saxatile* R. BR. subsp. *eusaxatile* THELL. — In rupestribus et lapidosis in tota regione frequens.

— — subsp. *graecum* (BOISS. HELDR.) HAY. — Stylus

emarginatura longior. — Ad Cetinje cum typo! (Če). Vero similiter etiam alibi.

*Kernera MED.*

1427. *K. saxatilis* (L.) RCHB. — In rupestr. regionis alpinae. — In monte Kom (Pt, Ba, Lo, Ro), Durmitor (Pč, Ro), Hasanac planina ad fines Albaniae, Gradište supra Košlašin (Ro), Sinjavina planina (Ba).

*Thlaspi L.*

?1432. *T. alpestre* L. — In rupestr. montis Kom et Mali Durmitor et montis Gradište supra Kolašin a cl. PANČEK et BALDACCI indicatum; verosimiliter ad aliam speciem pertinet.

?1434. *T. montanum* L. — „Siliculae breves, basi rotundatae, loculi extus reticulato-venosi“ (PANČIĆ Elenchus pag. 7). — In rupestr. montis Jastrebica-Bijela Gora ad fines Dalmatiae (Pč); etiam e monte Lisinj supra Bar, e monte Lisa prope Andrijevica, e Sinjavina planina et e monte Durmitor a cl. BALDACCI indicatum. Secundum cl. BECK Fl. Bosne II: 329 dubium.

1435. *T. praecox* WULF. — In graminosis et saxosis regionis subalp. et alpinae. — Bajce prope Cetinje (Gi, Ro), Njeguši; Nedajno in Pivska planina in valle Sušica; Sjećirica planina, Durmitor (Ro), in monte Kom (Ba). Loca hic enumerata pro maxima parte ad subf. *macrocarpum* BECK pertinent.

— subf. *viridisepalum* PODPERA. — Ad Njeguši loco Kučista (Pej, Ro).

\*1436. *T. cuneifolium* GRIS. — In pratis montis Krivi do supra vicum Aftovac ad confines Hercegovinae, in graminosis montis Durmitor, loco Savin Kuk (De, Si).

\*— var. *durmitureum* ROHL. IX. Beitr. pag. 17 (= *T. durmitoreum* ROHL.). — Siliculis triangularibus apice leviter emarginatis vel subtruncatis ad basin longiuscule sensim attenuato-cuneatis, cca 8–10 mm longis et 4–5 mm latis, brevius pendulatis (cca 4–6 mm), stylo 2–3 mm longo. — In sax. montis Durmitor cca 2200 m (Ro).

1437. *T. ochroleucum* BOISS. et HELDR. — In herbidis alpinis in monte Kom, Durmitor et Gradište supra Košlašin (Pt, Pč, Ba).

1438. *T h. alpinum* CR. — In regione alpina et subalp. — Durmitor iugo Šljeme (Pč), Sjekirica planina et supra Andrijevica (Ro), Kostića distr. Kuči; Rogam sub monte Kom (Ba). Secundum cl. HAYEK in dicione dubium.

1439. *T h. goesingense* HAL. (Conf. ROHL. III. Beitr. 17). — In gramin. silvat. regionis subalp. — Štirni do et Korita rovačka prope Lola planina, Durmitor, Sjekirica planina (Ro, No), Kom Kučki, montes Glave, Rudo brdo et Pivljan distr. Vasojevići usque ad 1950 m (Ja).

— f. *truncatum* BORB. — Korita rovačka (Ro).

\*— subsp. *avalanum* (PANČ.) — In gramin. supra Andrijevica (Ro).

1441. *T h. Kovatsii* HEUFF. — In herbidis reg. alpinae montis Kom Kučki (Ho). Ulterius observandum.

1444. *T h. perfoliatum* L. — In agris et incultis. — Ad Cetinje (Pč), in monte Lovćen, ad Andrijevica et Njeguši (Ro), circa Ulcinj (Ro, Ba).

1446. *T h. arvense* L. — In arvis et incultis regionis infer. et mediae frequens.

### *Peltaria* JACQ.

1449. *P. alliacea* JACQ. — In dumetis et ad marg. silvarum in regione infer. et subalp. — Sub monte Kom loco Orlova Skala (Pt), Lastva čevska distr. Katunska (Pt), ad Ostrog et Nikšić (Pč, Ba), in valle Skrobotuša distr. Kuči (Sz), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Viljuša, Njeguši, Danilovgrad, Zagarač, supra Andrijevica in monte Balj (Ro), in monte Vjetnik distr. Bratonožići (Ja), Vunsaj sub monte Prokletija (Df), Sutorman supra Bar (Eb), in valle fl. Tara prope Krstac et Lever Tara (De, Si).

— f. *brevipedicellata* ROHL. III. Beitr. 17. — Pedunculi breviores, circa dimidia longitudine siliculae. — Cum typo ad Njeguši, loco Pješiva et in valle fl. Piva sub Goraňsko (Ro).

### *Hornungia* RCHB.

1452. *H. petraea* (L.) RCHB. — In lapidosis et petrosis regionis calidioris. — Ad Cetinje (Ld, Če, Ki), circa Njeguši, Vir, Rijeka, Bar, Ulcinj et Podgorica (Ro).

### *Capsella* MED.

1455. *C. bursa-pastoris* (L.) MNCH. — In agris, ruderatis, ad vias in regione infer. media et subalpina frequens.

\*1456. *C. rubella* REUT. — Petala calyce sublongiora, siliculae marginibus lateralibus conspicue concavis. — In loco sicco inter Cetinje et Belveder (Ld).

### *Camelina* CR.

1459. *C. sativa* (L.) CR. subsp. *microcarpa* (ANDRZ.) HEGI. — In agris et ruderatis regionis calid. — Ad Vir (Pč), ad pedem montis Balj prope Andrijevica cca 900 m (Ro).

### *Vogelia* MED.

1461. *V. paniculata* (L.) HORNEM. — Inter segetes ad Borkovići distr. Piva et ad Andrijevica (Ro).

## *Resedaceae*

### *Reseda* L.

\*1464. *R. luteola* L. — Ad coenob. Morača cca 300 m (Ja).

1466. *R. phytisma* L. — In lapidosis et ruderatis regionis infer. et mediae frequens. — Circa Grahovo, Vir, Cetinje (Pč), ad Njeguši, Šavnik, Bar, Ulcinj, Podgorica, Danilovgrad, Andrijevica, Drušići, Rijeka (Ro).

Adnot.: „In muris veteris coenobii in Cetinje crescit forma radice multiplice, e muro aegre elevenda, perennante(?) seminibus speciei, ad hilum tamen fuscis nec albidis.“ Cf. PANČIĆ Elenchus pag. 9.

1471. *R. lutea* L. — In asperis dicionis calid. — Ad Cetinje (Pt), Krstac, Bukovica prope Njeguši (Ro).

— subf. *mucronulata* (TIN.) J. MUELL. — Cum typo ad Ulcinj (Ba), circa Podgorica (Ro).

— subf. *crispa* J. MUELL. — Folia margine undulato-crispa. — Cum typo inter Bukovica et Cetinje (Ro).

— f. ad var. *gracilis* (TEN.) G. G. vergens. — Capsulis minoribus (cca 8 mm longis) breviusque pedicellatis et foliorum laciinis anguste linearibus cum hac varietate bene congruit, sed color plantae viridis est nec glaucus. — Ad Bukovica prope Cetinje et ad Njeguši (Ro).

## Cistaceae

### *Cistus* L.

1473. *C. villosus* L. subsp. *euvilosus* HAY. var. *tauricus* (PRESL) GROSSER. — In fruticetis regionis mediterr. — Ad Bar et Ulcinj (Ro).

— subsp. *creticus* (L.) HAY. var. *corsicus* (LOIS.) GROSSER. — A praecedente praesertim indumento non solum villosa, sed etiam glandulosopilosa dignoscitur. — Ad Bar et Ulcinj (Ro).

1475. *C. salviaefolius* L. — Flores albi, sepala exte-  
riora interioribus multo latiora, styli brevissimi. — In dumetis  
regionis infer. mediterr. — Ad Vir (Eb, Pt), circa Bar et Ulcinj  
(Ro, Do), Nikšić (Ba).

### *Tuberaria* (DUN.) SPACH.

1479. *T. guttata* (L.) FOURR. — In graminosis et du-  
metosis regionis infer. mediterr. — Ad Vir (Pč), circa Bar (Ba,  
Ro), Podgorica et Farmaki (Ro), Bioče in valle fl. Morača (Ja).

— f. *Cavanillesii* (DUN.) HAY. — Dense longe hirsuta.  
— Cum typo ad Duklja, Danilovgrad et Podgorica (Ro).

— f. *exstipulatum* (PANT. Adnot. 97) HAY. — Folia  
superiora exstipulata. — In valle fl. Morača prope Bioče (Pt).

### *Helianthemum* BOEHM.

1482. *H. salicifolium* (L.) MILL. — In graminosis et  
lapid. regionis infer. mediterr. — Circa Ulcinj et Podgorica  
(Ro), Bioče in valle fl. Morača (Ja).

1488. *H. nummularium* (L.) MILL. subsp. *vulgare*  
(LAM. et DC.) HAY. — Folia subtus stellato-tomentosa. —  
In gramin. regionis infer. et mediae. — Ad Rijeka (Pt, Ho),  
Perućica sub monte Kom; Kovčice sub monte Durmitor (Pt),  
circa Grahovo (Pč), ad Viljuša et Čevo distr. Katunska (Ro),  
sub monte Kom Kučki (Ho), ad latera montis Vojnik (Ro),  
in valle fl. Tara ad Vrtljeka et Kolašin, in monte Pivljan, Rudo  
brdo, Peh et Glave distr. Vasojevići; ad Andrijevica (Ja), Savin  
Kuk in monte Durmitor (De, Si). — In regione alpina transit  
in subsp. *tomentosum* (SCOP.) BECK.

1489. *H. ovatum* (VIV.) DUN. subsp. *hirsutum*  
(THUILL.) HAY. var. *obscurum* (PERS.) HAY. — Folia sub-

tus viridia non stellato-tomentosa. — Medun prope Podgorica; in monte Dziebeze et Hum Orahovski (Sz), in monte Vjetnik et in valle fl. Tara locis pluribus (Ja), Velji vrh prope Njeguši (Ro).

— subf. *angustifolium* (WILLK.) HAY. — In monte Lovćen (Ro), ad Novi Bar (Do).

— subf. *lanceolatum* (WILLK.) HAY. — Ad Njeguši (Ro), Volovica prope Bar et in monte Rumija (Do).

— f. *stellatum* (BECK) HAY. — In monte Lovćen (Ro, Pej).

— var. *litorale* (WILLK.) JANCH. — Sepala interna inter nervos glabra vel subglabra. — Krstac prope Njeguši (Ja), Pivska planina prope Nedajno; ad Bar et Ulcinj cum formis ad var. *obscurum* transeuntibus (Ro).

1490. *H. nitidum* CLEM. (= *H. glabrum* Aut.). — Folia glabra vel tantum margine et nervo medio ciliata.

— var. *glabrum* (KOCH) JANCH. — In pascuis alp. in monte Vila distr. Kuči et in monte Prokletija (Df), in monte Durmitor (Ht).

— var. *glaucescens* (MURB.) HAY. — Foliis angustioribus obscuris vel glaucescentibus et floribus minoribus ab var. *glabro* dignoscitur. — In monte Jastrebica ad fines Dalmatiae (Ad), Sjekirica planina cca 1800 m (Ro).

— f. *aemulans* (BECK) HAY. — Folia multo minora. — Cum typo in monte Jastrebica (Ad).

1492. *H. canum* (L.) BAUMG. — Folia subtus vel utrimque cano- vel albo-tomentosa, superiora exstipulata. — In grassinosis et lapidosis regionis subalpinae et alpinae. — Carine sub monte Kom et in omnibus montibus distr. Kuči ad fines Albaniae: Hum Orahovski, Kostiča, Planinica, Mojan, Dibala, Vila (Ba), Konjsk planina (Ho), in monte Rumija (Do), Lovćen (Ba, Ro), Šavniki, Ivica planina, Čevski Lisac (Ro), Fuša Rudnices sub monte Prokletija (Df), Durmitor (Ba).

— var. *vineale* (W.) SYME et SOW. f. *virescens* (TEN.) JANCH. frequens.

— f. *candidissimum* (TEN.) JANCH. — In alp. montis Gradište supra Kolašin et in monte Balj supra Andrijevica [ $\pm$  ad f. *scardicum* (GRIS.) JANCH. verg. (Ro)].

— var. *balcanicum* JANCH. — Folia inferiora superioribus maiora rosulantia. — In regione alpina.

— — — f. *olympicum* JANCH. — Folia supra viridia, pilis stellatis destituta, subtus tomentosa. — In monte Durmitor (Pč, De, Si).

— — — f. *scardicum* (GRIS.) GROSSER. — Folia supra cano-usque candido-, subtus candido-tomentosa. — In alp. „Kućke planine“ ad fines Albaniae (Ba).

1493. *H. italicum* (L.) PERS. — A praecedente dig-noscitur praecipue foliis utrimque viridibus non cano-tomentosis, a sequente alabastris globosis (nec ovoideis), inflorescentia pluriflora (3—20), petalis minoribus. — In saxosis regionis montanae. — Inter Cetinje et Njeguši in forma ± ad var. *hercegovinicum* GROSSER verg. (Če); in m. Lovćen (Pej, Ro).

1494. *H. alpestre* (JACQ.) DC. — In pascuis et lapi-dosis regionis alpinae et subalp. — In monte Kom, Durmitor, Hum Orahovski, Rupa, Sinjavina planina, Javorje planina (Pt, Pč, Sz, Ba, Ho, Ro, Ht).

— — f. *glabratum* DUN. — Folia utrimque glabra vel solum margine et nervo medio sparse ciliata; inflorescentia eglandu-dulosa. — In alpinis m. Jablan vrh in Sinjavina planina, in monte Vojnik et Kom Vasojevički (Ro), in monte Durmitor (No).

— — f. *melanothrix* BECK. — „Axes inflorescentiae pilis glandulosis obscuris dense obsitae, sepala eglandulosa.“ — In alp. Čafa Velja prope Rikavac ad fines Albaniae (Df), in monte Durmitor loco Savin Kuk (De, Si).

— — var. *thessalum* (BOISS. et ORPH.) GROSS. — Axes inflorescentiae ut in var. *melanothrix*, sepala dense atroviolaceo-glandulosopilosa, sed pili strigosi pauci vel nulli. — In fissuris rupium inter Njeguši et Cetinje cca 1100 m (Ld?), in alp. Kućke planine ad fines Albaniae in formis appropinquatis et ad var. praeced. vergentibus (Ba).

#### *Fumana* (DUN.) SPACH.

1496. *F. thymifolia* (L.) VERL. f. *glutinosa* (L.) BURN. — A sequente dignoscitur foliis stipulatis, infimis et mediis oppositis, floribus in cincinnos terminales dispositis, se-minibus sulcato- vel reticulato-foveolatis. — In arenosis marit. ad Bar (Do).

1498. *F. vulgaris* SPACH. — In rupestr. regionis infer. et mediae calidioris. — Ad Rijeka (Ba, Ho), Krstac prope Nje-

guši, Lastva čevska, coenob. Piva, Podgorica, Ulcinj (Ro), Bioče in valle fl. Morača (Ja), sub Crna planina (Ba), in monte Rumija supra Bar (Do), in monte Rasovatac prope Vir (Eb).

1499. *F. ericoides* (CAV.) PAU. — A praecedente dig noscitur caulibus erectis (nec procumbentibus), foliis rigidioribus sursum sensim decrescentibus iis inflorescentiae bracteaeformibus. — Ad litora maris prope Ulcinj raro (Ro), collis Volo vica prope Bar (Do).

1500. *F. Bonapartei* MAIRE et PETITM. (= *F. ericoides* f. *Malyi* JANCH. sec. HAYEK). — Caulis humilis humifusus, rami arcuato-ascendentes pilis glanduliferis brevissimis patentibus obsiti; capsula 6sperma, semina foveolato-sulcata (conf. JANČHEN Oe. B. Z. LVIII.). — In summi montis Durmitor loco Čirova pećina (leg. Čurčić sec. JANČHEN).

## Violaceae

### *Viola* L.

1502. *V. odorata* L. — In dumetis reg. infer. et mediae. — Ad Cetinje et Ostrog (Pč), ad Bar et Njeguši (Ro, Ba), Crmnica (Eb).

1515. *V. vilaeensis* HAY. (conf. HAYEK Beitr. zur Fl. der mont.-alb. Grenzgeb. pag. 154). — Acaulis, estolonosa; flores pallide lilacini vel albi obscure violaceo-striati; sepala obtusissima, stipulae ovato-lanceolatae glandulosos-fimbriatae apice parum pilosae; stolones nulli; folia omnia (ut flores) basalia parva, longe petiolata ovata basi rotundata vel subcordata, juvenilia pubescenti-scabra, demum glabra. — Ad nives liquesc. in glareos. alp. supra lacum Rikavac distr. Kući cca 1900 m (Df).

1519. *V. Riviniana* RCHB. — In dumetis ad Žabljak sub monte Durmitor cca 1500 m (Ro).

1520. *V. silvestris* LAM. — In silvis et dumetis regio nis infer. et subalpinae. — In valle Morača et sub Sutorman (Pč), sub monte Čum Orahovski (Sz), Velki Krš supra Andrijevica (Ba), ad Ostrog (Ho), circa Njeguši, Bar, Lijeva Ri jeka, Andrijevica et in valle Perućica sub monte Kom (Ro), ad Kolašin (Ja), sub monte Vojnik (Ba), in monte Lovćen (Ro).

— f. *lilacina* ČELAK. — Cum typo ad latera montis Sjekira planina (Ro).

1521. *V. canina* L. subsp. *montana* (L.) DAHL. — In silvis et herbidis regionis alpinae. — Crna planina sub monte Kom (Pt), Katuni Busaci et Bukovica sub monte Durmitor, Tušina distr. Drobnjaci (Ba), in valle fl. Tara ad Matoševo et Lijeva Rijeka, in monte Žoljevica prope Andrijevica (Ro sub *V. canina* var. *lucorum*), in monte Velki Maglić distr. Kuči (Ba).

1530. *V. Košaninii* (DEG.) HAY. — „Suffrutex humilis multicaulis. Folia sessilia linearia, stipulae foliis paulo breviores, superiores lineares, inferiores bipartitae. Flores rubro-violacei, petala lateralia patentia vel deflexa, inferius apice excisum, calcar 12 mm longum petalis parum longius.“ — In glareosis alpinis Rapša iam ultra confines Albaniæ (Df). Locus in Montenegro mihi ignotus.

1531. *V. biflora* L. — In glareosis alpinis ad nives liquescentes. — In monte Durmitor (Pt, Ro), sub jugo Žijovo distr. Kuči (Ba), in monte Lovćen (Ba, Pej, Ro), Maganik, Pavlova livada (Ho), Javorje et Lola planina (Ro), Sinjavina planina (Ba).

? *V. alpina* JACQ. — In rupestr. summi montis Mali Durmitor a cl. PANTOCSEK lecta et in Adnotat. sub hoc nomine publicata certissime ad aliam speciem pertinet.

1540. *V. Zoysi* WULF. — In glareosis ad nives liquescentes regionis alpinae. — In montibus Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ro), Katuni Kostića, montes Žijovo, Maglić, Miočev do supra Rikavac et mons Planinica distr. Kuči ad fines Albaniæ (Ba), in montibus Gradište et Jablan supra Kolašin (Ba, Ro), Maglić Pivski (Ro), Čafa Velja distr. Kuči (Df), in monte Visitor prope Andrijevica (Sk).

— f. *lilacina* BECK (= var. *Pančići* BALD.). — In monte Durmitor saepe typo frequentior (Ba, De, Si, Ro), in monte Gradište supra Kolašin; Rogam sub monte Kom (Ba).

— f. *semicoerulea* BECK. — Petala superiora coerulea. — Cum typo.

— f. *oblongifolia* W. BECKER. — Folia oblonga, stipulae linear-lanceolatae fere integerrimae. — In monte Jastrebica-Bijela Gora ad fines Dalmatiae (Pt sub *V. gracilis* var. *lutea*; conf. BECKER Violae Europ. 85).

1545. ? *V. gracilis* S. S. — In rupestr. et pascuis alpinis. — Planta e monte Jastrebica-Bijela Gora sec. cl. BECKER ad

spec. praeced. pertinet. — In herbidis alp. montis Kunj Kostića et Dibala distr. Kuči, exsic. Nr. 155 sub *V. speciosa* PANT. „appropinquanter“ (Ba). — E monte Kom a cl. PANTOCSEK indicata sub var. *lutea* BOISS. — E montibus Lovćen et Kom etiam a cl. BALDACCI indicata. Ego non vidi.

1553. *V. Nicolai* PANT. — Ab affini *V. Orphanidis* BOISS. dignoscitur caule breviter hirsuto (nec dense pubescente), foliis inferioribus orbiculatis (nec ovatis) crenatis, superioribus oblongo-ovatis obtuse serratis; stipulis inciso-lobatis, lobo medio elongato lanceolato, floribus maioribus, corollis 18—30 mm longis et 15—20 mm latis, calcare cylindrico obtuso (nec tenui curvato) appendicibus calycis plusquam duplo longiore. — In pascuis, locis umbrosis, ad margines silvarum regionis subalp. et alpinæ dicionis septentr. — In valle Peručica sub monte Kom et ad portam montis Sinjavina planina Vratlo dictam supra Kolašin (Pt, Ba, Ro), Javorje planina et in monte Kukuraj Brdo prope montem Kom (Pč), Korita rovačka (Ho), in valle Jelovica sub Bjelastica planina et in monte Balj supra Andrijevica, Velki Šulac in monte Durmitor (Ro).

\* — f. *glabriuscula* ROHL. IV. Beitr. 27. — Caulis glaber vel subglaber. — In alp. montis Balj et ad Piševo prope Andrijevica (Ro). Haec forma non est identica cum *V. speciosa* PANT. (conf. HAYEK Prodr. I: 514).

\* — f. *brevicornu* ROHL. XI. Beitr. pag. 21. — Calcar obtusum breve, calycis appendices subaequans. — In pratis subalpinis in monte Jerinja glava prope Andrijevica (Sk).

1554. *V. Orphanidis* BOISS. — In herbidis et pratis regionis subalp. et alpinæ. — Sub m. Kom Vasojevički, mons Jablan supra Kolašin, Javorje planina, mons Zeletin supra Andrijevica (Ro).

1556. *V. speciosa* PANT. Oe. B. Z. XXIII: 79. — A *V. Nicolai* dignoscitur: caulis humilior 8—10 cm longus (in *V. Nicolai* 25—75 cm!) glabrescens, foliis latis (8×8 mm), superioribus ellipticis (8—15×5—8 mm), stipulis lyrato-pinnatifidis laciinis linearibus integerrimis latitudine partis indivisae aequilongis; sepalis minoribus (cca 5 mm), calcare coeruleo acuto appendicibus calycis ad summum duplo longiore. — In pratis alp. vallis Viruša dol infra Crna planina, sub monte Kom, in Sinjavina planina et in Mali Durmitor (Pt), Javorje planina (Pč), Starac in Sinjavina planina (Ba), in montibus Planinicis,

Mojan, Vila distr. Kuči (Ba), in monte Balj supra Andrijevica (Ro), Gvozd sub monte Vojnik (Ba), Ledenica planina, Konjsko planina, Lukavica, Durmitor, Ranisava, Sjekirica planina (Ro, De, Si).

1558. *V. elegantula* SCHOTT. (= *V. declinata* aut. montenegr. non W. K.). — In herbidis subalp. et alpinis. — Sub monte Kom (Ho, Ro), in valle Viruša sub Crna planina (Pt), Šavnik; Božur planina in Pivska nahija, Sinjavina (Ro), Volušačko jezero (Ma).

— subf. *lutea* (PANT.) BECK. — Flores lutei. — Cum typo, sed rarer.

— var. *latisepala* (WETTST.) BECK. — Breviter pubescens, stipulae superiores latere exteriore laciniis 2—4 praeditae. — In pratis alp. in monte Pivljan et Margarita sub monte Kom cca 1700—1900 m (Ja).

1559. *V. saxatilis* SCHMIDT subsp. *aetolica* (BOISS. et HELDR.) HAY. — In graminosis et lapidosis e regione infer. usque in subalpinam. — Dubovik prope Cetinje (Gi), Njeguši (Pej, Ro), Lijeva Rijeka, in montibus Balj et Piševu prope Andrijevica (Ro), Lješanska nahija, Črtov do et Varda distr. Piva (Ro), Bijela Skala et Rumija supra Bar (Do), Krivi do supra Aftovac distr. Piva (De, Si).

— subsp. *macedonica* (BOISS. et HELDR.) HAY. — In graminosis regionis mont. et subalpinae. — Circa Andrijevica (Ro), in valle fl. Tara ad Han Garančić, Matoševo, Košlašin; in monte Pivljan et Trešnjevik supra Kolašin; Kralje prope Andrijevica cca 900—1600 m (Ja).

— var. *pseudolutea* HAY. (= *V. lutea* ROHL. IV. Beitr. pag. 28). — In graminosis alp. montium Balj et Sjekirica planina usque ad 1700 m (Ro).

1560. *V. arvensis* MURR. — In agris et incultis regionis infer. et mediae. — Medjurečka planina distr. Primorje; sub monte Soko distr. Kuči (Ba), ad Andrijevica (Ho), Košlašin (Ja), Cetinje (Pč), Konjuhe sub monte Kom (Ba).

1561. *V. Kitaibeliana* R. S. — A praecedente dignoscitur caule breviter hispidulo, segmento stipularum terminali oblongo-spathulato stipitato magno folio suo saepe vix minore. — In incultis et arvis regionis infer. et mediae calid. — Circa

Podgorica; Lješanska nahija; Lastva čevska cca 1100 m; ad Njeguši (Ro).

— f. *parvuloides* BECKER. — Cum typo in Lješanska nahija in formis transeuntibus.

### Tamaricaceae

*Tamarix* L.

1573. *T. gallica* L. — Racemi terminales; folia adpressa, bracteae longe acuminatae calyce subaequilongae; antherae apiculatae. — In fruticetis ad Rijeka (Pt) et Vir (Pč).

\*1578. *T. africana* POIR. — Racemi laterales; folia patentia; bracteae pedicellis fere duplo longiores; antherae muticæ. — In paludosis ad Bar et ad ripam fl. Morača prope Plavnica (Ro).

### Cucurbitaceae

*Bryonia* L.

1582. *B. alba* L. — In dumetis, ad sepes regionis inferioris. — Ad Sindžon (Pt), supra coenob. Morača (Pč), ad Njeguši (Ba).

1583. *B. dioica* JACQ. — Flores dioici, fructus rubri. — In fruticetis, ad sepes regionis infer. et mediae calid. — Circa Njeguši et Grahovo (Pč), Orahovo (Sz), ad Bar, Viljuša, Šavnik, Andrijevica (Ro).

1585. ? *B. cretica* L. — In insula Lesandra a cl. EBEL indicata. Potius ad spec. praeced. pertinere videtur.

1588. *Colocynthis citrullus* (L.) FRITSCH, *Cucumis sativus* L., *C. melo* L., *Lagenaria vulgaris* SER., *Cucurbita maxima* DUCH., *Cucurbita pepo* L., *Cucurbita pepo* var. *melopepo* (L.) ALEF. coluntur.

### Guttiferae

*Hypericum* L.

1605. *H. perforatum* L. — In dumetis et lapidosis regionis infer. et mediae frequens. Plantae e regione infer. calidiore pertinent ad subsp. *veronense* (SCHRK.) et *angustifolium* (DC.) GAUD.

1606. *H. maculatum* CR. subsp. *quadrangulum* (TOURLET) HAY. — In pratis et fossis regionis infer. ad Plavnica, Danilovgrad, Spuž (Ro).

— subsp. *immaculatum* (MURB.) A. FROEHL. — Petala et sepala non nigro punctata vel maculata sed striis linearibus pellucidis praedita; folia saepissime copiose pellucido-punctata. — Ad rivulos et in pratis regionis subalp. et alpinae in tota ditione septentr. frequens. Forma foliis epunctatis rarius cum typo.

1607. *H. acutum* MCH. — Ad rivulos et in pratis uliginosis regionis mediae. — Ad Kolašin (Pč), coenobium Morača, Andrijevica (Ja).

1611. *H. hirsutum* L. — In dumetis et silvis regionis subalpinae. — Sub monte Balj prope Andrijevica, ad latera montis Lovćen, in valle fl. Piva sub Goraňsko, Bogojeva Glava prope Njeguši (Ro).

\*1629. *H. montanum* L. — In silva caedua ad Mratinje sub monte Maglić cca 800 m (Ro).

\*1634. *H. Grisebachii* BOISS. var. *quadristylum* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Pistillum quatuor stylis provisum, sepala acutiuscula cum glandulis crassis et breviter stipitatis. — In alp. montium Prokletija loco Pločica sub Gjeravica (Boš).

\* — var. *quinquestylum* BOŠNJAK l. c. — Pistillum quinque stylis provisum; sepala ut in priori, cum glandulis crassis, sed longius stipitatis. Cum praeced. (Boš).

1637. *H. alpinum* W. K. — In pratis et pascuis subalp. et alpinis in montibus dicionis septentr. — In monte Kom (Pt, Pč, Ba, Ja, Ro), Durmitor (Pt, Pč, Ro), in monte Dziebeze distr. Kući (Sz), Tursko ždrijelo et Korita rovačka (Ho), Štirni do prope Lukavica planina, in montibus Vojnik, Maglić, Javorje planina (Ro), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), Lovćen (Ba), Sinjavina planina (Ba).

1640. *H. barbatum* JACQ. — A praecedente dignoscitur praesertim sepalis triangulari-lanceolatis margine longe setoso-fimbriatis eglandulosis. — In pratis regionis subalpinae et alp. in tota ditione (etiam in monte Lovćen) frequens.

— subvar. *pindicolum* HAUSSKN. — Cum typo in monte Vojnik (Ro).

— subvar. *epirotum* HAL. — Folia non vel sparse ad marginem nigropunctata ut in varietate praecedente, sed folia anguste lanceolata. — In monte Lovćen (Ro), in valle fl. Tara ad Lever Tara et ad Krivi do distr. Piva (De, Si).

— var. *trichanthum* (B. SPR.) BOISS. — Caulis humilior densius foliatus, folia latiora non vel sparse nigropunctata. — In valle Perućica sub monte Kom, Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz); in monte Lovćen formae transeuntes (Vh, Ro).

### **Malvaceae**

#### *Hibiscus* L.

\*1643. *H. trionum* L. — In cultis et ruderatis regionis infer. mediterr. — Ad Rijeka (Pt), prope Vir (Ho), Velji kraj prope Njeguši (Pej, Ro).

#### *Abutilon* GAERTN.

1644. *A. Theophrastii* MED. — In ruder. et fruticetis humidis regionis mediterr. infer. — Ad Vir (Pč), Plavnica (Ro).

#### *Malva* L.

1646. *M. moschata* L. — In dumetosis et ad margines silvarum regionis subalpinae. — Ad latera montis Lovćen (Pč, Ba, Pej, Ro), Ivica et Javorje planina (Pč), Hum Orahovski et Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz), sub monte Kom Kučki (Ba, Ho), Barno jezero et Bukovica sub monte Durmitor, Ranisava; circa Andrijevica (Ba, Ro), in monte Vjetrnik, in valle fl. Tara, in montibus Pivljan et Rudo brdo supra Kolašin; Kralje prope Andrijevica (Ja), supra Nikšić, in monte Ključ supra Kolašin, mons Žijovo distr. Kuči (Ba).

— f. *laciiniata* VIS. — Folia omnia quinquefida segmentis in lacinias lineares pinnatipartitis. — In valle Perućica et Viruša (Pt); Mali Šavnik in monte Lovćen (Ro).

? 1647. *M. Tournefortiana* JUSL. — A praecedente dignoscitur floribus longe pedunculatis, mericarpis albidis faciebus rugosis. — Ad sepes circa Rijeka (Pt). Secundum cl. HAYEK pro dic. dubia.

1650. *M. silvestris* L. — In ruderatis et ad sepes regionis infer. et mediae frequens. — Ad Njeguši (Pč, Sz, Ro), Medun (Sz), Rijeka (Ho), Viljuša, coenob. Piva, Podgorica,

Velestovo et alibi in Katunska nahija (Ro), Andrijevica et Košlašin (Ro, Ja).

— — f. *hispidula* BECK. — Cum typo ad Njeguši (Gi, Ro), in monte Lovćen, loco Šavnik (Ro).

— — var. *incanescens* GRIS. — Circa Bar et Ulcinj (Ro).

— — f. *eriocarpa* BOISS. — Krstac prope Njeguši (Pej, Ro).

1651. *M. ambigua* GUSS. — Pedunculi folio suffulcrante aequilongi vel longiores; phylla epicalycis calyce dimidio breviora; mericarpia tomentosa (conf. *M. silvestris* var. *incanescens*). — In ruderatis ad vias. — Krnovo sub monte Vojnik (Ro), Bajce prope Cetinje (Kš).

1652. *M. montana* FORSK. — A *M. neglecta* dignoscitur: folia superiora acuta 3—5-fida, pedunculi fructiferi erecti; phylla epicalycis oblonga calyce parum breviora; petala obscure lilacina; mericarpia non tomentosa, sed glabra vel parce pilosa. — In ruderatis regionis infer. mediterr. — Ad Rijeka (Pt).

1653. *M. neglecta* WALLR. — In aridis regionis mediae calid. ad Grahovo (Pč); ad viam in angustiis Sutorman supra Bar (Do).

1654. *M. pusilla* WITH. — A praecedente dignoscitur petalis calycem non vel vix superantibus; phyllis epicalycis calyce plusquam dimidio brevioribus; mericarpio dorso leviter foveolato. — In ruderatis ad Šavnički raro cca 900 m (Ro).

### *Lavatera* L.

1658. *L. cretica* L. — In herbidis regionis inferioris ad Povija (Pt).

1661. *L. thuringiaca* L. — In dumetosis, herbidis, ad vias regionis inferioris et mediae. — Ad Strugari (Pt), circa Danilovgrad et Šavnički (Pč), Ceklin et Cetinje (Ba), Riječani (Ho), in monte Vjetrnik supra Jablan; coenob. Morača (Ja).

— — subf. *protensa* BECK. — Lobus medius foliorum superiorum elongatus, longe acuminatus. — Jerinja glava supra Andrijevica, circa Viljuša et Šavnički; Ljut et Varda supra coenob. Piva; Stubica et Pješivci distr. Katunska nahija (Ro).

— — var. *bulgarica* VELEN. — Floribus dimidio minoribus, petalis calyce duplo longioribus basi valde hirtis, calycis lobis lanceolato-acuminatis, foliorum superiorum lobo medio ceteris vix majore. — Inter Kotor et Njeguši (Kn).

1662. *L. ambigua* DC. — A *L. thuringiaca* dignoscitur inflorescentia longe racemosa, floribus brevius pedicellatis, pedicellis summo 12 mm longis calycem longitudine aequantibus, in floribus superioribus brevissimis, mericarpis faciebus transverse rugosis, foliis molliter stellato-tomentosis fere ad inflorescentiam 5-partitis. — In dumetosis, ad vias regionis infer. et mediae calidioris. — Ad Njeguši (Kn, Pej), ad Plavnica, Bogetići; Varda supra coenob. Piva (Ro).

### *Althaea* L.

1665. *A. hirsuta* L. — Annua, patule hispida, folia media et superiora profunde palmato 3—5-fida, segmentis obtuse dentatis. — In graminosis et lapidosis regionis infer. et mediae calid. — Ad Njeguši (Pč), Rudine nikšićke; Drušići prope Rijeka et Boljevići prope Vir (Ro), circa Andrijevica (Sk), ad Orak versus vallem Vrbnica distr. Piva (De, Si).

1670. *A. cannabina* L. — Perennis, dense stellato-tomentosa; folia usque ad basin palmati-partita segmentis lanceolatis duplicato-serratis, petala roseo-lilacina calyce plusquam duplo longiora, mericarpia dorso rugosa. — In fruticetis et pratis regionis infer. — Sub Danilovgrad (Pč), Dujevo (Ho), ad Vir (Ro), ad coenob. Morača cca 350 m (Ja), ad Njeguši loco Velji kraj (Pej, Ro).

1673. *A. officinalis* L. — In fruticetis et fossis regionis infer. mediterr. — Ad Rijeka (Pt, Ho), ad Vir (Pč), Plavnica (Sz, Ro, Ja), Tudjemile supra Bar (Ba), insula Vranina (Eb).

— subf. *mollis* BORB. — Densius tomentosa; phylla epicalycis triangulari-ovata. — Ad Bar (Do).

1674. *A. pallida* (W. K.) NYM. — A praecedente dignoscitur foliis cordato-orbicularibus tomentoso-hirtis (nec triangulari-ovatis molliter tomentosis), floribus singulis vel binis (nec fasciculatis), phyllis epicalycis ovatis calyce aequilongis (nec linearis-lanceolatis calyce dimidio brevioribus), petalis dilute (nec pallide) roseis. — In graminosis regionis infer. mediterr. — Circa Danilovgrad et Sinjac (Pč), ad Bioče et Dukla prope Podgorica (Ja), insula Vranina (Eb). E regione subalp. solum a Kolašin a cl. BALDACCI indicata.

1675. *A. rosea* L. — A praecedente dignoscitur caule hirsuto-tomentoso, phyllis epicalycis et sepalis triangularibus, pe-

talis basi non flavis, mericarpiis leviter (nec profunde) sulcatis. — In herbidis et dumetosis regionis infer. mediterr. prope Bar (Ba, Do).

## Tiliaceae

### Tilia L.

1681. *T. tomentosa* MCH. — Foliis subtus stellato-cis nereo-tomentosis facile dignoscitur. — In silvis regionis infer. et mediae calidioris frequens. — Cerovo (Pt), Cetinje, Ostrog (Pč, Ba), Lastva čevska (Ho, Ro), Njeguši, Ulcinj, Bar, Koškoti, Zagarać, Danilovgrad, Borkovići distr. Piva; ad latera montis Balj prope Andrijevica (Ro), ad coenob. Morača (Ja, Ba), Tušina prope Šavniki (Ba).

— f. *virescens* (SPACH) HAY. — Ad Čeklići prope Njeguši (Ro).

1682. *T. officinatum* CR. subsp. *platyphyllos* (SCOP.) HAY. — In silvis regionis infer. et mediae. — In valle fl. Morača et supra Grahovo (Pč), in valle fl. Perućica sub monte Kom (Ba) [sec. cl. WAGNER pertinet planta ex hoc loco ad *T. pseudorubram* C. SCHN. var. *corinthiam* (SIMK.) HAY. × *T. cordatum* MILL.]; supra coenob. Piva et in monte Vojnik; circa Viljuša (Ro), Tušina prope Šavniki (Ba). — f. *bosniaca* BECK. — Cum typo ad coenob. Piva (Ro).

1683. *T. cordata* MILL. — In silvis regionis mediae. — Lastva čevska (Pt), Kolašin (Pč), ad Njeguši, Andrijevica et in monte Žoljevica supra Andrijevica (Ro).

## Linaceae

### Linum L.

1684. *L. gallicum* L. — Annum; folia linear-lanceolata alterna margine scabra; inflorescentia laxa, pedunculi calycem + aequantes; sepala ovato-lanceolata acuminata margine glandulosi-ciliata, petala flava parva (cca 6 mm). — In gramin. et lapid. regionis infer. mediterr. — Ad Rijeka et Danilovgrad (Pt, Ro); circa Vir et Spuž (Ho, Ro); Bar, Ulcinj, Podgorica, Kokoti (Ro); Topolica et Volovica prope Novi Bar (Do).

1685. *L. liburnicum* SCOP. — A praecedente dignoscitur floribus in ramis inflorescentiae cymosis 1—3-nis appro-

ximatis. — In herbidis regionis infer. — Ad Rijeka et Piperi (Pt, Ro), Godinje prope Vir, Drušići (Ro), Andrijevica (Ba).

1686. *L. strictum* L. — A praecedente differt floribus in apice ramorum condensatis, pedicellis calyce brevioribus. — In gramin. et lapid. regionis infer. mediterr. — Circa Rijeka (Pt), Kokoti distr. Lješanska (Ro).

— var. *spicatum* (LAM.) PERS. — „Rami inflorescentiae valde abbreviati, inflorescentia racemosa subspicata.“ — Secus ripas rivuli Vrbica prope Podgorica reg. infer. mediterr. (Ro).

1687. *L. nodiflorum* L. — A praecedente dignoscitur foliis breviter denticulato-ciliatis, floribus subsessilibus, sepalis ovato-linearibus maioribus (cca 10 mm) margine non glandulosi-ciliatis, petalis maioribus (usque ad 20 mm). — In gramin. et collibus siccis reg. infer. mediterr. — Seljani (Ho), circa Bar; Godinje et Limljani prope Vir (Ro, Do).

1691. *L. flavum* L. — In pratis et herbidis regionis infer. et subalp. — Ad Cetinje et Vir (Pč), Brotnik (Ho), Sinjavina, Durmitor, Hum Orahovski, Kunj Kostića, Bežijevo, Čafa gvozdeča distr. Kući (Ba), Rijeka, Borkovići, Zakamen supra coenob. Piva, Perućica sub monte Kom; in monte Jerinja Glava et Žoljevica supra Andrijevica (Ro); ad Krstac et Orak supra vallem rivi Piva (De, Si).

? 1692. *L. thracicum* (GRIS.) DEG. — A *L. flavo* dignoscitur praesertim sepalis capsula dimidio vel bis longioribus longe acuminatis, caule a medio ramoso, inflorescentia multi-flora. — In herbidis et pascuis regionis subalp. et alp. — Secus viam e Andrijevica ad Kolašin; in monte Gradište supra Kolašin; in mónte Durmitor (Ba teste cl. A. DEGEN, Nro coll. 24.). Secundum cl. PODPÉRA (Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1902 pag. 637) et cl. JÁVORKA (Magy. bot. Lap. 1910:154) haec spec. crescit tantum in Bulgaria et Macedonia.

1694. *L. capitatum* KIT. — A *L. flavo* dignoscitur: rosulae basilares et steriles florendi tempore evolutae; inflorescentia fere capitata. — In pratis et pascuis regionis alpinae et subalp. in omnibus montibus dicionis septentr. et orient. frequens. — E monte Lovćen adhuc non vidi.

1706. *L. tenuifolium* L. — In graminosis et rupestribus regionis inferioris et subalpinae frequens. — Grahovo et in monte Durmitor (Pč), Orahovo et Hum Orahovski (Sz), sub

monte Kom Kučki (Ho), Cetinje (Kš, Kn), Njeguši, Rudine nikšićke, Viljuša, Šavniki, Mratinje sub monte Maglić Pivski, circa Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Spuž, Danilovgrad, Velestovo (distr. Katunska), circa Andrijevica, in montibus Jerinja Glava, Balj, Žoljevica (Ro), coenobium Morača (Ja). — f. *pubescens* WOHLF. — Caulis parte inferiore saepe usque ad medium ± pubescens. — Cum typo ad Njeguši (Ro), Limljani prope Vir (Do).

1707. *L. hologynum* RCHB. — Petala azurea calyce 2—3-plo longiora; sepala late ovata acuminata, basi uninervia margine late scarioso-eglandulosa; styli fere ad apicem coaliti. — In pratis regionis subalpinae raro. — In silva Trepelika sub monte Mojan ad fines Albaniae (Sz); in valle Perućica sub monte Kom, Ledenica planina distr. Piva (Ro); in monte Jerinja glava prope Andrijevica (Sk).

1709. *L. angustifolium* Huds. — In graminosis et lapidosis regionis infer. et mediae. — In valle fl. Perućica et Tara sub monte Kom; Kovčice sub monte Mali Durmitor (Pt), circa Bar (Ba, Ro), Rijeka (Ho), Dobrsko selo inter Rijeka et Cetinje (Kš), ad Ulcinj, Podgorica et Velestovo in nahija Katunska (Ro).

\*1710. *L. usitatissimum* L. — Cultum et saepe subspontaneum.

? 1712. *L. perenne* L. — E monte Durmitor et Kom a cl. PANČIĆ (Elench. 16.) et BALDACCI indicatum. Verosimiliter ad aliam spec. vel ad subsp. sequentem pertinet (Conf. ASCH. GRAEB. Syn. VII, 1: 202).

— subsp. *extraaxillare* (KIT.) ASCH. GRAEB. Syn. VII, 1: 204. — „Folia omnia 3-nervia, sepala interiora acutiuscula scarioso-marginata striis 3 pellucidis provisa.“ — In pratis regionis alpinae. — In monte Ranisava et Javorje planina (Ro), in monte Durmitor (No).

\*1713. *L. montanum* SCHL. f. *illyricum* BECK. (= *L. laeve* ROHL. an SCOP.?). — In herbidis subalp. et alp. — Supra Cetinje (Pč), in montibus Maglić Pivski, Durmitor, Kom Vasojevički, Gradište, Jablan, Bjelastica planina usque ad 2300 m (Ro, De, Si); in monte Lovćen (Ho, Ro).

? 1715. *L. alpinum* JACQ. — A cl. PANTOCSEK (Adnotationes pag. 114.) e montibus Kom et Mali Durmitor et

a cl. HORÁK e montibus Maganik et Tursko Ždrijelo indi-  
catum. (Sec. BECK et HAYEK pro dicione dubium.)

1716. *L. austriacum* L. subsp. *euaustriacum* HAY.  
var. *Tommasinii* (RCHB.) WOHLF. — In herbidis summi  
montis Pešinjak supra Rikavac et Planinica distr. Kuči (Ba).

1717. *L. catharticum* L. subsp. *sueicum* HAY. —  
In pratis regionis subalp. et alp. frequens. — In vallibus Peru-  
ćica et Viruša dol sub monte Kom; circa Kovčice ad pedem  
montis Durmitor (Pt), in monte Dziebeze distr. Kuči (Sz), ad  
Cetinje (Kn), in montibus Vojnik, Maglić Pivski, Ledenica  
planina; Čevo, Njeguši, Velestovo in nahija Katunska; inter  
Žabljak et Nedajno in nahija Pivska; ad Andrijevica (Ro), in  
monte Pivljan et circa Kolašin (Ja), Suhi vrh prope montem Kom;  
Sinjavina planina; Bukovica sub monte Durmitor (Ba), in monte  
Lovćen (To).

### Oxalidaceae

#### *Oxalis* L.

1719. *O. acetosella* L. — In silvis regionis subalp. et  
alp. — In montibus Kom (Pt, Ro), Durmitor (Pt, Pč, Ro),  
Javorje planina (Pč), in valle Perućica sub monte Kom (Sz),  
in monte Lovćen (Kš, Pej), supra coenob. Piva, Mratinje sub  
monte Maglić; Sjekirica planina et Štit distr. Vasojevići (Ro),  
circa Andrijevica (Ro, Ja).

1721. *O. corniculata* L. — In ruderatis et incultis re-  
gionis infer. mediterr. frequens. — Circa Rijeka (Pt, Ro),  
Boljevići prope Vir (Pč), circa Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica,  
Danilovgrad, Njeguši (Ro).

### Geraniaceae

#### *Geranium* L.

1722. *G. phaeum* L. — In pratis et dumetis regionis alp.  
et subalp. — In monte Lovćen (To); Viruša dol sub Crna  
planina; vallis Perućica sub monte Kom; Sinjavina planina,  
Kovčice sub monte Durmitor (Pt), in valle fl. Tara (Pč);  
Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz); sub monte Kom  
Kučki (Ho), Viljuša; Ravno distr. Piva, Mratinje sub monte  
Maglić, supra coenob. Piva, in montibus Balj et Jerinja Glava  
supra Andrijevica (Ro), circa Andrijevica (Ja, Ro), in alp.

Vermoš planina ad fines Albaniae (Df), in monte Ključ supra Kolašin (Ba), Volujačko jezero (Ma), Piva planina (De, Si).

1723. *G. reflexum* L. — Petalis reflexis facile a praecedente dignoscitur. — In silvis et pratis regionis subalp. et alpinae. — Ad Radeča Velja prope Kostiča distr. Kuči (Ba), in montibus Durmitor, Vojnik, Ledenica planina, Sjekirica planina, Žoljevica, Jerinja glava prope Andrijevica, sub monte Kom Vasojevički; in valle Jelovica sub Bjelastica planina; Treblješ luka prope Lukavica planina; sub Lola planina et in valle rivi Bijela prope Šavniki (Ro), circa Kolašin; ad Vrujica supra coenob. Morača; in montibus Pivljan, Trešnjevik, Kom, Glave (Ja) usque ad 2000 m; etiam in monte Lovčen raro (Pej, Ro).

\*1725. *G. villosum* TEN. — Ab affini *G. molle* petalis duplo maioribus, seminibus tenuiter punctatis dignoscitur. — In dumetosis et graminosis regionis infer. et mediae calid. — Planinica prope Ostrog (Ho), Belveder prope Cetinje (Ld, Bo, Če), circa Bar, Ulcinj, Rijeka, Njeguši (Ro), ad Drežnica prope Nikšić; in monte Balj supra Andrijevica usque ad 1450 m (Ro), in valle fl. Tara ad Matoševo et Kolašin (Ja), ad pedem montis Rumija cca 1200 m (Do).

1726. *G. molle* L. — In graminosis et ruderatis reg. infer. et mediae raro. — Ad Cetinje et Vir (Pč), ad coenob. Piva, ad Andrijevica (Ro), in muris ad Bar (Do).

1729. *G. pyrenaicum* BURM. — In herbidis et dumetis regionis infer. et mediae. — Viruša dol sub Crna planina; Orlova skala sub monte Kom (Pt), Sutorman supra Bar et in monte Štirovnik (Pč), ad Cetinje (Pč), Rijeka (Ho), Žabljak sub monte Durmitor; Črtov do et Varda sub Ledenica planina distr. Piva; Konjsko, Lukavica planina, Štirni do; Njeguši (Ro), Bostur in monte Lovčen (Kš), Vernoš planina distr. Kuči; in monte Gradište supra Kolašin (Ba), Crmnicka nahija (Eb).

1730. *G. bohemicum* TORN. — Annum; caulis dense glandulosopubescentis pilis longis simplicibus immixtis; folia palmato 3—5-fida segmentis acutis rhomboeo-ovatis duplicato-inciso-serratis; pedunculi biflori dense glandulosopilosii villosaque; petala coerulea venis 5 violacea obcordata ciliata sepalis ovatis longe aristatis villosisque 2—3plo longiora; mericarpia glandulosopilosa, semina tenuiter lineato-punctata. — In silvis et dumetis regionis mediae raro. — Ljut et Varda supra coenob.

Piva; in montibus Balj et Jerinja glava supra Andrijevica  
cca 1000—1400 m (Ro).

1732. *G. pusillum* L. — In ruderatis et incultis regionis  
infer. et mediae. — Ad Cetinje et Vir (Pč), circa Spuž (Ho),  
ad coenob. Piva et Goraňsko distr. Piva; circa Andrijevica (Ro),  
ad Matoševo in valle fl. Tara (Ja), Rogam sub monte Kom  
(Ba).

1733. *G. dissectum* JUSL. — In agris et lapidosis  
regionis infer. et mediae. — Ad coenob. Piva; Vrbica prope  
Goraňsko distr. Piva; inter Velestovo et Njeguši in nahija  
Katunska, circa Bar, Podgorica, Andrijevica (Ro).

1736. *G. sanguineum* L. — In herbidis, dumetosis, ad  
marg. silvarum regionis infer., montanae, subalp. in tota dizione  
frequens.

— var. *latipartitum* PETUNIKOW. — Foliorum segmentis  
2—3plo latioribus ac in typo. — Lopatin do ad Njeguši (Ro).

— var. *villosum* MURR. — Caulis dense albo-villosus. —  
Kraćeva Glavica prope Njeguši (Pej, Ro), Krivi do distr. Piva  
ad confines Hercegovinae (De, Si).

1737. *G. cinereum* CAV. subsp. *subcaulescens*  
(L'HÉR.) HAY. — Caulis humilis aphyllus vel subaphyllus  
sparse breviter pilosus; flores magni, petala purpurea obovata  
trunctata calyce duplo longiora; pedunculi uniflori; sepala ovato-  
lanceolata adpresse pubescentia exteriora basi + longe patule  
hispida. — In lapid. et in dumetis ad summum jugum montis  
Lisinj supra Bar (Ba).

1739. *G. silvaticum* L. — In pratis et dumetis regio-  
nis subalp. et alp. in montibus dicionis septentr. et orient. —  
Crna planiná, Kom, Sinjavina planina, Durmitor (Pt, Ba, Ro),  
in montibus Dziebeze distr. Kuči (Sz), Maglić Pivski, Ranisava;  
vallis Perućica, Sjekirica supra Andrijevica (Ro); in montibus  
Pivljan et Kom Vasojevički (Ja), ad Pišće distr. Piva (De, Si).

— f. *parviflorum* KNAF. — Cum typo in Sjekirica pla-  
nina (Ro).

— f. *roseum* MURR. — Ad Nedajno distr. Piva (De, Si).

— var. *eglandulosum* ČELAK. (= var. *alpestre* SCHUR). —  
Pavlova livada (Ho), Ledenica planina, Vališnica in monte  
Durmitor (Ro), Volujačko jezero (Ma).

1740. ? *G. pratense* L. — In pratis vallis Viruša dol infra Crna planina, Kom, Sinjavina planina et Mali Durmitor (Pt). Vero similiter ad aliam (an 1743?) speciem pertinet.

\*1742. *G. rotundifolium* L. — In herbidis et dumetis regionis infer. et mediae. — Ad Rijeka (Pt), Treblješ luka (Ho), ad Ulcinj, Bar, Podgorica, Šavniki, Goraňsko, in monte Žoljevica prope Andrijevica (Ro), in monte Troica supra Vir (Eb).

1743. *G. coeruleatum* SCHUR. — „Proxime affine *G. silvatico*, sed differt: statura minore spitamam non excedente, foliis minoribus tenuibus dissectis, caule paucifloro, absentia glandularum in pedunculis ac calyce, valvulis apice rugosis a duobus nervis transversis, nervo superiore ad medium furcato, inferiore breviore, simplici interdum obsolescente“ (PANČIĆ sub *G. oreades*). — In gramin. subalp. et alp. regionis subalp. et alp. — Durmitor jugo Šljeme et in monte Kom supra Rogam (Pč, Ba), in herb. montis Vila distr. Kuči (Ba), in montibus Pivljan, Kom (Ja), Sjekirica planina; Kom Vasojevički (Ro, Sk); in monte Durmitor locis pluribus: Savin Kuk, Ledena pećina, supra lacum Crno jezero et Lokva; Krivi do distr. Piva (De, Si).

1745. *G. nodosum* L. — Ab affini *G. palustre* dignoscitur caule fere glabro, foliis profunde 3—5lobis segmentis ovatis acutis, pedunculis fructiferis erectis, sepalis lanceolatis, petalis lilacinis, mericarpiis puberulis. — In irriguis ad latera silvarum vallis Tara (Pč, Ro), sub monte Durmitor; Sinjavina planina supra Vratlo (Ba).

1746. *G. columbinum* L. — In graminosis et dumetis regionis inferioris et mediae in tota dizione frequens.

1748. *G. macrothizum* L. subsp. *eumacrothizum* HAY. — In rupestribus et dumetis regionis subalp. — Vjetnik prope Jablan (Pt), Viruša dol sub Crna planina (Pt), Javorje planina in valle fl. Morača (Pč), Mokre sub monte Dziebeze et in monte Hum Orahovski (Sz), Lukavica planina (Ho), Kučka planina; Varda supra coenob. Piva; Božići supra Andrijevica; Korita rovačka 1700 m, Šavniki sub Ivica planina (Ro), Mala Rijeka prope Nožica; Han Garančić in valle fl. Tara (Ja), sub monte Žijovo distr. Kuči; in monte Lisa et Gradište supra Kolašin; nahija Katunska (Ba), Volujačko jezero (Ma), Krivi do supra Aftovac distr. Piva (De, Si).

\*——— f. *perrugosum* ROHL. IX. Beitr. 1933 pag. 7. —

Mericarpia per totam longitudinem transverse rugosa (rugis 6–7 praedita). — Ad latera montis Lovćen; ad Vršanj et Presjeka prope Njeguši (Pej, Ro).

— subsp. *microrhizum* FREYN. — In rupestr. regionis infer. et subalp. — Trijepši et sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Ba), Bioče in valle fl. Morača dicionis mediterr. (Ro).

1749. *G. lucidum* L. — In rupestr. et dumetis regionis infer. et subalp. frequens. — Circa Njeguši (Sz, Ro), Lovćen (Ho, Ro), Trijepši distr. Kuči (Ba), circa Bar, Ulcinj, Rijeka, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Viljuša, Andrijevica, coenob. Piva; Ljut et Varda sub Ledenica planina distr. Piva; in montibus Vojnik, Balj, Jerinja glava etc. (Ro).

1750. *G. purpureum* VILL. — Ab affini *G. Robertianum* dignoscitur foliis glaucescentibus crassiusculis laciniis ovatis, pedunculis crassiusculis, petalis calyce parum longioribus sensim in unguem attenuatis dilute purpureis, valvulis dense et tenuiter transverse rugosis. — In rupestr. regionis infer. mediterr. et mediae calid. — Lastva čevska, Ostrog (Pč), Medun prope Podgorica (Sz), Rudine nikšićke, Podgorica, Pošćensko jezero supra Šavnići (Ro), Cetinje (Kn).

1751. *G. Robertianum* L. — In silvis et rupestr. in tota dictione frequens. — Orlova skala sub monte Kom (Pt), Cetinje (Pč), Mokre sub monte Dziebeze (Sz), Kom Vasojevički (Ho), Njeguši (Ba, Pej), ad Rijeka, Vir, Bar, Ulcinj, Podgorica, Danilovgrad, Viljuša, Šavnići, Velestovo, coenob. Piva (Ro), circa Andrijevica (Ro, Ja), ad coenob. Morača, in valle fl. Tara, in monte Pivljan (Ja), Crvena Stijena sub monte Durmitor (Ba), in monte Kosa supra Bar (Do).

### *Erodium* L'HÉR.

\*1753. *E. botrys* (CAV.) BERTOL. — „Folia inferiora longe petiolata cordato-oblonga obtuse sinuato-lobata vel crenata, reliqua subsessilia ovato-lanceolata pinnatisecta laciniis inciso-serratis; pedunculi pauci-(1–3)flori; petala violacea calyce dimidio longiora; mericarpia dense hispida tenuiter punctata, apice utrimque foveola et infra hanc plicis 3 transversis praedita; rostrum 10–11 cm longum.“ — Ad litora maris prope Ulcinj (Ba).

1759. *E. malacoides* (L.) WILLD. var. *malvaceum* (JORD.). GRAEBN. — Folia basalia cordato-ovata lobata,

lobis sese tegentibus. — In incultis regionis infer. mediterr.  
— Ad Bar et Ulcinj (Ro).

\*1760. *E. moschatum* (L.) L'HÉR. — Ad litora maris  
prope Ulcinj (Ba).

1761. *E. cicutatum* (L.) L'HÉR. — In arenosis, lapi-  
dosis, incultis, ad vias regionis infer. et mediae in tota dictione  
frequens.

— f. *triviale* TR. subf. *leucanthum* BECK. — Cum typo ad  
Podgorica (Ro).

1762. *E. ciconium* (JUSL.) WILLD. — A praecedente  
dignoscitur petalis calyce aequilongis purpureis, calyce fructi-  
fero cca 10 mm longo, rostro usque ad 8 cm longo. — In  
cultis regionis infer. mediterr. ad Rijeka (Pt).

### Balsaminaceae

*Impatiens* L.

1768. *I. nolitangere* L. — In silvis udis, ad ripas re-  
gionis subalpiniae. — In valle fl. Tara (Pt, Ro, Ja), Nižin luk  
prope Kolašin (Pt), sub monte Javorje (Pč), in valle fl. Peru-  
čica sub monte Kom (Ba, Ro), circa Andrijevica (Ro), sub  
monte Kljuć prope Andrijevica (Ba).

### Zygophyllaceae

*Tribulus* L.

\*1773. *T. terrestris* L. — In arenosis et lapidosis regio-  
nis infer. — Lješko polje et Medun prope Podgorica (Ba).

### Rutaceae

*Ruta* L.

1775. *R. graveolens* L. var. *divaricata* (TEN.) WILLK.  
— In rupestr. regionis infer. mediterr. et mediae calidioris. —  
Ad Čevo et Grahovo (Pč), in montibus Kosa, Lonac, Rumija  
supra Bar (Do), in montibus Lisinj et Medžurečka planina  
prope Bar (Ba), circa Njeguši et ad latera montis Lovćen (Kš,  
Pej, Ro), ad Viljuša, Zagarač, Kokoti, Rijeka, Drušići, in  
monte Tvrđak distr. Katunska; inter Bogetiči et Nikšić (Ro,  
Ba), Brčeli prope Vir (Eb).

— — f. *latisecta* ROHL. V. Beitr. p. 24. — Foliis multo maioribus, lacinis latiusculis usque 6 cm longis et 12 mm latis late oblongis apice plus obtusis discoloribus subtus insigniter glauco-caesiis. — In dumetis ad Drušići prope Rijeka in regione inferiori (Ro).

1777. *R. chalepensis* L. var. *bracteosa* DC. — A precedente dignoscitur petalis longe fimbriatis, foliis brevius pedicellatis, bracteis anguste linearibus pinnatilobis, capsulae lobis acuminatis. — In fruticosis et rupestr. regionis infer. mediterr. — Ad Ulcinj (Ro), Drušići prope Rijeka (Ba), Limljani prope Vir (Eb).

*Haplophyllum* JUSS.

1780. *H. patavinum* (L.) BOISS. — In dumetis et lapidosis dicionis calidioris. — Rudine nikšićke raro (Ro).

*Dictamnus* L.

1786. *D. albus* L. — In dumetis, rupestribus, ad margines silvarum regionis infer. et mediae calidioris. — Sub monte Lovčen et ad Ostrog (Pč), collis Volovica prope Bar, Drušići prope Rijeka, in monte Tvrđak distr. Katunska, circa Viljuša (Ro), in monte Lisinj prope Bar; Nikšić (Ba).

— — var. *macedonicus* BORB. — Floribus multo minoribus, sepalis latioribus obtusis subglabris sparsius nigro-punctatis; stylus fere eglandulosus. — Ad coenob. Dajbaba prope Podgorica (Ro).

**Polygalaceae**

*Polygala* L.

1790. *P. supina* SCHREB. var. *bosniaca* (MURB.) HAY. — In rupestr. regionis subalpinae. — Vunsaj prope Gusinje sub monte Prokletija (Df).

1794. *P. major* JACQ. — In pratis subalp. et alp. in tota dizione septentr. et orient. — E monte Lovčen adhuc non vidi. — — subf. *azurea* PANT. Adnot. p. 119. — Flores coeruleo-violacei. — Non raro cum typo.

1797. *P. nicaeensis* RISSO subsp. *mediterranea* CHOD. var. *Kerneri* BORB. — A *P. comosa* dignoscitur caule elatiore, foliis infer. obovatis, floribus maioribus intense roseis

mox decolorantibus alis 8—9 mm longis basi subito contractis, venis evidenter anastomosantibus, capsula obcordata. — In herbidis regionis infer. mediterr. — Circa Podgorica, Bar, Ulcinj (Ro).

— f. *flaviflora* ROHL. IV. Beitr. 28 sub *P. comosa* SCHK. f. *flaviflora*. — Alae angustiores basin versus sensim attenuatae, flores flavescentes. — Ad latera montis Lovćen versus Njeguši; Mosori prope Podgorica (Ro).

1798. *P. comosa* SCHK. — In pratis regionis infer. et subalp. — Sub monte Kom (Pt); ad Cetinje et sub monte Sutorman (Pč); circa Andrijevica (Ro); sub monte Lisa prope Andrijevica (Ba).

1799. *P. vulgaris* L. subsp. *euvulgaris* SYME. — In graminosis regionis infer. et subalp. — Ad Danilovgrad (Pt), inter Njeguši et Cetinje (Ld), Vrh suta, Bijela Skala, Medžuš rečka planina supra Bar; Planinica distr. Kuči (Ba), Ranisava sub monte Durmitor, Vojnik, Borkovići distr. Piva, Varda sub Ledenica planina; circa Andrijevica (Ro), Kralje, Rudo brdo, mons Pivljan et in valle fl. Tara (Ja).

\* — subsp. *Tempskiana* DEG. et DOERFL. (= var. *oxyptera* K. MALÝ, JANCH. non RCHB.). — In alp. Crna gora prope Vermoš ad fines Albaniæ (Df), in pinguibus Mokre sub monte Dziebeze? (Sz ex loco), Han Garančić in valle fl. Tara (Ja).

1801. *P. alpestris* RCHB. — In pascuis et glareosis regionis alpinae. — In monte Kom (Pt, Ba), in monte Durmitor (Pč, Ba); verosimiliter ad subsp. *croaticam* pertinet.

— subsp. *croatica* (CHOD.) HAY. — „Folia inferiora spathulata vel elliptica pauca, superiora lanceolata; alae 3nerviae venis parum anastomosantibus capsula triente longiores et parum latiores.“ — In herbidis et pascuis regionis alp. et subalp. — In montibus Vila, Planinica, Hum Orahovski, Kom Kučki (Sz, Ba); sub monte Lovćen (Ho); in montibus Vojnik, Maglić Pivski, Ledenica planina, Zeletin, Sinjavina (montes Gradište et Jablan); etiam in valle Perućica sub monte Kom (Ro sub *P. alpestris*); Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

1804. *P. monspeliac a* L. — Dignoscitur radice annua. — In lapidosis et dumosis regionis infer. mediterr. — Circa Bar (Ba, Ro).

## Anacardiaceae

### Pistazia L.

1806. *P. terebinthus* L. — In dumetis regionis infer. mediterr. — Ad coenob. Ostrog et ad Šavica distr. Komani; Rijeka (Ho); inter Cetinje et Rijeka (Kš); circa Ulcinj, Bar, Podgorica (Ro); Bioče et coenob. Morača in valle fl. Morača; in monte Vjetnik usque ad pagum Klopot (Ja); Vrojca distr. Kući (Ba); insula Vranina (Eb).

1807. *P. lentiscus* L. — A praecedente dignoscitur foliis coriaceis non deciduis paripinnatis foliolis ovato-lanceolatis petiolo alato. — In fruticetis sempervirentibus ad Ulcinj (Ro), insula Vranina (Eb).

### Cotinus ADANS.

1808. *C. coggygria* SCOP. — In dumetosis et ad margines silvarum regionis infer. et mediae calidioris. — Lukovo prope Nikšić (Pt), Cetinje, Grahovo, Sutorman (Pč), Rijeka (Ba, Ho), Dujevo prope Vir (Ho), circa Šavnik, Borkovići, Sinjac sub coenob. Piva, Zagarać supra Danilovgrad, Njeguši, Lješanska nahija; in monte Vojnik usque ad 1600 m! Circa Andrijevica in saxosis calcareis sub monte Balj et ad Konjuhe (Ro), supra coenob. Morača usque ad Bistrica; ad latera merid. montis Pej prope Kolašin (Ja); ad Vunsaj prope Gusinje sub monte Prokletija (Df), Boljevići prope Vir (Do).

### Rhus L.

\*1809. *R. coriaria* L. f. *maritima* BALD. Malp. V:66. — Frutex 40—50 cm altus, foliis parvulis villosissimis, floribus in spicam densissime dispositis. — In rupestr. ad Ulcinj (Ba).

## Aceraceae

### Acer L.

1812. *A. tataricum* L. — Inter dumeta regionis infer. et mediae calid. — Ad Danilovgrad (Pt), Rudine nikšičke (Ro), supra coenob. Morača usque ad Bistrica (Ja).

\*— f. *torminaloides* PAX. — Foliis profundius acute lobatis iis Sorbi *torminalis* subsimilibus. — Cum typo ad Danilovgrad (Ro).

1813. *A. pseudoplatanus* L. — In silvis regionis subalp. — Sub montibus Kom et Mali Durmitor (Pt, Pč), in valle fl. Morača super. (Pč), ad latera montis Širokar et in valle Skroboča distr. Kuči (Sz), inter Bukovica et Tušina distr. Drobnjaci (Ba), in monte Balj (Ba, Ro), circa Andrijevica (Ro), ad latera montis Lovćen (Pej, Ro), in valle fl. Tarā prope Kolašin (Ja).

1814. *A. Heldreichii* ORPH. subsp. *eutheldreichii* (PAX) HAY. — In silvis regionis subalp. et alp. — In monte Durmitor (Pč, Ba), Margarita sub monte Kom Vasojevički (forma „foliis variegatis subtus glabrescentibus“ Ba); in montibus Ključ et Lisa supra Kolašin; Tušina prope Šavniki, Suhi vrh prope montem Kom (Ba).

— subsp. *Visianii* (NYM.) K. MALY. — Folia maiora (13–14 cm longa et lata) subtus vix glauca; samarae 4–5 cm longae horizontaliter patentes. — In silv. subalp. et alp. — Rupa Konjska sub monte Vila (Sz), Božur planina distr. Piva, ad latera montis Maglić Pivski; vallis Jelovica sub monte Bjelasica; Korita rovačka usque ad 1700 m (Ro), Biogradsko jezero ad Kolašin (Čer).

1815. *A. obtusatum* KIT. — In silvis regionis subalp. — In valle fl. Perućica sub monte Kom; Javorovi dol prope Cerovo (Pt), Čeklići loco Dobre Strane (Pč), supra coenob. Piva; Borkovići, Varda distr. Piva usque ad 1300 m (Ro); Andrijevica (Ba), Lovćen (To, Ad), Cetinjsko polje (Ba), Orani do, Ostrog (Ba).

1816. *A. hyrcanum* F. et M. — In silvis regionis subalp. — Šavniki, Zakamen supra coenob. Piva (Ro).

— f. *intermedium* (PANČ.) BORNM. — Sub monte Hum Orahovski (Sz).

— var. *paradoxum* BORNM. et SINT. — In silvis ad Viljuša (Ro).

1818. *A. monspessulanum* L. — In dumetis regionis infer. et mediae calidioris. — Planinica prope Ostrog (Pt), Cetinje, Ostrog (Pč), circa Njeguši (Gi, Ld), Viljuša, Rudine nikšićke; Sinjac prope coenob. Piva (Blau, Ro), Borkovići distr. Piva; inter Bogetići et Nikšić (Ro), circa Andrijevica (Ro, Ja), Vjeternik, Jablan, Lopate, mons Pej, coenob. Morača usque ad Bistrica (Ja).

— var. *illyricum* TSCH. — „Folia basi truncata vel rotunda vel subcordata lobis triangularibus acutis, lateralibus saepe horizontaliter patentibus; samarae inter se parallae 5—8 mm latae.“ — Cum typo supra Njeguši (Ro).

\*— var. *microphyllum* BOISS. — Folia minora 2—2,25 cm longa et 3—4 cm lata, lobis dentatis; samarae minores. — Cum typo inter Bogetići et Nikšić (Ro).

1821. *A. campestre* L. subsp. *eucampestre* HAY, var. *leiocarpum* (OP.) WALLR. — In dumetis regionis infer. et mediae calidioris in tota dicione.

— f. *glabratum* WIMM. GRAB. — Cum typo ad Podgorica et Danilovgrad (Ro).

— f. *suberosum* DUM. — Cum typo ad coenob. Piva et Danilovgrad (Ro).

— f. *collinum* WALLR. — Frequens.

1822. *A. platanooides* L. — In silvis regionis mediae. — Ivica planina supra Šavnik, Javorje planina, circa Kolašin (Pč), in valle fl. Piva prope coenobium (Ro), Sinjavina planina supra Vratlo (Ba).

## Aquifoliaceae

### Ilex L.

1824. *I. aquifolium* L. — In silvis regionis mediae raro. — Ad Šekular prope Andrijevica (Ro), Velje osoje et Ivanov laz ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

— f. *heterophylla* AIT. — Folia media et superiora integra. — Cum typo ad Šekular prope Andrijevica (Ro).

## Celastraceae

### Evonymus L.

1825. *E. verrucosa* SCOP. — In silvis et dumetis regionis mediae. — Supra coenob. Morača (Pč, Ba), circa Njeguši (Kš, Pej), in monte Lovćen, circa Šavnik et Andrijevica (Ro), Mala Rijeka prope Nožica (Ja), ad Kolašin (Ba).

— f. *laevifolia* BECK. — Folia subtus glabra. — Cum typo ad Njeguši (Ro sub var. „*latifolia*“).

1826. *E. vulgaris* MILL. — In fruticetis et silvis regionis infer. et mediae. — In valle fl. Morača (Pč), Sindžon

et Lukovo (Pt), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Njeguši, Šavniki (Ro), ad Kolašin (Ja).

— — f. *scaberula* BECK. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

\* — — f. *diversifolia* ROHL. f. n. — Folia dissimilia sunt; alia utrimque attenuata ut in typo, alia apice obtusa vel subretusa. — Ad Njeguši loco Ljut (Pej, Ro).

— — var. *bulgarica* VELEN. Fl. bulg. 116, 1891. — „Folia maiora 5—6 cm longa et 3—3 $\frac{1}{2}$  cm lata, subtus ad nervos scabridula, tenuiter acuminata, margine cartilagineo-serrata; inflorescentiae abbreviatae, folio breviores.“ Capsulae (maturae) basi aut rotundatae (= f. *rotundata* m.), aut ad basin attenuatae et apice profundius (fere ad dimidium) emarginatae (= f. *attenuata* ROHL. VIII. Beitr. p. 14.). — Šavniki sub Ivica planina, cca 900 m; in monte Šarišnik prope Goraško distr. Piva; in monte Žoljevica prope Andrijevica (Ro).

\*1827. *E. latifolia* (L.) MILL. — Flores pentameri, capsula quinque-alata, folia usque ad 10 cm longa. — In silva supra Bar (Ho).

## *Staphyleaceae*

*Staphylea* L.

1829. *S. pinnata* L. — In silvis regionis mediae calidioris. — Ad latera montis Lovćen; nahija katunska loco Pišine Strane (Pč).

## *Rhamnaceae*

*Rhamnus* L.

1831. *R. cathartica* L. — In silvis regionis mediae calidioris. — Cetinje et in monte Jastrebica (Pč), ad coenob. Piva, Šavniki, Pošćensko jezero, Borkovići et Božur planina distr. Piva; Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro), Krstac supra vallem rivi Piva (De, Si).

1832. *R. orbiculata* BORNM. — A praecedente differt: folia multo minora (1—3 cm longa) orbiculata rarius ovata vel elliptica, basi rotundata, margine glandulosocrenato-serrata petiolo subaequilonga; receptaculum convexum. — In fruticetis et saxosis regionis calidioris. — Ad latera montis Lovćen et

circa Njeguši (Kš, Pej, Ro); in collibus ad Podgorica regionis mediterr. (Ro); Pristan prope Bar (B).

— — f. *elliptica* BORNM. — Sutorman supra Bar (Do).

1835. *R. saxatilis* JACQ. — „Fruticulus humilis prostratus ramosissimus, ramis tortuosis spinescentibus; folia parva (1—3 cm) obovata vel cuneato-obovato-lanceolata crenato-serata acuta glabra inferiora opposita, petiolo stipulis subaequis longo; drupa nigra, sulcus pyrenae apertus.“ — In saxosis regionis subalpinae et alpinae. — Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz), Korita rovačka cca 1700 m, Dobri do in monte Durmitor, in montibus Vojnik, Ranisava (Ro), Medun distr. Kuči; Konjuhe prope Andrijevica (Ba).

1836. *R. intermedia* STEUD. et HOCHST. — A praecedente dignoscitur: folia suborbiculata, receptaculum planum, dentes calycini patuli. — In fruticetis et rupestr. regionis mediterr. — Ad Cetinje (Ba); Sutorman et Lisinj supra Bar; Kunja et Pećurica inter Bar et Ulcinj; Nikšić (Ba).

1840. *R. fallax* BOISS. — In rupestribus et fruticetis regionis subalp. et alpinae in tota dizione septentr. et orient. frequens. — Etiam in monte Lovćen ad Njeguši, Cetinje, Lastva čevska etc.

— — var. *montenegrina* (BALD.) HAY. — Differt a typo caulibus pumilis 8—10 cm altis, foliis 2—4 cm longis, 1—2 cm latis, nervaturis ad nervum medium utrimque 5—8. — In rupestribus alp. montis Vila distr. Kuči (Ba).

1844. *R. rupestris* SCOP. — In dumetosis et rupestr. regionis infer. et subalp. — Ad Cetinje et Ostrog (Pč), in monte Lovćen (Ad), circa Bar (Ba), ad coenob. Morača (Ba, Ja), inter Bioče et Podgorica (Ba, Ro), Sutorman supra Bar (Ba), inter Cetinje et Rijeka (Kš), Mratinje sub monte Maglić Pivski; Rudine nikšičke; in montibus Balj, Jerinja glava supra Andrijevica, Godinje prope Vir, Lovćen, Njeguši (Ro), circa Košašin (Ja), Vrojca distr. Kuči; Nikšić (Ba), Čekanje prope Cetinje (Gi).

— — f. *maior* (BECK) HAY. — Cum typo ad Njeguši (Ro), ad Krstac distr. Piva (De, Si).

1845. *R. frangula* L. — In fruticetis regionis subalp. ad Murino distr. Vasojevići (Ba), ad Andrijevica (Ro).

— — f. *subrotunda* ROUY. — Folia late ovalia vel suborbicularia apice rotundata. — Cum typo ad Andrijevica (Ro).

\*1846. *R. alaternus* L. — In dumetis regionis infer. medit. in Crmnicka nahija (Eb).

### *Zizyphus* JUSS.

1847. *Z. jujuba* MILL. — Donja Zeta prope Podgorica dicionis mediterr. (Ro).

### *Paliurus* JUSS.

1849. *P. spinæ-Christi* MILL. — In fruticetis et rupest. totae dicionis mediterr. et mediae calidioris frequens. — Ad Rijeka et Sindžon (Pt, Ho, Ro), Rogani, Duga, Povia, Bojetići, Cerovo (Pt), Sinjak, Danilovgrad (Pč), Medun (Sz, Ho), Rudine nikšićke, Nikšić, Bar, Boljevići; Vir, Spuž, Podgorica (Ro), nahija Katunska et Lješanska (Ro), in valle fl. Morača (Ja).

— — f. *macrocarpus* BECK. — Inter Rijeka et Lipovik (Ro).

## *Vitaceæ*

### *Vitis* L.

1850. *V. silvestris* GMEL. — In dumetis regionis mediterr.; etiam ad coenob. Piva (Ro).

1851. *V. vinifera* L. — In regione mediterr. et mediae calid. culta et non raro subspontanea.

## *Crassulaceæ*

### *Sempervivum* L.

\*1854. *S. glaucum* TEN. (= *S. Schlehani* ROHL. olim. p. p. non SCHOTT.). — In rupestr. supra Njeguši (Golica, Bogojeva glava) et in monte Lovćen; in montibus Durmitor et Maglić Pivski (Ro).

1855. *S. Schlehanii* SCHOTT. — Petala 12—18 stellatim expansa sordide rosea lanceolata stria media purpurea notata glandulosociliata sepalis ad  $\frac{1}{3}$  coalitis lanceolatis duplo longiora; foliis in lamina dense eglandulosopubescentibus, ad marginem rigide setosociliatis. — In rupestribus regionis subalp. et alp. — In monte Maglić Pivski (B).

\*1855b. *S. Košaninii* PRAEGER. — Ab affini et simili *S. Schlehanii* SCHOTT dignoscitur praeter notas alias praesertim foliis in lamina utrimque breviter dense glandulosopubescentibus. — In rupestribus regionis subalpinae et alpinae in montibus Sjekirica, Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

1862. *S. Heuffelii* SCHOTT (= *S. patens* GRIS. et SCHENK). — Petala 6 ± conniventia ochroleuca ciliata apice tridentato-expansa. — In rupestr. alp. et subalp. — In montibus Kom, Durmitor (Pt, Pč, Ba, Ho), Sinjavina planina (Ba). An ad var. sequentem pertinet?

— var. *glabrum* BECK et SZYSZ. (= *S. patens* var. *glabrum* ROHL.). — Inflorescentia glabra, folia glaberrima tantum margine ciliata. — In rupestr. regionis subalp. et alp. — Supra pagum Orahovo, Rupa Konjska sub monte Vila, montes Dzibezze et Hum Orahovski distr. Kuči (Sz), Goraňsko distr. Piva, Maglić Pivski, Konjsk planina, Sjekirica planina, mons Balj supra Andrijevica (Ro); in calcar. prope Kolašin; in montibus Pej et Pivljan (Ja).

\*— var. *semiglabrum* BOŠNJAK in Glasnik Zagreb 1938, pag. 23. — Folia tantum ciliata; caulis etiam superne glaber. — In alp. montis Prokletija (Boš).

### *Sedum* L.

1865. *S. maximum* (L.) SUT. — In lapidosis regionis infer. et subalp. — Orlova Skala sub monte Kom (Pt), Sutor man supra Bar (Pč), ad Plavnica et Andrijevica, sub monte Balj prope Andrijevica, ad Viljuša, Šavnik, coenob. Piva (Ro), Sinjavina planina (Ba).

1867. *S. magellense* TEN. — Perenne, laxe caespitosum; caulis tenuis, adscendens basi ramosus; folia plana glabra inferiora obovato-spathulata, superiora lanceolata integerrima; flores laxiuscule racemosi, petala 5—6 alba rubello-suffusa calyce 3plo longiora; stamina 10—12. — In rupestr. et glareosis subalp. et alp. — Crna planina distr. Kuči (Pt), in montibus Kom (Pt, Sz, Ro, Ja), Javorje planina (Sz), Ledenica planina, Maglić Pivski; etiam in valle fl. Piva sub Mratinje; Durmitor; Brađavac supra vallem Perućica (Ro), Sinjavina planina; Crvena Stijena et Dobri do in monte Durmitor; in monte Vojnik (Ba, Ro), in monte Orijen (Ad); Volujačko jezero (Ma), in monte Lovćen (Brandis), supra lacum Crno jezero (De, Si).

— f. *macrostylum* HAL. et BALD. Malp. V: 69. — Caulis pauciramosus; folia surculorum spathulata saepe opposita; cappa petalis longiora. — Savin Kuk in monte Durmitor cca 2200 m; Kom, Stožac, Lola planina (Ba); Rikavac et Kostića distr. Kuči; Vodni do prope Lukavica planina (Ba).

1868. *S. cepaea* L. — In silvis et fruticetis lapidosis regionis infer. et mediae. — Ad Rijeka (Pt), Buan in valle fl. Tušina prope Šavniki (Pč), Bar (Ho), Andrijevica (Ro, Ja), in montibus Balj et Žoljevica prope Andrijevica (Ro), Drušići prope Rijeka (Ro), in monte Vjetnik distr. Bratonožići, coenob. Morača, vallis Bistrica prope Kolašin (Ja), in monte Rumija supra Bar cca 1450 m (Do).

1872. *S. dasyphyllum* L. — Ab affini *S. albo* dignoscitur indumento glandulosopuberulo, foliis obovatis, inflorescētia pauciflora, petalis obtusiusculis. — Ad rupes et muros e regione infer. usque ad regionem alpinam. — Ostrog, Javorje planina (Pč), in montibus Dziebeze, Velki Maglić et in valle Skrobotuša distr. Kuči (Sz), circa Andrijevica (Ro, Ja), Sjekirica planina, montes Štit et Žoljevica distr. Vasojevići, coenob. Piva, Črtov do sub Ledenica planina, Jasenovo polje sub monte Vojnik, Bijela Voda distr. Kuči, circa Podgorica et Šavniki; Žabljak sub monte Durmitor (Ro), Bioče prope Podgorica, Lopate sub monte Vjetnik; Kolašin et coenob. Piva (Ja).

1873. *S. album* L. — In saxosis et muris regionis mediae et alpine. — Crvena Stijena sub monte Durmitor (Pč), in valle Skrobotuša (Sz), Kom Kučki (Ho), in valle fl. Piva sub Goraňsko, Črtov do sub Ledenica planina cca 1500 m, Jerinja glava supra Andrijevica (Ro), in monte Živoje distr. Kuči (Ba), coenob. Morača, Han Garančić et Kolašin in valle fl. Tara (Ja), ad Andrijevica in collibus calc. (Ro, Ja), Rogam sub monte Kom; Jablan vrh supra Kolašin (Ba), Brčeli et Limljani prope Vir; insula Lesandra (Eb).

— subsp. *athoum* DC. (= var. *brevifolium* BOISS.). — In monte Vojnik, ad Šavniki (Ro).

— subsp. *micranthum* (BAST.) HEGI. — A cl. HAYEK e Montenegro indicatum; locus mihi ignotus.

1877. *S. acre* L. — In lapidosis, saxosis, ad muros. — In monte Kom Vasojevići (Ba), Jerinja glava, Sjekirica planina, circa Andrijevica distr. Vasojevići (Ro), Bioče in valle fl.

Morača, in montibus Pivljan, Han Garančić; Kolašin in valle fl. Tara (Ja).

— var. *neglectum* (TEN.) VIS. Fl. dalm. — Cetinje, Lovćen (Kš, Ro).

\* — subsp. *Rohlena e* DOM. Bull. intern. de l'Acad. des scienc. de Bohême 1929 (= *S. acre* var. *neglectum* ROHL. p. p.). — Caulibus floriferis strictis elatioribus, foliis a basi caulis ad inflorescentiam densissime imbricatis et caulem totum occultantibus, erectis, oblongis vel ovato-oblongis in sicco latitudine saltem duplo usque triplo longioribus et manifeste albicantibus cymae ramis (plerumque tantum duobus) stricte erectis..... (DOMIN l. c.). — Ad Njeguši (Ro), in monte Lovćen (Sk).

1880. *S. boloniense* LOIS. — In lapidosis et arenosis regionis infer. et subalp. — In monte Lovćen (Pč, Kš, Ro, Ad), Njeguši (Sz, Ro), Šavnik, mons Ranisava, Vojnik, coenob. Piva, Viljuša (Ro), circa Andrijevica (Ro, Ja), coenob. Morača, Han Garančić, Matoševo, Kolašin in valle fl. Tara (Ja), in monte Žijovo distr. Kuči; Sinjavina planina (Ba), in monte Orjen (Ad); Limljani prope Vir; Rumija et Sutorman supra Bar (Do).

— var. *montenegrinum* HORAK. — Gracilior; foliis longe tenuiter linearibus, ramis cymae erectis, sepalis sensim anguste attenuatis, petalis aureis tenuiter linearibus longe sensimque subulato-attenuatis, carpellis sensim elongato-angustatis, stylis sub flore petala attingentibus. — Cum typo.

1881. *S. Horákii* ROHL. (= *S. alpestre* var. *Horákii* ROHL. IV. Beitr. p. 50 et Acta botan. boh. 1923 p. 17; conf. JANCHEN. Oe. B. Z. 1919). — Ab affini *S. alpestre* dignoscitur sepalis angustioribus oblongo-lanceolatis saepe rubro-suffusis, petalis acutis mucronatis mucrone recurvo sepala vix superantibus rubello suffusis. — In pascuis alpinis. — In monte Zeletin supra Andrijevica (Ro), in monte Kom Kučki et in monte Pivljan cca 1950 m (Ja).

1882. *S. alpestre* VILL. — In alp. montibus Kom (Pt), Sinjavina planina (Ba). An ad spec. praecedentem pertinet?

1884. *S. ochroleucum* CHAIX. — In rupestr. e regione infer. usque ad alp. — Orlova Skala sub monte Kom (Pt), ad coenobium Ostrog (Pč), ad latera montis Lovćen (Pč, Ad, Kš, Pej, Ro), in montibus Dziebeze et Hum Orahovski distr. Kuči (Sz), ad Viljuša, Šavnik, Cetinje, in Ledenica pla-

nina (Ro), Brotnik (Ho), circa Andrijevica (Ro, Ja), in valle fl. Tara inter Han Garančić et Kolašin (Ja), ad Podgorica et Rijeka; Štirni do prope Lukavica planina; Durmitor (Ro), ad Nikšić (Ba), Kostića distr. Kuči (Ba), in montibus Jastrebica et Orjen (Ad), Volujačko jezero (Ma), Rumija et Sutorman supra Bar (Do).

— f. *candidum* ROHL. V. Beitr. p. 42. — Petalis (praeter carinam viridem) candidis (nec ochroleucis). — Cum typo in monte Durmitor et ad coenob. Piva (Ro).

\*1888. L. *S. Grisebachii* HELDR. (= *S. racemiferum* HAL.). — Ab affini *S. annuo* dignoscitur floribus conspicue pedunculatis, petalis aristato-acuminatis calyce triplo longioribus stamina multo superantibus. — In monte Lovćen (Ad). Non vidi.

1890. *S. litorium* GUSS. (Conf. ROHLENA III. Beitr. p. 31). — Annuum, caule subsolitario simplici vel parum ramoso glabro erecto 6—10 cm alto crassiusculo, foliis infimis semiteretibus oblongo-spathulatis oppositis ceteris cylindricis alternantibus usque 1 cm longis obtusis, floribus solitariis rarius binis subsessilibus, pedunculis incrassatis, cyma 6—15 flora ramis demum recurvis flores unilaterales gerentibus, sepalis obtusis, petalis lanceolatis acutis ochroleucis calyce parum longioribus apice breviter mucronatis mucrone saepissime recurvo, staminibus 10 (raro 5) petalis parum brevioribus, carpellis divaricatis obtusculis mucronatis calyce parum longioribus. — In rupestribus et in muris dicionis infer. mediterr. ad Bar et Ulcinj (Ro).

1892. *S. atratum* L. — Annuum, glabrum, folia clavato-cylindrica, basi rotundata sessilia ± rubro suffusa; inflorescentia densa, flores pedunculati, petala virescentia-alba acuminata sepalis ovato-triangularibus acutis sublongiora. — In rupestr. regionis alpinae. — In montibus Kom, Durmitor (Pt, Pč, Ro), Hum Orahovski, Mali Maglić distr. Kuči (Sz), Maglić Pivski, Leđenica, Sjekirica, Štit supra Andrijevica; Bijela Voda sub monte Kom; Javorje planina, Štirni do prope Lukavica planina (Ro), Vermoš planina ad fines Albaniæ (Df), Rikavac distr. Kuči (Ba), Čirova pećina et Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

1895. *S. glaucum* W. K. (= *S. hispanicum* aut.). — In saxosis et lapidosis e regione infer. usque ad alp. in tota dictione frequens. — Ad Kralje prope Andrijevica legit JANCHEN

formam floribus pentameris ut in var. *pallido*, sed ceteris characteribus cum typo congruentem.

— f. *glabrum* BECK. — Tota planta glaberrima. — Ad Podgorica (Ro).

— var. *Buxbaumii* (GRIS.) HAY. — Tota planta glandulosopubescent. — In montibus Vojnik et Javorje planina (Pč).

\*— var. *pallidum* (M. B.) HAY. — Caulis glaber, inflorescentia glandulosopilosa; flores pentameri. — Ad litora prope Ulcinj (Ro), conf. JANCHEN Oe. B. Z. 1919: 30.

1897. *S. tuberum* (L.) THELL. — Annum, glabrum; folia obovata crassa; inflorescentia 2—3fida pauciflora, flores 5andri sessiles; petala lanceolata alba sepalis lanceolatis duplo longiora. — In lapidosis et arenosis regionis infer. mediterr. ad Podgorica (Ro).

### Cotyledon L.

1902. *C. horizontalis* GUSS. — Bracteae anguste linearres pedicellis subdupo longiores. — Ad muros oppidi Bar (Do, Ro).

1904. *C. pendulinus* (DC.) BATT. — Ad rupes et muros regionis infer. mediterr. — Ad Boljevići et Limljani (Pč), Cetinje (Kn), circa Vir et Podgorica (Ro), Bioče (Ja).

— var. *Velenovskýi* ROHL. I. Beitr. p. 21; VI. Beitr. p. 22. — Dignoscitur racemo denso, bracteis inferioribus foliosis, pendunculis multoties, superioribus spathulatis duplo longioribus. — Cum typo ad Bar et Ulcinj (Ro).

1907. *C. chloranthus* (HELDR. et SART.) HAL. — Corolla calyce ad summum duplo longior ad  $\frac{3}{4}$  fissa, bracteae noscitur caudiculis rosulatim foliatis, foliis basalibus integeris Kuk in monte Durmitor (De, Si).

### Saxifragaceae

#### Saxifraga L.

\*1911. *S. taygetea* BOISS. et HELDR. — Ab affini *S. rotundifolia* dignoscitur caulibus humilibus (5—25 cm), foliis parvis ad summum 25 mm latis saepe multo minoribus obtuse 5—9crenatis, caulinis paucis valde diminutis cuneato-trilobis, petalis elliptico-lanceolatis obtusis, sepalis oblongis obtusiusculis. — In rupestribus alp. Savina Voda in monte Durmitor

(Pt); in monte Gradište supra Kolašin, in montibus Dibala, Prouš, Maglić distr. Kuči (Ba).

1912. *S. rotundifolia* L. var. *vulgaris* ENGL. — In herbidis et fruticetis regionis infer. usque in alp. in tota dictione. — var. *hirsuta* STERNB. — Frequentior quam forma typica.

\*1913. *S. heucherifolia* GRIS. et SCHENK. — Ab affini *S. rotundifolia* differt caule inferne glabriusculo, foliorum limbo margine vix membranaceo, saepe in petiolum cuneatim attenuato, calycis lacinis ovatis obtusis; petalis latioribus obtusis. — In rupestribus alp. Crveno ždrijelo (Ho), Korita rovačka prope Lukavica planina (Ro).

1915. *S. bulbifera* L. — In graminosis regionis mediae. — Ad Cetinje (Pč), Krstac prope Njeguši (Ld), Jerinja glava supra Andrijevica cca 1500 m (Ro).

1916. *S. graeca* BOISS. et HELDR. — Ab affini *S. granulata* differt caule inferne numquam ramoso, inflorescentia subconferta, sepalis brevioribus ovatisque. — In graminosis ad Banjani — Crkvice (Pej, Ro).

1917. *S. granulata* L. — In herbidis ad Velki Mikulić sub monte Strenj distr. Primorje prope Bar (Ba), in monte Lovćen cca 1400—1600 m (Pej, Ro).

1920. *S. tridactylites* L. — In graminosis et rupestr. e regione infer. usque ad alp. — Ad Cetinje et sub monte Lovćen (Pč), Njeguši; Varda sub Ledenica planina distr. Piva; in monte Kom Kučki (2200 m), Sjekirica planina; Andrijevica; circa Bar, Vir, Podgorica, Lješanska nahija, Zagarać supra Danilovgrad (Ro); coenob. Morača (Ja), Ulcinj (Ro, Ba), Sutor man supra Bar (Do), ad Pišće distr. Piva (De, Si).

— f. *exilis* POLL. — Cum typo non raro.

1921. *S. adscendens* L. — In rupestribus alp. et subalp. — In montibus Kom, Durmitor, Sinjavina planina (Pt, Pč); Velki Maglić et Kunj distr. Kuči (Sz, Ba); Rogam sub monte Kom; in monte Gradište supra Kolašin (Ba). Verosimiliter loca hic enumerata partim (vel omnia?) ad subsp. sequentem referunt.

— subsp. *Blavii* (ENGL.) HAY. — A *S. adscendente* dig noscitur petalis maioribus patentibus obcordatis sepalis ter longioribus et latioribus, inflorescentia late pyramidalis ramis gra-

ciliis elongatis ascendentibus; filamentis sepalae aequantibus.  
— In graminosis et saxosis regionis alp. — Kučke planine: Žijovo, Planinica, Kostiča, Pešnjak, Maglić, Crna planina (Ba); Pavlova livada (Ho), Durmitor, Kom, Jerinja glava, Sjekirica planina, Zeletin, Velki Krš prope Andrijevica, Piperska Lukavica, Lovćen; Mokre distr. Kuči (Ro), Krivi do distr. Piva (De, Si), in montibus Pivljan supra Kolašin (Ja), Čafa Velja prope Rikavac (Df), Krivi do distr. Piva (De, Si).

— — — f. *minor* BECK. — Cum typo in monte Lovćen (Ro).

1925. *S. exarata* VILL. subsp. *Villarsii* (ENGL. et I.R.M.) HAY. — In pascuis et lapidosis alpinis. — In montibus Kom, Durmitor (Pt, Pč, Sz, Ba, Ro), Bjelastica planina supra Kolašin, Korita rovačka prope Lukavica planina (Ro).

— — subsp. *adenophora* (C. KOCH) HAY. — Dense glandulosopilosa, petala sepalis 2—3plo longiora. — In alp. Kom (Sz, Ba), Stožac (Ba), Savina Voda in monte Durmitor (Ba).

1926. *S. moschata* WULF. — In alpinis montium Kom, Durmitor (Pt, Pč, Ho, Ba, Ro), Planinica distr. Kuči (Ba).

— — f. *compacta* MERT. et KOCH. — Rikavac distr. Kuči; Durmitor, Carine sub monte Kom (Ba).

1927. *S. sedoides* L. subsp. *prenja* (BECK) HAY. — A typo differt petalis linearibus truncatis vel emarginatis, sepalis longioribus latitudinem subaequantibus, foliis basalibus apice saepe tridentatis. — In glareosis alp. montium Kom et Durmitor (Pč, Ba, Ro), in monte Maglić Pivski (Ro), in monte Prokletija supra Gusinje (Df).

1928. ? *S. Facchinii* KOCH. — A praecedente dignoscitur caudiculis rosulatim foliatis, foliis basalibus integerris mis, caule foliato, petalis parvis (1,5—2 mm) violaceis vel rubellis. — In rupestr. summo jugo Šljeme montis Durmitor 2300—2500 m et ad Rikavac distr. Kuči (Ba). Sec. cl. HAYEK dubia.

1930. *S. labella* BERTOL. — A *S. prenja* dignoscitur petalis orbiculari-obovatis albis (nec flavescentibus) calyce duplo longioribus, foliis basalibus carnulosis glabris recurvis oblongo-spathulatis obtusis, caulibus elatioribus (usque ad 10 cm) foliatis. — In glareosis alp. — In montibus Kom et Durmitor (Pč, Ba, Ro, De, Si); Kučke planine: Kostiča, Dibala, Strunga, Vila, Planinica (Ba), Gradište supra Kolašin (Ba), Maglić

Pivski (Ro) 1800—2500 m! In alp. montis Prokletija supra Gusinje (Df).

1933. *S. aizooides* L. — In glareosis regionis alp. — In montibus Kom (Pč, Ba, Ro), Pavlova livada (Ho), Groblje sub monte Maglić Kučki, Korita rovačka prope Lukavica planina, Maglić Pivski (Ro); Volujačko jezero (Hawelka fide MALÝ).

1934. *S. media* GOUAN subsp. *porophylla* (BERTOL.) HAY. — In saxosis alpinis. — In monte Kom (Pt, Sz, Pč); in summo jugo montium Žijovo et Dibala et per viam ad Kostiča distr. Kuči (Ba), in alp. montis Prokletija ad fines Albaniae (Df), mons Hum prope Cetinje (Ma), in monte Lovćen (Biasoletti, Pej, Ro); Tursko ždrijelo et Treblješ (Ho), Korita rovačka prope Lukavica planina; Velje Osoje supra Nješuši (Pej, Ro); in monte Pivljan supra Kolašin (Ja); in monte Lisinj supra Bar (Ba).

— f. *montenegrina* (HAL. et BALD.) HAY. — Folia rosularia apice valde dilatata 10—20 mm longa, 3—5,5 mm lata. — Cum typo raro.

1935. *S. sempervivum* C. KOCH. (= *S. Gouani c. crnagorica* TERR.). — A praecedente dignoscitur: folia rosularia linear-lanceolata (nec oblongo-lingulata) 1,5—2 mm lata acuminata subtus carinata (nec apice rotundata vel breviter cuspidata, subtus plana); petala dilute purpurea. — In rupestr. regionis alp. — In montibus Kom (Ba, Sz, Ro), Sjekirica planina supra Andrijevica (Ro), ad jugum Maglić prope Kostiča et in monte Žijovo distr. Kuči (Ba).

— f. *alpina* TERR. — Diminuta, racemo tenui. — In alp. Žijovo et Kostiča distr. Kuči cum typo (Ba).

1938. *S. caesia* L. — In rupestr. et glareosis regionis alp. in montibus Maglić Pivski et Bioče ad fines Hercegovinae (Ro). Occurrit saepissime in var. *glandulosissima* ENGL.

1939. *S. scardica* GRIS. — Ab affini *S. marginata* dignoscitur praesertim foliis valde carinatis acutis, punctis impressis 9—15, petalis calyce  $2\frac{1}{2}$ —3plo longioribus. — In rupestr. alp. montis Javorje et supra Buan vallis Tušina (Pč); Mala Ivica sub monte Durmitor; mons Kom; mons Gradište supra Kolašin; mons Lisa prope Andrijevica (Ba).

1940. *S. marginata* STERNB. var. *Rocheliana* (STERNB.) ENGL. et IRM. — In rupestr. alp. montis Maganik (Ho). An ne ad subsp. sequent. pertinet?

— var. *coriophylla* (GRIS.) ENGL. — Folia rosularia spatulata vel oblonga obtusa 4—6 mm longa, 0,8—1,5 mm lata non vel parum arcuatim cartilagineo-marginata punctis impressis 5—7; caulis ad 8 cm altus dense glandulosopilosus 3—9florus; petala alba calycis laciniis cuneato-ovatis duplo longiora. — In rupestr. regionis subalp. et alp. in omnibus fere montibus dicionis septentr. et orient. — Etiam in montibus Lisinj, Kosa, Rumija, Bijela Skala supra Bar (Ro, Do et alii).

— f. *tubescens* ROHL. in FEDDE Rep. III: 147. — Petala pallide rosea. — In alp. montis Jablan supra Kolašin cca 2100 m (Ro).

— f. *grandis* ROHL. V. Beitr. 43. — Petala duplo maiora ad 15 mm longa. — In alp. montis Zeletin supra Andrijevica (Ro).

— f. *Bubákii* ROHL. III. Beitr. 31. — Caule, foliis caulinis, paniculae ramulis calycibusque glaberrimis. — In alp. montis Durmitor loco Vališnica do cca 2200 m (Ro); Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

— f. *subuniflora* TERRAC. — In rupibus montis Velki Maglić distr. Kuči (Ba).

\*1941. *S. Spruner i* BOISS. — A praecedente dignoscitur praesertim foliis rosularum albo-glandulosopilosis. — In praeruptis montium Kom Kučki et Vasojevički 2400 m (Ba).

1944. *S. crustata* VEST. — Ab affini *S. aizoon* L. distinguuntur foliis rosularum integerrimis (nec crenatis vel dentatis) linearibus cca 1,5 cm longis et 2 mm latis. — In rupestr. calcareis alp. — In montibus Kom (Pč), Lovčen (Ba), Maganik (Ho), Dobri do in monte Durmitor; Vodni do prope Lukavica planina; Gradište et Jablan vrh supra Kolašin; Rikavac distr. Kuči (Ba).

1946. *S. aizoon* JACQ. — In rupestribus regionis alpinae et mediae in tota dictione frequens, praecipue in saxosis calcareis.

— var. *alpicola* (SCH. N. KY.) ENGL. IRM. — In valle fluminis Tara prope Lever Tara (De, Si).

— var. *brevifolia* ENGL. — Frequens.

— — — f. *moesiaca* VELEN. — In alp. montis Kom Kučki et in monte Maganik (Ho).

— — var. *Malyi* (SCH. N. KY.) ENGL. et IRM. — In alp. Vermoš ad fines Albaniae (Df), in monte Bijela Gora ad fines Hercegovinae (Ad), in monte Durmitor loco Savin Kuk (De, Si).

\*— — var. *recta* (LAP.) SER. — Frequens cum typo; saepe floribus non punctatis (= f. *candida* BECK Fl. N. Oe. 675).

1947. *S. opositifolia* L. var. *meridionalis* TERR. — A typo differt foliis maioribus 4,5—6 mm longis acuminatis apice punctis impressis 1—5. — In glareosis et ad nives regionis alp. raro. — In montibus Mali Durmitor (Pt), Durmitor jugo Šljeme (Pč, Ba), Durmitor loco Vališnica do (Ro), Kom Vasojevički supra Ljubanj (Ba); Žijovo et Rikavac distr. Kuči; mons Lisinj et Lonac supra Bar (Ba).

### *Chrysosplenium* L.

1949. *Ch. alternifolium* L. — In silvis irriguis ad rivum Bukovica sub monte Durmitor reg. subalp. (Pč), ad Vučji potok in Vermoš planina ad fines Albaniae (Df).

### *Parnassia* L.

1950. *P. palustris* L. — In spongiosis, pratis humidis regionis subalp. et alp. in tota dizione septentr. et occident. frequens. — E monte Lovćen et Rumija adhuc non vidi.

### *Ribes* L.

1951. *R. grossularia* L. — In silvis et fruticetis regionis mediae. — Viruša dol sub Crna planina; Perućica sub monte Kom (Pt); sub monte Balj prope Andrijevica; Varda supra coenob. Piva; Matošev in valle fl. Tara (Ro).

1952. *R. alpinum* L. — In silvis et rupestr. subalp. et alp. — Sinjavina planina (Pt), in monte Jastrebica (Pč), Skrobočica sub monte Vila, Čafa Mala, ad jugum Kariman supra Rikavac distr. Kuči (Ba), Njeguši (Ro, Gi), Ivanov laz in monte Lovćen, Vališnica do in monte Durmitor, Maglić Pivski, Zakamen supra coenob. Piva, Štirni do prope Lukavica planina (Ro), Volujačko jezero (Ma).

— var. *pallidigemmum* (SIMK.) HAY. (= *R. Fleischmanni* BORB.). — „Ramuli hornotini minute glandulosi et pubescentes; folia saepe 5-loba ± glandulosopilosa; gemmae saepe pallide virentes.“ — Rarius cum typo.

1955. *R. petraeum* WULF. — A praecedente dignoscitur racemis demum pendulis, floribus hermaphroditicis, bracteis pedicellis brevioribus, foliorum lobis argute biserratis, petalis rufescentibus, fructibus obscure rubris. — In frutic. subalp. et alpinis. — Sub monte Durmitor (Pč); Cetinje (Ba); in monte Rumija supra Bar (Ba); Ravno distr. Piva (Ma); supra lacum Lokva prope Žabljak, in monte Durmitor loco Ledena pećina (De, Si).

### Rosaceae

#### *Spiraea* L.

1962. *S. media* SCHMIDT var. *mollis* C. KOCH et BOUCHÉ (SCHNEIDER Handb. Laubholz. I: 457). — In rupestr. et dumetis ad latera montis Jerinja glava supra Andrijevica (Ro); Ljut supra coenob. Piva (Ro) cca 1200—1400 m! — var. *oblongifolia* (W. K.) DIPPEL. — Cum priore in montibus Jerinja glava et Balj supra Andrijevica; Pirlitor prope Žabljak sub monte Durmitor (Ro).

1963. *S. ulmifolia* SCOP. — A praecedente dignoscitur „foliis ramorum elongatorum fere a basi, ramorum floriferorum a medio inciso-serratis.“ — In rupestr. montis Durmitor loco Crvena Stijena (Pč, Ba).

### *Aruncus* AD.

1965. *A. silvester* KOSTEL. — In silvis et ad rivulos regionis subalp. — In valle fl. Tara (Pč, Ja); Nižin Luk in valle Bistrica prope Kolašin (Pt); Skrobotuša (Sz), Bukovica sub monte Durmitor (Ba, Ro), Mratinje sub monte Maglić Pivski, Šćepangrad in valle fl. Piva, Zakamen supra coenob. Piva, Trešnja supra Njeguši, in monte Lovćen (Ro), in monte Bać supra Kolašin; Sinjavina planina (Ba).

### *Filipendula* MILL.

1966. *F. hexapetala* GILIB. — In graminosis siccis e regione infer. usque ad subalpinam frequens. — Ad Danilovę

grad (Pt, Ro), Viruša dol sub Crna planina (Pt), in valle Tara (Pt, Ja), Crmnica (Pč), sub monte Hum Orahovski (Sz), Lukavica planina (Ho), Bežijevo distr. Kuči (Ba), Gorańsko, Andrijevica, Jerinja glava, Balj, Viljuša, Njeguši, Podgorica, Rijeka, Spuž, Bukovica sub monte Durmitor (Ro), in montibus Peh et Glave supra Kolašin (Ja), in monte Rumija supra Bar (Do), in monte Troica prope Vir (Eb), Lovćen (To).

1967. *F. ulmaria* (L.) MAXIM. — In fruticetis udis, ad ripas regionis subalpinae. — Sub monte Durmitor (Pč).

— — *f. denudata* (PRESL) BECK. — Murino prope Velika distr. Vasojevići (Ba), Zmijničko jezero et Bukovica sub monte Durmitor (Ro), circa Kolašin (Ja), Poljana et Volujačko jezero distr. Piva (Ma).

### *Rubus* L.

1968. *R. saxatilis* L. — In silvis regionis subalp. et alp. — Sinjavina planina, montes Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ro, De, Si).

\* — — *f. crenatus* HRUBY. — Supra lacum Lokva in monte Durmitor (De, Si).

1969. *R. idaeus* L. — In silvis regionis subalp. et alp. — Javorje planina, Durmitor, vallis Tara (Pč), Skrobotuša sub monte Vila; ad latera montis Hum Orahovski (Sz); Crno jezero sub monte Durmitor (Ro), circa Kolašin (Ja), Bukovica sub monte Durmitor; Sinjavina planina (Ba), ad latera montis Lovćen, Štirni do prope Lukavica planina, in monte Vojnik; Čeklići et Donja Krivača prope Njeguši (Ro), Crmnica (Eb).

— — var. *maritimus* (ARRH.) *f. armatipedicellatus* HRUBY. — Cum typo sub monte Vojnik (Ro).

1975. *R. praecox* BERTOL. subsp. *macrostemon* (FOCKE) HAY. — In dumetis ad Medun distr. Kuči (Sz), Volubica prope Bar (Ba).

1977. *R. bifrons* VEST. — In dumetis ad Strugari (Pt).

1978. *R. Pantocsekii* HOLUBY ap. PANT. Adnot. 117. — Ad pedem montis Gliva prope Trebinje in Hercegovina (Pt). E Montenegro adhuc non vidi. (Conf. HAYEK Prodr. Fl. penins. Balc. I: 662.)

\*1980. *R. ulmifolius* SCHOTT subsp. *dalmatinus* (TRATT.) FOCKE. — In dumetis saxosis regionis calidioris.

— Ad Njeguši, Cetinje, Grahovo (Pč); Plavnica (Sz), Medun distr. Kuči (Ho), Crmnica (Eb).

× *R. tomentosus* × *ulmifolius* subsp. *rusticanus*  
= *R. Baldaccianus* BORB. — In dumetis ad Orahovo distr. Kuči (Ba).

1983. *R. tomentosus* BORKH. var. *canescens* WIRTG.  
— In declivibus montis Maglić Pivski versus Mratinje (Ro), circa Njeguši (Sz, Ro).

— — f. *cinereus* (RCHB.) FOCKE. — Ad Njeguši et Andrijevica (Ro).

— — var. *glabratus* GODR. — Ad coenob. Piva, sub monte Balj prope Andrijevica, Donja Krivača, Šanik, Bukovica prope Njeguši (Ro).

— — f. *setoso=glandulosus* WIRTG. — Ad latera montis Balj supra Andrijevica (Ro).

\*1983b. *R. Hrubyi* ROHLENA XI. Beitr. 1936 pag. 16 (= *R. Rohlenae* HRUBY in Rohl. IX. Beitr. pag. 13 non TOCL; *R. tomentosus-serpens* HRUBY). — Turio?; ramus florifer obtusangulus dense et distanter pilosus glandulis pallidis inaequalibus onustus aculeis paucis debilibus reclinatis basi aliquot dilatatis flavescentibus aciculis variis exasperatus; folia 3-nata coriacea supra glabra nitida subtus cano-tomentosa floscosa (ut in *R. tomentoso*) foliolum terminale plerumque basi cuneatum (ut in *R. tomentoso*), aut ± late ovatum aut fere orbiculare; petioli ut rami vestiti et exasperati; inflorescentia elongata perfoliata, pedunculis inferioribus longis erectis, superioribus brevibus, pedicellis brevibus; axis floralis dense hirsutus glandulis inaequalibus pallidis onustus; aciculis flavis, aculeis sparsis debilissimis exasperatus; bracteae foliolatae lanceolatae discolores promiscue tripartitis (ut in *R. tomentoso*), maioribus; flores mediocres; calyx extus tomentoso-viridis dense flavescenter aciculatus, glandulis pallidis mediocribus exstructus; petala albo-flavescentia(?) obovata; stamina stylis virescentibus paucum longiora alba. — Habitat in dumetis ad ripam fluminis Lim prope Andrijevica cca 800 m (Ro). — „Diese prächtige Brombeere gleicht im Blütenstande stark *R. tomentosus*, dessen Beteiligung sich auch in dem Blattzuschnitte, der Blattrandzung und der Form der Deckblättchen zeigt, während sonst die Pflanze völlig das Aussehen von *R. serpens* (WHE) SUDRE besitzt.“ (HRUBY in litt.)

\*1983c. *R. divergens* P. J. MUELL. (= *R. tomentosus* *Lloydianus-caesius*) f. *supertomentosus* HRUBY (Rubi penins. balc. p. 161 Tab. CV. fig. 3). — Valać rupe sub monte Lovčen (Pej, Ro).

\*1983d. *R. trachypus* BOUL. et GIL. (= *R. tomentosus* LLOYD nec alior) f. *firmior* HRUBY (Rubi penins. balc. p. 160). — Ad Viljuša distr. Katunska nahija cca 1000 m (Ro).

1993. *R. hirtus* W. K. var. *montenegrinus* HAY. — „Turiones epilosi, glandulis stipitatis et setis glanduliferis densissime, aculeis parum validioribus sparse obsiti; folium terminale obovatum; inflorescentia angusta, racemosa, axibus densissime atropurpureo-glandulosis. — In silvis regionis subalp. — Varda sub monte Kom; circa Andrijevica (Ba, Ro); huc specie tant verosimiliter plantae a cl. PANČIĆ sub monte Durmitor lectae et sub *R. glanduloso* publicatae.

1999. *R. caesius* L. — In dumetis et saxosis regionis infer. — Sinjac prope Vir (Pč), Plavnica (Sz), Rijeka (Ba), Andrijevica (Ro), Donja Zeta prope Podgorica (Ro), Crmnica; insula Vranina (Eb).

— var. *meridionalis* A. KERN. f. *aquaticus* (W. et N.) HRUBY. — In dumetis ad Andrijevica ad f. *mollifolium* (SUDRE) HR. verg. (Ro).

\*— var. *pseudo-dunensis* TOCL. — „Schösslinge kaum behaart, ziemlich dicht bewehrt, Blättchen klein, runzelig, grob oft eingeschnittengesägt, unterseits dicht behaart. Kelche graugrün, rotdrüsig, Kronblätter rosa, fein flaumig.“ (TOCL in schedis 1903). — In campo ad Podgorica cca 30—50 m (Ro).

### *Fragaria* L.

2000. *F. vesca* L. — In graminosis silvat. regionis infer. et subalp. — In valle Peručica sub monte Kom (Pt), vallis Morača sub Javorje planina (Pč), in monte Hum Orahovski distr. Kući (Sz), sub monte Kom Kučki (Ho), circa Ulcinj et Vir (Ro), circa Kolašin et Andrijevica (Ro, Ja), Crmnica (Eb).

2001. *F. moschata* DUCH. — In silvis et dumetis regionis mediae. — Kovčice sub monte Durmitor (Pt), Ljut supra coenob. Piva, Jerinja glava supra Andrijevica (Ro), circa Kolašin (Ja).

2002. *F. viridis* DUCH. — In dumetosis et herbidis regionis infer. et mediae. — Viruša sub Crna planina (Pt), circa Podgorica et Kokoti (Ro).

*Potentilla* L.

2003. *P. speciosa* WILLD. — In rupestribus alp. et subalp. — Montes Kom (Pt), Lovćen (Pč, Ro), Vučji Zub—Bijela gora (Pč), Treblješ, Korita rovačka (Ho), Dobri do in monte Durmitor; Balj supra Andrijevica (Ro).

— f. *concolor* TH. WOLF. — Cum typo in monte Lovćen.  
— subvar. *elatior* TH. WOLF. — Ad 40 cm alta; folia maiora; phylla epicalycis angusta sepalis longiora. — Cum typo in montibus Lovćen, Štirni do prope Lukavica planina 1400—1800 m (Ro); sub monte Prokletija supra Gusinje (Df).

2005. *P. apennina* TEN. — A praecedente dignoscitur indumento sericeo-tomentoso, foliolis apice tantum 2—5dentatis, caule plerumque aphylo. — In rupestribus supra Gusinje loco Fuša Rudnices cca 1600 m (Df).

\*2007. *P. caulescens* TORN. — Foliola apice tantum serrata dentibus ciliatis, praeterea glabra; inflorescentia ± laxa; stamina pilosa. — In rupestr. calcareis regionis subalp. — In montibus Tičnjak et Maganik (Ho); Kostiča distr. Kuči; Rosgam sub monte Kom (Ba).

\*— f. *persicina* TH. WOLF (ROHL. V. Beitr. p. 39). — Petalis persicinis, staminibus et stylis plerumque rubicundis. — In saxosis ad Poščensko jezero supra Šavnik; in valle fl. Piva sub Goraško (Ro).

2008. *P. Clusiana* JACQ. — Foliola supra laxius subtus densius pilosa; inflorescentia condensata pauciflora; stamina glabra. — In rupestr. regionis alp. — Montes Kom (Pt, Pč, Sz, Ba, Ho), Mali Durmitor (Pt, Pč, Ba), Velki Maglić, Planina distr. Kuči (Ba), Maglić Pivski (Ro), Sinjavina planina (Ba).

2012. *P. micrantha* RAM. — Folia caulina indivisa, basalia ternata foliolis cuneato-obovatis utrimque sericeo-pilosis argute serratis dentibus utrimque 7—11, petala alba, stamina pilosa. — Sutorman supra Bar (Pč, Ro), sub monte Kom Kučki (Ho), Njeguši (Ro, Ld), Lješanska nahija; Bioče prope Podgorica (Ro), circa Kolašin et Andrijevica (Ja, Ro).

2013. *P. palustris* (L.) SCOP. — In pratis turfosis ad lacum Crno jezero sub monte Durmitor cca 1500 m (Ro).

2014. *P. rupestris* L. — In saxosis calcareis supra lacum Riblje jezero sub monte Durmitor (Pč).

2015. *P. argentea* L. f. *typica* BECK. — In gramin. regionis subalp. — Viruša dol sub Crna planina; Perućica sub monte Kom (Pt), ad Cetinje (Pč, Ba), in monte Maglić Pivski; Ledenica et Varda supra coenob. Piva (Ro); Konjuhe prope Andrijevica (Ba).

— f. *latisecta* F. SAUT. — Ad coenob. Piva (Ro).

— f. *incanescens* OPIZ. — Cum typo ad Kolašin (Ja).

— f. *multifida* TRATT. (= f. *angustisecta* TRATT.). — Ad coenob. Piva (Ro).

— f. *tenuiloba* (JORD.) SCHWARZ. — Cum typo ad Andrijevica in locis apricis (Ro).

— var. *pseudocalabra* TH. WOLF. — Borkovići distr. Piva cca 1400 m, Kralje sub monte Kom (Ja), in montibus Balj et Žoljevica prope Andrijevica cum formis ad *P. calabram* TEN. vergentibus (Ro).

× *P. argentea* × *canescens*. = *P. Kernerii* BORB. — Cum parentibus ad Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro).

2016. *P. canescens* BESS. f. *typica* BECK. — In gramin. et dumet. regionis mediae. — Mratinje sub monte Maglić Pivski, in valle fl. Lim et Zlorječica prope Andrijevica, in monte Balj supra Andrijevica (Ro), circa Kolašin, ad coenob. Morača loco Vrujica (Ja).

— f. *oligodonta* TH. WOLF. — Cum typo ad Andrijevica et Borkovići distr. Piva (Ro).

— f. *virescens* (BOISS.) TH. WOLF. — Foliola subtus viridia vel parum cano-tomentosa, caulis parce longepilosus. — Ad coenob. Piva, in valle fl. Tara ad Kolašin (Ro).

— f. *incisoserrata* TH. WOLF. Monogr. 273 (= var. *incisodentata* TH. WOLF ap. ROHL. IV. Beitr. pag. 45). — Foliola profundius inciso-serrata, dentibus oblongis vel anguste triangularibus indivisis. — Cum typo ad Andrijevica et in monte Balj (Ro).

× *P. canescens* × *hirta* var. *pedata*. — Cum parentibus ad Andrijevica (Ro).

2017. *P. recta* L. var. *sulphurea* (LAM.) LAM. et DC.  
— In dumetosis ad Andrijevica (Ho, Ro).

\* — var. *obscura* (SER.) KOCH. — Ad coenob. Piva, in monte Vojnik cum forma ad var. *leucotricham* BORB. verg., in valle fl. Jelovica sub Bjelastica planina, ad Andrijevica in f. *parceglandulosa* TH. WOLF in litt. (Ro).

— var. *pilosa* (WILLD.) LED. — Ad Cetinje (Pt), Vir, Kopilje (Ho), inter Cetinje et Rijeka (Kn).

— var. *balcanica* TH. WOLF. — In dumet. et gramin. in monte Vojnik; circa Andrijevica et Danilovgrad (Ro), sub montibus Kom et Durmitor (Pt, Pč ex loco), in monte Lovćen (Sk), in montibus Kosa et Rumija supra Bar (Do).

— f. *viridis* TH. WOLF. — In montibus Durmitor, Vojnik, Ledenica planina (Ro); Kapetanova Rijeka prope Andrijevica (Ja).

— f. *hirsutior* TH. WOLF. — Bioče prope Podgorica; Ledenica planina et Črtov do supra coenob. Piva (Ro), Kralje prope Andrijevica (Ja), in monte Prokletija ad fines Albaniæ (Df).

— f. *Pejovićii* ROHL. III. Beitr. 28. — In valle fl. Zeta prope Spuž (Ro).

\* — subvar. *vlasicensis* (SIEGF.) TH. WOLF. — In monte Jerinja glava supra Andrijevica, in monte Gradište supra Košlašin; Danilovgrad, Bioče prope Podgorica (Ro).

2020. *P. hirta* L. var. *laeta* (RCHB.) FOCKE. — In dumetosis et graminosis regionis infer. mediterr. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Danilovgrad (Ro).

— var. *pinnatifida* GRIS. f. *hirsuta* TH. WOLF. — Cum typo ad Podgorica (Ro).

— var. *pedata* (WILLD.) KOCH. — „Caulis robustior et elatior usque ad 40 cm altus dense setulosus; dentes foliorum triangulari-lanceolati patentes (nec extus recurvati).“ — Čukovjevići (Ho), in monte Lovćen et circa Njeguši; ad coenob. Piva, circa Bar, Ulcinj, Cetinje, Vir, Podgorica, Danilovgrad; etiam sub monte Balj prope Andrijevica (Ro).

2021. *P. adriatica* MURB. — A praecedente dignoscitur indumento longe piloso et glanduloso, petalis dilute flavis calyce multo longioribus. — In dumetis ad Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz sub *P. taurica*); supra Bar (Ho, B).

2028. *P. opaca* JUSL. — In graminosis et dumet. subalp. et alp. — Kunj Kostiča, Hum Orahovski, Dibala, Vila, Pešinjak, Strunga, Miočev do distr. Kuči, Gradište supra Kolašin (Ba). An ad var. sequentem pertinet?

— var. *subalpina* TH. WOLF. apud ROHL. IV. Beitr. 46. — „Foliola parva late obovata obtuse dentata; phylla epicalycis sepalis fere triangularibus multo minora.“ — Ledenica planina supra coenob. Piva cca 1600 m, in monte Zeletin supra Andrijevica cca 1500—1700 m (Ro), in monte Pivljan supra Andrijevica cca 1950 m (Ja).

2029. *P. australis* KRAŠ. — A praecedente dignoscitur: caulis adpresso (nec patule) longe pilosus, foliola antice inciso-serrata dentibus 2—4, utrimque adpresso pilosa; auriculae stipularum lanceolatae. — In graminosis montis Lovćen (Ro).

— f. *pygmaea* KRAŠ. — Cum typo in monte Lovćen.

\*— f. *dinarica* BECK Fl. Bosne III: 31. — In monte Lovćen (Bo).

2031. *P. Crantzii* (CR.) BECK var. *gracilior* (KOCH) HAY. — In graminosis et pascuis alp. montium Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ba, Sz); Bijela Voda sub monte Kom; Maglić Pivski (Ro), Carine supra Kolašin (Ba).

— f. *subsericea* (TH. WOLF) HAY. — Dense adpresso subsericeo-pilosa. — In monte Gradište supra Kolašin cca 2200 m (Ro).

— var. *stricticaulis* (GREMLI) HAY. — In summo montis Durmitor et in Bjelastica planina cca 2000—2400 m (Ro, De, No, Si).

— var. *tridentina* (GELMI) HAY. — In cacumine montis Durmitor et in monte Žoljevica supra Andrijevica (Ro).

— var. *baldensis* (A. KERN.) HAY. — In monte Gradište supra Kolašin (Ba), Fuša Rudnices sub Prokletija planina ad fines Albaniæ (Df).

× *P. aurea* × *Crantzii* (= *P. Huteri* WOLF) var. *super-aurea*. — Cum parentibus in monte Durmitor (Ro).

2032. *P. aurea* TORN. — In graminosis regionis alp. — Montes Kom, Durmitor (Pt, Pč, Ba, Ro), Maganik (Ho), Planinica, V. Maglić, Mojan distr. Kuči (Ba), Maglić Pivski, Ledenica planina, Zeletin, Sjekirica planina, Mokra planina supra Andrijevica (Ro).

— — f. *piperorum* ROHL. III. Beitr. 27. — Dentes foliorum inferiorum obtusiusculi; caulis et petioli subpatule pilosi. — Cum typo in alp. Piperska Lukavica cca 1800 m (Ro).

2033. *P. ternata* C. KOCH. — Ab affini *P. aurea* dignoscitur foliis basalibus ternatis, foliolis cuneato-ovobatis inciso-serratis dentibus utrimque 3—5, medio lateralibus breviore induimento magis flavescente. — In herbidis et pascuis regionis alpiniae. — Sjekirica planina, mons Štit prope Mokra planina, mons Zeletin supra Andrijevica (Ro); sub monte Kom Vasojevički et in monte Pivljan supra Kolašin (Ja); inter Vermoš et Širokar ad fines Albaniæ (Df).

2034. *P. dubia* (CR.) ZIMM. — A praecedente discrepat: foliola late cuneata apice dentata dentibus utrimque 1—3; phylla epicalycis sepalis ovatis parum breviora et angustiora (nec linearis-lanceolata); caulis saepe uniflorus; petala dilute flava (nec aurea). — In herbidis alp. montis Velki Maglić distr. Kući cca 2200 m (Ba).

2035. *P. montenegrina* PANT. Oe. B. Z. XXIII:5. — Caulis elatus e basi adscendente erectus foliis basalibus multo longior paucifolius superne parum ramosus et dense puberulus; folia ternata, foliola magna, petiolata superiora subsessilia late obovata grosse serrata ad nervos adpresso pilosa, pilis stellatis vel fasciculatis nullis; phylla epicalycis oblonga obtusa sepalis lanceolatis acutis subbreviora; stylus nucula matura longior; petala aurea calyce multo longior. — In herbidis et dumet. subalp. et alp. dicionis septentr. — Perućica sub monte Kom, Sinjavina planina, Kovčice sub monte Durmitor (Pt), in monte Vojnik, Jablan in Sinjavina planina, Sjekirica planina, Balj, Zeletin supra Andrijevica; Bjelastica planina supra Kolašin; Korita rovačka (Ro); Varda et Pivljan prope montem Kom (Ba, Ja).

— — f. *Jankeana* (PANT.) TH. WOLF. — Dense sericeo-pilosa; stipulae foliorum caulinorum apice 3—4dentatae. — In alp. Bijele Carine sub monte Kom (Pt).

2038. *P. Tommasiniana* F. SCHULTZ. — A simili *P. arenaria* BORKH. dignoscitur praesertim foliis basalibus ternatis. (Confer etiam var. *ternatam* TH. WOLF.) — In rupestr. regionis mediae dicionis septentr. — In montibus Balj et Jerinja glava prope Andrijevica (Ba, Ro), Mratinje sub monte Maglić Pivski; Goračko distr. Piva cca 700—1500 m (Ro).

— — f. *quinata* TH. WOLF. — Folia quinata. A *P. arenaria* surculis abbreviatis aegre discernenda. — Rarius cum typo (Ro).

2039. *P. reptans* L. — In graminosis, ruderatis, ad vias in tota dictione e regione infer. usque ad subalp. frequens.

— — f. *microphylla* TRATT. — Ad Bukovica prope Cetinje (Pej).

2040. *P. erecta* (L.) HAMPE. (= *P. Tormentilla* NECK., *P. silvestris* NECK.). — In silvis et gramin. regionis subalp. et alp. — Viruša dol sub Crna planina, Pašina Voda sub monte Durmitor (Pt), supra Kolašin (Pč, Ja), Konjsk planina (Ho), Korita sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Ba), Pošćensko jezero supra Šavnik, Lastva čevska, Velestovo et Milušina pećina in distr. Katunska nahija, circa Andrijevica (Ro), Rudo brdo supra Kolašin (Ja).

2043. *P. anserina* L. — In fossis regionis inferioris ad Vir (Pč).

2045. *P. supina* L. — In arenosis regionis inferioris ad Vir (Pč).

#### *Alchimilla* L.

2047. *A. arvensis* (L.) SCOP. — In arvis et incultis regionis inferioris et subalp. — In pascuis Carine sub monte Kom (Pt), circa Ulcinj, Vir, Bar, Rijeka; etiam in valle fl. Piva sub Goraňsko (Ro), Starac in Sinjavina planina (Ba).

2050. *A. Hoppeana* (RCHB.) BUS. var. *angustifolia* BUS. subvar. *velebitica* DEG. (= *P. alpina* aut. monten.). — Perennis, folia fere ad basin usque 7—9 partita subtus sericeo-tomentosa, supra glabra, foliolis cuneato-oblongis obtusis apice inciso-serratis dentibus 3—7 porrectis. — In pascuis et lapidosis regionis subalp. et alpinae in omnibus montibus regionis septentrionalis. — Maglić Pivski, Durmitor, Ledenica, Vojnik, Sinjavina planina, Kom, Planine kučke, Sjekirica, Zeletin, Lukavica, Prokletija etc.

— — — subvar. *sericea* BUSER. — In monte Orijen (ad subvar. *amphiargyrea* BUS. verg.), Perućica sub monte Kom (Ro), in monte Durmitor loco Savin Kuk (De, Si).

— — — subvar. *conuncta* (BUS.) ASCH. GR. — Ad lacum Volujačko jezero (Ma).

— — — subvar. *leptoclada* (BUS.) ASCH. GR. — Cum praecedente (Ma).

\*2052. *A. glaberrima* SCHM. — Folia reniformia, ad summum ad medium usque 7-lobata glabra; pedicelli glabri, sepala acutissima calycis tubo parum longiora. — In pratis humidis regionis alpinae. — Perućica sub monte Kom (Sz), in monte Želetin supra Andrijevica, mons Jablan in Sinjavina planina, Durmitor, Maglić Pivski (Ro), Rogam sub monte Kom; Gradište supra Kolašin (Ba).

? 2054. *A. acutiloba* STEV. — In valle Perućica sub monte Kom (Pt). Verosimiliter ad aliam speciem pertinet.

2055. *A. alpestris* SCHM. var. *montana* (SCHM.) SCHINZ et KELL. — In pascuis alp. sub montibus Kom, Maglić, Durmitor, Sinjavina, Lovćen, Kučke planine.

— var. *frigens* (BUS.) ASCH. GR. — In subalp. Vermoš ad fines Albaniæ (Df).

2056. *A. pratensis* SCHM. — In pratis et pascuis regionis mediae et subalp. — Mokra sub monte Dziebeze, Velki Maglić distr. Kuči et mons Kom Kučki (Sz), circa Andrijevica; Lastva čevska, Velestovo, Njeguši distr. Katunska nahija (Ro), Crvena Stijena sub monte Durmitor (Ba). Verosimiliter loca hic enumerata partim ad speciem sequentem pertinent.

2057. *A. silvestris* SCHM. var. *pastoralis* (BUS.) HAY. — In pratis et pascuis regionis subalp. — Kapetanova rijeka prope Kolašin, in monte Pivljan et ad pedem montis Kom cca 1600 m (Ja).

2058. *A. pubescens* LAM. var. *glaucescens* (WALLR.) ASCH. GR. subvar. *transiens* HAY. — In pascuis regionis subalpinae et alpinae. — Štavna sub monte Kom; in montibus Pivljan (Ja), Hum Orahovski, Rikavac distr. Kuči (Ba), in monte Durmitor (Ht, De, Si); in monte Lovćen et Durmitor informis ad var. *plicatam* vergentibus (Ro, De, Si).

### *Geum* L.

2062. *G. urbanum* L. — In dumetis et silvis e regione infer. mediterr. usque ad regionem subalp. in tota dizione frequens.

— f. *glandulosum* MURB. — Caulis cum foliis, pedunculis, articulus inferior styli dense glandulosi. — Cum typo ad Njeguši loco Lopotna Strana (Pej, Ro).

2064. *G. molle* VIS. PANČ. — A praecedente dignoscitur caulinibus et foliis dense pubescentibus (nec sparse hirsutis), foliolis terminalibus cordato-reniformibus (nec ovatis), petalis luteis calyce longioribus. — In dumetis et silvis regionis subalp. et alp. — Ad Cetinje; Viruša dol sub Crna planina; Perućica sub monte Kom; Kovčice sub monte Durmitor (Pt); mons Durmitor versus jugum Štulac; mons Jastrebica (Pč, Ba), montes Sjekirica, Balj, Štit supra Andrijevica; Ranisava, Vrelo et Baranjezero prope montem Durmitor, Poščensko jezero supra Šavniki (Ro), Rudo brdo supra Kolašin (Ja), in monte Gradište supra Kolašin (Ba), Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

× *G. molle* × *rivale* = *G. pseudomolle* PANT. Adnot. 121. — Cum parentibus in valle Viruša dol sub Crna planina (Pt), Rogam sub monte Kom (Ba).

2065. *G. montanum* L. — In pratis humidis regionis alp. — Crna planina distr. Kuči (Pt, Ba), Bijele Carine sub monte Kom (Pt), Rogam sub monte Kom Kučki (Pč), in montibus supra Andrijevica: Sjekirica et Zeletin; mons Jablan in Sinjavina planina (Ro), in monte Starac supra Kolašin (Ba).

\*2067. *G. reptans* L. — A praecedente dignoscitur stolonibus supraterreneis (nec estolonosum), foliolis inciso-serratis vel pinnatifidis (nec crenatis) aequalibus, terminali non maiore (nec permagno). — Ad nives deliquescentes summo jugo Šljeme in monte Durmitor cca 2500 m (Ba). Non vidi. A cl. HAYEK non indicatum.

2068. *G. bulgaricum* PANČ. — A *G. montano* discrepat floribus nutantibus (nec erectis), caule longe piloso et glanduloso, 3—7-floro, foliolo terminali cordato-reniformi (nec rotundato). — In pratis humidis regionis alp. raro. — In monte Žijovo et ad Miočev do supra Řikavac distr. Kuči (Ba), in monte Zeletin supra Andrijevica (Ro), Fuša Rudnices et Prokletija supra Gusinje (Df).

2069. *G. rivale* L. — Ad rivulos, in pratis, in silvis humidis regionis subalp. dicionis septentr. — In monte Vjetnik distr. Bratonožići; Viruša dol sub Crna planina; Kovčice sub monte Durmitor (Pt), Riblje jezero sub monte Durmitor (Pč), Lukavica planina (Ho), Donja Bukovica distr. Drobnjaci, Treblješ luka prope Lukavica planina; Perućica sub monte Kom, in valle fl. Lim prope Berane et Andrijevica (Ro), Carine sub monte Kom (Ba).

### *Dryas* L.

2070. *D. octopetala* L. — In pascuis et glareosis regionis alp. in omnibus montibus regionis septentr. et septentr. orientalis frequens. E montibus regionis meridionalis (Lovćen et Rumija) adhuc non vidi.

### *Agrimonia* L.

2071. *A. eupatoria* L. — In graminosis et dumetosis regionis infer. et mediae. — Bioče, coenob. Duga, Bijela, Slivje (Pt), Danilovgrad (Pč, Ro), Orahovo (Sz), Rijeka (Ho, Ro), Viljuša, Podgorica, Lješanska nahija, Spuž, Drežnica prope Nikšić, Andrijevica (Ro), Bar (Do), Crmnica (Eb), in valle rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

— f. *longifolia* WALLR. — Cum typo ad Bukovica supra Njeguši (Ro).

\*— f. *grossedentata* ROHL. f. n. — Foliolis profunde inciso-dentatis. — Cum typo ad Viljuša (Ro).

### *Artemonia* NECK.

2073. *A. agrimonoides* (L.) NECK. — In dumetosis et herbidis regionis mediae et subalpinae. — Crna planina et sub monte Kom (Pt), Njeguši; ad latera montis Lovćen (To, Ro), Sutorman supra Bar, in monte Balj supra Andrijevica, Goraňsko, coenob. Piva (Ro), Golo brdo supra Njeguši (Ho), Krstac (Ld), Cetinje (Kn, Če).

### *Sanguisorba* L.

2074. *S. officinalis* L. — In pratis humidis regionis subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina, in valle fl. Tara (Ja), sub monte Durmitor (Pt, Pč, Ro), Sinjavina planina, Nikšić, Viljuša (Ro), in monte Kljuć supra Kolašin (Ba).

2076. *S. minor* SCOP. — In graminosis siccis regionis infer. et subalp. — Rijeka (Pt, Ro), in valle fl. Zeta et distr. Crmnica (Pč), Medun (Sz), Cetinje (Pč, Ba), Orahovo (Ba), Viljuša, Nikšić, Velestovo in nahija Katunska, in monte Žoljevica supra Andrijevica (Ro).

2078. *S. muticata* (SPACH.) FOCKE. — Calyx fructifer angulis alatis, faciebus cristato-foveolato-rugosus. — In pratis et graminosis siccis regionis infer. et mediae. — Ad Medun

(Sz), ad Kolašin (Ba, Ja), Lijeva Rijeka (Ba), ad Njeguši, Šavniki, Borkovići, Bar, Ulcinj, Podgorica, Andrijevica (Ro), Kralje sub monte Kom (Ja), mons Pivljan supra Kolašin (Ja), Ječmeni do in Sinjavina planina (Ba), Podgora et Brčeli prope Vir (Eb).

— f. *microcarpa* G. BECK. — Fructus 2,2—3 mm longi. — Prope Bar (B).

*Rosa* L.\*

2086. *R. sempervirens* L. — In fruticetis regionis infer. mediterr. — Ad Šavica distr. Lješanska nahija (Pč), sub monte Lisinj prope Bar (Ba), ad Ulcinj, Podgorica, Donja Zeta, Bar, Plavnica (Ro). Saepe cum f. *microphylla* DC. et *glabriflora* VIS.

2088. *R. arvensis* Huds. — In silvis et dumetis regionis infer. — Sutorman supra Bar (Ba).

— f. *Baldaccii* R. KELLER. — Cum typo ad Bar (Ba).

— var. *pilifolia* BORB. — In saxosis et dumetis ad Žanjev do sub monte Lovćen; in valle fl. Zeta prope Danilovgrad; in valle fl. Lim et Zlorječica prope Andrijevica; supra coenob. Piva (Ro).

— var. *carstigena* (H. BR.) HAY. — Rarior in regione calid.

2089. *R. gallica* L. — In dumetis regionis infer. et subalp. — In valle fl. Zeta prope Danilovgrad (Pč).

— var. *pumila* (JACQ.) H. BR. (in BECK Fl. v. Nieder-Oesterr. 779, 1890). — Ad Andrijevica (no. 117), forma foliis vestitis et glandulosis ut in f. *muscipula* BOULLY videtur (Ro); Lješanska nahija (no. 48), ad varietatem sequentem vergens (Ro).

— var. *liophylla* (BORB.) R. KELL. (in A. u. G. Syn. VI. 369, 1902). — Lješanska nahija (no. 47 et 49, Ro); Farmaki ad Podgorica (no. 44), forma valde dearmata; in dumetis ad Danilovgrad cca 100 m (no. 1) (Ro).

— var. *haplodonta* (BORBÁS) BRAUN (in BECK Fl. v. Nieder-Oesterr. 779, 1890). — Vera rara videtur: Lješanska nahija (no. 50, Ro), foliolis antice rotundatis, ramis ramulisque floriferis fere inermibus (= f. *dearmata* BORB.). Formae sub-inermes in omnibus varietatibus inveniuntur. Copiose in formis

\* Confer: Dr. IVAN KLÁŠTERSKÝ Rosae montenegrinae ex herbario J. ROHLENA in Acta Musei nation. Pragae Vol. IB, No 5 1938.

± composito-serratis, dentibus simplicibus nunc intermixtis, nunc praevalentibus, quae ad A. HAYEK (Prodr. Fl. pen-Balc. I: 705) in varietatem *grahovicensem* R. KELL. collectae sunt, per analogiam var. *transitoriae* R. KELL. e *caninis*, sed vix iure: ad Andrijevica (no. 116, Ro) receptacula densissime glanduloso-stipitata. — Ad Podgorica (no. 28, 29, 39, 40, Ro).

Ad var. *haplodontam* (BORB.) BRAUN forma sequens pertinet, valde diversa et notabilis: E stirpe brevissima flexuosa rami erectissimi usque 70 cm longi, internodiis longis, fere inermes (raro aculeum subrectum parvum, seti glanduliferi aut eglandulosi rarissimi, solum in ramulis floriferis sub inflorescentia crebriores); stipulae a latioribus ad angustissimas ( $20 \times 3$  mm —  $19 \times 0,5$  mm!) variantes, subtus glabrescentes; folia magna, 92—133 mm longa, in vivo verosimillime debilia, petiolum foliolaque sicca tenuissima. Petiolum puberulum, sparse glanduloso-stipitatum, hic illic cum paucis (1—3) aciculis parvis; foliola (5, rarius 7) late elliptica aut subovata antice late acuta usque breviter acuminata, 40—47 mm longa et 22—26 mm lata; dentes pro maiore parte simplices (et fere eglandulosi). Foliola supra glabra, subtus tota sparse pilosa, saepius glabrescentes, semper eglandulosa. Nervus medianus semper totus ± dense pilosus; bractae desunt; pedunculi longi (36—53 mm) tenues, sparse glanduloso-stipitati, seti nulli; receptacula parva paupere glandulosa usque eglandulosa; sepala lata petalis breviora; flores magni laete purpureo-rosei; styli capitulum albo-lanatum formantes. Forma rarissima, verosimiliter oecologica, in planta heliophila umbra evocata. — In dumetis ad Danilovgrad (no. 6, Ro).

— var. *leiostyla* GELMI. — In dumetis ad Danilovgrad (no. 3) forma dearmata; Boljevići (Ro), forma ad var. *Czakianam* H. BR. propinqua, stylis longioribus, infra pilosis, supra glabris, in capitulum non confertis, sed fascem patentem formantibus.

2091. *R. andegavensis* BAST. — In dumetis et ad margines silvarum. — Ad Timar inter Bukovica et Tušina distr. Drobnjaci (Ba).

— var. *rupivaga* H. BR. (= *R. surculosa* b. *rupivaga* H. BR. in BECK et SZYSZ. Pl. Crnag. 103). — In saxosis castri Medun prope Podgorica (Sz).

— var. *biharensis* BORB. — In dumetis pagi Lijeva Rijeka (Sz).

× *R. canina* × *gallica*. — In monte Žoljevica prope Andrijevica (Ro).

2092. *R. canina* L. subsp. *lутетиана* (LEM.) HAY. — In dumetis ad Kurlaj et Konjuhe sub m. Kom; Duge prope Njeguši; Andrijevica (Ro). Ad Pištet pr. Njeguši ad f. *pallens* R. KELLER verg. (Pej, Ro).

— var. *insubrica* WIERZB. — In saxosis ad Njeguši (Sz).

— var. *subfirmula* H. BR. in BECK et SZYSZ. Pl. Crnag. 93. — In dumetis pagi Lijeva Rijeka (Sz).

— var. *transitoria* R. KELLER in ASCH. GR. Syn. VI. 1: 159). — Andrijevica, Valać rupe, Šavnik et Pištet sub monte Lovćen, ad Viljuša (f. *inermis*), Šavniki sub Ivica planina (Ro).

— subsp. *spuria* (PUG.) H. BR. f. *apraca* H. BR. — Distr. Kuči (Sz 95 sine loci specialis indicatione).

— var. *crnagorae* (H. BR.) HAY. — In dumetis ad Lijeva Rijeka (Sz).

— subsp. *dumalis* (BECHST.) HAY. var. *glaucina* (RIP.) H. BR. — In incultis pagi Njeguši, ad Podgorica, Andrijevica, Viljuša, Krstac njeguški cum forma *biserrata* (Ro), Šanik sub monte Lovćen (Pej, Ro). Ad Pištet pr. Njeguši forma foliis pallide glauco-viridibus, stylis nunc sparsissime pilosis, nunc pilosioribus, paulo elongatis liberis capitulum non formantibus [ad f. *glaberrimam* (DUM.) CHRIST verg.] (Pej, Ro).

— var. *dissimilis* H. BR. in BECK SZYSZ. Pl. Crnag. 102. — In calcareis pagi Medun (Sz).

2093. *R. dumetorum* THUILL. subsp. *dumetorum* (THUILL.) HAY. — In dumetis ad Žanjev do prope Njeguši; Kurlaj sub monte Kom (Ba), Ivanov laz sub monte Lovćen; Donja Zeta prope Podgorica (Ro).

— var. *Thuillieri* CHRIST. — Lješanska nahija; circa Njeguši locis pluribus (Ro). Ad Djevojački do pr. Njeguši ad f. *Brachtii* (BRAUN) R. KELLER vergens. Foliola pallide griseo-viridia, subtus nervis prominentibus (Pej, Ro).

— var. *valdefoliosa* H. BR. in BECK et SZYSZ. Pl. Crnag. 107. — In pascuis alp. montis Hum Orahovski et in incultis pagi Orahovo distr. Kuči (Sz).

— var. *platyphylla* CHRIST. — Krstačko polje prope Njeguši; Varda et Sinjac prope coenob. Piva, Šavniki sub Ivica planina; Podgorica (Ro).

- \* — — var. *cinerosa* (DES.) ROUY. — In m. Rumija (Do).  
 — — var. *aemoniana* KMET. — Ad Njeguši loco Ivanov Laz; Donja Zeta prope Podgorica (Ro).  
 — — var. *leptotricha* BORB. — In incultis pagi Orahovo et in calcareis circa Medun (Sz).  
 — — subsp. *uncinella* (BESS.) HAY. f. *subviolacea* H. BR. (sub *R. pilosa* var. *subviolacea* in BECK et SZYSZ. Pl. Crnag. 105). — In pascuis alp. montis Hum Orahovski (Sz).  
 — — var. *hemitricha* (RIP.) BORB. — Circa Podgorica et Andrijevica (Ro).

2094. *R. Deseglisei* BOR. f. *ornata* H. BR. (sub *R. collina* var. *ornata* H. BR. in BECK et SZYSZ. Pl. Crnag. 108). — Ad sepes prope Orahovo distr. Kuči (Sz).

\*2100. *R. tomentella* LEM. — In fruticetis ad Bijela Skala distr. Primorje (Ba).

2101. *R. agrestis* SAVI var. *Schulzei* R. KELL. — Lješanska nahija (Ro).

— — var. *lasiopoda* R. KELL. — Circa Danilovgrad in forma foliis maioribus ( $-31 \times 22$  mm), stylis prominentibus, laxe pisis (Ro).

— — var. *Milenae* H. BR. in BECK et SZYSZ. Pl. Crnag. 109. — In dumetis pagi Lijeva Rijeka (Sz).

— — var. *inodora* FRIES. — Ad Boljevići supra Vir (Ro).

— — var. *Gizelae* (BORB.) R. KELLER. — Krstac prope Njeguši; Trešnja sub monte Lovćen, Podgorica, Štirni do (Ro).

2102. *R. micrantha* SM. f. *polyacantha* BORB. — In incultis pagi Njeguši (Sz).

\* $\times$  *R. agrestis* SAVI  $\times$  *R. glutinosa* S. S. = *R. Novákii* KLÁŠTERSKÝ. — In alp. Štirni do (Ro).

2111. *R. glutinosa* S. S. — In rupestr. regionis subalp. — Ad Viljuša cca 1000 m (Ro), in monte Rasovatac prope Vir (Eb), in alpinis Štirni do cca 1800 m; sub monte Vojnik cca 1000—1200 m forma ad var. *Formánekii* J. B. KELLER vergens.

— — var. *dalmatica* (A. KERN.) BORB. — Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz), Krstac et Duge prope Njeguši (Gi, Ro).

— — f. *minor* H. BR. — In monte Dziebeze distr. Kuči (Sz).

— — f. *Baldaccii* HAY. — Krstac prope Njeguši et in monte Lovćen loco Tresnjak (Ba).

\*2112. *R. tomentosa* SM. — In dumetosis regionis mediae. — Čevo, Župa Nikšićka, in monte Jastrebica (Pč), sub monte Mavraljnik; Bukovica sub monte Durmitor, Varda sub m. Kom, Velki Mikulić supra Bar; Velika et Konjuhe prope Andrijevica (Ba).

— — var. *cinerascens* (DUMORT.) CREP. — Šavniki sub Ivica planina; specimen foliolis irregulariter serratis (Ro).

— — var. *subglobosa* (SM.) CARION. — Duge prope Njeguši; Vir-Pazar (Ro).

— — var. *cuspidatooides* (CRÉP.) R. KELL. — Ad Andrijevica (no. 122, Ro), specimen parvifolium foliola plerumque vix 18—20 mm longa et 10—12 mm lata; (no. 125 et 126, Ro), ad Vir-Pazar, 30—50 m; (no. 17 et 18, Ro), plantae subinermes, glandulis subfoliariis raris, stylis subglabris et no. 17 (Ro) praeterea etiam ramulis floriferis hic illic pilosis, in monte Balj prope Andrijevica cca 1000 m, no. 97b (Ro), specimen stylis glabris.

— — var. *dumosa* R. KELL. — Ad Gorańsko distr. Piva cca 900 m (Ro).

2113. *R. mollis* SM. — In dumetosis regionis subalp. — Vrh Suta supra Bar, Čafa gvozdeča distr. Kuči (Ba), Krstac prope Njeguši (Sa, Pej, Ro).

— — var. *Szyszlowiczii* (H. BR.) HAY. — In pascuis alp. Livady sub monte Hum Orahovski et in monte Soko distr. Kuči (Sz, Ba).

— — var. *montenegrina* (H. BR.) HAY. — Sine loci specialis indicatione frequens in Crna gora (Sz). In monte Ključ prope Kolašin (Ba).

\* 2114. *R. pomifera* HERM. — In dumet. regionis mediae. — Sub monte Sutorman supra Bar, ad viam e Andrijevica ad Kolašin sub monte Ključ (Ba).

— — var. *typica* CHRIST. — Ad Njeguši (no. 181, Ro) — ibidem loco Krstac (no. 164 et 165, Ro), in monte Žoljevica prope Andrijevica cca 1300 m (no. 134, Ro), f. transitoria inter var. *typicam* et var. *reconditam*.

— — var. *recondita* (PUGET) CHRIST. — Ad Andrijevica (no. 111, Ro), f. ad var. *praecedentem* glandulis subfoliariis

paucis vergens. — In monte Balj prope Andrijevica (no. 97, Ro) vera — et ibid., cca 1000 m (no. 99, Ro), forma imprimis longitudine peduncularum ad var. *resinosam* STERNB. spectans. — Supra coenobium Piva loco Varda, cca 800 m (no. 82, Ro) vera et ibid., cca 1000 m (no. 96, Ro), f. aculeis ramorum omnibus leviter arcuatis (ramulorum recti!) divergens. — Sub monte Vojnik (no. 59 et 60, Ro); ad Viljuša cca 1000 m (no. 12, Ro), forma extrema, sparsissime aculeata, foliolis supra glabrescentibus subtus paupere glandulosis, pedunculis longis, sparse glandulis stipitatis obsitis.

— var. *resinosa* (STERNB.) R. KELL. — Supra coenobium Piva loco Vorda cca 1000 m (no. 93 et 94; Ro), Perućica sub monte Kom (no. 76, Ro) forma in ramulis floriferis ± heterocantha.

— var. *engadinensis* CHRIST. — Sub monte Vojnik (no. 58, Ro), vix typica, aculeis saepe leviter arcuatis, dentibus in foliolis nonnullis denticulis accessoris glandulis munitis intermixatis, receptaculis nudis.

2117. *R. glauca* POURRET (= *R. rubrifolia* VILL.). — In dumet. regionis mediae et subalp. — Ad Cetinje et Ostrog (Pč), Radeča Velja prope Kostiča distr. Kuči (Ba).

— var. *typica* CHRIST. — Ljut sub Ledenica planina distr. Piva in subalpinis (no. 85, 86, 87, Ro).

\*— var. *caninaeformis* KLÁŠTERSKÝ. — Foliola viridia usque luteoviridia, debilia, subtus nervatura fusca, sed non prominente, serratura simplicissima, peraperta, dentibus magnis; sepala crebre divisa, exteriora usque 5—6 pinnis parvis linearilanceolatis praedita. Ceterum sicut var. *typica* CHRIST; toto habitu *Rosae caninae* var. *andegavensi* similis. — Ad Vir Pazar (no. 21, 24, Ro).

\*— var. *subbiserrata* R. KELLER. — Donja Krivača sub m. Lovćen (Pej, Ro).

\*— var. *Rohlenae* KLÁŠTERSKÝ. — Foliola griseoviridia, pruinosa; sepala crebre divisa, exteriora 4—6 pinnulis filiformibus praedita, appendice lanceolata, margine simpliciter serrata, dentibus glandula terminali munitis; styli glabri, rarius parum pilosi, numquam pilosi nec lanati. — In monte Lovćen (Ro, Pej); ad Cetinje (Sag).

— var. *glaucescens* (WULF.) R. KELL. — Ad Njeguši, loco Valač rupa (no. 180, Ro) — ibidem, loco Ljut (no. 182 et 183,

Ro) — ibidem, loco Trešnja (no. 169 et 170, Ro), forma transitoria inter var. *glaucescentem* et var. *typicam*; nonnulli pedunculi paupere stipitato-glandulosi, alii eglandulosi; pedunculus inflorescentiae centralis etiam in speciminibus aliis saepe eglandulosus; sepala glandulis perpaucis obsita, interiora eglandulosa.

— var. *praerupticola* (H. BRAUN) R. KELL. f. *Baldacciana* (R. KELLER) HAYEK. — Ad Njeguši loco Ivanov laz (no. 158, 159, Ro) — ibid. loco Trešnja (Ro) — Bogojeva glava prope Njeguši (no. 150, Ro) — in monte Jezerski vrh (Lovćen) (no. 151, Ro) — Srablje jezero sub monte Durmitor (Ro) — ad Njeguši loco Duge prope Čeklići (no. 175, Ro) — ibid., loco Ljut (no. 167, Ro), f. setis glanduliferis non crebris etiam in ramulis sub inflorescentia (Ro). In distr. Kuči (Ba), in monte Lovćen (Sa). — Specimina omnia non solum in foliis inferioribus, sed in omnibus, etiam in summis, duplo serrata.

2120. *R. pendulina* L. — In silvis et dumetis subalp. — Sub monte Durmitor (Pt, Pč), in monte Ključ supra Kolašin (Ba), in pascuis Varda et Carine sub monte Kom (Ba), in monte Pivljan supra Kolašin ± ad var. *levis* (SER.) R. KELLER verg. (Ja); Velki Maglić distr. Kuči (Ba), Velje osoje prope Njeguši, Sinjavina planina (Ro).

— var. *pyrenaica* (GOU.) R. KELL. — In rupestribus in monte Kom et in Orlova Skala sub monte Kom (Pt).

— var. *setosa* SERINGE. — Supra coenob. Piva, loco Za kamen dicto, in subalpinis (no. 90, Ro), solum exceptione typica. Saepius diversae variationes imprimis in glandulositate receptaculi et calycis. — Bukovica sub monte Durmitor (no. 901, Ro), forma receptaculo glanduloso. In monte Ranisava, 1400—1600 m (no. 63, Ro), differt receptaculo et calyce eglanduloso. Dobri do in monte Durmitor, 1600—1800 m (no. 64, Ro), pedunculi, receptacula, calyces eiusdem rami in glandulositate variant. Ljut sub monte Ledenica, distr. Piva, in subalpinis (no. 84, Ro), differt receptaculis et calycibus eglandulosis, foliolis subtus in nervis stipitato-glandulosis. — Perućica sub monte Kom (no. 75, Ro), differt receptaculis eglandulosis, foliolis inferioribus subtus laxe pilosis, quia ad var. *pubescens* (KOCH) R. KELLER spectat.

— var. *pubescens* (KOCH) R. KELLER. — In valle fl. Jelovica, in subalpinis (no. 74, Ro), forma typica, receptaculis calycibusque glandulosis. Krivača sub m. Lovćen (Pej, Ro).

— var. *levis* (SERINGE) R. KELL. — In monte Ranisava 1400—1600 m (no. 63c, Ro) — et ibidem (no. 63b, Ro), sed forma nervo mediano et hic illic nervis lateralibus foliorum + glandulosis, quare ad var. *montis-ludovici* ROUY vergens.

— var. *Ebelii* (BRAUN) R. KELL. — Ad Andrijevica (no. 109, Ro), rara et, sicut varietas sequens, non solum in Montenegro, sed ubique extra aream bosniacam adhuc non observata, sed aream multo latiorem verosimiliter praedita.

— var. *Bosniaca* (J. B. v. KELLER) R. KELL. f. *setacea* R. KELL. — In valle fluminis Jelovica (no. 73, Ro) et ad Andrijevica (no. 119, Ro), plantae rarae, quas R. KELLER in sectionem formarum foliolis parvis inserit, sed quae nullo modo ad subspeciem sequentem accedunt.

— var. *pseudorupestris* H. BR. in BECK et SZYSZ. Plantae Crnagorae pag. 90. — In monte Hum Orahovski et in monte Dziebeze distr. Kuči (Sz).

\*— subsp. *mediterranea* KLÁŠTERSKÝ. — Plantae pu- milae, maxime ad 100 cm altitudinis attingentes, saepe parvae, alt. 10—20 cm non superantes; caules omnes cinnamomei iner- mes, rarissime solum aciculi aliquot recti, basi dilatata rotun- data, in ramis; ramuli floriferi breves, pro maiore parte con- tracti; folia parva, 36—82 mm, saepissime 50—60 mm, longa; foliola regulariter 7, rarius 5, raro 9; foliola ima a stipulis re- mota; petioli tenues, saepe atropurpurei, sat copiose glandulis parvis stipitatis nigrescentibus obsiti; stipulae in forma et lati- tudine maxime variabiles, solum in longitudine 10—14 mm sat constantes supra subtusque glaberrimae et eglandulosae, in mar- gine copiose usque dense glandulosae; foliola subcoriacea, glau- co-viridia saepe purpurascens parva, 12—25 mm, saepissime 14—19 mm longa et 7—15 mm, saepissime 9—12 mm lata (lon- gitudo: latitudo = 1,3: 2,5, saepissime 1,4: 1,8), late elliptica aut subovata, antice subrotundata, raro subacuta, basi rotundata vel cuneata, supra glaberrima, subtus glabra aut rarius laxe pilosa, nervis prominentibus subreticulata, nervo mediano raris glan- dulis obsito. Serratura (rarissime subaperta) variat saepe etiam in eodem frutice sicut in fruticibus diversis a serratura simplici usque ad serraturam valde compositam; dentes acuti saepe acu- minati in foliolis cum serratura simplici eglandulosi, ceterum extus 1—2glandulis, denticuli semper cum glandulis terminali- bus; bracteae, saepe deficientes, parvae late lanceolatae acutae tenuiter serratae, eglandulosae; inflorescentia semper uniflora;

pedunculi tenues 10—34 mm, saepissime 12—16 mm longi eglandulosi, rarius glandulis stipitatis tenuibus + dense toti, aut in parte superiore, obsiti, receptacula parva, praematura (matura non vidi) late lagenaria aut pyriformia, raro ovoidea, levia (nuda) aut rarius sicut pedicelli glandulosostipitata, vix dense; sepala cum apendice linearilanceolata integra, 13—23 mm, saepissime 16—20 mm longa, eglandulosa vel solum exceptione aliquot glandulis stipitatis obsita. — In speciminibus montenegrinis duas varietates adsunt:

\*——— var. *biserrata* KLÁŠTERSKÝ. — Serratura foliorum composita, saepe glandulosa; pedunculi et receptacula omnia vel nonnulla glandulosa. — In monte Durmitor, in alpinis (no. 56, Ro); ad Andrijevica, in monte Žoljevica cca 1300 m (no. 131, Ro, typus: Herb. Mus. Nat. Pragae no. 492562); in monte Kom Vasojevički (no. 77, Ro); in monte Ranisava (no. 63d, Ro), forma pedunculis et receptaculis fere dense glandulosostipitatis.

\*——— var. *subuniserrata* KLÁŠTERSKÝ. — Serratura foliorum tota aut pro maiore parte simplex et saepe eglandulosa; pedunculi et receptacula omnia nuda vel insigne glandulosa. — In monte Ranisava 1400—1600 m (no. 61, Ro, typus: Herb. Mus. Nat. Pragae 492563, et 62, Ro); in alpinis montis Javorje (no. 68 et 69, Ro).

2121. *R. spinosissima* L. — In rupestr. regionis calidioris. — In monte Jastrebica (Pč), Bijela Skala supra Bar (Ba), Rogam et Varda sub monte Kom (Ba), Žanjev do prope Njeguši, Rudine nikšićke, Andrijevica, ad latera montis Balj (Ro), in monte Lovćen (To).

\*——— f. *pyrifera* KLÁŠTERSKÝ l. c. p. 64. — Receptacula matura longe pedunculata, versus pedunculum longe attenuata, sat magna, pyriformia; forma ad f. *Manthonettii* (CREP.) ROUY et f. *attenuata* ROUY e grege *pimpinellifoliae* analoga et ad var. *catacalyx* DINGLER accedens. — Habitat in monte Jerinja glava prope Andrijevica (Ro).

### *Cydonia* MILL.

2123. *C. oblonga* MILL. (= *Pirus Cydonia* L.). — In hortis culta.

### *Amelanchier* MED.

2124. *A. ovalis* MED. — In rupestribus et dumetis regionis subalp. et alp. — Ad Grahovo (Pč), Cetinje (Ba), ad

Kariman supra Rikavac distr. Kuči (Ba), Perućica sub monte Kom, Jerinja glava supra Andrijevica, Borkovići distr. Piva, Pošćensko jezero supra Šavnik, Dobri do in monte Durmitor, Štirni do prope Lukavica planina (Ro), Lovćen (Ad, Ro), ad latera montis Rumija supra Bar, Crvena ploča in Sinjavina planina (Ba), in monte Stožac (Ba).

— f. *grossedentata* ROHL. Acta bot. Boh. II: 24. — Folia orbiculari-elliptica, basi cordata, grosse fere duplicato-crenato-serrata. — Cum typo in monte Lovćen (Ro).

— f. *grandifolia* BALD. — Folia 7—9 cm longa, 3—4 cm lata subintegra; pedunculi elongati 2,5—3 cm longi. — Cum typo supra Njeguši (Ro), Čafa Gvozdeča prope Orahovo distr. Kuči (Ba).

— f. *macrophylla* (VAND.) HAY. — Folia ultra 3 cm longa tantum supra medium crenato-serrata. — Ljut supra Njeguši (Pej, Ro); occurunt etiam formae intermediae, quae foliorum magnitudine cum f. *macrophylla* congruunt, sed folia margine a basi usque ad apicem serrata habent. Vidi e locis sequentibus: Krstac, Zanovetni brieg et Bogojeva glava supra Njeguši; Ljut supra coenob. Piva (Ro).

\*2125. *A. cretica* (WILLD.) DC. — A praecedente dignoscitur foliis apicem versus argute serratis (ut in *A. ovalis* f. *grossedentata*) sepalis demum reflexis (nec patentibus) petalis 2—3plo brevioribus stylis disco dimidio longioribus. — In rus pestr. ad Cetinje (Bo).

### Sorbus L.

2128. *S. aucuparia* L. — In silvis et dumetis regionis subalp. et alp. — In valle fl. Tara sub monte Kom (Pt), Javorje planina et sub monte Durmitor (Pč), Skrobotuša sub monte Vila (Sz), supra coenob. Piva; Mratinje sub monte Maglić Pivski; Velki Krš prope Andrijevica; Vranjak sub Bjelastica planina (Ro); ad Kolašin (Ja), Štulac sub monte Durmitor (Ba); Savin Kuk et Medjed in monte Durmitor (Ht).

— var. *glabrata* W. GR. — In alp. montis Dziebeze distr. Kuči (Sz), Vališnica do in monte Durmitor cca 2000 m (Ro).

\*— f. *incisa* ROHL. V. Beitr. 41. — Foliolis profundius inciso-serratis. — In monte Durmitor (Ro).

2129. *S. Maugeotii* SOY. WILL. et GODR. subsp. *austriaca* (BECK) HAY. — Folia basi breviter cuneata inciso-

lobata lobis dentatis apicem versus minus profunde lobata de-  
mum duplicato serrata. — In silvis subalp. — Borkovići et supra  
coenob. Piva; Crno jezero sub monte Durmitor (Ro), Cetinje  
(Kn).

2130. *S. aria* (L.) CR. subsp. *euaria* HAY. — In ru-  
pestr. silvat. regionis subalp. et alp. — Lastva čevska supra  
Vojnići (Pt), Javorje planina (Pč), Lovćen (Pč, Ro), Bukovica  
sub monte Durmitor (Ba), Pivska planina, Korita rovačka,  
Lukavica planina; Jerinja glava et Velki Krš supra Andrijevica  
(Ro), Tušina prope Šavniki (Ba).

\*——— var. *typica* SCHN. f. *obtusidens* ROHL. VIII. Beitr.  
26. — Foliis obtusissime dentatis fere crenato-dentatis. — In  
dumetis ad Velestovo distr. Katunska nahija (Ro).

——— f. *lanigera* KERN. — Cum typo ad Njeguši loco  
Duge (Ro).

——— var. *cyclophylla* (BECK) C. K. SCHNEIDER. — Fo-  
lia suborbiculata apicem versus profundius et fere duplicato-  
serrata. — Velki Krš supra Andrijevica (Ro).

—— subsp. *umbellata* (DESF.) HAY. var. *cretica* (LINDL.)  
C. K. SCHNEIDER. — Folia basin versus cuneata duplicato-  
serrata. — Djevojački do prope Njeguši (Ro).

2131. *S. chamaemespilus* (L.) CR. — Folia oblonga  
vel elliptica inaequaliter serrata lucida subtus non tomentosa,  
viridia. — In fruticetis et glareosis regionis alp. — Crvena Sti-  
jena in monte Durmitor (Pč, Ba), Ranisava prope montem  
Durmitor, Maglić Pivski, Kom supra Štavna (Ro), Savin Kuk  
et Medjed in monte Durmitor (Ht), supra lacum Lokva prope  
Žabljak, in monte Durmitor loco Ledena pećina (De, Si).

2132. *S. terminalis* (L.) CR. — A praecedente dig-  
noscitur foliis profunde acute lobatis, floribus albis (nec roseis),  
fructibus ovatis fulvis demum fuscis (nec aurantiacis). — In  
fruticetis et rupestr. subalp. et alp. — In valle fl. Morača  
super. supra coenobium, in monte Sutorman supra Bar (Pč),  
in monte Durmitor jugo Štulac cca 2000 m (Ba), Varda supra  
coenob. Piva (Ro).

### *Pirus* L.

2134. *P. amygdaliformis* VILL. — In rupestribus  
fruticetis regionis infer. et mediae calidioris. — Ad Sindžon

(Pt), Bioče (Ja), Bratonožići (Pč), Pristan Bar (Ba), Viljuša, Podgorica; Lastva čevska distr. Katunska nahija (Ro).

2138. *P. piraster* (L.) BORKH. — In silvis, dumetis regionis calidioris. — Ad Cetinje, Grahovo (Pč), Lješanska nahija, Viljuša, Šavniki, Borkovići, Mratinje sub monte Maglić (Ro).

*Malus* MILL.

2139. *M. silvestris* (L.) S. F. GRAY. — In silvis regionis mediae calidioris. — Pišine Strane in nahija Katunska et supra Grahovo (Pč); circa Viljuša, Šavniki, Borkovići, Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro).

*Cotoneaster* MED.

2141. *C. integriflora* MED. — In fruticet. et saxosis regionis subalp. et alp. — In monte Durmitor (Pč, Ro), sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz), Konjsk planina, in montibus Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro), supra lacum Lokva prope Žabljak; Savin Kuk et Ledena pećina in monte Durmitor (De, Si).

2143. *C. tomentosa* (AIT.) LINDL. — A praecedente dignoscitur calycis tubo et fructu tomentoso. — In rupestr. subalp. et alp. frequentior quam praecedens. — Orlova Skala sub monte Kom, Crno jezero sub monte Durmitor (Pt), Javorje planina (Pč), Konjsk planina (Ho), Bogojeva glava supra Njeguši (Pej, Ro), Jerinja glava et Sjekirica supra Andrijevica; Perućica sub monte Kom, Viljuša; Borkovići distr. Piva, Maglić Pivski; Lovčen (Ro, Ad), Andrijevica (Ba).

*Pyracantha* ROEM.

2145. *P. coccinea* ROEM. — In fruticetis sempervirentibus ad Bar (Ba).

*Crataegus* L.

2148. ? *C. pentagyna* W. K. — Fructus nigri; folia supra laxe lanata demum glabra, subtus lanata demum glabrescentia, rami novelli albo-tomentosi. — Ad Grahovo? (Pč). — (*Cr. spec. fructu nigro prob. melanocarpa* M. B. ab indigenis in montanis ad Grahovo indicata, mihi invisa . . . PANČIĆ Elench. 28.) Ab oppido Trebinje in Hercegovina a cl. PANČESEK indicata.

\*2153. *C. oxyacantha* L. — Styli 2—3; fructus ovato-globosi 2—3pyreni. — Inter dumeta regionis mediae calid. — Ad Orahovo distr. Kuči (Sz).

2154. *C. monogyna* JACQ. var. *typica* BECK. — Stylos 1, fructus ovati unipyreni. — In saxosis et fruticetis regionis infer. et mediae frequens. — Ad Cetinje (Pč, Kn), circa Grahovo et Danilovgrad (Pč), ad Medun (Ba), circa Bar, Ulcinj, Podgorica, Viljuša, Njeguši, Šavniki, coenob. Piva (Ro). — var. *azarella* (GRIS.) HAY. — Folia pilosa, pedunculi et calyces dense fere villose pilosi. — Orahovo distr. Kuči (Sz), Fundina distr. Kuči, Volubica prope Bar (Ba), Rijeka (Ro), insula Vranina (Eb).

— var. *panachaica* (C. K. SCHNEIDER) HAY. — Ramuli novelli laxe villosi, inflorescentia dense cano-villosa. — Kakavčićka gora prope Podgorica in regione inferiore (Ro), ad Cetinje et sub monte Rumija prope Bar (Ba).

### *Mespilus* L.

2155. *M. germanica* L. — In hortis culta.

### *Prunus* L.

2156. *P. spinosa* L. — In silvis et fruticetis regionis infer. et mediae frequens. — Ad Cetinje, Grahovo, Vir (Pč), circa Viljuša, Šavniki, Njeguši, coenob. Piva (Ro), ad Andrijevica et coenob. Morača (Ja). Verosimiliter etiam alibi.

\*2157. *P. pseudarmenaca* HELDR. et SART. — Rami glabri inermes; folia parva, elliptica vel elliptico-spathulata crenato-serrata glabra; flores bini albi; pedunculi brevissimi glabri; fructus ovato-globosi flavi, dein rubro-suffusi nutantes. — Ad pagum Poljice sub Somina planina ad confines Hercegovinae (fide K. MALÝ).

2159. *P. insititia* JUSL. — Colitur et non raro subsppontanea.

2160. *P. domestica* L. — Ut praecedens.

2162. *P. communis* (L.) FRITSCH. — In collibus ad Podgorica inquilina; etiam in regione mediterr. colitur.

\*2165. *P. prostrata* LABILL. — Fruticulus humilis squarroso-ramosus; flores subsessiles saepe solitarii parvi rosei;

folia parva suborbiculata vel ovata grosse biserrata. — In saxosis montis Lovćen clivo occident. (Pč, Ad).

\*2166. *P. fruticosa* PALL. — Ab affini *P. cerasso* distinguuntur: folia ramorum abbreviatorum brevissime petiolata obtusa parva (ad summum 3 cm), flores breviter pedunculati (1—2 cm), petala minora (5—7 mm). — In apricis vallis Zeta prope Danilovgrad (Pč).

2167. *P. cerasus* L. subsp. *eucerasus* A. GR. — Colitur et subspontanea.

— var. *marasca* (HOST) VIS. — Colitur.

2168. *P. avium* L. — In silvis montium Ivica et Javorje planina (Pč), circa Viljuša et Šavniki (Ro). Etiam colitur.

2169. *P. mahaleb* L. — In silvis regionis infer. et mediae calidioris frequens. — In tota Katunska nahija frequens (Pč, Ro); Lješanska nahija; Cetinje, Njeguši, Bogetići, Danilovgrad, Podgorica (Ro, Ba, Gi), Vrujca distr. Kuči (Ba).

2171. *P. laurocerasus* L. — In hortis colitur.

## *Papilionaceae*

### *Ceratonia* L.

2172. *C. siliqua* L. — Hinc inde in hortis culta.

### *Robinia* L.

2177. *R. pseudacacia* L. — Colitur et non raro subspontanea. Etiam in valle fl. Piva ad coenobium (Ro).

### *Colutea* L.

2178. *C. arborescens* L. — In saxosis et fruticetis regionis infer. et mediae calidioris frequens. — Pišine Strane in nahija Katunska et circa Grahovo (Pč); Cetinje (Kn), Medun (Sz), Riječani (Ho), ad coenob. Morača usque ad Bistrica (Ja), circa Vir, Podgorica, Danilovgrad, Kokoti, Njeguši, Viljuša; etiam in valle fl. Piva sub Borkovići cca 1200 m (Ro), in montibus Rumija et Kosa supra Bar; Limljani prope Vir (Do).

— f. *microphylla* TOMMASINI. — Foliola minora ad summum 5—6 mm longa. — Prope Vir (Ba).

*Astragalus* L.

2182. *A. hamosus* L. — Legumen hamatum 1,5—3 cm longum, stipulae fere vaginiformes apice liberae folio oppositae, flores dilute flavi cca 7 mm longi; inflorescentia primum globosea demum elongata, pedunculo folio suffulcrante breviore. — In herbidis regionis infer. mediterr. — Ad Bar et Ulcinj (Ro).

2191. *A. sesameus* L. — A praecedente dignoscitur: stipulae liberae; racemi subsessiles capitati 4—10flori; flores coerulentes, legumina erecta. — In graminosis siccis regionis inferioris mediter. ad Podgorica (Ro).

2192. *A. Gremlii* BURN. (= *A. purpureus* KOCH; ROHLENA non LAM.) — Perennis; caulis adscendens adpresso pilosus, capitula 10—20 flora, pedunculo folio suffulcrante longiore; corolla purpurea, vexillo alis multo longiore; legumen albo-villosum; stipulae connatae. — In graminosis subalp. et alp. — In monte Kom (Pt, Pč, Ro); Mrčenov do, Bijela Voda, Groblje sub monte Kom (Pč, Ro), Vališnica in monte Durmitor, Javorje planina, Piperska Lukavica, Štirni do; etiam ad Lijeva Rijeka (Ro), Vermoš planina (Df), Sinjavina planina loco Crvena ploča (Ba), supra Crno jezero et Ledena pećina in monte Durmitor (De, Si).

2193. *A. glycyphylloides* L. — In fruticetis et ad margines silvarum regionis infer. et subalp. — Crna planina et Mali Durmitor (Pt); supra coenob. Morača (Pč), Skrobotuša sub monte Vila (Sz), ad pedem montis Kom Kučki (Ho), Matoševo et Kolašin in valle fl. Tara; Pivljan supra Kolašin (Ja), circa Bar, Ulcinj, Vir, Viljuša, Andrijevica (Ro), Sutorman supra Bar (Eb).

— f. *bosniacus* BECK. — Inflorescentiae axes cum calycibus pilis nigris brevibus obsitae. — Cum typo ad coenob. Piva, Viljuša et Njeguši (Ro); in silvis montis Sutorman supra Bar (Do), ad Orak distr. Piva (De, Si).

2194. *A. glycyphylloides* DC. — A praecedente discrepat: caulis adscendens vel erectus parce hirsutus; foliola subtus parce hirsuta; calyx pilis nigris adpressis dense obsitus, dentibus tubo dimidio brevioribus, legumina oblongo-lanceolata parce pilosa. — In dumetis et silvis regionis subalp. — In monte Gradište supra Kolašin (Ba); an ad var. sequentem pertinet?

— var. *serbicus* BECK. — Foliola conspicue acutata subtus copiose pilosa; dentes calycini tubo fere aequilongi. — Zaka-

men supra coenob. Piva, in monte Balj supra Andrijevica 1100—1400 m (Ro), in valle fl. Peručica sub monte Kom (Pt fide BECK).

2195. *A. cicer* L. — In pratis pinguibus regionis inferiores ad Vir (Pč).

2199. *A. australis* (L.) LAM. — In rupestribus alp. — Durmitor jugo Šljeme (Pč Elench. 23), in monte Kozin pogled prope Ravno distr. Piva (Ro); in monte Durmitor locis pluribus: Čirova pećina, Savin Kuk, Ledena pećina, supra lacum Crno jezero (De, Si).

2213. *A. depresso* L. — In lapidosis et saxosis subalp. et alp. — Crna planina, Kom, Mali Durmitor (Pt), in montibus Lovćen et Jastrebica (Pč, Pichler), supra Njegusi (Pej, Ro), Kolašin in valle fl. Tara (Ro), Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si, No).

— f. *leucophaeus* (SM.) ASCH. et KAN. — Cum typo in alp. montis Kom (Pt).

2224. *A. vesicarius* L. var. *pastellianus* (POLL.) RCHB. — In rupestr. et gramin. siccis regionis mediae et alp. — In monte Lovćen (Ba, Ro), in montibus Rumija supra Bar (Ba, Do), Štirni do, Konjsk et Lukavica planina; Ledenica planina et Božur supra coenob. Piva (Ro), Durmitor loco Savin Kuk; Krivi do et Orak distr. Piva (De, Si). Occurrunt etiam formae, quae ± ad var. *albidum* (W. K.) BECK et ad var. *hercegovinum* BECK spectant.

2231. *A. vegliensis* SADL. — „Calyx post anthesin non inflatus, foliola linearilanceolata incano-sericea; racemi laxi pedunculo folio 2—3plo longiore; stipulae parvae ovatae acutae; corolla coerulea, calyce duplo longior.“ — In saxosis ad Cetinje (Pč).

2237. *A. onobrychis* L. — In cultis ad Grahovo, in asperis montis Ivica (Pč), in excelsis montis Rumija 1600 m (Ba).

2242. *A. illyricus* BERNH. — In lapidosis et graminosis regionis infer. et subalp. — Štirni do et Pavlova livada (Ho); Kakarička gora ad Podgorica (Ro).

? — var. *dinaricus* BECK (an *A. Spruneri* var. *glabrescens* PANČ. Elench. 24?). — „In saxosis supra Mrčenov do sub monte Kom cum *A. purpureo*; utrimque fructificantem recognosco“

vit cl. GRISEBACH; si revera hujus loci sistit formam alpestrem, omnibus partibus reductam etiam leguminibus 1 cm longis et 4 mm latis.“ — PANČ. l. c.

2245. *A. Fialae* DEG. Oe. B. Z. L:242. — Ab *A. vesicario* dignoscitur: caulis valde abbreviatus folia et pedunculi subbasilares, foliola 8—12juga incano-sericea; calyx campanulatus patule albe et nigre pilosus; legumen albe et nigre pilosum. — In rupestr. alp. — Crno jezero sub monte Durmitor (Pt sub *A. melanocephalus*), in monte Dibala prope Katunska Kostiča, in montibus Vila et Pešnjak distr. Kuči (Ba), Javorje planina et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro), in pascuis Margarita sub monte Kom, in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), Prokletija, Vermoš planina (Df).

2251. *A. angustifolius* LAM. subsp. *euanagustifolius* HAY. (conf. ROHLENA V. Beitr. 32). — In saxosis summi montis Lovćen (Pč, Ba, Kš, Vh, Pej, Ro).

### Oxytropis DC.

? 2252. *O. pilosa* (L.) DC. — In herbidis alp. Lukavica planina (Ho).

2254. *O. campestris* (L.) DC. subsp. *eucampestris* HAY. — In pascuis regionis alp. dicionis septentr. — Kom, Sinjavina, Durmitor (Pt, Pč, Sz, Ba, Ro), Javorje planina, Jablan vrh (Ro).

— subsp. *dinarica* MURB. (= *O. argentea* corollis sulphureis PANT. Adnot. 128). — „Bracteae saepissime ad summum dimidia longitudine tubi calycini; planta patule pilosa; flores dilute flavi.“ — In alp. montium Kom, Durmitor (Pt, Ba, De, Si, Ro); Planine Kučke: Žijovo, Planinica, Mojan, Hum Orahovski, Vila (Ba), Jablan vrh in Sinjavina planina (Ba, Ro), Maglić Pivski (Ro). Formae intermediae non raro: Margarita sub monte Kom (Ja), Fuša Rudnices supra Gušinje (Df).

2257. *O. montana* (L.) DC. subsp. *Jacquinii* (BUNGE) HAY. — In herbidis alp. montis Durmitor jugo Šljeme (Pč).

### Galega L.

2264. *G. officinalis* L. — In fruticetis et pratis humidis regionis infer. — Ad Rijeka (Pt, Pč), Sinjac (Pč), sub monte

Rumija (Ba); Plavnica (Sz, Ro), Ulcinj, Podgorica, Danilovgrad (Ro), Bar (Ro, Do), Vir (Eb, Ro).

— f. *laxiflora* GREC. — Folia latiora, pedunculi folio breviores vel subaequilongi, racemi laxi pauciflori. — In litore ad Novi Bar (Do).

*Psoralea* L.

2265. *P. bituminosa* L. — In graminosis et fruticetis regionis inferioris mediterr. — Ad Vir et Limljani (Pč, Ro); Gradjani (Ba), Ulcinj, Bar, Rijeka, Podgorica, Kokoti (Ho, Ro), Nikšićko polje (Ba), Crmnica (Eb).

*Vicia* L.

2272. *V. narbonensis* L. subsp. *eunarbonensis* HAY. — In graminosis et dumetosis regionis infer. — Ad Boljevići prope Vir (Pč), circa Bar (Ro).

— subsp. *serratifolia* (JACQ.) VELEN. Fl. Bulg. 162. — Foliola et bracteae dentatae racemi 2—6flori. — In dumetosis et incultis regionis infer. — Circa Vir, Kokoti, Danilovgrad, Zagarač, Komarni prope Rijeka, Lastva čevska in nahija Kastunska — 1000 m (Ro).

2272b. *V. faba* L. — In agris colitur.

2273. *V. lathyroides* L. — In graminosis. — Ad Njeguši (Pč, Ba), circa Vir (Pč).

2274. *V. lutea* L. var. *hirta* LOIS. — In agris et dumetosis regionis inferioris. — In campo Donja Zeta, ad Plavnica, Podgorica, Drušići prope Rijeka (Ro).

2275. *V. melanops* S. S. — A praecedente dignoscitur foliolis ovalibus vel oblongis (nec linearibus vel linearioribus oblongis); dentes calycini superiores inferioribus parum (nec dimidiatio) breviores; corollae vexillum dilute flavum, alae macula nigra notatae; legumen glabrum (nec hispidum). — In agris et graminosis regionis inferioris. — Ad Njeguši (Pt), circa Bar et Ulcinj (Ro).

2277. *V. peregrina* L. — In graminosis, agris, dumetosis regionis calidioris. — Ad Klopot distr. Bratonožići (Pč), Bar (Ro).

2279. *V. grandiflora* SCOP. var. *rotundata* (SER.) JANCH. — In gramin. et dumetosis regionis infer. et mediae.

Zagarać supra Danilovgrad, Lastva čevska loco Vojnići (Pt), in valle fl. Zeta sub Danilovgrad (Pč), Medun supra Podgorica (Sz), Cetinje, Čevo (Ho, Ro), Velki Mikulić sub monte Rumija, Dedići distr. Primorje (Ba), Bar (Ro, Do), Ulcinj, Vir, Podgorica, Viljuša, Rijeka, Dobrsko selo, coenob. Piva, Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro), Rikavac distr. Kuči; mons Gradište supra Kolašin (Ba).

\*— — — f. *polychroma* G. BECK. — Krstac supra Kotor (B), Velki Mikulići supra Bar (Do).

— — — subvar. *serrata* (PANT.) ROHL. IV. Beitr. pag. 43. — Foliola argute serrata dentibus utrimque 3—8. — Cum typo ad Podgorica loco Zelenika (Ro), ad Krstac prope Njeguši in formis appropinquatis (B).

— — var. *Kitaibeliana* KOCH Syn. 197 ed. 1. — Foliola latitudine 3—5 plo longiora. — Ad Njeguši et Dobrsko selo (Pt); circa Podgorica (Ro), insula Vranina (Eb).

2280. *V. sepium* L. — In graminosis et dumetosis regionis montanae et subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), Štirni do prope Lukavica planina (Ho, Ro), Treblješ luka (Ho), circa Andrijevica (Ro), Han Garančić prope Košašin (Ja), Volujačko jezero (Ma).

2282. *V. sativa* L. subsp. *notata* (GILIB.) A. G. — In graminosis et agris regionis mediae. — Ad Njeguši et Čevo distr. Katunska (Pč); Nikšić (Ro), in valle Perućica sub monte Kom; Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

— — subsp. *cordata* (WULF.) ASCH. GR. — A typo differt floribus minoribus (cca 10—15 mm) concoloribus purpureo-violaceis, leguminibus non torulosis. — In campo ad Cetinje (Kš).

— — subsp. *angustifolia* (REICH.) A. GR. var. *segetalis* (THUILL.) SER. — In dumetosis et agris ad Drušići prope Rijeka et circa Podgorica (Ro).

— — — f. *variifolia* NEILR. — Cum typo ad Podgorica (Ro).

— — — var. *nigra* L. — Foliola foliorum superiorum linearia 1,5—3 mm lata; legumen calycem non rumpens. — In graminosis ad Bar (Ro).

2284. *V. hybrida* L. — In graminosis et dumetosis regionis infer. — Circa Bar et Ulcinj (Ro).

2285. *V. pannonica* CR. subsp. *eupannonica* HAY.

— In agris et cultis. — In valle fluminis Lim prope Andrijevica (Ro), Lazarev štit prope Njeguši (Ro, Pej).

— subsp. *striata* M. B. — Lazarev štit prope Njeguši.

2287. *V. bithynica* L. — In graminosis regionis infer. mediterr. — Circa Bar, Ulcinj, Podgorica (Ro).

2288. *V. montenegrina* ROHL. in FEDDE Repert. III: 146. — Habitu *V. cassubicae* L. similis: glabra, tantum foliorum petioli sparse pilosi; folia ecirrhosa et exaristata (foliola terminalia gerentia) dispariter 8—12juga, rhachide basi latius superne angustius alata, foliola breviter petiolata oblonga 10—25 mm longa 4—8 mm lata basi subrotunda apice obtusissima vel subtruncata breviter apiculata subtus pallide viridula et sublucida, margine cartilagineo-denticulata pilosa; stipulae inferiores semisagittatae basi 2—3dentatae, superiores anguste lineares; racemi cca 10flori folio suffulcrante aequilongi vel parum longiores; pedunculi floriferi calycis tubo sublongiores; calyx campanulatus oblique truncatus glaber solum ad marginem breviter ciliatus, dentibus superioribus cca 3 mm, inferioribus 1—1,5 mm longis; corollae coeruleae, legumina oblonga 20 mm longa, 5 mm lata, seminibus oblongis subcylindricis e lateribus paulo compressis 4—4,5 mm longis, 2—2,5 mm latis, pallide brunneis levibus haud lucidis. — In silvis regionis subalp. cca 900—1400 m raro. — Šavniki sub monte Ivica; Zakamen supra coenob. Piva, in valle fl. Peručica sub monte Kom (Ro).

2289. *V. onobrychoides* L. — „Folia cirrhifera, foliola 6—11juga lanceolata vel linearia; stipulae semi hastatae dentibus paucis angustis; racemi laxi pedunculo stricto folium superante; flores 2 cm longi pulchre coeruleo-violacei.“ — In dumetosis et graminosis regionis subalpinae usque ad 1500 m. — In montibus Jerinja glava, Balj, Žoljevica prope Andrijevica (Ro, Sk), Božur planina distr. Piva (Ro), Pivska planina ad Nedajno, Pišće, Krstac (De, Si).

2291. *V. dumetorum* L. — In silvis et dumetis regionis infer. et mediae. — Ad rivum Sušica prope Danilovgrad (Pt), in valle fl. Tara (Pč, Ja), in declivi montis Balj supra Andrijevica (Ro).

2292. *V. pisiformis* L. — A cl. HAYEK e Montenegro indicata. Locus mihi ignotus.

2293. *V. silvatica* L. — In silvis et dumetis regionis mediae et subalpinae usque ad 1400 m. — Ad lacum Crno jezero sub monte Durmitor (Pč), in valle fl. Tara inter Han Garančić et Kolašin (Ja), Bijela supra Šavniki; in monte Jezinja glava supra Andrijevica (Ro).

2298. *V. Sibthorpii* BOISS. — In silvat. circa pagum Kovčice ad pedem montis Mali Durmitor (Pt).

2300. *V. tenuifolia* ROTH subsp. *eutenuifolia* A. GR. — In pratis, herbidis, dumetis regionis infer. et subalp. — Ad Danilovgrad (Pt), circa Grahovo (Pč), Štirni do prope Lukavica planina (Ho), Viljuša, Njeguši, Goraško, Borkovići, Ljut supra coenob. Piva; in valle fl. Perućica sub monte Kom forma foliolis angustioribus ( $1\frac{1}{2}$ —2 mm) ad subsp. sequentem vergens (Ro); Krivi do supra Aftovac ad confines Hercegovinae, ad Orak supra vallem Vrbnica distr. Piva (De, Si).

— f. *luxurians* VIS. — Foliola latiora (usque 6 mm), apice subito truncata, mucronata. — In pratis montanis ad Nedajno in Pivska planina 1400 m (De, Si).

— subsp. *stenocephylla* (BOISS.) VELEN. Fl. Bulg. 163. — In saxosis calcar. ad Medun prope Podgorica (Sz).

2301. *V. cracca* L. subsp. *vulgaris* GAUD. — In pratis et dumetis regionis infer. et mediae. — Ad Danilovgrad (Pt), circa Kolašin (Pč, Ja), in monte Dziebeze distr. Kuči (Sz), ad Rijeka (Ho), Cetinje (Ba), ad Njeguši (Gi, Ro), ad Šavniki, Viljuša, Bar, coenob. Piva (Ro).

— f. *oxyphylla* BECK. — Krstac prope Njeguši (Ro).

— subsp. *incana* (VILL.) ROUY. — A typo dignoscitur: tota planta copiose patule pilosa, saepe sericeo-villosa, stipulae maiores, stipes leguminis calyce longior. — In dumetosis et graminosis regionis mediae, subalpinae et alpinae. — In monte Durmitor (Pč, Ro, De, Si), in monte Dibala supra Kostića distr. Kuči (Ba), in monte Balj supra Andrijevica; Štirni do prope Lukavica planina (Ro), in monte Pivljan supra Kolašin 1900 m (Ja), in monte Lovćen (Ro), inter Njeguši et Cetinje cca 1000 m forma foliolis 15—20 mm longis, 3—4 mm latis paucioribus minus densis; habitu omnino *V. craccae* typicae (Ld).

\*2302a. *V. villosa* ROTH. — In pratis ad Njeguši (Pej, Ba).

\*2302b. *V. dasycarpa* TEN. var. *malisorica* ROHL. V. Beitr. 35. — A typo differt foliolis angustissimis acutis paucijugis, floribus minoribus, leguminibus minoribus (7—8 mm latis, 20 mm longis) (1)—2spermis. — Inter dumeta ad confines Albaniae prope Podgorica (Ro), in arenosis maritimis ad Bar et ad Njeguši loco Grašina in forma typica (Do, Pej, Ro). — var. *glabrescens* (KOCH) BECK. — Inter segetes et in dumetis regionis infer. et mediae. — Ad Cetinje et Vir (Pč); Rijeka, Podgorica, Gornje blato (Ho), inter Monastir Morača et Bistrica; Kralje prope Andrijevica (Ja), circa Bar et Podgorica (Ro).

2305. *V. cassubica* L. — In dumetis et ad margines silvarum reg. infer. et subalpinae. — Orlova Skala sub monte Kom (Pt), in valle fl. Perućica sub monte Kom (Pt, Ro), ad latera montis Zeblje prope Godinje supra Vir (Ro).

\*— var. *adriatica* FREYN. — Foliola linearilanceolata; racemi 4—7flori; vexillum basi album. — Cum typo ad Boljevići supra Vir cca 100 m (Ro).

2312. *V. hirsuta* (L.) S. F. GRAY. — In graminosis et agris regionis infer. et mediae. — Circa Bar et Andrijevica (Ro). — var. *sardoa* (MORIS) HAY. — „Stipulae linearisetaceae longe ciliatae; legumen obscure fuscum fere glabrum.“ — Circa Vir et Boljevići — 200 m (Ro).

2314. *V. ochroleuca* SPR. var. *dinara* (BORB.) K. MALY. — In dumetis et graminosis regionis calidioris. — Ad Njeguši (Pt, Ba, Gi), Cetinje (Ba), in monte Lovćen (Eb, Ho), Vjetnik, Jablan, Lopate distr. Bratonožići (Ja).

— f. *nigropunctata* (SAG.) ROHL. — Carina apice nigrescens. — Krstac prope Njeguši (Pej, Ro), ad latera montis Lovćen (Kš).

— subf. *angustana* ROHL. V. Beitr. 36. — Foliola anguste linearia 1,5—2 mm lata. — Krstac prope Njeguši (Ro, Pej).

2315. *V. gracilis* LOIS. — A *V. tetrasperma* dignoscitur: foliola acuta; racemi 1—5flori folio longiores; corolla palea coerulescens; legumen 5—6spermum. — In graminosis regionis infer. raro. — Ad Bar (Ro).

2316. *V. tetrasperma* (L.) MCH. — In graminosis et cultis regionis mediae. — Ledenica planina distr. Piva (Ro), circa Andrijevica (Ro, Df), in monte Lovćen (To).

*Ervum* L.

2319. *E. lens* L. — In agris culta et saepe subspontanea.

2320. *E. nigricans* M. B. — Patule pubescens; foliola 3—4juga; pedunculi folio longiores; corolla pallide coeruleascens; pedunculus aristatus, legumen glabrum. — In herbidis regionis infer. mediterr. — Circa Podgorica (Ro).

2321. *E. ervooides* (BRIGN.) HAY. (= *E. pubescens* ROHL. I. Beitr. 79 non DC.). — Adpresse pubescens; pedunculi non aristati; legumen pilosum; corolla coerulea. — In lapidosis et herbosis regionis infer. mediterr. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Boljevići, Godinje (Ro).

*Lathyrus* L.

2322. *L. aphaca* L. — In lapidosis, graminosis, dumetis, cultis regionis calidioris — 1000 m. — Dobrsko selo, Rijeka (Pt), circa Ulcinj, Bar, Vir, Boljevići, Cetinje, Njeguši (Ro), Mali Šavnik sub monte Lovćen (Pej).

— f. *affinis* (GUSS.) CESS. et f. *biflorus* POST. — Cum typo ad Krstac prope Njeguši (ROHL. V. Beitr. 36).

2323. *L. nissolia* L. — In dumetis et graminosis regionis calidioris. — In valle fl. Zeta sub Danilovgrad (Pč), circa Njeguši (var. *puberulus* BECK = *genuinus* ASCH. GR.; Pej, Ro).

2327. *L. cicera* L. — In graminosis et agris regionis infer. mediterr. — Circa Bar et Ulcinj; ad Bioče prope Podgorica culta et subspontanea (Ro).

2332. *L. annuus* L. — In herbidis et dumetosis regionis infer. mediterr. — Circa Podgorica, Boljevići supra Vir, Rijeka, Drušići, Kokoti, Duklja (Ro), Bar (Ro, Do).

— subf. *luxurians* ROHL. I. Beitr. 18. — Petioli latius alati, alae pilis tuberculo insidentibus sparse obsitae. — Cum typo ad Boljevići supra Vir (Ro).

2334. *L. sphaericus* RETZ. — In agris, vineis, dumetis regionis inferioris. — In campis ad Kunja distr. Primorje (Ba), circa Bar, Ulcinj, Boljevići, Godinje, Vir, inter Kotor et Njeguši; etiam ad Andrijevica (Ro).

2335. *L. inconspicuus* L. var. *stans* VIS. — In agris ad Cetinje (Pt).

2337. *L. setifolius* L. — In herbidis et pratis regionis infer. mediterr. — Ad Boljevići supra Vir (Pč), circa Podgorica et Bar (Ro).

2338. *L. hirsutus* L. — In agris, vineis, dumetis regionis infer. mediterr. — Dobrsko selo, Piperi, Danilovgrad (Pt), Gornje blato ad Rijeka (Ho), in campo ad Bar (Ba), Kokoti, Rijeka, Boljevići, Godinje supra Vir (Ro).

2339. *L. pratensis* L. — In pratis et dumetis regionis infer. (raro) et subalp. — Ad Vir; in valle Perućica sub m. Kom; Kovčice ad pedem montis Durmitor (Pt), Štirni do et Pavlova livada prope Lukavica planina (Ho), Šavniki, coenob. Piva, Ledenica planina, Lastva čevska, Velestovo in nahija Kačunska, Njeguši, Andrijevica (Ro), circa Kolašin frequens (Ja), Vunsaj prope Gusinje (Df), in monte Lovćen (Eb).

— f. *velutinus* DC. — Ad Njeguši (Ro).

2341. *L. tuberosus* L. — In agris regionis infer. et mediae. — Seoce sub monte Balj prope Andrijevica (Ba), Njeguši (Ho, Ro), ad coenob. Piva, Mratinje sub monte Maglić; Tudjemile prope Bar (Ro), in monte Lovćen (Kš, To).

2344. *L. silvester* L. — In silvis et dumetis regionis infer. et subalp. — Ad Danilovgrad (Pt); coenob. Morača (Pč), Podgorica, Konjsk planina (Ho).

2345. *L. membranaceus* PRESL. (= *L. ensifolius* BA-DARO). — Ad margines silvarum et in dumetis regionis mediae. — Kralje prope Andrijevica cca 1000 m; in valle fl. Tara inter Matoševo et Kolašin (Ja), Bukovica sub monte Durmitor cca 1300 m (Ro).

2346. *L. megalanthus* STEUD. — In dumetis, lapidosis, ad marginem silvarum e regione infer. usque ad subalp. — 1600 m. — Ad Njeguši, Vir (Pč), Orahovo distr. Kuči (Sz), inter coenob. Morača et Kolašin, in valle fl. Tara ad Matoševo, in montibus Peh et Glave supra Kolašin (Ja), ad latera montis Rumija supra Bar (Ba, Do), Kralje prope Andrijevica (Ja, Ro), Barno jezero et Bukovica sub monte Durmitor; coenob. Piva, Šavniki, Boljevići supra Vir, Perućica sub monte Kom, Viljuša ad fines Hercegovinae; in valle fl. Lim sub Andrijevica (Ro), Crna planina (Ba), Topolica prope Bar (Do), in monte Lovćen (To).

— var. *obtusifolius* (BECK) HAY. — Foliola late elliptica 4—8 cm longa et 2—4 cm lata. — Cum typo rarius.

— var. *lanceolatus* (FREYN) GINZB. — Foliola minora 1,5—5 cm longa latitudine 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> plo longiora; alae petiolorum cumala caulina fere aequilatae. — Ad Njeguši et Oražhovo (Sz); Bioče prope Podgorica (Ro), Velji Šavnik in monte Lovćen, Žanjev do prope Njeguši (Pej, Ro).

2354. *L. pannonicus* (JACQ.) GARCKE var. *versicolor* (GMEL.) K. MALÝ. — Radices elongati 10—20 cm longi; racemi folio aequilongi vel breviores; dentes calycini superiores glabri. — In pratis humidis, in dumetis regionis montanae, usque ad 1500 m. — Krstac prope Njeguši, in montibus Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

2356. *L. filiformis* (LAM.) J. GAY. var. *ensifolius* (LAP.) HAY. — In pratis et dumetis regionis subalpinae usque ad 1800 m. — Sinjavina planina et circa pagum Kovčice sub monte Mali Durmitor (Pt); in pascuis elatioribus montis Durmitor (Pč sub *Orobo sessilifolio*); Božur planina distr. Piva, Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

— f. *Nicolai* ROHL. III. Beitr. p. 26. — Sepala glabra. — Cum typo ad Bukovica (Ro), Pivska planina prope Pišće et Nedajno (De, Si).

2357. *L. montanus* BERNH. — A cl. HAYEK e Monte negro indicatus; locus mihi ignotus.

2360. *L. vernus* (L.) BERNH. — In silvis et dumetis regionis montanae et subalpinae usque ad 1800 m. — In valle fl. Tara ad Kolašin (Pč), ad latera montis Dziebeze distr. Kuči (Sz), Cetinje (Ba), in montibus Vojnik, Maglić; sub monte Kom Vasojevički; Varda supra coenob. Piva (Ro), Sustorman supra Bar (Eb).

2361. *L. venetus* (MILL.) WOHLF. — In silvis et dumetis regionis infer. et mediae usque ad 1700 m. — Ad Cetinje (Pč, Ld); Njeguši (Ki, Ho, Ld, Pej), Jezerski vrh in monte Lovćen (Ho), Dobrsko selo prope Cetinje, Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Milušina pećina in nahija Katunska, coenob. Piva, in montibus Jerinja glava et Žoljevica prope Andrijevica, in valle fl. Lim (Ro); Vermoš planina (Df), in montibus Troica et Rasovatac prope Vir (Eb).

— f. *acutifolius* ROHL. V. Beitr. 37. — *Foliola ovato-lanceolata* longe acuminata. — Cum typo ad latera montis Balj supra Andrijevica (Ro).

\* — var. *longipes* ROHL. in FEDDE Rep. 1937 pag. 202. — *Racemus longe pedunculatus folio suffulcrante duplo longior* ut in var. *rigido* (LANG) K. MALÝ, quae differt pedunculo glabro et leguminibus eglandulosis. Occurrit etiam forma floribus albis (= *f. albescens* ROHL. l. c.). — In dumetis ad Njeguši loco Djekojački do (Pej).

2362. *L. niger* (L.) BERNH. — In silvis et dumetis regionis calidioris. — Velki Mikulić supra Bar (Ba).

— f. *longipes* (ROHL.) LINDB. (= *Orobos niger* var. *longipes* ROHL. I. Beitr. 18). — *Racemi pedunculis (praesertim superioribus) elongatis folio suffulcrante multo (usque 3plo) longioribus.* — Inter dumeta ad Viljuša, Njeguši, Mratinje sub Maglić, Boljevići supra Vir, Mali Šanik sub monte Lovćen (Ro).

— f. *protensus* ROHL. in A. GR. Syn. VI. 2: 1053; V. Beitr. 37. — *Foliola 7–11-juga linearis-lanceolata.* — Ad Njeguši sub monte Lovćen (Ro).

\*2363. *L. luteus* (L.) PETERM. var. *laevigatus* (W. K.) BECK. — In dumetis ad Grahovo (Pč).

### *Pisum* L.

2364. *P. elatius* STEV. — In graminosis et dumetosis regionis infer. mediterr. — Dobra Voda prope Bar; Duklja prope Podgorica (Ro).

\*2365. *P. sativum* L. subsp. *arvense* (L.) A. GR. — In campo supra Seoce, mons Balj distr. Vasojevići (Ba); forma e loco sicco corollis albicantibus parvis.

— subsp. *hortense* (NEILR.) A. GR. — In agris et hortis culta et non raro subspontanea.

### *Phaseolus* L.

*P. vulgaris* L. — In hortis colitur.

### *Ononis* L.\*)

2369. *O. breviflora* DC. — Annua, patule glandulosos-

\*) Confer: ŠIRJAEV: Generis *Ononis* L. revisio critica (Beihefte z. Bot. Centralblatt 1932).

pilosa; folia media ternata, infima et suprema simplicia; flores pallide flavi laxe racemosi; corolla calyce brevior; pedunculi articulati longe aristati; legumen calyce duplo longius pendulum. — In arenosis maritimis ad Ulcinj (Ro).

2373. *O. reclinata* L. var. *mollis* HELDR. — Annua, glandulosovillosa, folia infima simplica, cetera ternata, foliolis cuneato-ovovatis supra medium subserratis; stipulae ovatae dentatae; flores minutus rosei vel purpurei calyce breviores vel aequilongi; pedunculi articulati uniflori submutici; legumen hirsutum calyce parum longius pendulum. — In apricis et saxosis regionis infer. mediterr. — Circa Bar (Ba, Ro); Ulcinj (Ro).

2375. *O. pusilla* L. — A cl. HAYEK, ASCHERSON et GRAEBNER e Montenegro indicata; verosimiliter ad Bar et Ulcinj, sed locus mihi ignotus.

2383. *O. antiquorum* L. — A cl. HAYEK e Montenegro indicata (conf. ASCH. GR. Syn. VI. 2: 354). Locus mihi ignotus.

2385. *O. procurrens* WALLR. — Vide no. 2387.

\*2386. *O. spinosa* L. — In ruderatis, incultis, ad vias regionis infer., montanae, subalpinae. — Ad Danilovgrad (Pt, Pč), sub monte Kom Kučki (Ho), Bežijovo distr. Kuči (Ba), circa Njeguši (Ba, Pej, Ro), Viljuša (Ro).

2387. *O. hircina* JACQ. var. *spinescens* LED. (= *O. arvensis* ROHL. I. Beitr. 14 nec alior.). — In dumetis, graminosis, ad vias regionis infer. et mediae. — Ad Kralje, Matošev, Kolašin (Ja), circa Podgorica, Spuž, Danilovgrad, Andrijevica, Pošćensko jezero supra Šavnik, Mratinje sub monte Maglić (Ro), Torinje prope Njeguši (Pej).

\*— — — f. *spinosa-hircina* (FEICHT.) ŠIRJ. (= f. *pseudospinosa* ROHL. IX. Beitr. 11). — Caulis et ramuli unifariam nec circumcirca hirsuti ut in *O. spinosa*. — Ad Njeguši (Pej, Ro); ad Bar (Do).

### *Trigonella* L.\*)

2394. *T. monspeliaca* L. — In arenosis, lapidosis, colibus siccis regionis infer. mediterr. — Circa Bar, Ulcinj, Podgorica (Ro).

\*) Confer G. ŠIRJAEV „Generis *Trigonella* L. revisio critica“. Public. de la Faculté des sciences de l' univers. Brno.

\*— f. *leiocarpa* KOCH. — „Foliola integra, legumina ova-  
riumque toto glabra.“ — Cum typo ad Podgorica (Ro).

2398. *T. corniculata* L. — In herbidis et cultis regi-  
onis infer. mediterr. — Circa Vir et Danilovgrad (Ro); Bar  
(Ro, Do).

*Medicago* L.

2405. *M. marina* L. — Tota planta dense albo tomentosa.  
— In arenosis maritimis ad Bar (Ba, Ro, Do) et Ulcinj (Ro).

2406. *M. sativa* L. — Culta et saepe subsppontanea. —  
Cetinje, Danilovgrad (Pt), Blatište in monte Lovćen (Kš), Ko-  
kot i nahijsa Lješanska etc. (Ro).

× *M. falcata* × *sativa* = *M. varia* MARTYN. — Inter  
parentes non raro.

2407. *M. falcata* L. — In graminosis regionis infer. et  
mediae. — Ad Njeguši (Pč), Cetinje (Pč, Kn), Orahovo distr.  
Kuči (Sz), Andrijevica (Ro, Ja), Šavniki, Borkovići, coenob.  
Piva, Podgorica (Ro), Kolašin (Ja).

— var. *viscosa* RCHB. (= var. *glandulosa* KOCH; conf.  
ROHL. V. Beitr. 29). — Legumen glandulosopilosum. —  
Cum typo ad Njeguši (Gi, Pej).

— f. *glutinosa* (M. B.) BECK. — Etiam calyces cum  
pedicellis glandulosi. — Cum praecedente rarius.

2409. *M. lupulina* L. — In pratis et agris regionis infer.  
et subalp. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), ad Vir (Pč),  
Cetinje (Kn), Mokra sub monte Dziebeze (Sz), circa Kolašin  
(Ja), ad Bar, Rijeka, Njeguši, Viljuša (Ro), Crmnica (Eb).

— f. *glandulosa* KOCH. — Legumina et pedunculi patule  
glandulosopilos. — Non raro cum typo: Viljuša, coenob.  
Piva, Andrijevica, Trešnja prope Njeguši (Ro).

2410. *M. prostata* JACQ. — In rupestribus et gramino-  
sis reg. infer., montanae, subalp. — Ad Šavniki et Danilovgrad  
(Pt); sub Javorje planina (Pč), Medun supra Podgorica (Sz),  
Čafa Gvozdeča sub Orahovo; Trijepši distr. Kuči (Ba), circa  
Bar, Ulcinj, Podgorica, Spuž, Velestovo in nahijsa Katunska;  
Borkovići supra coenob. Piva, inter Bojetići et Nikšić; nahijsa  
Lješanska; in monte Lovćen et circa Njeguši; Velki Zagarać  
supra Danilovgrad; in valle fl. Lim sub Andrijevica (Ro).

— f. *declinata* (KIT.) URB. — Cum typo ad Duklja et Podgorica; circa Šavniki sub Ivica planina; ad latera montis Jerinja glava prope Andrijevica (Ro).

— f. *glandulifera* URB. — Tota planta + glandulosopilosa.  
— In rupestr. ad Podgorica (Ro).

2412. *M. orbicularis* (L.) ALL. — In graminosis et vineis regionis infer. mediterr. — Circa Rijeka (Pt), Klopot distr. Bratonožići (Pč), circa Bar, Ulcinj, Rijeka, Podgorica, Vir, Kokoti in nahija Lješanska, Duklja (Ro).

\*2413. *M. scutellata* (L.) MILL. — Ad litora maris prope Ulcinj (Ba).

\*2416. *M. hispida* GAERTN. var. *denticulata* (WILLD.) URB. — In herbidis, cultis, ruderatis regionis infer. mediterr. — Circa Bar, Ulcinj, Rijeka, Podgorica (Ro).

\* — var. *lappacea* (DESR.) HALÁCSY. — In cultis regionis infer. mediterr. ad Rijeka (Pt); ad litora maris prope Ulcinj (Ba).

2421. *M. rigidula* (L.) DESR. — In graminosis, vineis, ad vias regionis infer. et montanae usque ad 1000 m. — Ad Cetinje (Pč, Kn), Podgorica (Ro, Ja), Danilovgrad, Bar, Rijeka, Njeguši (Ro).

\*2425. *M. litoralis* ROHDE var. *longiseta* DC. — In saxosis regionis inferioris mediterr. — Circa Bar et Ulcinj (Ro).

— var. *breviseta* DC. — A cl. HAYEK e Montenegro indicata; locus mihi ignotus.

2428. *M. arabica* (L.) ALL. — In herbidis, ruderatis, ad vias regionis infer. mediterr. — Ad Podgorica (Ja), circa Bar et Ulcinj (Ro).

2429. *M. minima* (L.) DESR. — In arenosis, lapidosis, graminosis regionis infer. et montanae. — Ad Cetinje (Pč), circa Bar, Vir, Rijeka, Boljevići (Ro), ad Ulcinj (Ba, Ro).

— f. *mollissima* (ROTH) KOCH. — Dense pubescentis tomentosa. — Cum typo ad Ulcinj (Ro).

— var. *longiseta* SER. — Spinae spirarum diametro longiores. — Rijeka, Monastir Duga (Pt), circa Podgorica (Ro, Ja), Lješko polje, Njeguši, Šavniki, Andrijevica (Ro).

*Melilotus* (L.) HILL.

2435. *M. italicus* (L.) LAM. — Stipulae foliorum mediorum conspicue dentatae; foliola supra medium dentata; racemi multi (30—40) flori folio duplo longiores; flores 6—9 mm longi aurei; legumen pendulum reticulato-rugosum; calyx fructu demum ruptus. — In rupestribus et lapidosis regionis infer. mediterr. — Ad Vir (Pč), circa Bar (Ro).

\*2438. *M. neapolitanus* TEN. — Stipulae linearis-acuminatae integrae; foliola antice serrata; racemi laxi 8—10 flori folio duplo longiores, fructiferi elongati laxissimi; flores 3—5 mm longi pallide flavi; pedunculi tubo calycino aequilongi; legumen erecto-patulum juvenile pilosum dein glabratum. — In glareosis, rupestribus, herbidis regionis infer. mediterr. — Tudjemile prope Bar (Ba), circa Spiza ad fines Dalmatiae et Montenegro, in campo Doljani ad ripam fl. Morača prope Podgorica (Ro).

2439. *M. officinalis* (L.) DESR. — In incultis, lapidosis, herbidis, ad vias in regione infer. et montanaea usque ad 1200 m. — Ad Danilovgrad (Pč), Cetinje (Kn), Andrijevica (Ho, Ro), in valle fl. Tara ad Han Garančić, Matoševko, Košašin frequens (Ja), Bar, Njeguši, Viljuša, Lastva čevska, Šavnik, coenob. Piva, Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro).

2440b *M. albus* LAM. — In incultis, glareosis, graminosis, in fruticetis regionis infer. et mediae. — Ad Vir (Pč), circa Andrijevica, coenob. Piva, Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro).

2441. *M. indicus* (L.) ALL. — Ab affini *M. neapolitanus* TEN. (2438) dignoscitur caule elatiore et robustiore, stipulis basi denticulatis, racemis densioribus, floribus minoribus (cca 2 mm) et legumine pendulo. — In arenosis et lapidosis maritimis ad Ulcinj (Ro).

*Trifolium* L.

2442. *T. filiforme* L. — A sequente (2445) dignoscitur vexillo basi non constricto fere levi dorso + carinato, legumine vexillo parum breviore, capitulis paucis (2—6) floris, dentibus calycinis subaequilongis, corollis minoribus (cca 2 mm longis). — In graminosis uidis et in fossis regionis infer. et mediae usque ad 900 m. — In valle fl. Sušica prope Danilovgrad (Pt), in pratis humidis ad Plavnica; circa Andrijevica (Ro).

2445. *T. campestre* SCHREB. — In pratis, agris, græ minosis siccis regionis infer. et subalp. usque ad 1800 m. — In valle Perućica et in pascuis sub monte Kom (Pt), ad Græ hovo, in monte Lovćen (Pč), ad Plavnica (Sz), ad Andrijevica (Ho), circa Kolašin frequens (Ja), ad Vir, Bar, Ulcinj; Trešnja supra Njeguši (Ro), insula Vranina (Eb).

— var. *pratense* (POSP.) ROHL. VI. Beitr. 22. — Caulis a basi ramosus; capitula magna ultra 1 cm longa et lata, flores aurei; pedunculi folio 2—3-plo longiores. — In pratis ad Podgorica regionis infer. mediterr. (Ro).

— f. *minus* (KOCH) HAY. (= *T. pseudoprocumbens* SCHREB.). — Ut praecedens sed capitula multo minora. — Ad Danilovgrad (Pt).

2450. *T. patens* SCHREB. — A *T. campestre*, cui silimis, prasertim var. *pratense* (POSP.) ROHL., dignoscitur stylo legumine fere aequilongo. — In pratis, herbidis, lapidosis regionis infer. mediterr. et mediae usque ad 900 m. — Ad Cetinje et Šavniki (Pt); circa Plavnica (Sz, Ro), ad Monastir Morača (Ja), circa Podgorica, Kokoti in nahija Lješanska, Bar, Rijeka, Boljevići, Vir; etiam ad Andrijevica in valle fl. Lim (Ro).

\*— f. *maximum* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Caulis ascendens ad 100 cm altus. — Ad lacum Plavsko jezero prope Gusinje (Boš).

2451. *T. Velenovskýi* VANDAS SBGW. 1888: 441, VELENOVSKÝ Fl. bulg. 143. — „Species decora ab affini *T. strepente* CR. dignoscitur: caulis saepe ramosior ramis longis, pedunculi tenuiores et longiores, color capitulorum colorem florum *T. patentis* potius aemulans; flores post anthesin non sunt dense imbricati ut in *T. strepente*, sed laxe divergentes capitulum globosum nec oblongum formantes; capitula 30—40-flora, dentes calycini superiores tubo aequilongi, ceteri eo triplo longiores; stipulae ovato-oblongae basi auriculato-subcordatae.“ (VELEN. I. c.). — In pratis et pascuis subalp. et alpinis usque ad 1900 m. — In monte Pivljan supra Kolašin cca 1500 m (Ja); Štirni do sub Lola planina cca 1900 m, in montibus Balj et Jerinja glava supra Andrijevica; ad lacum Barno jezero sub monte Durmitor, in nahija Pivska frequens: Varda, Ljut, Ledenica, Božur (Ro).

2452. *T. strepens* CR. — In pratis subalpinis. — Čafa Gvozdeča versus Orahovo (Ba), in valle Perućica sub monte

Kom (Ro), in monte Jerinja glava prope Andrijevica (Sk, Ro), ad Nedajno in Pivska planina (De, Si).

2454. *T. badium* SCHREB. — In pratis udis regionis subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina; Perućica sub monte Kom; circa pagum Kovčice ad pedem montis Durmitor (Pt), Crvena Stijena in monte Durmitor (Pč). Loca hic enumera verosimiliter ad subsp. sequentem spectant.

— subsp. *pseudobadium* (VELEN.) A. GR. Syn. VI, 2: 486. — Caulis erectus; stipulae inferiores elongatae lineares longe acuminatae, superiores linear-lanceolatae; dentes calycini tubo 2—3-plo longiores; color corollae sub anthesi eximie aurantiaco-fuscus tandem similis ei *T. spadicei*, cuius staturam potius refert quam *T. badii* (VELEN. Fl. bulg. 141). — In pratis et pascuis subalp. et alp. dicionis septentr. usque ad 1800 m. — Sub monte Kom Kučki (Ho); Piševo et Sjekirica planina supra Andrijevica; Bukovica et Barno jezero sub monte Durmitor (Ro).

2458. *T. montanum* L. — In herbidis et pascuis regionis montanae, subalp. et alpinae usque ad 2200 m. — In monte Durmitor (Pč), Jablan vrh in Sinjavina planina (Ba), in montibus Pivljan, Rudo brdo, Peh, Glave supra Kolašin (Ja); Borkovići et Goraško distr. Piva; Viljuša, Šavnik, Rudine nikšićke, mons Lovćen, Njeguši; inter Drežnica et Nikšić; Lukavica planina, Bukovica sub monte Durmitor, circa Andrijevica (Ro); Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

2464. *T. nigrescens* VIV. subsp. *eunigrescens* HAY. — A simili *T. repente* dignoscitur radice annua, caulis non ad nodos radicantibus adscendentibus, stipulis triangulari-lanceolatis, calycis laciniis demum sursum curvatis patulis, legumine 1—2spermo. — In locis graminosis, humidis, fossis, incultis regionis infer. mediterr. et montanae usque ad 1000 m. — Circa Cetinje et Grahovo (Pč), Doljani prope Podgorica, circa Bar (Ro).

— f. *prostratum* HAUSSK. — Caulis procumbens. — Cum typo prope Viljuša cca 1000 m ad fines Hercegovinae (Ro).

2468. *T. pallescens* SCHREB. — A *T. hybrido* dignoscitur caulis brevibus prostratis, foliolis obovatis, stipulis albo-membranaceis solum apice herbaceis. — In glareosis et pascuis regionis alpinae. — In montibus Kom et Mali Durmitor

(Pt), in monte Pivljan supra Kolašin cca 1950 m (Ja), Vermoš planina distr. Kuči (Df).

2469. *T. repens* L. — In graminosis, pratis pinguibus, pascuis e regione infer. mediterr. usque ad regionem alpinam. — In montibus Kom, Sinjavina planina, Durmitor (Pt, Ba, Pč), ad lacum Scodranum (Pč), circa Andrijevica (Ro, Ja), Bar, Ulcinj, Njeguši, Viljuša, Velestovo in nahija Katunska; Bjelastica planina (Ro), circa Cetinje (Kn), in monte Rumija (Do).

— f. *minus* BALD. apud ROHL. V. Beitr. 29. — Foliola perparva obcordata, pedunculi breviores, dentes calycini tubo breviores. — In herbidis sub monte Kunj Kostiča distr. Kuči. Num: collect. 183 (Ba).

2471. *T. glomeratum* L. — Annuum; folia superiora subsessilia; foliola obovato-cuneata spinuloso-denticulata; stipulae ovatae acuminatae integrae; capitula globosa parva subsessilia axillaria; flores sessiles vel brevissime pedicellati; calyx valide 10-nervius, laciniis aequalibus triangulari-ovatis acuminatis demum patentibus tubo parum brevioribus; corolla rosea calyce tertia parte longior. — In graminosis siccis regionis infer. mediterr. usque ad 200 m. — Drušći prope Rijeka; nahija Lješanska (Ro).

2472. *T. suffocatum* L. — A praecedente dignoscitur caulinibus abbreviatis ad summum 8 cm altis caespitem depresso-densum formantibus, capitulis in parte caulium inferiore aggregatis saepe confluentibus, calycis laciniis triangulari-lanceolatis demum recurvis tubo obsolete (nec valide) nervio, corolla alba calyce fere duplo breviore. — In glareosis, lapidosis, arenosis, graminosis siccis regionis infer. mediterr. — Circa Bar, Rijeka, Danilovgrad, Podgorica (Ro).

2473. *T. strictum* JUSL. — Dignoscitur facile stipulis latis ovatis albidis glanduloso-fimbriatis, foliolis margine glanduloso-serratis, capitulum bracteis exterioribus in involucrum brevissimum dentatum connatis, corollis roseis calyce parum longioribus. — In graminosis siccis regionis infer. mediterr. — Circa Danilovgrad (Pt), Doljani prope Podgorica, in monte Zeblje supra Godinje prope Vir (Ro).

2479. *T. vesiculosum* SAVI. — Capitula magna globosa demum parum elongata ovata vel elliptica, pseudoterminalia; calyx post anthesin vesiculoso-auctus 24 nervius, inter

nervos transverse venosus dentibus setaceis basi 3-nerviis demum recurvatis; corolla alba dein rosea calyce dimidio longior ab initio cum calyce scariosa et multistriata; foliola argute serrata venoso-striata vertis subincrassatis. — In asperis apricis regionis infer. mediterr. ad Rijeka et Vir (Pč).

2481. *T. physodes* STEV. — Ab affini *T. fragifero* L. dignoscitur capitulis multo maioribus, bracteis non connatis, caulinis decumbentibus vel adscendentibus non repentibus, floribus breviter pedicellatis (nec subsessilibus), calycis laciniis longioribus, corolla calyce duplo longiore vexillo libero. — In pratis uidis, in fossis et graminosis regionis infer. mediterr. circa Bar et Ulcinj (Ro).

2482. *T. fragiferum* L. — In pratis humidis, in fossis regionis inferioris et montanae usque ad 900 m. — Njeguško polje (Ho), ad Plavnica (Ja), Podgorica, Medun; coenob. Piva et Mratinje sub monte Maglić (Ro); Bar (Do), Crmnica (Eb).

2483. *T. resupinatum* L. — In graminosis humidis, ad vias, in cultis, in inundatis regionis infer. et montanae. — Circa Plavnica (Sz, Ro); Krstac prope Njeguši et in monte Lovćen (Ho), in campo ad Cetinje (Kš), circa Bar, Ulcinj, Vir (Ro).

— f. *cruentum* ROHL. IV. Beitr. 40. — Caulis cum foliis sanguineus. — Cum typo frequens ad Bar et Plavnica (Ro). — var. *maius* BOISS. — Pedunculi folio fere duplo longiores; flores maiores (7–8 mm longi); calyx fructifer 10–12 mm longus; caulis robustior fistulosus. — Cum typo ad Krstac prope Njeguši (Ro).

2484. *T. tomentosum* L. — A praecedente dignoscitur praesertim capitulis superioribus subsessilibus, floribus minoribus (cca 3 mm), calycis fructiferi dentibus tomento obtectis. — In lapidosis, arenosis, incultis regionis infer. mediterr. — Ad Danilovgrad (Pt), ad litora maris prope Ulcinj (Ro).

2485. *T. Boccone i* SAVI. — Capitula sessilia solitaria vel gemina ovata demum oblongo-cylindrica; calyx 10-nervius hirtulus fauce ecallosus apertus fructifer non inflatus corolla sublongior, dentibus subulatis rectis inaequalibus inferioribus tubo aequilongis; corolla discolor, vexillo rubello, alis carinaque albis. — In pratis vallis Zeta sub Danilovgrad regionis infer. mediterr. (Pč).

2486. *T. tenuifolium* TEN. — A praecedente dignoscitur caule magis ramoso, foliolis foliorum superiorum linearibus, capitulis maioribus, corolla concolore pallide rubra calycem fere duplo superante. — In apricis, lapidosis, graminosis, arenosis regionis infer. mediterr. — Štoj distr. Primorje (Ba), Kokoti in nahija Lješanska; Drušići prope Rijeka (Ro).

2488. *T. striatum* L. — In graminosis siccis, in pascuis, ad vias regionis infer. et montanae. — Ad Danilovgrad (Pt), Šestani distr. Primorje (Ba), Božići prope Andrijevica (Ro), Kralje supra Andrijevica (Ja).

— var. *elatum* LOJAC. — Capitula maiora cylindrica multi-flora; dentes calycini tubo aequilongi vel longiores; caulis robustior. — In herbidis ad Rijeka (Ro).

2489. *T. scabrum* L. — In locis siccis, arenosis, lapidosis, saxosis regionis infer. et montanae usque ad 900 m. — Ad Šavniki (Pt), Rijeka (Pč), Cetinje (Kn), Bar (Ba, Ro, Do), circa Ulcinj, Rijeka, Podgorica (Ro); Crmnica (Eb).

— f. *subvillosum* HAUSSKN. — Caulis patule pilosus. — Cum typo ad Bar (Ro, Do).

— var. *maius* GIB. et BELLI. — Capitula maiora magis elongata; corolla plerumque rubella dentes calycinos aequans vel parum superans. — Cum typo ad Ulcinj (Ro), Čeluga prope Bar (Ba).

2490. *T. dalmaticum* VIS. — Ab aff. *T. scabro* dignoscitur caule graciliore elatioreque, foliolis saepissime maculatis, capitulis interdum geminatis, spicis longioribus, calycis dentibus mollioribus angustioribus longioribusque, apice non spina mucronatis sed abruptis et pilis saepe binis rarius unico aut pluribus terminatis, corolla calycem saepissime duplo superante alis tenuiter puberulis, calyce sub anthesi fauce ecallosa. — In lapidosis et herbidis regionis infer. et mediae usque ad 1200 m. — Lipovo prope Kolašin (Pt), ad Njeguši et Orahovo (Sz); Goraško distr. Piva, Podgorica, Kokoti, Danilovgrad, Rijeka, Drušići, Boljevići supra Vir; etiam ad Andrijevica (Ro), Vunsaj prope Gusinje sub monte Prokletija (Df).

2492. *T. pallidum* W. K. — Habitu *T. pratense* revocans, a quo differt radice annua vel bienni, ramis magis elongatis, foliolis minoribus cuneato-obovatis saepe retusis, calyce patule villoso, capitulis minoribus, corolla pallide rosea vel albida. — In herbidis et dumetosis regionis infer. mediterr. —

Plavnica, Kakarička gora prope Podgorica, Drušići versus Prevlaka prope Vir (Ro).

2494. *T. maritimum* Huds. — In graminosis regionis infer. et montanae. — Cetinje (Kn), Bar (Grimburg).

2495. *T. cinctum* DC. — A praecedente dignoscitur: stipulae pilis basi nodoso-incrassatis obsitae; capitula basi involucro 6—7-fido cincta. — In pratis regionis infer. mediterr. — Ad Bar (Ba), circa Ulcinj (Ro).

2498. *T. squarrosum* L. — In sepibus et ad margines pratorum vallis Zeta sub Danilovgrad (Pč), ad Drušići prope Rijeka (Ro).

2503. *T. arvense* L. — In incultis, arenosis, glareosis, ad vias e regione infer. usque ad subalp. 1800 m. — Cetinje (Pč), ad Rijeka, sub monte Kom Kučki (Ho), Kralje supra Andrijevica, inter monastir Morača et Bistrica (Ja), circa Ulcinj (Ba), Šavniki, Podgorica, in campo ad Čevo, Lastva čevska in nahija Katunska, Štirni do sub Lola planina, Farmaki, Drušići prope Rijeka (Ro), Crmnica (Eb).

2507. *T. stellatum* L. — In lapidosis et graminosis regionis infer. et montanae calidioris. — Ad Njeguši (Pč, Ro), Vir (Pč), circa Bar (Ro), Crmnica (Eb).

— subf. *xanthinoides* ROHL. Magy. Bot. Lap. III: 327. — Corolla dilute flava vexillo initio roseo. — Cum typo ad Bar et Ulcinj (ROHL. IV. Beitr. p. 38).

2508. *T. incarnatum* L. var. *Molinieri* (BALB.) DC. — In graminosis et lapidosis regionis infer. et montanae usque ad 1000 m. — Danilovgrad (Pt, Ro), Krstac prope Njeguši (Ho), Gornja Krivača et Trešnja sub monte Lovćen, Vir, Podgorica, Kokoti, Bar, Rijeka; etiam ad Andrijevica in rupestr. calcareis (Ro).

— f. *roseum* ROUY et FOUC. — Flores dilute rosei. — Cum typo ad Kralje supra Andrijevica (Ro).

\*— f. *stramineum* PRESL. — Flores luteo-albi. — In pratis ad Andrijevica (Df).

2511. *T. angustifolium* L. — In collibus siccis, in dumetis, lapidosis regionis infer. mediterr. et montanae calidioris usque ad 900 m. — Ad Danilovgrad (Pt, Ro, Pč), monastir Duga, Komani (Pt), ad Njeguši (Ho, Ro), Bioče (Ja), Ulcinj, Vir, Rijeka, Drušići (Ro), Bar (Ro, Do).

2512. *T. purpureum* LOIS. — A praecedente dignoscitur omnibus partibus robustioribus, foliolis latioribus, corolla multo maiore purpurea e calyce longe exserta, capitulis brevioribus demum strobiliformibus, dentibus calycinis valde inaequalibus inferiobus quam superiores fere duplo longioribus. — In graminosis, dumetosis regionis infer. mediterr. — Ad coenob. Ždrebanik prope Danilovgrad (Pt), Kakarička gora et Medun prope Podgorica (Ro).

2514. *T. noricum* WULF. — In pratis, pascuis, rupestribus regionis alpinae usque ad 2400 m. — In montibus Kom, Durmitor, Sinjavina planina (Pt, Pč, Ba, De, Si, No, Ro), Jas vorje planina (Pč), Štirni do, Pavlova livada (Ho, Ro), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), in montibus Dibala, Vila, Pešinjak, Planinica distr. Kuči (Ba), montes Maglić Pivski, Ledenica, Konjsk, Lukavica, Lola; Gradište et Jablan vrh supra Kolašin (Ro).

\*— — f. *maior* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Foliola maiora usque 4 cm longa et 19 mm lata. — Prokletija (Boš).

— — — subf. *biceps* BECK. — „Capitula bina, alterum minus, breviter pedunculatum.“ — Cum typo in Lukavica planina et in monte Durmitor (Ro, De, Si).

2517. *T. patulum* TSCH. — Ab affini et simili *T. medio* differt: caulis gracilior; folia supra stipulas brevissime petiolata vel sessilia, pars stipularum petiolo adnata hoc aequilonga; capitulo ovata laxiora, calycis tubus adpresso pilosus dentibus inaequalibus tubo dimidio longioribus\*) primo erectis dein patulis reflexisve. — In silvis, dumetis, saxosis regionis infer. et montanae calidioris. — Supra coenob. Morača (Pč), ad pagum Mali Mikulić sub monte Rumija (Ba), Krstac prope Njeguši, ad latera montis Zeblje prope Boljevići supra Vir (Ro), Crvena Stijena sub monte Durmitor(?) (Ba), in monte Kosa supra Bar (Do), in monte Rasovatac et ad Brčeli prope Vir; Sutorman supra Bar (Eb).

2519. *T. pratense* L. — In graminosis et pratis in tota ditione e regione inferiore usque ad alpinam. — Viruša dol sub Crna planina, Perućica sub monte Kom, in valle fl. Tara, Kovčice sub monte Durmitor (Pt), in valle fl. Zeta sub Danilovgrad (Pč), ad Rijeka (Ho), circa Kolašin frequens (Ja).

\*) Confer HAYEK Prodr. Fl. pen. Balc. I: 868.

Andrijevica, Trešnja sub monte Lovćen, Lukavica et Konjsk planina (Ro), in herbidis montis Vila distr. Kuči (Ba, sub var. *collino* GIBELLI et BELL).

\* — f. *heterophyllum* LEJ. et COURT. — Caulis humilis, foliola foliorum inferiorum multo minora obcordata apice emarginata. — Cum typo ad Njeguši, Andrijevica; Bukovica et Barno jezero sub monte Durmitor (Ro).

— — var. *sativum* SCHREB. f. *flavicans* (VIS.) HAY. — Caules crassi flaccidi inferne pilosi; corolla ochroleuca, sicca flavescens. — In dumetis pagi Medun (Sz).

\* — var. *Zetae* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Caulis robustus, ad 35 cm altus, adpresso pilosus, foliola inferiora obcordata, omnia in utraque facie pilosa; calyx copiose piloso-villosus; corolla rubra. Videtur intermedia inter var. *spontaneum* WILLK. et var. *nivale* KOCH. — In alp. montium Prokletija (Boš).

— — var. *nivale* SIEB. — Humilius, capitulis crassioribus, floribus sordide albis vel ochroleucis rarius in colore rubellum vergentibus; caule patule piloso, stipulis superioribus extus pilosis. — In pratis regionis alpinae et subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina; in monte Kom; in valle Perućica sub monte Kom; Sinjavina planina, Durmitor (Pt), Piperska Lukavica (Ro).

— — — f. *minus* ROUY et FOUC. confer ROHL. V. Beitr. 29. — Caulis tenuis procumbens apice tantum adscendens; foliola et capitula minora. — Cum praecedente in pratis et pascuis alpinis in monte Lukavica planina et in monte Maglić Pivski (Ro).

2522. *T. ochroleucum* HUDS. — In herbidis, pascuis, dumetis regionis infer., subalpinae et alpinae. — Ad Rijeka (Pt), Ivica planina et Javorje planina (Pč), ad pagum Orahovo distr. Kuči (Sz), Nikšić, Štirni do (Ho), in monte Vjetnik distr. Bratonožići, inter coenob. Morača et Bistrica, Matoševo in valle fl. Tara, in monte Pivljan supra Kolašin; Kralje supra Andrijevica (Ja), circa Podgorica, Spuž, Viljuša, Goransko, coenob. Piva; Varda planina distr. Piva, in monte Vojnik, Barno jezero sub monte Durmitor (Ro), in valle rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

2523. *T. pannonicum* L. — In graminosis et dumetis regionis subalpinae et alpinae. — Ad pagum Kovčice sub monte

Durmitor (Pt), in monte Ranisava distr. Drobnjaci; Korita rovačka et Piperska Lukavica (Ro).

2524. *T. Pignantii* FAUCHÉ et CHAUB. — Ab affini et simili *T. medio* dignoscitur caule patule villosa, foliolis latioribus ovatis, ovato-rotundis usque oblongis, stipulis latioribus ovatis vel ovato-lanceolatis acuminatis, calycis fauce glabro dentibus fere aequilongis tubo dimidio longioribus demum divergentibus, corolla ochroleuca calyce parum longiore. — In dumetis et saxosis, ad margines silvarum regionis infer. mediterr. et montanae calidioris usque ad 1400 m. — Ad Cetinje (Ba, Ce), Lovćen (Ba); Njeguši (Ld, Ro), circa Kolašin (Ja), Bijela Skala et Rumija supra Bar (Ba), Borkovići distr. Piva, Vir, Lijeva Rijeka, Andrijevica, ad latera montis Sutorman supra Bar (Ro), Vučji potok sub Vermoš planina (Df), Boljevići prope Vir (Eb).

— f. *piligerum* ROHL. Magy. Bot. Lap. III: 322. — Calycis tubus ad nervos longe pilosus. — Cum typo ad Andrijevica cca 800 m (Ro).

2525. *T. medium* L. subsp. *flexuosum* (JACQ.) A. GR. — In dumetis et ad margines silvarum regionis infer. et mediae calidioris. — Ad Vir (Pč), Rijeka (Ho), Krstac prope Njeguši (Ho), Seoce sub monte Balj (Ba), Viljuša; coenob. Piva; Lastva čevska (Ro), in monte Rumija supra Bar (Ba).

— subsp. *balcanicum* VELEN. Fl. bulg. 135. — „Caule praesertim superne dense molliter patentipiloso, stipulis e basi latiori sensim et longe acuminatis saepius submembranaceis, foliolis maioribus latioribusque, petiolis inferioribus longissimis, dentibus calycinis denique patentibus“ (VELEN. l. c.). — In silvis et dumetis regionis subalp. usque ad 1600 m. — Sub monte Kom Kučki (Ho); Šavniki; ad latera montis Balj supra Andrijevica, in valle fl. Lim; Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

2527. *T. Cherleri* JUSL. — In lapidosis et arenosis regionis infer. mediterr. — Bioče in valle fl. Morača (Pt), Dukla prope Podgorica, circa Ulcinj, Bar, Podgorica (Ro).

2529. *T. lappaceum* L. — In graminosis et dumetosis regionis infer. mediterr. — Rijeka (Pt), Danilovgrad (Pč), Čeluga prope Bar (Ba), Kokoti in nahija Lješanska, Drušići prope Vir, Čemovsko polje prope Podgorica, ad Vir, Boljevići, Bar (Ro).

2530. *T. alpestre* L. — In dumetis et silvis regionis subalpinae et alpinae usque ad 1800 m. — In monte Ivica planina supra Šavnik (Pč), in monte Sinjavina planina; ad pagum Kovčice sub monte Durmitor (Pt), ad latera montis Hum Orahovski (Sz); Štirni do et Treblješ luka (Ho, Ro), circa Kolašin; in montibus Peh et Glave supra Kolašin; Trešnjevik distr. Bratonožići, Kralje prope Andrijevica (Ja), circa Andrijevica, in monte Balj, Korita rovačka et Lukavica planina, Bukovica, Žabljak, Crno jezero sub monte Durmitor, Šavnik, Božur et Varda planina distr. Piva, Mirac supra Kotor; ad latera montis Lovćen supra Njeguši cum f. *monostachyum* SER. (Ro).

— var. *durmitureum* ROHL. III. Beitr. 24. — Caulis gracilior; calyx 10—12nervius; flores minores. — In pascuis alpinis montis Durmitor cca 2000 m.

2532. *T. subterraneum* L. — In graminosis et dumetis regionis inferioris mediterr. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Drušići prope Rijeka (Ro).

— f. *longipes* H. GRAY. — Laxum, flagelliforme, pedunculi elongati foliis longiores. — Cum typo in dumetis ad Kokoti in nahija Lješanska (Ro).

### Dorycnium VILL.

2535. *D. hirsutum* (L.) SER. var. *hirtum* (JORD. et FOURR.) RIKLI. — A sequente specie dignoscitur calyce regulariter profunde 5fido (non subbilabiato), corollis multo maioribus 12—14 mm longis albo-roseo-striatis carina atropurpurea, capitulis 4—10floris, caule ± dense piloso (non tomentoso), foliis breviter petiolatis (nec sessilibus), foliolis ± pilosis (non adpresse sericeis). — In saxosis et dumetis regionis infer. mediterr. — Circa Bar et Ulcinj (Ro), inter Limljani et Boljevići prope Vir (Eb).

— var. *italicum* (JORD. et FOURR.) RIKLI. — Cum typo ad Novi Bar (Ro, Do).

2538. *D. germanicum* (GREMLI) ROUY. — In lapidosis, herbidis, fruticetis regionis montanae, subalpinae, alpinae usque ad 2000 m. — Orlova Skala sub monte Kom; ad pagum Kovčice sub monte Durmitor (Pt); ad latera montis Hum Orahovski (Sz); in monte Rumija supra Bar (Ba); Krstac prope Njeguši (Ho, Ld, Pej); nahija Katunska locis pluribus:

Njeguši, Velestovo, Čevski Lisac, Viljuša, mons Lovćen; ad coenob. Piva; Jablan vrh supra Kolašin (Ro); Carine sub monte Kom (Ba), Savin Kuk in monte Durmitor; Pivska planina (De, Si).

2539. *D. herbaceum* VILL. — A praecedente dignoscitur caule et foliolis adpresso pilosis (nec sericeis), capitulis 15—25floris (nec 8—15), floribus longius pedicellatis, calycis dentibus breviter triangularibus (nec triangulari-lanceolatis), corolla minore (cca 4—5 mm). — In herbidis, silvis, dumetis regionis inferioris, montanae et subalpinae usque ad 1700 m. — Circa coenob. Ždrebanik (Pt), Limljani distr. Crmnica (Pč), Medun supra Podgorica (Sz), Cetinje (Kn), Kolašin (Ja), Kralje, Andrijevica (Ja, Ro), Bijela Skala supra Bar; in distr. Kući frequens: Čafa Gvozdeča, Orahovo, Trijepši, Hum Orahovski, mons Kunj Kostiča (Ba); circa Rijeka, Podgorica, Njeguši; in monte Ranisava prope montem Durmitor; in montibus Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

— var. *illyricum* BECK. — Caulis breviter pubescens, pilis elongatis nullis; foliola vix 10 mm longa sparse longe pilosa et brevissime puberula, capitulis minoribus, calycis dentibus brevissimis. — Cum typo ad Podgorica et Plavnica. In formis appropinquatis etiam ad Krstac prope Njeguši (Ro), Medun (Sz), Novi Bar (Do).

— f. *heterophyllum* ROHL. V. Beitr. 31. — Foliola foliorum inferiorum et mediorum obcordata apice emarginata et apiculata. — Cum var. *illyrico* ad Podgorica (Ro).

### *Lotus* L.

2540. *L. ornithopodioides* L. — Annuus; calyx ad medium bilabiatus dentibus lateralibus obtusis intermedio lanceolato dimidio brevioribus; legumen lineare compressum glabrum torulosum subarcuatum calyce multo longius; umbellae 2—5 florate. — In graminosis, lapidosis, cultis regionis inferioris mediae. — Circa Bar et Ulcinj (Ro).

2549. *L. corniculatus* L. subsp. *eucorniculatus* BRIQU. — In pratis, pascuis, herbidis, lapidosis e regione infer. mediterr. usque ad alpinam frequens, usque supra 2000 m.

— f. *ciliatus* KOCH. — Caulis glaber, foliola ciliata vel pilosa. — Frequens.

— — — f. *hirsutus* KOCH (cf. ROHL. V. Beitr. 31). — Caulis cum foliolis longe pilosus. — In regione subalp. et alpina.

— — — f. *grandiflorus* ROUY. — Parce pilosus; flores maiores. — Vermoš planina ad fines Albaniae (Df).

— — — var. *speciosus* VAL de LIEVRE. — Differt floribus majoribus aureis, carina apice nigricante, dentibus calycinis tubo brevioribus. — In pratis alpinis.

— — — var. *alpinus* SER. — Ut praecedens, sed caulis humilis procumbens, foliola parva ± pilosa, capitula pauciflora (1—3), corolla aurea extus et carina ± rubescens. — In pratis regionis alpinae. — In monte Velki Maglić (Sz); Tursko Ždrilo et Korita rovačka (Ho), Štirni do, Durmitor (Ro).

— — — var. *stenodon* BOISS. et HELDR. — Foliola parva pilosa; dentes calycini angustiores tubo dimidio longiores. — In pratis alpinis montium Kom et Mali Durmitor (Pt, Ro); Štirni do (Ro).

— — subsp. *tenuis* (KIT.) BRIQU. — In fossis et pratis humidis regionis inferioris. — Ad Vir (Pč), Bar (Ba, Do).

2551. *L. parviflorus* DESF. — A sequente dignoscitur umbellis 3—6-floris (nec 1—2-floris), caulis foliisque patule villosis (nec laxe pilosis), foliolis infimis petiolo duplo longioribus (nec dimidio), legumine oblongo calycem parum superante (nec pluries longiore). — In arenosis maritimis et in collibus siccis regionis infer. mediterr. — Circa Ulcinj (Ro).

2553. *L. angustissimus* L. — In herbidis, in dumetis regionis infer. mediterr. — Piperi (Pt), Čeluga prope Bar (Ba), Drušići prope Rijeka (Ro).

2555. *L. strictus* FISCH. et MEY. var. *albus* (JKA) HAY. — In campo Radovče polje cultus (Ho).

### *Securigera* DC.

2562. *S. securidaca* (L.) DEG. DOERFL. — In cultis, graminosis, lapidosis, ad margines silvarum et viarum regionis infer. mediterr. — Circa Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica, Tudješ mile sub monte Sutorman, Drušići prope Rijeka (Ro).

### *Anthyllis* L.

2564. *A. Hermanniae* L. — Fruticosa, valde ramosa ramis spinescentibus; capitula pauciflora (1—3) ebracteata se-

cus ramos interrupte spicata; folia simplicia vel ternata, foliola subtus sericea; legumen glabrum. — In dumetis regionis montanae rarissime. — Adhuc solum ad Cetinje (Ba). Non vidi.

2567. *A. aurea* WELDEN. — In saxosis, lapidosis, dumetosis regionis montanae et subalpinae usque ad 1700 m. — Mali Lonac sub monte Sutorman (Pč, Do), Mužnica Skala distr. Primorje (Ba), in monte Vojnik, Lovćen, Konjsk et Lukavica planina, Korita rovačka (Ro), in monte Kosa supra Bar (Do), in monte Rasovačka prope Vir (Eb).

— f. *aurantiaca* PANT. — Flores aurantiaci. — Cum typo ad Vučje gornje prope Gvožd Han (Pt), Bogojeva glava supra Njeguši (Pej, Ro).

2568. *A. montana* subsp. *Jacquini* (A. KERN.) HAY. — In saxosis, glareosis, calcareis, pascuis regionis subalpinae usque in alpinam usque ultra 2200 m. — In montibus Kom (Pt), Durmitor (Pč), Gradište, Jablan supra Kolašin (Ba, Ro), Kunj Kostiča, Hum Orahovski, Žijovo, Pešinjak, Planinica distr. Kuči (Ba), Lovćen, Vojnik, Ledenica et Božur planina distr. Piva (Ro), Rumija (Do), Pivska planina (De, Si).

— f. *atropurpurea* VUKOT. — Flores 9—12 mm longi, corolla intense rubropurpurea. — Cum typo in monte Planinica distr. Kuči (Ba); Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

2569. *A. vulneraria* L. subsp. *polyphylla* (KIT.) HAY. — In pratis subalpinis. — In monte Rudo brdo supra Andrijevica (Ja), in valle fl. Lim prope Andrijevica (Df).

— subsp. *vulneraria* (L.) HAY. — Ad viam e Kotor ad Njeguši sub Krstac cca 600—700 m (fide BECKER), ad Njeguši loco Pračište (Ro).

— var. *pseudovulneraria* SAG. f. *cattarensis* SAG. — Torinje prope Njeguši (Pej, Ro).

— subsp. *Spruneti* (BOISS.) BORNM. var. *illyrica* (BECK) HAY. — In herbidis, lapidosis, rupestribus regionis infer. mediterr. — Ad Ulcinj (Ro), Volovica prope Pristan Bar (B), circa Rijeka (Ro).

— f. *praepropera* (A. KERN.) HAY. — In graminosis montis Lovćen (forma caule adpresse piloso, Ro, Pej).

— subsp. *pulchella* (VIS.) BORNM. — In rupestribus e regione montana usque in alpinam. — Circa Njeguši; in monte

Lovćen (Huter, Ro), in monte Kunj Kostiča distr. Kuči (fide BECKER), Kom Kučki (fide BECK), in monte Durmitor (No).

— var. *scardica* (WETTST.) BORNM. — In alp. montium Kom (Sz, Pt), Hum Orahovski, Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz); in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), Jezerski vrh in monte Lovćen (Ho), Piperska Lukavica, Jablan vrh supra Kolašin, Kom Kučki, Maglić Pivski, Durmitor ultra 2200 m (Ro).

— f. *Baldaccii* SAG. — In lapidosis et saxosis regionis alpinae in monte Vila supra Rikavac distr. Kuči (Df).

— f. *montenegrina* DEG. et FIALA. — In pratis alpinis montium Hum Orahovski et Kunj Kostiča distr. Kuči et in monte Durmitor (Ba).

— var. *monticola* (SAG.) HAY. — Cum typo supra Njeguši ad latera montis Lovćen (Huter, Ld, Pej, Ro); in campo Donja Zeta prope Podgorica (Ro).

— subsp. *alpestris* (KIT.) HAY. — In pascuis et pratis alpinis. — In montibus Kom, Durmitor (Pt), Maglić Pivski (B).

— var. *dinarica* BECK. — In rupestribus alpinis supra Fuša Rudnices prope Gusinje; in monte Vila distr. Kuči (Df), in valle fl. Jelovica prope Andrijevica, in alp. montis Maglić Pivski usque ad 2000 m (Ro).

— subsp. *vulgaris* (A. KERN.) HAY. — In pratis ad Andrijevica (Ho), Danilovgrad (Pt) (?).

### *Lupinus* L.

2575. *L. hirsutus* L. — In pratis, lapidosis, agris regionis inferioris et montanae. — Ad latera montis Rumija (Ba), in pratis circa Bar (Ba, Ro), in campo ad Podgorica; cultus ad Danilovgrad et ad pagum Bijela prope Nikšić (Ro).

\*2577. *L. graecus* BOISS. — In arenosis dicionis mediterr. ad Bar (Ro).

### *Cytisus* L.

2583. *C. nigricans* L. — In dumetis et rupestribus regionis infer. et mediae. — Ad rivum Morača super. (Pč), Kačmenjak (Ho). An loca hic enumerata ad var. sequentem pertinent?

— var. *sericeus* ANDRAE. — Caulibus, calycibus, leguminibusque argenteo-sericeis, foliolis et floribus minoribus. — Circa

pagum Zagarać supra Danilovgrad, circa Vir, inter Bogetići et Nikšić (Ro); Bar (Ba), in monte Rumija (Do); Limljani prope Vir (Eb).

2585. *C. procumbens* (W. K.) SPR. — In rupestribus regionis subalpinae. — Lipovo prope Kolašin (Pt).

2586. *C. diffusus* (WILLD.) VIS. — A praecedente differt ramulis 5-angulis non alatis, foliis glabris, pedicellis calyce glabro  $1\frac{1}{2}$ -3-plo longioribus, floribus 1—3 fasciculatis, corolla calyce solum duplo (nec ter) longiore, legumine glabro vel parce piloso.

\*— f. *adpresso-pilosus* LINDB. f. Iter Austro-Hung. 49. — „A planta typica differt innovationibus et foliis subtus sat dense adpresso pilosis, pedicellis calycibusque adpresso ± pilosis, leguminibus hirsutis, floribus 10 mm longis numerosis inflorescentiam longam laxam formantibus.“ (LINDB. l. c.). — In saxosis juxta viam inter Krstac et Njeguši cca 970 m (Ld, Ro), Cetinje (Bo fide LINDB.), Stare Strane sub monte Lovćen (Pej, Ro), Ledenica planina (Ro).

\*— subf. *glabricalyx* ROHL. VI. Beitr. 20. (= *C. procumbens* f. *glabricalyx* ROHL. VIII. Beitr. 11). — Calyces glabri solum ad dentes barbulati. — Cum typo ad Krstac prope Njeguši (Pej, Ro).

2587. *C. decumbens* (DURANDE) SPACH. — Ramulis, foliis (subtus et margine), calyce et leguminibus dense pustule pilosis. — In rupestribus et dumetis regionis subalpinae et alpinae usque ad 1800 m. — In montibus supra Andrijevica: Jerinja glava, Žoljevica, Balj, Sjekirica (Ro).

2593. *C. hirsutus* L. subsp. *leucotrichus* (SCHUR.) A. GR. — In dumetis et silvis regionis infer. et subalp. — Peručica sub monte Kom (Pt, Ro), in monte Lovćen (Ba), Cetinje (Ld), circa Ulcinj, Vir, Podgorica, Bjelice prope Njeguši, Ledenica, Božur et Varda planina distr. Piva (Ro), Lipovo prope Kolašin (Pt).

— subsp. *ciliatus* (WAHLENB.) A. GR. var. *alpestris* (SCHUR) BRIQU. — Rami procumbentes vel apice adscendentes, foliola ± elliptica utrimque pilosa. — In dumetis regionis subalpinae usque ad 1600 m. — Božur planina distr. Piva, in montibus Žoljevica et Sjekirica supra Andrijevica (Ro), ad Njeguši (Bo).

— — — f. *aberrans* BECK. — Legumen in faciebus parce pilosum. — Cum typo (fide BECK).

2597. *C. supinus* L. — Rami et petioli patule pilosovillosi. — In dumetis ad Grahovo (Pč).

2599. *C. Tommasinii* VIS. — Rami et petioli dense breviter adpresso pilosi; foliola viridia subtus vel utrimque adpresso pilosa. — In saxosis, inter dumeta, ad margines silvarum e regione inferiore ad subalpinam usque ad 1600 m. — Piperi, Sušica prope Danilovgrad (Pt); ad Ostrog et coenob. Morača; sub monte Kljuć prope Kolašin (Ba), inter Bistrica et coenob. Morača (Ba, Ja), in valle fl. Tara ad Matoševo et Kolašin, in montibus Pivljan, Trešnjevik, Peh, Glave distr. Vasojevići; Kralje prope Andrijevica (Ja, Ba), Konjuhe sub monte Kom (Ba), ad Vir; Drežnica prope Nikšić, Boljevići versus Sutorman, inter Krstac et Kotor (Ro), ad Medun (Ba), Boljevići et Limljani prope Vir (Eb), Ivanov laz prope Njeguši (Pej, Ro), in montibus Balj et Jerinja glava supra Andrijevica; Perućica sub monte Kom, Lipovo prope Kolašin (Ro).

2601. *C. austriacus* L. — Rami adpresso pilosi; foliola subtus incano-sericea; corollae vexillum extus sericeum. — In dumetis regionis montanae. — Nahija Katunska: Čevo, Pišine Strane (Pč), ad coenob. Morača (Ba). Verosimiliter (saltem p. p.) ad speciem praecedentem pertinet.

### *Petteria* PRESL.

2616. *P. ramentacea* (SIEB.) PRESL. — In regione inferiore et montana calidiore vulgaris dumeta vasta constituens usque ad 1200 m. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić; nahija Katunska: Njeguši, Cetinje, Čevo, mons Lovćen, Viljuša, Grahovo, Rudine nikšičke; in distr. Kuči in regione inferiore et montana; tota nahija Lješanska; in monte Vjetnik in declivibus merid.; in dizione septentrionali rarissime: adhuc solum in valle fl. Piva sub Gorańsko et supra vicum Krstac.

### *Genista* L.

2628. *G. silvestris* SCOP. subsp. *innocua* (VIS.) HAY. — In silvis et dumetis regionis infer. et montanae usque ad 1200 m. — Nahija Lješanska; in monte Tvrđak in nahija Katunska (Ro), ad Njeguši loco Kučista (Pej, Ro).

— — subsp. *dalmatica* (BARTL.) LINDB. f. — Patule pilosa; spinae patentes rigidiores. — In lapidosis et dumetis regionis montanae et subalpinae. — Čafa Gvozdeča prope Orahovo (Ba), Kamenjak (Ho), Borkovići distr. Piva (Ro). — — — f. *parce-pilosa* LINDB. f. — Planta sparse subadpresso pilosa; spinae rigidae. — Cum typo ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

2629. *G. germanica* L. — In saxosis regionis montanae ad Grahovo (Pč).

\*2630. *G. pilosa* L. — In declivibus montis Javorje versus vallem fl. Morača super. (Pč), in monte Suhı vrh prope Kom (Ba).

2632. *G. Villarsii* CLEM. — Flores 1—3 ni axillares breviter racemosi; folia simplicia parva oblongo-lanceolata complicata subtus dense adpresso sericea; pedicelli ebracteolati. — In saxosis regionis montanae ad Cetinje (Pt); Medun distr. Kuči; Konjuhe prope Andrijevica; Kolašin (Ba).

2635. *G. sericea* WULF. — In apricis lapidosis, in rupestribus, inter dumeta regionis infer. et montanae calidioris. — Ad Cetinje (Pč, Ba), Mali Lonac sub monte Sutorman (Pč, Ba); Vrh Suta, Mužnica, Bijela Skala supra Bar (Ba); circa Njeguši et ad latera montis Lovćen frequens (Gi, Pej, Ja, Ro); in collibus ad Podgorica; in rupestribus ad ripas fl. Morača infer.; circa Boljevići et Vir (Ro); ad Vrojca et Medun distr. Kuči (Ba); in monte Kosa supra Bar (Do), Crmnica (Eb).

— — var. *rigida* PAMP. — „Humilior, cca 10 cm alta; folia minora ovata vel elliptica latitudine circa duplo longiora, juvenilia hinc inde supra sparse pilosa.“ — Cum typo rarius.

\*— — — f. *brevifolia* BECK Fl. Bosne III: 194. — „Folia omnia elliptico-oblonga rotundata, superiora nec longiora nec angustiora rotundata vix acuta“ (BECK l.c.). — Ad Cetinje (B).

\*2637. *G. tinctoria* L. — In dumetis, silvis, herbidis regionis infer. et subalp. usque ad 1600 m. — Circa Vir et Danilovgrad (Pč, Ro), Radovče polje (Ho), in pascuis Štavna et Kozel sub monte Kom (Ja, Ro), circa Bar, Ulcinj, Podgorica, Njeguši, Plavnica (Ro), Andrijevica (Ba).

2639. *G. ovata* W. K. — A praecedente dignoscitur cauleibus hirsutis, ramulis pubescentibus, foliis saepe ovatis sub-

tus et ad marginem longe pubescentibus, leguminibus oblongis ad 4 cm longis dense patule pilosis. — In pratis, pascuis, dumetis regionis subalp. et alpinae, 1200—1900 m. — Varda sub monte Kom Vasojevički (Ba), Jerinja glava supra Andrijevica, Ljut supra coenob. Piva (Ro).

2642. *G. januensis* VIV. — In saxosis et dumetis regionis montanae et alpinae usque ad 1900 m. — Mratinje sub monte Maglić Pivski in valle fl. Piva, in monte Jablan vrh supra Kolašin, ad pedem montis Balj prope Andrijevica, Lješanska nahija (Ro).

\*2646. *G. sagittalis* L. — In pratis, lapidosis, dumetis, ad margines silvarum regionis montanae et subalpinae usque ad 1600 m. — Viruša dol sub monte Crna planina, Sinjavina planina (Pt), Kovčice et Bukovica sub monte Durmitor (Pt, Ro), sub monte Kom loco Kukuraj (Pč), in monte Balj supra Andrijevica (Ba, Ro), Bukovica sub monte Durmitor; Borkovići et Zakamen distr. Piva (Ro), Han Garančić, Matoševo, Kolašin in valle fl. Tara; in montibus supra Kolašin: Pivljan, Trešnjevik, Rudo brdo, Peh, Glave frequens (Ja); Kralje supra Andrijevica (Ja, Ro).

### *Spartium* L.

2647. *S. junceum* L. — In rupestribus et dumetis regionis inferioris mediterraneae. — Circa Vir (Pč); Tudjemile sub Sutorman (Ho), circa Ulcinj et Bar frequens; ad Podgorica et in Lješanska nahija rarius (Ro); ad Nikšić (Ba), ad Andrijevica? (Ba).

### *Ornithopus* L.

2648. *O. compressus* L. — In lapidosis, arenosis regionis inferioris mediterraneae. — Ad coenobium Dajbaba prope Podgorica (Ro).

### *Coronilla* L.

2650. *C. emerus* L. subsp. *emeroides* (BOISS. et SPR.) HAY. — In saxosis et dumetosis regionis montanae calidioris usque ad 1200 m. — Ad Grahovo et Vir (Pč, Ro), circa Njeguši et Cetinje (Ld, Pej, Ro), in valle fluminis Morača inter Bioče et coenobium Morača (Ja), ad latera montis Sutorman supra Bar, ad pagum Velki Mikulić sub monte Rumija (Ba), circa Ulcinj, Bar, Podgorica, Danilovgrad, Bioče

frequens; circa Andrijevica rario: ad latera montis Balj et in valle fluminis Perućica sub monte Kom; etiam in valle fluminis Piva inter Šavniki et Mratinje!! (Ro); lacus Biogradsko jezero (Čer).

2652. *C. valentina* L. — Fruticosa effusa, ramis striatis, stipulis deciduis liberis inferioribus oblongis, superioribus reniformi-orbiculatis foliolis saepe latioribus maioribusque 3—4 jugis cuneato-oblongis, terminale lateralibus non maiore, pendunculis elongatis 6—9-floris; floribus luteis, alarum carinaeque apice siccando virescente, legumine compresso-tetragono 4—7-articulato, articulis facile secedentibus. — In dumetis regionis inferioris mediterraneae. — Ad Ulcinj (legit Fuehrer, teste DEGEN; Ba).

2654. *C. vaginalis* LAM. — In graminosis summi montis Hum Orahovski (Sz).

— f. *aurantiaca* ROHL. Magy. Bot. Lap. III: 322. — Flores intense aurei vel subaurantiaci. — In graminosis alpinis montis Jablan supra Kolašin cca 2200 m (Ro).

2656. *C. coronata* L. — A praecedente dignoscitur: caules elati, erecti, stipulae minutae foliolis minores apice liberae mox deciduae, legumen obtuse quadrangulum 2—3-articulatum (nec sexangulare 3—8-articulatum), umbellae 15—20-florae (nec 5—8-florae). — In graminosis alpinis et subalpinis montis Maganik (Ho), supra vallem rivi Piva prope Krstac cca 1200 m (De, Si).

2658. *C. varia* L. — In graminosis, pratis, dumetis regionis inferioris et subalpinae usque ad 1600 m. — Danilovgrad et Zagarač (Pt), ad Njeguši et Cetinje (Pč, Eb, Sz, Ro); Orahovo, mons Dziebeze, sub monte Hum Orahovski (Sz), circa coenobium Piva; Golo brdo supra Njeguši (Pej, Ro), Veles-tovo in nahija Katunska, circa Andrijevica (Ro); Kralje supra Andrijevica, Kolašin (Ja); ad Vunsaj supra Gusinje (Df), Velki Maglić distr. Kuči (Ba).

— f. *recta* HAY. — Caules erecti firmi cca 60 cm alti nec procumbentes. — In alpinis dicionis septentrionalis montis Prokletija ad fines Albaniae (Df).

— var. *pauciflora* GRIS. Spic. I: 61. — Foliola 5—6-juga minora; umbella 5—10-flora, flores minores. — In subalpinis (HAYEK Prodr. Fl. penins. Balc. I: 919). — In valle rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

2660. *C. cretica* L. — A praecedente dignoscitur radice annua, umbellis 3—7-floris, pedunculis florum calyce aequilongis, foliolis 13—17, floribus minoribus (cca 5 mm), legumine recto. — In rupestribus et ad muros regionis inferioris mediterraneae. — Ad Bar (Ro, Do).

2662. *C. scorpioides* (L.) KOCH. — Annua; folium terminale lateralibus 1—2 jugis multo maius; umbellae paucis (2—4-)florae, flores parvi lutei; legumen 6—8 angulatum stria-tum arcuatum. — In cultis, ruderatis, lapidosis regionis inferioris mediterraneae. — Dobrsko selo inter Rijeka et Cetinje (Pt), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Spuž, Danilovgrad usque ad 400 m (Ro).

*Hippocrepis* L.

2664. *H. comosa* L. subsp. *eucormosa* HAY. — In rupestribus, graminosis, glareosis e regione inferiore (rarior!) usque ad alpinam ultra 2000 m! — Limljani prope Vir (Pč), Crna planina distr. Kuči (Pt), montes Kom et Durmitor (Pt, Ro), ad Njeguši sub monte Lovćen (Sz, Pej, Ro), in alpinis montis Maganik (Ho), in monte Dibala supra Kostića distr. Kuči (Ba), in valle Perućica sub monte Kom, in alp. Sjekirica et in monte Zeletin supra Andrijevica, Bjelastica planina supra Kolašin, Jablan vrh in Sinjavina planina, Javorje planina (Ro), Crmnica (Eb), Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

? — subsp. *glaucia* (TEN.) ROUY. — Adpresse canescens-pilosa; foliola anguste oblonga; pedunculi valde elongati; sinus lomenti leviter arcuati. — In alpinis montis Durmitor jugo Šljeme a cl. PANČIĆ et e monte Lisa prope Andrijevica a cl. BALDACCI indicata. Verosimiliter ad plantam typicam pertinet (confer ROHLENA V. Beitr. p. 34; BECK Fl. Bosne III: 295).

2666. *H. ciliata* WILLD. — Annua; caulis adscendens vel erectus; foliola anguste cuneata; umbellae 2—6-florae, pedunculus folium subaequans; flores 3—4 mm longi; legumina parum curvata parte seminifera papillis rufis vestita sinubus in latere concavo fructus sitis. — In graminosis siccis lapidosis regionis inferioris mediterraneae. — Circa Bar et Ulcinj (Ro).

2668. *H. unisiliquosa* L. — A praecedente differt caule procumbente, foliolis retusis, floribus axillaribus solitariis, rarius binis, subsessilibus, leguminibus rectis vel leviter curvatis sinubus saepius ad latus convexum spectantibus. — In gra-

minosis apricis regionis inferioris mediterraneae. — Ad Ulcinj; collis Volovica ad Bar (Ro).

*Scorpiurus* L.

2671. *S. subvillus* L. subsp. *eusubvillus* HAY. — In graminosis, cultis, lapidosis regionis inferioris mediterraneae. — Circa Bar, Ulcinj, Podgorica (Ro).

*Onobrychis* HILL.

2686. *O. alba* (W. K.) DESV. subsp. *eualba* HAY. var. *dalmatica* ŠIRJ. — A typo dignoscitur internodiis abbreviatis brevibus pedunculos longissimos gerentibus reductis (interdum planta subacaulis est), foliolis minoribus et angustioribus, racemis brevioribus (ŠIRJAEV Revisio *Onobrychis* critica I: 106). — In graminosis et rupestribus montis Šarišnik supra Goransko distr. Piva cca 1000—1200 m.

— subsp. *laconica* (ORPH.) HAY. — Caulis gracilis adscendens, flexuosus, calycis dentes vix 2—2 $\frac{1}{2}$ plo tubo suo longiores molliter dense pilosi saepe fusti; corolla alba vel pallide rosea vexillo carinaque + roseostriatis. — In pratis et pascuis regionis subalpinae et alpinae. — Ad Sutivan (leg. Ebel sub *O. alba* teste ŠIRJAEV); in alpinis montis Javorje planina (Ro, sub *O. sativa* var.); Ledena planina (Ro); in monte Lovćen forma foliis minoribus et foliis angustioribus (Pej, Ro); Tudjemile supra Bar (Ba).

2687. *O. arenaria* W. K. vide 2691 sub *O. ocellata* BECK.

2688. *O. viciaefolia* SCOP. — Verosimiliter solum introducta.

2689. *O. montana* LAM. — In glareosis regionis subalpinae et alpinae.

— subvar. *scardica* (GRIS.) HAY. — Foliola parva orbiculari-ovata vel elliptica; dentes calycini tubo suo duplo longiores sparse ciliati. — In graminosis, pascuis, lapidosis regionis subalpinae et alpinae in omnibus montibus dicionis septentrionalis et septentr.-orientalis. — Nikolin do in monte Durnitor (Blau teste ŠIRJAEV), in herbidis montis Ivica supra Šavniki, in pratis alpinis montis Kunj Kostiča distr. Kuči (Ba), in monte Hum Orahovski aversus Konjska Rupa (Sz, Ba), in

declivibus septentrionalibus et occidentalibus montis Kom Kučki (Ja), in montibus Kom (Kosta Marić), Pišće, Nedajno in Pivska planina; Ledena et Čirova pećina in monte Durmitor (De, Si), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), Lukavica planina (Ho), Kom, Sinjavina, Durmitor, Javorje planina (Pt, Pč, Ro); mons Vojnik (Ba); in montibus Dibala, Vila, Strunga distr. Kuči, Ledenica planina distr. Piva, Maglić Pivski; Bukovica et Ranisava sub monte Durmitor; Štirni do prope Lukavica planina forma ad *O. montanam* typicam valde transiens (Ro).

2691. *O. ocellata* BECK (= *O. Tommasinii* JORD.). — Ab affini *O. arenaria* SER. dignoscitur racemis ante anthesin oblongis apice cylindraceis acutis dentibus calycinis subcomosis, subsetaceis 3—4-plo tubo suo longioribus. — In herbidis et lapidosis e regione inferiore (rarius!) usque ad subalpinam ad 1600 m adscendens. — In arvis et pratis prope Bar; in herbidis sub Varda, mons Kom Vasojevički; circa pagum Orahovo distr. Kuči forma ad *O. oxyodontam* transiens (Ba); ad Smiljanici (Ebel teste ŠIRJAEV); circa Njeguši locis pluribus: Torinje, Bogojeva glava, Zanovetni brije (Pej, Ro); ad Podgorica; Drežnica supra Nikšić (Ro). Saepe occurruunt formae ad *O. oxyodontam* transeuntes. In saxosis ad Šavniki legi formam, quae valde ad *O. arenariam* transit — fide ŠIRJAEV (ROHLENA V. Beitr. 34 sub *O. arenaria*).

2692. *O. oxyodonta* BOISS. — Caulis humilis adscendens; foliola 6—8-juga, dense approximata elliptica complicata breviter subargenteo-pilosa; racemi floriferi ovati vel ovato-oblongi 1—3—(4) cm longi ad summum 25-flori, fructiferi quoque abbreviati; calyx adpresso pilosus, calycis dentes tubo suo  $1\frac{1}{2}$ —4-plo longiores margine pilis brevibus ciliatuli. — In regione inferiore et montana. — In glareosis ad Premiči distr. Kuči; in silvis Olearum ad Dabanova Voda prope Bar; in aridissimis secus viam Pristan-Spica ad fines Dalmatiae (Ba), in calcareis circa Medun (Sz), in declivibus montis Balj supra Andrijevica (Ro).

2694. *O. aequidentata* (S. S.) URV. — Annua; racemi pauciflora (1—5)-flori, corolla purpurea calyce tertia parte longior; legumen muticum vel parce spinosum, crista in 5—6 lacinias triangulares integerrimas subaequales partita. — In colibus apricis regionis inferioris mediterraneae. — Ad Pristan Bar (ASCH. GRAEB. Syn. VI. 2: 802).

2695. *O. caput-galli* (L.) LAM. — A praecedente dignoscitur foliolis oblongo-linearibus (nec oblongo-ellipticis), pedunculis 3—6 floris folio suo aequilongis vel parum (nec multo) longioribus; dentes calycini tubo duplo (nec 3—4 plo) longiores; corolla rosea (nec purpurea) calycem subaequans (nec tertia parte longior); legumen ad discum dense spinosum, crista in spinas numerosas subulatas partita. — In arenosis, lapidosis, graminosis regionis inferioris mediterraneae. — Circa Bar (Ba, Ro).

### *Thymelaeaceae*

*Lygia* FASANO.

2697b. *L. passerina* (L.) FASANO. — In lapidosis et arvis regionis inferioris et montanae usque ad 900 m. — Ad Podgorica, Andrijevica; Mratinje sub monte Maglić; Poščensko jezero supra Šavniki (Ro).

— f. *pilifera* ROHL. V. Beitr. 106 (= *Thymelaea arvensis* f. *pilifera* ROHL. III. Beitr. 54). — Caulis pilis longis albis adpressiusculis vel subpatentibus praeditus. — Cum typo ad Bogetići et Dragovoljići supra Danilovgrad; Rudine nikšićke copiose (Ro).

### *Daphne* L.

2702. *D. mezereum* L. — In silvis regionis subalpinae usque ad 1600 m. — Viruša dol sub Crna planina, in valle fluminis Perućica sub monte Kom (Pt), in silvis sub monte Durmitor (Pt, Pč, Ro), in monte Maglić Pivski, ad coenobium Piva, ad latera montis Balj supra Andrijevica (Ro), Sinjavina planina et mons Vojnik (Ba, Ro).

\*2703. *D. laureola* L. — In valle fluminis Morača prope coenobium (Ba).

2705. *D. Blagayana* FREYER. — In silvis regionis subalpinae. — Ad lacus Riblje jezero et Crno jezero sub monte Durmitor (Pč, Ro), in monte Vojnik; Vratlo in Sinjavina planina; mons Ključ supra Kolašin (Ba).

\*2707. *D. alpina* L. subsp. *eualpina* HAY. — In rupestribus regionis montanae, subalpinae, alpinae. — In monte Vučji Zub (Pč), Sutorman supra Bar (Ba), Radovče polje (Ho); in monte Lovćen; circa Njeguši et Cetinje; in monte Ranisava sub monte Durmitor (Ro).

- \*— f. *glabrescens* BECK. — Supra vallem Vrbnica prope Orak distr. Piva; in monte Durmitor loco Savin Kuk (De, Si).
- \*— subsp. *oleoides* (SCHREB.) HAY. var. *glandulosa* (BERTOL.) HAY. — Folia coriacea sempervirentia supra albo-punctata juvenilia utrimque pilosa adulta supra glabrescentia, laciniae perianthii tubo suo paulo breviores. — In rupestribus subalpinis et alpinis. — Jablan vrh in monte Vojnik, in monte Velki Maglić distr. Kuči (Ba); Javorje planina; Dobri do in monte Durmitor; in monte Žoljevica prope Andrijevica (Ro).
- \*— f. *pseudojasminea* ROHL. VIII. Beitr. 1931 pag. 11. — Foliis multo minoribus adultis etiam subtus glabris, receptaculis tubo glabro vel subglabro, ovario subglabro. — In rupestribus montis Maglić Pivski cca 2000 m (Ro).

## *Lythraceae*

### *Lythrum* L.

- \*2716. *L. salicaria* L. — In paludosis, pratis udis, ad ripas e regione inferiore usque ad subalpinam. — In valle fluminis Zeta sub Danilovgrad (Pč), ad ripas lacus Skadarsko jezero (Pč, Ja, Ro), ad Rijeka (Kn), sub monte Kom Kučki (Ho), ad coenobium Morača, Kolašin, Kralje, Pivljan (Ja), in valle Lim ad Andrijevica (Ja, Ro), Zmijničko jezero sub monte Durmitor, circa Nikšić frequens; Perućica sub monte Kom, Mratinje sub monte Maglić, circa Bar et Ulcinj (Ro).
- \*— f. *glabricaule* KOEHNE. — In incultis pagi Orahovo distr. Kuči (Sz), Lipovik prope Rijeka (Ro).
- \*— var. *tomentosum* (MILL.) DC. — Folia utrimque dense incano-pubescentia vel tomentosa. — Cum typo ad Bar (Ro, Do).

2716b. *L. virginatum* L. — In fruticetis udis, ad ripas regionis inferioris. — Circa Rijeka (Pt, Kn), ad Vir (Pč), in valle fluminis Zeta sub Danilovgrad (Pt); ? Konjuhe prope Andrijevica (Ba).

2718. *L. hyssopifolia* L. — In incultis, inundatis, fruticetis uliginosis regionis inferioris. — Circa Rijeka et Danilovgrad (Pt), ad Bar (Ba, Do).

\*2719. *L. thymifolia* L. — A praecedente dignoscitur calyce 4-nervio, dentibus calycinis et epicalycinis 4, staminodiis 4. — In humidis regionis inferioris. — Ad Drušići prope Rijeka (Ro).

2720. *L. tribracteatum* SALZM. — A *L. hyssopifolio* dignoscitur foliis obtusis omnibus alternis, bracteolis florum conspicuis (nec minutis), dentibus epicalycinis triangularibus obtusis, petalis purpureis. — In arvis regionis inferioris. — Ad Šavica distr. Lješanska (Pč), Vrojca distr. Kuči (Ba). (An ne ad spec. praecedentem pertinet?)

*Peplis* L.

2722. *P. portula* L. — In uliginosis et ad fossas regionis inferioris et subalpinæ usque ad 1200 m. — Ad Danilovgrad, in monte Balj supra Andrijevica (Ro).

*Ammannia* L.

2724. *A. verticillata* LAM. — In inundatis regionis inferioris. — Ad Rijeka (Pt).

**Myrtaceæ**

*Myrtus* L.

\*2725. *M. communis* L. — In fruticetis sempervirentibus regionis inferioris mediterraneæ. — Circa Bar (Ba, Ro), ad Ulcinj (Ro), Crmnica (Eb).

**Punicaceæ**

*Punica* L.

2726. *P. granatum* L. — In rupestribus et dumetis regionis inferioris mediterraneæ et montanae calidioris. — Circa monastir Duga, Cerovo, Povia (Pt), inter Cetinje et Bajce (Pč), ad Dobrsko selo supra Rijeka (Pč, Ba, Kn), ad Medun distr. Kuči (Sz), Krstac prope Njeguši cca 700 m (Gi), ad Bioče in valle fluminis Morača (Ja), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Bogetići; Lješanska nahija (Ro), Orani do distr. Katunska nahija; Očeviči et Drušići (Ba); insula Vranina (Eb).

**Oenotheraceæ**

*Ludwigia* L.

2727. *L. palustris* (L.) ELLIOT (= *Isnardia p.* L.). — In fossis et aquis stagnantibus. — Ad Rijeka (Pt, Kn), Vir, Sinjac (Pč), Plavnica (Ro).

*Epilobium* L.

2728. *E. hirsutum* L. — Ad ripas et fossas regionis inferioris et montanae. — Ad Nožica prope Lijeva Rijeka (Ja), in valle fluminis Tara ad Han Garančić, Matoševu, Kolašin (Ja, Ro), circa Andrijevica (Ja, Ro), in campo Nikšićko polje; Jasenovo polje sub monte Vojnik, in valle fluminis Piva sub Goraško et Mratinje (Ro).

— f. *tomentosum* (VENT.) BOISS. subf. *trichocarpum* HAUSSKN. — Ad Topolica prope Bar (Do).

2729. *E. parviflorum* (SCHREB.) WITH. — In humidis et ad fossas regionis inferioris et mediae. — Sub monte Kom Kučki (Ho), ad Rijeka (Kn); ad coenobium Piva et in valle fluminis Piva sub Mratinje; circa Andrijevica (Ro, Ja), ad coenobium Morača, in valle fluminis Tara ad Han Garančić et Matoševu (Ja).

\*2730. *E. montanum* L. — In silvis humidis et in dumetis regionis subalpinae et alpinae. — Viruša dol sub Crna planina, in silvis sub montibus Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ro), ad latera montis Lovćen in Fagetis (Pč, Ro), in montibus Hum Orahovski et Dziebeze distr. Kući (Sz); Bukovica prope Njeguši; Ledenica planina distr. Piva; Šavniki sub monte Ivica planina, ad coenobium Piva (Ro), in valle fluminis Lim ad Andrijevica (Ro, Ja), in monte Balj supra Andrijevica (Ro), in valle fluminis Tara ad Han Garančić, Matoševu, Kolašin; in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), Kostiča distr. Kući (Ba).

— f. *albiflorum* HAUSSKN. — Ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

— f. *subcordatum* HAUSSKN. — Folia basi subcordata; flores maiores. — In valle Perućica sub monte Kom (Sz), ad Andrijevica (Ro).

\*— f. *grandiflorum* ROHL. VIII. Beitr. pag. 12. — Petala magna usque 16 mm longa. — In Fagetis ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

\*2732. *E. lanceolatum* SEB. et M. — In rupestribus ad latera montis Lovćen regionis subalpinae (Pej, Ro).

2733. *E. roseum* (SCHREB.) PERS. — Ad ripas et in fossis regionis montanae. — Mratinje sub monte Maglić Pivski, Šavniki sub monte Ivica planina, in valle fluminis Lim et Zlorječica ad Andrijevica (Ro).

— — f. *simplex* ROHL. IV. Beitr. 49. — Caulis humilis sub-  
*simplex* pauciflorus. — Cum typo ad Andrijevica frequens  
(Ro).

2734. *E. gemmascens* C. A. MEY. — Habitu similis  
*E. alsinefolio*, sed dignoscitur turionibus sessilibus, caule patule  
glandulosopilosum, foliis longius petiolatis in axillis saepe bul-  
billos gerentibus, seminibus papillosis apice rotundatis et ovario  
adpresso incano-puberulo. — In valle fluminis Tara ad Ko-  
lašin (Ro).

2735. *E. adnatum* GRIS. — In paludosis et fossis re-  
gionis inferioris. — In rivo Sušica prope Danilovgrad (Pt),  
prope Sinjac ad ripam lacus Scodrani (Pč); prope Spuž (Ro).

2737. *E. obscurum* (SCHREB.) ROTH. — Ad ripas  
regionis montanae. — Zabrgje et Kralje supra Andrijevica  
(Ro, Ja).

2739. *E. palustre* L. — In pratis turfosis et ad fossas  
regionis subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), in  
silvis sub monte Durmitor (Pt, Ro), Pošćensko jezero supra  
Šavnik; Maglić Pivski; Sjekirica planina et mons Balj supra  
Andrijevica (Ro).

2740. *E. alpestre* (JACQ.) KROCK. — In pascuis, her-  
bidis, dumetosis humidis regionis subalpinae et alpinae. —  
Crvena stijena in monte Durmitor (Pč), Bukovica et Crno  
jezero sub monte Durmitor, Sjekirica planina et Mokra pla-  
nina supra Andrijevica, Bjelastica planina et vallis fluminis  
Jelovica prope Kolašin (Ro), in monte Pivljan cca 1900 m  
prope Kolašin (Ja); Bać inter Kolašin et Andrijevica (Ba).

2741. *E. alsinefolium* VILL. — In turfosis regionis  
subalpinae. — Crno jezero sub monte Durmitor (Pt), Crvena  
Stijena in monte Durmitor (Pč), Mrčenov do sub monte Kom  
(Pč), in monte Velki Maglić distr. Kuči (Sz), Sinjavina pla-  
nina (Ba).

### *Chamaenerion* SCOP.

2743. *Ch. angustifolium* (L.) SCOP. — In caesuris,  
ad margines silvarum, in lapidosis regionis montanae, subalpi-  
nae, alpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), Sinjavina  
planina (Pt, Ba, Ro), in monte Javorje planina (Pč), ad Kola-  
šin (Pč, Ja), in monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz), circa  
Andrijevica (Ho, Ja), in valle fluminis Tara inter Han Garan-

čić et Matoševu, Kolašin; in montibus Pivljan et Peh supra Košlašin (Ja), ad Njeguši, Viljuša, Borkovići distr. Piva; in monte Jerinja glava et in monte Balj supra Andrijevica; Trešnja sub monte Lovćen, Bukovica et Ranisava sub monte Durmitor, Štirni do prope Lukavica planina usque ad 1900 m (Ro).

\* — var. *pubescens* HAUSSKN. — Folia subtus praecipue ad nervum medium et axis inflorescentiae ± dense puberula. — Sub monte Lovćen loco Velje osoje (Ro).

2744. *Ch. palustre* SCOP. — In saxosis, glareosis, ad ripas regionis montanae. — In valle fluminis Morača superioris (Pč), Krstac prope Njeguši, Mratinje sub monte Maglić Pivski, in valle fluminis Lim prope Andrijevica (Ro), Vrujica prope coenobium Morača (Ja).

#### *Circae a* L.

2747. *C. lutetiana* L. — In silvis regionis montanae et subalpinae. — In valle Bistrica prope Nižin Luk (Pt), ad latera montis Lovćen (Pč, Pej, Ro), Sutorman supra Bar (Pč), sub monte Kom Kučki (Ho), in valle Skrobotuša ad fines Albaniae (Sz), in monte Maglić Pivski, ad Njeguši (Ro, Pej), circa Andrijevica (Ja, Ba, Ro), inter coenobium Morača et Bistrica, ad Kolašin, in monte Pivljan prope Kom (Ja).

2748. *C. intermedia* EHRH. — In silvis et dumetosis humidis regionis montanae et subalpinae. — In valle fluminis Tara inter Han Garančić, Matoševu, Kolašin; Brda (Ro).

2749. *C. alpina* L. — In silvestribus muscosis vallis Bukovica sub monte Durmitor regionis subalpinae (Pč), in paucis Bać inter Kolašin et Andrijevica (Ba).

#### *Hydrocaryaceae*

##### *Trap a* L.

2750. *T. natans* L. — In aquis stagnantibus. — Ad Rijeka et Ploča (Pt); in lacu Scodrano copiose (Pč, Eb, Sz, Ba, Ro, Ja).

#### *Haloragidaceae*

##### *Myriophyllum* L.

2751. *M. verticillatum* L. — In aquis. — Ad Rijeka (Pt), Plavnica (Ja).

2752. *M. spicatum* L. — In aquis. — Sub Rijeka (Pt), in lacu Scodrano (Pč, Sz, Ja, Ro), in lacu Rikavac distr. Kuči (Sz, Ba).

### **Hippuridaceae**

*Hippuris* L.

2753. *H. vulgaris* L. — In aquis, fossis, ad ripas regionis inferioris. — In lacu Scodrano ad Vranina et Plavnica (Ro, Ja).

### **Callitrichaceae**

*Callitrichche* L.

2755. *C. verna* L. — In aquis stagnantibus. — In rivulo ad Kolašin (Pč), Štirni do prope Lukavica planina; Barni do in monte Javorje planina (Ro).

2756. *C. hamulata* KUETZ. — In stagno ad Bar regionis inferioris mediterraneae (Ro).

2759. *C. stagnalis* SCOP. — In aquis et fossis. — Ad Mokro prope Bijela (Pt); Jezerski vrh in monte Lovćen (Ho, Ro), circa Bar, Danilovgrad, Spuž (Ro).

2761. *C. autumnalis* L. — Ad rivulum Sušica prope Danilovgrad (Pt).

### **Cornaceae**

*Cornus* L.

2762. *C. mas* L. — In fruticetis et silvis regionis inferioris et montanae. — Circa Grahovo, Vir, ad latera montis Lovćen (Pč), ad Viljuša, Šavniki, Goraňsko, coenobium Piva, Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro), circa Andrijevica (Ro, Ja), Vrojca distr. Kuči (Ba), in monte Kosa supra Bar, Mikulići sub monte Rumija (Do).

2763. *C. sanguinea* L. — In silvis et dumetis regionis inferioris et montanae. — Ad Cetinje et Vir (Pč), circa Podgorica (Ho), ad Bar, Viljuša, Šavniki, Goraňsko, coenobium Piva, Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro).

## Araliaceae

Hedera L.

2765. *H. helix* L. subsp. *euhelix* HAY. — In rupestribus, ad muros, in silvis regionis inferioris et montanae frequens. — Ad Cetinje et Ostrog (Pč); Očeviči, Medun (Ho), ad coenobium Morača (Ja), circa Bar, Ulcinj, Vir, Šavniki, Viljuša; ad Andrijevica rarius (Ro).

## Umbelliferae

Sanicula L.

2767. *S. europaea* L. — In silvis humidis, praesertim fagineis, in lapidosis, inter virgulta regionis montanae et subalpinae usque ad 1700 m. — Viruša dol sub monte Crna planina (Pt), in valle fluminum Morača et Tara (Pč), in valle Skrobotuša ad fines Albaniæ (Sz), in monte Lovćen (Ho, Pej, Ro), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), circa Andrijevica (Ja, Ro), Velje osoje sub monte Lovćen, ad Njeguši (Pej, Ro), Cetinje (Kš), in monte Balj supra Andrijevica, Ljut sub Ledenica planina distr. Piva, supra coenobium Piva (Ro).

Astrantia L.

2770. *A. major* L. subsp. *elatior* (FRIV.) MALÝ. — „Folia involucelli 5-nervia apice saepissime 3—5dentata; dentes calycini rigidi flores duplo superantes; pedicelli et fructus valde papillosi.“ — In pratis, fruticetis, ad margines silvarum e regione montana usque ad alpinam. — Crna planina (Pt), sub monte Durmitor (Pt, Pč, Ba), in monte Hum Orahovski et ad Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz), in monte Lovćen (Ba, Pej, Ro), Čevo in nahija Katunska (Ba), in pascuis Varda sub monte Kom (Ba); Sinjavina planina; in monte Lisinj supra Bar (Ba); Kapetanova rijeka, Rudo brdo, mons Glave supra Kolašin (Ja); Mali Šavnik et Golo brdo supra Njeguši, Korita rovačka, Velestovo in nahija Katunska (Ro). Ad Andrijevica legi plantas, quae dentibus calycinis corolla vix longioribus, involucelli foliis angustioribus 3-(non 5) nerviis ad var. *illyricam* BORB. spectant.

\*— f. *integra* MALÝ. — Involucri phylla saepissime integra. — Cum typo in monte Lovćen (Ro).

— — — f. *carinthiaca* (WETTST.) BECK non HOPPE. — Involucri phylla floribus et fructibus multo longiora. — Cum typo.

\* — — subsp. *eumaior* GRINTZ. var. *involucrata* KOCH. — „Involucri foliolis maioribus 1=nerviis flores fere duplo super=antibus integris vel paudentatis, calycis dentibus longius aris=tatis“ (PANTOCSEK Adnot. 76). — In silvaticis montis Kom et vallis Perućica dol infra Kom (Pt), in pascuis alpinis montis Hum Orahovski, in dumetis aversus Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz). An ne (saltem p. p.) cum subspecie praecedente identica?

### *Eryngium* L.

2771. *E. alpinum* L. — In pratis et pascuis regionis alpinae in montibus dicionis septentrionalis usque ad 2000 m. — Crvena Stijena in monte Durmitor (Pč), Štirni do sub Lola planina (Ba, Ro), Pavlova livada (Ho), in monte Ranisava prope montem Durmitor, in valle Jelovica sub Bjelastica pla=nina supra Kolašin (Ro), Piperska Lukavica, in monte Bać supra Kolašin, Jećmeni do in Sinjavina planina, Štulac prope montem Durmitor (Ba).

\*2772. *E. maritimum* L. — In arenosis maritimis ad Bar (Do).

\*2775. *E. palmatum* VIS. PANČ. — Viride; caulis sim=plex vel pauce ramosus; folia basalia et caulina inferiora longe petiolata ad basin usque 5—7=palmato=partita, segmentis con=spicue reticulato=venosis oblongo=cuneatis apice 2—3fidis spi=nuloso=serratis; folia involucelli lanceolata remote spinuloso=dentata capitula subduplo superantia; paleae receptaculi trifidae. — In pratis, silvaticis, dumetis, lapidosis, glareosis regio=nis montanae et subalpinae usque ad 1400 m. — In saxosis Orlova skala dictis in valle Perućica dol infra montem Kom et circa pagum Lukovo (Pt), Nikšićka župa (Pč), in monte Balj supra Andrijevica (Ba, Ro), Konjuhe sub monte Kom (Ba), in monte Vojnik, ad Šavniki sub monte Ivica planina, circa Viljuša, Gorańsko, coenobium Piva, inter Nedajno et Crkvica in Pivska planina (Ro), Crna planina distr. Kuči, in monte Jerinja glava supra Andrijevica (Sk).

2779. *E. amethystinum* L. — In lapidosis, incultis, pascuis, ad vias regionis inferioris et montanae calidioris usque

ad 1200 m. — Ad Cetinje et Grahovo (Pč), circa Njeguši frequens (Sz, Kn, Pej, Ro), ad Rijeka, Medun, Podgorica (Sz, Ba, Ho, Ro), in valle fluminis Morača prope Bioče (Ja), ad latera montis Vojnik, in campo Jasenovo polje, Šavnik sub monte Ivica planina, Garać supra Danilovgrad, circa Viljuša (Ro), Tudjemile supra Bar, Nikšićko polje, Bijela sub monte Vojnik, Tušina prope Šavnik, Kolašin, Konjuhe prope Andrijevica (Ba), ad Bar (Do).

\*— var. *tenuifolium* BOISS. — Petioli fere inermes; foliorum pinnae angustiores elongatae; tota planta viridis, solum caulis parum violascens. — In declivibus montis Lovćen versus Njeguši (Pej, Ro).

2780. *E. campestre* L. — In pascuis, aridis, lapidosis, ad vias regionis inferioris et montanae usque ad 1000 m. — Bioče in valle Morača (Ja), in valle Zlorječica prope Andrijevica, circa Podgorica et Njeguši (Ro).

### *Bupleurum* L.

\*2785. *B. ranunculoides* L. subsp. *euranunculoides* HAY. var. *humile* (GAUD.) BRIQ. — In saxosis et pascuis in monte Maglić Pivski ultra 2000 m (Ro).

2789. *B. Siphonopianum* SM. — In graminosis regionis montanae, subalpinae, alpinae ultra 2000 m. — Orlova skala sub monte Kom, in valle fluminis Tara, supra pagum Kovčice sub monte Durmitor (Pt, Ba), in monte Dziebeze distr. Kući (Sz), Planinica et Rikavac distr. Kući, Konjuhe sub monte Kom (Ba), in monte Balj supra Andrijevica (Ba, Ro), in montibus Durmitor, Velka Jastrebica, Javorje planina (Pč), in saxosis supra coenobium Ostrog (Ho), Sinjavina et Javorje planina, Štirni do prope Lukavica planina, in monte Kom Vasojevički, mons Žoljevica prope Andrijevica, Lastva čevska in nahija Katunska, ad latera montis Lovćen versus Njeguši (Ro), in montibus Jastrebica et Orijen (Ad).

— f. *montenegrinum* H. WOLFF. — Folia linearia obtusa vel breviter acuminata basin versus parum attenuata. — Cum typo non raro.

— var. *orbicum* (VELEN.) HAY. — „Folia basalia linearis oblonga basin versus sensim petioliforme attenuata, caulinis e basi parum dilatata sensim longe acuminata multinervia; umbella 6–10 radiata.“ — In monte Balj supra Andrijevica,

in monte Ranisava prope montem Durmitor, Božur et Varda planina distr. Piva, in montibus Kom et Sinjavina planina (Ro), ad Han Garančić in valle fluminis Tara, in montibus Pej, Rudo brdo, Peh, Glave supra Kolašin (Ja), in montibus Jerinja glava et Visitor prope Andrijevica (Sk), in valle fluminis Tara prope Lever Tara (De, Si).

\*2790. *B. junceum* L. subsp. *Wettsteinianum* (H. WOLFF) HAY. — In graminosis, saxosis, dumetis regionis inferioris, montanae, subalpinae. — Dobre Strane prope Čeklići distr. Katunska (Pč), ad Cetinje (Kn), ad latera montis Velki Maglić et supra Kurlaj distr. Kuči (Ba), ad Bar et Ulcinj (Ho), circa Viljuša; Medun supra Podgorica, ad pedem montis Balj prope Andrijevica (Ro).

2799. *B. Kartiglii* VIS. — In rupestribus regionis montanae et subalpinae. — Orlova skala sub monte Kom; Nižin luk prope Kolašin; ad Šavniki sub monte Ivica planina (Pt), ad Cetinje (Pč, Ro), Čevo, Lastva čevska (Pč, Ro), Grahovo, Nikšićka župa (Pč), in valle Vrbnica distr. Piva (De, Si), Buskovica sub monte Durmitor, Nikšićko polje; Tušina prope Šavnik; Vrojca distr. Kuči (Ba); circa Njeguši et Krstac frequens (Ba, Kn, Pej, Ro); in monte Hum Orahovski et ad pedem montis Kukuraj distr. Kuči (Sz), Lonac supra Bar (Ba); Rikavac et Soko distr. Kuči (Ba), in monte Vjetnik ad latera meridionalia; ad ostium rivi Bistrica in flumen Tara; in declivi montis Pej supra Kolašin (Ja), Zagarać supra Danilograd; Čulice prope Cetinje; Viljuša, Šavnik, Borkovići (distr. Piva), Uble prope Podgorica, in saxis calcareis ad Andrijevica (Ro); ad latera montis Lovćen (Ad, Vh, Kš, Pej, Ro), Vunsaj prope Gusinje ad fines Albaniae (Df), ad Kolašin; Konjuhe prope Andrijevica (Ba); in monte Rumija supra Bar (Do).

— f. *strictum* H. WOLFF. — Frequens.

— f. *patulum* H. WOLFF. — Caulis humilis a basi ramosissimus ramis prostratis vel arcuato-adscendentibus. — Cum typo ad Krstac prope Njeguši (Pej, Ro), in monte Lovćen (Sk).

\*— var. *aureum* HORÁK. — „Umbellae radiis ubique quaternis, involucri phyllis linearis-lanceolatis setaceo-acuminatis, involucelli phyllis submajoribus aureis, pedunculis flore sublongioribus.“ — In graminosis calidis regionis inferioris mediterraneae ad Rijeka (Ho).

2801. ? *B. semiadiaphanum* BOISS. — A cl. BALDACCII e monte Lisinj prope Bar et e Vrojca distr. Kuči indiscat. A cl. HAYEK non commemoratum.

2804. *B. veronense* TURRA. — In lapidosis, aridis, collibus apricis graminosis et saxosis regionis inferioris mediterraneae et montanae calidioris frequens usque ad 1350 m. — Circa Danilovgrad, Šavniki, Bogetići (Pt, Ro), ad Rijeka (Pt, Ho, Ro, Ba), circa Njeguši et Čeklići (Pč, Pej, Ro), Medun supra Podgorica (Sz), Cetinje (Kš), in monte Lovćen; Tušina prope Šavniki (Ba), ad Bar (Ro, Do), Limljani prope Vir (Do), insula Vranina (Eb), circa Ulcinj, Podgorica, Lastva čevska, Pišine strane supra Bogetići (Ro); ad Bioče et coenobium Morača; in monte Vjeternik in declivibus meridionalibus; in collibus aridis ad Kolašin (Ja).

— f. elegans (BALD.) HAY (= *B. variabile* var. *elegans* BALD.). — „Caulis induratus basi cylindricus superne quadrangulus; tota planta speciosa viridissima“ (BALD.). „Gracile ramosum; folia involucelli florendi tempore dilute flava semipellucida late lanceolata longe aristata copiose venulosa“ (HAYEK Prodr. Fl. pen. Balk. I: 980). — In pratis et silvis sub jugo montis Sutorman supra Bar (Ba).

— f. *diffusum* LEVIER. — Ramosissimum, ramis divaricatis dichotomis, caulis egregie quadrangulis, planta gracilis statura 5—8 cm. — In saxosis montanis ad Pračište et Krstac ad Njeguši (Ba); etiam alibi (Ro).

— f. *humile* (VEST.) HAY. — Humile ad summum 15 cm altum dense breviter ramosum; folia involucelli 4—8 mm longa florendi tempore viridia. — Non raro cum typo (Ba, Ro).

2808. *B. lancifolium* HORNEM. — In agris, incultis, dumetis regionis inferioris mediterraneae et montanae calidioris usque ad 1000 m. — Circa Bar, Ulcinj, Vir; ad Njeguši rarius (Ro).

2809. *B. rotundifolium* L. — In agris et incultis. — Ad Cetinje et Vir (Pč), circa Andrijevica (Ro, Ja).

### *Trinia* HOFFM.

2810. *T. glauca* (L.) DUM. (= *T. Kitaibelii* ROHL. IV. Beitr. 54 non M. B.) var. *Jacquinii* (DC.) H. WOLFF. — In pratis, pascuis, lapidosis regionis montanae, subalpinae, alpinae ultra 2200 m. — In omnibus montibus dicionis septentrionalis

et orientalis frequens; etiam in nahija Katunska, Čevski Lisac, Lovćen, Njeguši etc.

— var. *durmitorea* ROHL. V. Beitr. 50. — Fructibus duplo vel subdupo maioribus, cca 5 mm longis et 1,5—2 mm latis oblongis (nec subrotundis), pedicello dimidio vel plus brevioribus, stylopodio non elongato. — In graminosis montis Durmitor loco Valoviti do cca 2000 m.

— var. *carniolica* (KERN.) HAY. — „Pedicellis fructiferis brevioribus fructus longitudine semper superantibus et externis iis 2—2,5×plo longioribus.“ (BECK Fl. Bosne III: 410). — In alpinis montis Ledenica planina et in monte Maglić Pivski (Ro), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja).

2814. *T. Dalechampii* (TEN.) JANCH. Oe. B. Z. LVIII: 298; confer BECK Fl. Bosne III: 984. — Similis *T. carniolicae*, sed fructus jugis primariis 5, secundariis 4 instructi valleculis 2—3×vittatis. — E Montenegro a cl. H. WOLFF indicata et a cl. ADAMOVIĆ lecta. Locus mihi ignotus.

### *Petroselinum* HOFFM.

2821. *P. hortense* HOFFM. — In hortis cultum.

### *Ammi* L.

2825. *A. maius* L. — Inter vineas regionis inferioris mediterraneae. — Ad Vir (Pč).

### *Ptychotis* KOCH.

\*2827. *P. ammoides* KOCH. — In lapidosis, incultis, dumetis, ad vias regionis inferioris mediterraneae. — Lješko polje (Ho), circa Podgorica (Ro).

### *Falcaria* BERNH.

2828. *F. vulgaris* BERNH. — In declivibus asperis vallis Zeta sub Danilovgrad (Pč).

### *Carum* L.

2829. *C. carvi* L. — In pratis regionis subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina, vallis Perućica sub monte Kom (Pt), in pratis sub monte Durmitor (Pt, Pč, Ro), Matoševa in valle fluminis Tara (Ja); in monte Durmitor usque ad 2300 m (De, Si).

2830. *C. Velenovskýi* ROHL. III. Beitr. 34. (= *C. carvi* L. subsp. *Velenovskýi* ROHL. in sch.). — Glabrum, glaucovirens, caule elato (cca 1—1 $\frac{1}{2}$  m alto), tereti dense subtiliter striato, foliis caulinis ambitu oblongis bipinnatipartitis, laciniis anguste linearibus (cca  $\frac{1}{2}$ —1 mm latis, 10—25 mm longis) integerrimis uninerviis margine scabris et parum revolutis, involucri phyllis 6—8, rarius subnullis anguste linearibus indivisis vel bis tripartitis usque 1 $\frac{1}{2}$  cm longis, involucelli phyllis subnullis minutissimis, floribus albis, fructibus maioribus cca 6 mm longis et 2,5—3 mm latis, valleculis univittatis, jugis crassis, stylis recurvis rubellis stylopodio fere duplo longioribus. Planta e seminibus montenegrinis culta a Caro Carvi L. dignoscitur statura elatiori, foliis inferioribus latius triangularibus segmentis lateraliter magis pinnatisectis laciniis angustioribus longioribus, laciniis foliorum caulinorum eximie elongatis fere setaceis, umbellis etiam terminalibus longius pedunculatis, ramis magis elongatis, fructibus maioribus. — Inter segetes ad Gornja Bukovica sub monte Durmitor cca 1400 m (Ro).

*Bunium* L.

2837. *B. ferulaceum* S. S. — Pedicelli fructiferi stellatim patentes incrassati, umbella 6—14 radiata; involucrum oligophyllum (1—2) vel subnullum; fructus prismatico-cylindricus *pedicellis aequilongus*; mericarpia 5 angula valleculis univittatis. — In rupestribus regionis inferioris mediterraneae. — A cl. HAYEK e Montenegro indicatum; verosimiliter ad Bar et Ulcinj.

2838. *B. montanum* KOCH. — In lapidosis, saxosis, dumetis regionis inferioris et montanae calidioris, rarius subalpinae usque ad 1400 m. — Ad latera montis Lovćen (Pč, Pej, Ro, Vh, Kš), circa Cetinje (Ba, Če); Vrh suta distr. Crmnica; Bijela Skala et Medjurečka planina supra Bar (Ba), circa Njeguši (Ro), Golo brdo supra Njeguši (Gi), ad Viljuša, Vir, Podgorica, Zagarać supra Danilovgrad, Kokoti distr. Lješanska, Lastva čevska distr. Katunska, Godinje prope Vir, Črtov do sub Ledenica planina distr. Piva (Ro), Konjuhe sub monte Kom (Ba, Ro), in monte Rumija supra Bar (Do).

2839. *B. alpinum* W. K. — Caulis humilis decumbens flexuosus folia basalia vix superans; folia inferiora longe petiolata ternatobipinnatipartita laciniis appropinquatis abbreviatis lanceolato-linearibus carnosus crassiusculis inconspicue 1-nerviis

obtusiusculis vel acuminatis, umbellae 5—6 (rarius —10) radiae, radiis umbellula fructifera duplo (rarius usque quadruplo) longioribus. — In lapidosis mobilibus, saxosis regionis alpinae usque ultra 2400 m. — In omnibus montibus elatioribus: Kom (Pt, Pč, Ba, Ho, Ro), in montibus Strunga et Vila distr. Kuči (Ba), Maglić Pivski, Durmitor; Balj et Jerinja glava supra Andrijevica; etiam in monte Lovćen (To, Ro); Golo brdo prope Njeguši (Gi).

### Freyera RCHB.

2846. *F. cynapioides* (GUSS.) GRIS. Spic. I: 366 (= *Bia-solettia pindicola* ROHL. III. Beitr. non HAUSSKN.). — In lapidosis graminosis, inter dumeta regionis subalpinae et alpinae usque ad 1900 m. — In monte Sinjavina planina (Pt), Kunj Kostića sub monte Vila distr. Kuči (Ba, Df), in monte Lovćen; montes Jerinja glava et Sjekirica planina supra Andrijevica; Štirni do sub Lola planina (Ro), in monte Durmitor (De, Si), in monte Rasovatac prope Vir (Eb).

— var. *montenegrina* (BALD.) HAY. — Caulis glaber, laciniae foliorum superiorum capillares; pedicelli fructiferi fructu 2—3-plo longiores. — Habitat in umbrosis ad jugum Sutorman et in monte Vrh-suta supra Bar (Ba).

### Pimpinella L.

2852. *P. major* (L.) HUDS. — In pratis silvestribus supra Kolašin, ad Cetinje (Kn) usque ad 1000 m.

2855. *P. saxifraga* L. — In graminosis siccis, in lapidosis, ad vias regionis montanae et subalpinae usque ad 1400 m. — Ad Ceklin (Ho), circa Šavnik sub Ivica planina; ad coenobium Piva, circa Žabljak sub monte Durmitor (Ro); Sinjavina planina (Ba).

— var. *nigra* (WILLD.) SPRENGL. — Tota planta + dense breviter pubescens. — In pratis subalpinis ad Vrtljeka in valle Tara super. (Ja).

— var. *erythrantha* BECK (confer ROHL. V. Beitr. 49). — „Caulis humilis basi puberulus; foliola foliorum inferiorum oblique suborbicularia grosse serrata, ea caulinorum palmato-incisa; flores rosei, stylus ovario longior.“ — In pratis et pascuis regionis alpinae in monte Maglić Pivski usque ad 2000 m (Ro).

2856. *P. polyclada* B. H. — In saxosis Skala Rikavac distr. Kuči; num. collect. 435 (Ba). „Forma caulibus et foliis breviter pubescentibus.“ Verosimiliter ad speciem sequentem pertinet.

2857. *P. tragium* VILL. — A *P. saxifraga* L. dignoscitur praesertim fructibus dense breviter pubescentibus, foliolis foliorum basarium irregulariter inciso-serratis. — In pascuis, pratis, lapidosis regionis subalpinae et alpinae usque ad 2000 m. — Treblješ luka (Ho), Ječmeni do in Sinjavina planina (Ba).

— f. *bipinnatisecta* GRIS. ap. PANT. Adnot. 78. — Folliis inferioribus bipinnatisectis. — In graminosis montis Sinjavina planina (Pt).

— f. *hercegovina* VANDAS in ROHL. V. Beitr. 49. — Caulis elatior et subglaber; folia basalia ad 6-jugo-pinnata foliolis longe (ad 1 cm) petiolulatis profunde incisis vel pinnatisectis. — In alpinis montis Maglić Pivski; Črtov do sub Ledena planina, Štirni do sub Lola planina; Lukavica planina usque ultra 2000 m (Ro).

2859. *P. peregrina* L. — Fructus patule hispidus, radix annua vel biennis. — In collibus siccis, in incultis, lapidosis, fruticosis regionis inferioris mediterraneae. — Circa Medun distr. Kuči (Sz), ad Ulcinj (Ba), in campo ad Podgorica (Ro), circa Bar (Do).

### Pančićia VIS.

2862. *P. serbica* VIS. (conf. ROHLENA IV. Beitr. 54). — In pratis et pascuis subalpinis et alpinis usque ultra 2000 m. — Crna planina (Pt), in monte Kom (Pt, Ba, Ro), Sinjavina planina (Pt, Ro), in monte Durmitor (Pt, Pč, Ba, Ro), ad Gvozd (Pč); Javorje planina (Pč), Komarske katune sub monte Durmitor (Ba), sub monte Žijovo (Ba), Carine et Varda sub monte Kom (Ba, Ro), in monte Lisa prope Kolašin (Ba), Pavlova livada (Ho), Kunj Kostića distr. Kuči (Ba), Kapetanova rijeka prope Kolašin (Ja), in monte Maglić Pivski (Ro), ad lacum Volučko jezero (Ma), Štirni do sub Lola planina, Korita rovačka; in montibus Jerinja glava, Zeletin, Sjećkirica planina supra Andrijevica (Ro); e montibus dicionis meridionalis (Lovčen, Lastva čevska, Rumija) non vidi; ad Vunsaj prope Gusinje, in alpinis montis Vila prope Rikavac distr. Kuči (Df), Pivska planina (De, Si).

### *Aegopodium* L.

2864. *Ae. podagraria* L. — In umbrosis humidis, ad ripas regionis inferioris et subalpinae. — In dumetis vallis Zeta et Morača (Pč), ad rivum prope Bukovica sub monte Durmitor, Krivača sub monte Lovćen, ad pedem montis Jezrinja glava et in valle Lim prope Andrijevica (Ro) usque ad 1400 m.

### *Sium* L.

2865. *S. latifolium* L. — In spongiosis et paludosis. — Ad Sinjac (Pč), Plavnica (Ro, Ja).

### *Betula* KOCH.

2867. *B. erecta* (HUDS.) COVILLE. — In fossis, paludosis, irriguis regionis inferioris et mediae. — Circa Danilovgrad (Pt); in irriguis supra Kolašin et ad rivum Morača super. (Pč); sub monte Ključ supra Kolašin (Ba).

### *Critchmum* L.

2868. *C. maritimum* L. — In lapidosis, arenosis, rupestribus maritimis ad Bar (Ro, Ba, Do).

### *Seseli* L.

2874. *S. rigidum* W. K. — Caule pedali crasso rigido superne ramoso subtomentoso, foliis glaucis ternato-2—3-pinnatisectis, laciniis linearibus rigidis subpungentibus, umbellis 10—20-radiatis densissimis, radiis usque 4 cm longis fructibusque tomentosis, involucellis basi in discum coalitis in lacinias lanceolato-subulatas cano-tomentosas albomarginatas umbellulis aequilongas irregulariter fissis. — In rupestribus regionis montanae, subalpinae, rarius alpinae. — Javorje planina, mons Kom, coenobium Morača (Pč), Pošćensko jezero supra Šavnik, Martinje sub monte Maglić Pivski, mons Šarišnik supra Goraško distr. Piva, in monte Žoljevica supra Andrijevica (Ro).

2878. *S. globiferum* VIS. — A praecedente differt caule glabro basi lignoso ramosissimo, foliorum magis divisorum laciniis linear-setaceis canaliculatis (margine involutis), umbellis densioribus radiis brevioribus (cca 1 cm longis), 20—30 in globum congestis, involucelli phyllis ad medium usque in infundibulum connatis ovato-lanceolatis, floribus virescenti-al-

bis. — In saxosis calcareis regionis inferioris et montanae calidioris usque ad 1000 m. — Ad Cetinje, Vir, Ostrog (Pč); Krstac, Velji Kraj, Gojanove grede prope Njeguši (Pej, Kn, Ro), supra Bar (Ba), in monte Troica prope Vir (Eb).

2883. *S. Tommasini* RCHB. — In rupestribus et lapi-  
dosis e regione inferiore usque ad subalpinam, sed non frequens.  
— Viruša dol sub Crna planina; Carine sub monte Kom (Pt  
sub *S. montano*); circa Grahovo et in monte Jastrebica (Pč sub  
*S. montano*), ad Cetinje (Kn), in aridis circa Tušina distr.  
Drobnjaci (Ba), ad Borkovići sub monte Durmitor (Ro),  
in saxis ad Bar, ad Bijela prope Šavnik (Ba), Kunji do prope  
Njeguši (Pej, Ro).

2884. *S. annuum* L. — In pratis silvestribus regionis  
subalpinae sub monte Durmitor (Pč).

2888. *S. variun* TREV. — In collibus siccis, in lapi-  
dosis, in glareosis regionis montanae et subalpinae. — Ad Šav-  
niki sub Ivica planina; supra Njeguši; in monte Jerinja glava  
supra Andrijevica (Ro).

— var. *umbrosum* ROHL. V. Beitr. 47. — Caulis elatior,  
folia maiora laciniis longioribus fere filiformibus, umbellae  
radii valde elongati. — Ad Njeguši et ad latera montis Lovćen  
(Pej, Ro).

— var. *longicarpum* ROHL. in FEDDE Rep. III: 146. —  
Fructus linearis oblongi 5 mm longi pedicello duplo longiores.  
— Mravljanik et Krstac prope Njeguši; ad Viljuša in finibus  
Hercegovinae, in saxis inter Bukovica et Njeguši, Vučevo  
ždrijelo sub monte Lovćen (Ro, Pej).

2895. *S. peucedanoides* (M. B.) HAY. — Planta  
glabra; caule angulato-striato superne parce et stricte ramoso;  
foliis petiolatis ambitu oblongis bipinnatisectis, laciniis oblongo-  
linearibus mucronatis margine scabriusculis; umbellis inaequa-  
liter 5—20-radiatis; involucro pleiophyllo, involucelli phyllis  
linearis-setaceis pedunculis subaequilongis, petalis pallide luteis  
non radiantibus. — In pratis et herbidis regionis subalpinae.  
— Sub monte Durmitor versus jugum Štulac (Pč), in montibus  
Balj, Piševi, Sjekirica planina supra Andrijevica (Ba, Ro),  
Bijela sub Lola planina; mons Šarišnik prope Goraňsko; Varda,  
Zakamen, Ljut supra coenobium Piva (Ro); etiam ad latera  
montis Lovćen loco Ljut supra Njeguši (Pej, Ro).

*Libanotis* CR.

2896. *L. montana* CR. — In rupestribus, lapidosis, dumetis regionis montanae calidioris et subalpinae. — In valle fluminum Tušina et Morača super. (Pč); circa Njeguši frequens: Mali Šanik, Košarica, Bjelice (Pej, Ro).

2897. *L. daucifolia* (SCOP.) RCHB. (= *L. montana* b. *athamanthoides* ROHL. V. Beitr. 47). — In rupestribus regionis montanae et subalpinae. — Foliis magis divisus (ac in *L. montana* typica), laciinis angustioribus et longioribus, fructibus et eorum pedicellis glabris vel subglabris cum descriptione in BECK Flora Bosne III: 436 bene congruit, sed radiis  $\pm$  puberulis vel pilosis ad plantam typicam spectat. Vidi etiam plantas, quae foliorum forma *L. daucifolium* revocant, sed fructibus dense puberulis cum *L. montana* typica congruunt. — Njeguši; Mali Šavnik in monte Lovčen; in monte Maglić Pivski (Ro), supra lacum „Lokva“ sub monte Durmitor (De, Si). — var. *ciliata* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Foliola foliorum basaliū in nervis pilosa et in marginibus ciliata. — In alpinis montium Prokletija (Boš).

*Oenanthe* L.

2898. *Oe. aquatica* (L.) LAM. — In paludosis et fossis regionis inferioris. — In lacu Scodrano (Pč, Sz, Ro), inter Danilovgrad et Spuž (Ro), ad Vrojca distr. Kuči (Ba).

\*2902. *Oe. silaifolia* M. B. — In humidis ad rivum Sušica prope Danilovgrad (Pt), ad Cetinje (Ba).

— var. *media* (GRIS.) BECK Fl. N. Oe. II: 641 (conf. ROHL. VII. Beitr. 2). — In lacu Scodrano; Plavnica, Gornje blato; ad Danilovgrad et Andrijevica (Ro) usque ad 800 m.

2907. *Oe. pimpinelloides* L. — In humidis, lapidosis, fossis regionis inferioris et mediae. — Ad Rijeka et Danilovgrad; Mokro sub monte Vojnik (Pt), Gornje blato prope Plavnica (Ro), Novi Bar (Do).

2909. *Oe. incrassans* CH. et B. — A praecedente differt umbellis sub fructu fere semiglobosis (nec planiusculis), radiis 4—10 inflato-incrassatis. — In pratis paludosis regionis inferioris mediterraneae ad Mosor prope Podgorica et ad Bar (Ro).

2911. *Oe. fistulosa* L. — In recessibus lacus Scodrani (Pč, Ro); etiam in stagno ad Nikšić (Ro).

*Aethusa* L.

2913. *Ae. cynapium* L. — In agris, incultis, ruderatis, ad sepes regionis montanae. — Ad Kolašin (Pč), Andrijevica (Ro).

*Portenschlagia* VIS.

2914. *P. ramosissima* (PORT.) VIS. — In rupestribus calcareis regionis inferioris et montanae calidioris. — Pestinograd supra sinum Rhizonicum, in montibus Lisinj et Sutorman supra Bar; ad Boljevići prope Vir; Krstac prope Njeguši (Ba, Pej, Ro); in calcareis vallis fluminis Morača prope Bioče (Ja), Tudjemile prope Bar (Ba), Vučević ždrijelo sub monte Lovćen (Pej).

*Athamanta* L.

2918. *A. Haynaldii* BORB. et UECCHTR. — In saxosis regionis subalpinae et alpinae. — Viruša dol sub Crna planina, Orlova skala sub monte Kom (Pt), in monte Lovćen locis pluribus (Pč, Ho, Kš, Pej, Ro), in montibus Maganik et Tičnjak (Ho), in alpinis montis Dziebeze distr. Kuči (Sz), in montibus Soko, Vila, Žijovo, Dibala, Strunga, Hum Orahovski distr. Kuči (Ba); in valle fluminis Mala Rijeka prope Nožica, in montibus Pej et Pivljan prope Kolašin, in valle fluminis Tara inter Han Garančić et Kolašin (Ja), circa Andrijevica (Ja, Ro); Krstac prope Njeguši; in monte Ranisava sub monte Durmitor; Božur planina distr. Piva, Štirni do sub Lola planina; mons Jerinja glava supra Andrijevica (Ro) usque ad 1900 m; ad Vunsaj prope Gusinje ad fines Albaniae (Df), in monte Jastrebica (Ad).

— f. *pilosa* WETTST. Beitr. Fl. Alb. 46. — Folia + pilosa.  
— Non raro cum typo. — Andrijevica, Štirni do, Lovćen, Krstac (Ro).

? 2919. *A. cretensis* L. — A praecedente differt umbellis 5—12 radiatis (nec 15—25), foliis dense pubescentibus magis divisis (3—5 pinnatisectis), laciniis tenuioribus (0,3—0,8 mm latis), fructibus oblongis ad apicem attenuatis maioriibus (6—8 mm). — A cl. PANČIĆ in rupestribus montis Dur-

mitor jugo Šljeme indicata; Sinjavina planina, Dobri do in monte Durmitor (Ba). An ad speciem praecedentem pertinet? — var. *decipiens* DUBY. — Planta glabrescens; foliorum laciniae angustiores longioresque. — In silva ad latera montis Dziebeze distr. Kuči in societate *A. Haynaldii* (Sz). An ad speciem praecedentem pertinet? (Confer BECK Fl. Bosne III: 444).

### *Foeniculum* HILL.

\*2921. *F. vulgare* MILL. — In rupestribus, saxosis, lapidosis regionis inferioris mediterraneae. — Ad Podgorica, Medun, Uble distr. Kuči (Ro).

### *Meum* HILL.

2925. *M. athamanticum* JACQ. — In pascuis, herbidis, lapidosis, glareosis regionis subalpinæ et alpinae usque ultra 2000 m. — In montibus Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ba); Javorje planina (Pč, Ro), in herbidis montium Planinica et Mojan distr. Kuči (Ba); Rudo brdo et Pivljan supra Kolašin (Ja), Sinjavina planina; in montibus circa Andrijevica: Zeletin, Sjekirica, Mokra, Bjelastica, Krivi do (Ro).

### *Cnidium* GUSS.

2926. *C. silaifolium* (JACQ.) SIMK. — In rupestribus et dumetosis regionis montanae calidioris. — Ad Simunj distr. Katunska (Ro), in montibus Kosa et Rumija supra Bar (Do), in valle rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

— f. *umbrosum* ROHL. Acta bot. boh. II:24. — Folia tenuiora segmentis latioribus. — In umbrosis ad Njeguši (Pej, Ro).

— var. *orientale* (BOISS.) HAL. Consp. I:648 (cf. ROHLENA V. Beitr. p. 46). — Folia rigidiora ambitu triangularia segmentis cuneato-ovatis in lacinias cuneato-oblongas obtusas saepe + lobatas fissa. — Rudine nikšićke; supra coenobium Piva; Trešnja et Čeklići prope Njeguši (Ro).

### *Selinum* L.

2929. *S. carvifolia* L. — In Salicetis vallis Zeta prope Danilovgrad (Pč).

*Ligusticum* L.

2930. *L. Seguieri* (JACQ.) KOCH. — In saxosis regionis montanae et subalpinae. — Sub monte Durmitor et in clivo Mali Lonac montis Sutorman; ab indigenis sub nomine „Velje zelje“ remedium populare laudatum (PANČIĆ Elench. 36).

— var. *balcanicum* (THELL.) HAY. — „Caulis angulato-sulcatus; foliorum laciniae breviores; involucelli phylla late membranaceo-marginata.“ — In valle fluminis Piva in declivi montis Maglić prope Mratinje (Ro); ad latera montis Lovčen (Pej, Ro).

2931. *L. mutellina* (L.) CR. — In pascuis, lapidosis, glareosis regionis alpinae raro. — Crna planina, Kom, Sinjavina planina, Mali Durmitor (Pt), in monte Velki Maglić distr. Kući (Sz); Jablan vrh supra Kolašin (Ba). Verosimiliter partim ad speciem sequentem pertinet.

\*2932. *L. albanicum* JĀV. (= *Meum Vandasi* ROHL. VI. Beitr. 21; *Ligusticum mutellina* subsp. *Vandasii* ROHL. l. c.). — A praecedente dignoscitur caule angulato-striato, foliorum laciis anguste linearibus vel linear-lanceolatis multo angustioribus (cca 0,5 mm) margine denticulato scabris, vaginis basalibus demum non fibrosis, umbellae radiis costatis asperulo-puberulis. — In pascuis sub monte Kom loco Štavna cca 1600 m (Ro).

*Angelica* L.

2934. *A. silvestris* L. — In pratis humidis ad lacus Barno et Pošćensko jezero sub monte Durmitor (Ro), in rivularibus sub monte Durmitor forma depressior, floribus roseis, involucro polyphyllo (PANČIĆ Elench. 36).

— var. *elatior* WAHLENB. (= *A. montana* SCHLEICH.); confer BECK Flora Bosne III: 454. — In umbrosis irriguis ad rivum Morača super. (Pč). — Sec MALÝ (Glasnik 1919, pag. 67) ad *A. Pančićii* VAND. pertinet.

\*2936. *A. brachyradiata* FREYN var. *Pančićii* (VAND.) HAY. — „Ab *A. silvestri* differt proportionibus multo maioribus, praecipue autem foliis magis decompositis, nam inferiorum segmenta primae ordinis bitemnatim decomposita sunt, segmentumque ordinis secundae 5—7na segmenta utrimque gerit, quorum unumquodque utrimque 3—4 foliola habet“

(VELEN. Fl. Bulg. 200). — Ab *A. brachyradiata* FREYN dignoscitur foliis glabris, fructibus fere dimidio minoribus pedicellis 2—4-plo brevioribus. — Ad rivulum prope Šavnički sub monte Ivica planina cca 900 m (Ro).

*Ostericum* HOFFM.

2939. *O. palustre* BESS. — In Alnetis supra Kolašin regionis subalpinae (Pč).

*Ferula* L.

2948. *F. communis* L. — In rupestribus calcareis supra coenobium Ostrog (Pč), Medun distr. Kuči; Nikšić (Ba).

2949. *F. glauca* L. — A praecedente dignoscitur foliorum laciniis linearibus (nec linearifiliformibus) obtusiusculis 1—2,5 mm latis subtus glaucis (nec viridibus) elevato-uninerviis, fructibus subminoribus glauco-pruinosis, vittis vallecularibus 3-fructu paulo (nec dimidio) brevioribus. — In rupestribus calcareis regionis inferioris mediterraneae. — Ad Bar (Ro).

*Ferulago* KOCH.

2951. *F. silvatica* (BESS.) RCHB. var. *commutata* (ROCH.) HAY. — A *F. galbanifera* dignoscitur foliis basilibus ambitu oblongis vel oblongo-lanceolatis basin versus angustatis, laciniis dense approximatis breviter linearilanceolatis longius mucronatis, involuci phyllis latioribus. — In pascuis et graminosis regionis subalpinae et montanae cca 1000—1500 m. — Inter Nedajno et Crkvica in Pivska planina, ad Šavnički sub Ivica planina; Ravno distr. Piva, Goraňsko supra coenobium Piva, Velestovo in nahija Katunska (Ro), Medun distr. Kuči (Ba).

2955. *F. galbanifera* KOCH. — In saxosis et herbidis regionis montanae et subalpinae. — Supra coenobium Ostrog (Pč), Borkovići distr. Piva, in declivi montium Vojnik et Maglić Pivski (Ro), Nikšić (Ba), in monte Kosa supra Bar (Do).

*Opopanax* KOCH.

2958. *O. chironium* (L.) KOCH. — In saxosis, lapidosis, dumetosis regionis inferioris et montanae. — Njeguši, Nikšićka župa (Pč, Ro), Kakarička gora prope Podgorica, circa Ulcinj, ad Zagarać supra Danilovgrad, Pošćensko jezero

supra Šavniki, Sinjac prope coenobium Piva (Ro), Nikšićko polje (Ba), Limljani prope Vir (Eb).

*P e u c e d a n u m* L.

2961. *P. ruthenicum* M. B. var. *Rochelianum* (HEUFF.) HAY. — „Ab affini *P. officinali* L. recedit foliis minus divisis trisectis (nec iteratim trisectis), eorum laciniis latioribus (2—4 mm latis), pedicellis brevioribus“ (NEILREICH Diagnosen 28). — In herbidis et pratis regionis subalpinae. — Circa Mokro prope Bijela distr. Šavniki (Pt), ad Gvozd distr. Drobnjaci (Pč), sub monte Vojnik (Ba).

2963. *P. longifolium* W. K. — Caule terete striato, osseo, foliis terz — quinques trisectis vel ternato-pinnatisectis, laciniis elongatis anguste linearibus cuspidatis vix 1 mm latis, carinatis numerosissimis et dense confertis, involucro monophyllo vel nullo, involucelli foliolis linearisubulatis, pedicellis fructum aequantibus vel subduplo superantibus, radiis umbellae striatis glabris, petalis luteis. — In rupestribus regionis inferiores et montanae calidioris. — In jugo montis Sutorman supra Bar (Pč), ad latera montis Lovćen (To, Ho, Ad, Pej), Rijeka (Ho); Krstac et Djevojački do prope Njeguši (Pej, Ro), in monte Orijen (Ad), in monte Kosa supra Bar (Do).

2964. *P. coriaceum* RCHB. — In pratis, silvis, saxosis regionis montanae et subalpinae. — In monte Javorje planina (Pč), in jugo montis Sutorman supra Bar (Ho), ad latera montis Lovćen supra Njeguši; in campo Nikšićko polje, Krnovo sub monte Vojnik, Šavniki sub Ivica planina; Zakamen, Goransko, coenobium Piva distr. Piva (Ro). („Supra Buan vallis Tušinae crescit alia forma umbellis copiosioribus brevius pedunculatis, foliis inferioribus tempore florescentia emmortuis, superioribus in paucas laciniis lineares divisus, supremis ad vaginas reductis. Sub nomine *P. olygophylli* m. amicis communis catum; eamdem formam in Dalmatia occurserunt monet cl. GRIESBACH.“ PANČIĆ Elench. 37.) Quid haec planta sit, nescio.

\*2968. *P. carvifolia* (L.) VILL. — In rupestribus et fruticetis supra coenobium Ostrog (Ho).

2969. *P. Schottii* BESS. var. *petraeum* (NOE) KOCH. — In dumetosis, ad marginem silvarum, in saxosis regionis montanae et subalpinae. — Planinica prope coenobium Ostrog (Ho),

Njeguši, Šavnik; Žabljak sub monte Durmitor, Zakamen, Leđenica planina, Goraňsko distr. Piva (Ro).

2973. *P. Neumayeri* (VIS.) RCHB. f. — Caulis compresso-teres striatus glaber demum rufescens; folia radicalia et inferiora 2—4 pinnati-partita ambitu triangularia, segmentis linearibus obtusis mucronatis crassiusculis carinatis in sicco canaliculatis; umbellae 2—6 radiatae; involucrum nullum vel monophyllum; involucelli polyphylli foliolis lanceolato-filiformibus acuminatis subtus lepidotis margine membranaceis; flores virescenti-flavi, petala lineis ramosis resiniferis exornata; fructus ovalis-oblongus a dorso compressus lepidoto-cinereus pedicello 4-plo longior. — In graminosis et lapidosis regionis subalpinae. — Ad Borkovići distr. Piva (Ro).

2976. *A. aegopodioides* (BOISS.) VAND. — Glabrum; caulis erectus crassiusculus fistulosus subangulato-striatus sparse et alterne ramosus; folia inferiora ampla ambitu triangularia ternatim bipinnatisecta, foliola magna 2—4 cm lata indivisa mollia viridia subtus ± glaucescentia breviter petiolata vel sessilia margine grosse serrata; umbellae 10—25 radiatae; involucrum 3—6phyllum phyllis linearis-subulatis deflexis, involucelli phylla 5—8 linearis-setacea pedicellos aequantia vel parum superantia; flores albi vel rosei; fructus margine alato membranaceo diaphano fructu fere aequilato; tota planta primo aspectu *Aegopodium podagrariae* similis. — In pratis humidis et ad rivulos regionis subalpinae. — Viruša dol sub monte Kom; etiam ad Andrijevica (Ro).

2978. *P. alsaticum* L. — In graminosis siccis et in dumetis lapidosis regionis inferioris. — Ad Sinjac et Vir (Pč); inter Plavnica et Podgorica; Topolica prope Bar (Ro).

2980. *P. cervaria* (L.) CUSS. — In silvis et dumetis lapidosis regionis inferioris et subalpinae usque ad 1400 m. — In valle fluminis Zeta prope Danilovgrad (Pč), circa Viljuša, Borkovići, Goraňsko, coenobium Piva; ad latera montis Vojnik (Ro).

— f. *angustisectum* WAISB. — Foliorum segmenta angustiora, 4—8 mm lata. — Cum typo in declivibus montis Lovćen versus Njeguši (Pej, Ro).

— var. *simplex* VANDAS (= *P. illyricum* MALÝ Glasnik XXXI: 79; BECK Fl. Bosne III: 471). — „Folia bipinnatisecta segmentis paucis praeter terminales saepe trilobos integris ovato-

oblongis basi valde inaequali subcordata sessilibus simpliciter spinuloso-serratis; radii umbellae latere interiore glabri.“ — In dumetis Skala Smedec distr. Trijepši (Ba), in monte Vojnik (Ro).

2981. *P. oreoselinum* (L.) MNCH. — In silvis et fruticosis regionis montanae. — In monte Lastva čevska distr. Katunska (Ro).

2983a. *P. austriacum* (JACQ.) KOCH. — In silvis et dumetis lapidosis regionis montanae et subalpinae. — In valle fluminis Tara (Pt), in valle Perućica sub monte Kom (Pt, Sz), in saxosis montium Durmitor et Javorje planina (Pč, Ba), in monte Dziebeze distr. Kuči (Sz); Cetinje et Sinjavina planina (Ba); supra coenobium Piva, ad latera montis Balj prope Andrijevica (Ro), Crna planina (Ba).

— var. *Fuchsii* (TEN.) THELL. — Foliorum laciniae angustiores sublineares acuminatae 1—1,5 mm latae. — Cum typo.

### *Anethum* L.

\*2983b. *A. graveolens* L. — In vineis ad Dobrsko selo supra Rijeka; circa Vir et Klopot subsppontaneum (Eb, Pč).

### *Pastinaca* L.

2985. *P. sativa* L. subsp. *eusativa* BRIQU. — In pratis et herbidis regionis inferioris et subalpinae usque ad 1200 m. — Circa Kolašin frequens (Ja), ad Šavniki et Bijela; circa Bar (Ro).

— subsp. *urens* (ROQU.) ROUY et CAM. — „Caulis saepissime teretiusculus (nec acute angulato-sulcatus) glabriusculus; petioli et saepe etiam in lamina pilis elongatis obsiti; umbellae 5—9-radiatae.“ — In pratis et dumetis regionis montanae et subalpinae. — Supra coenobium Morača (Pč), ad Bijela, Šavniki; Andrijevica et Mratinje (Ro), in monte Visitor supra Andrijevica (Sk).

### *Heracleum* L.

2989. *H. Orsinii* GUSS. var. *balcanicum* THELL. in HEGI Fl. M.-Eur. V. 2: 1433 (= *H. sibiricum* var. *triseptum* GRIS. in PANTOCSEK Adnotat. 79 „foliis triseptis palmatis fidisque“.) — A sequente, cui similis foliorum segmentis non petiolulatis, dignoscitur caule glabrescente, foliis coriaceis glab-

ris vel subtus breviter setulosis bipinnatilobis, raro superioribus trisectis vel pinnatilobis. — In pratis vallis Viruša dol infra Crna planina et in valle Perućica sub monte Kom (Pt).

2990. *H. Pollinianum* BERTOL. — In herbidis, du<sup>z</sup> metosis, lapidosis regionis subalpinæ et alpinae. — In monte Durmitor (Pč, Ro), in monte Bijela Gora sub clivo Vučji Zub (Pč), in montibus Maganik et Treblješ luka (Ho), Rumija planina supra Bar (Ba).

2991. *H. sphondylium* L. — In pascuis alpinis montis Hum Orahovski (Sz). An ne ad speciem sequentem pertinet?

2992. *H. sibiricum* L. (confer BECK Fl. Bosne III: 474; HEGI Fl. M.-Eur. V.2: 1432). — In silvis et pratis regionis montanae et subalpinæ. — In monte Lovćen (Ba), in montibus Kom Kučki (Ho), Mali Šavnik supra Njeguši (Pej), Viljuša; Pošćensko jezero supra Šavnik (Ro).

— var. *chaetocarpum* H. NEUMAYER et THELL. — Ovarium breviter setulosohispidum. — In pratis subalpinis montis Balj supra Andrijevica (Ro).

— f. *coloratum* ROHL. V. Beitr. 46. et X. Beitr. 9. — Flores fuscescentes. — In monte Lastva čevska distr. Katunska nahija; in monte Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

— var. *trisectum* GRIS. in PANTOCS. Adnot. 79. — Confer 2989. *H. Orsinii* var. *balcanicum* THELL.

### *Malabailla* HOFFM.

2996. *M. aurea* (S. S.) BOISS. — In rupestribus et lapidosis regionis inferioris. — Circa Rogami ad flumen Močrača (Pt), ad Klopot distr. Bratonožići (Pč), Doljani distr. Kuči (Ba), ad Kokoti et Podgorica (Ro). Occurrunt formæ: a. *lasiocarpa* STOJ. et b. *leiocarpa* STOJ.

### *Tordylium* L.

2999. *T. maximum* L. — In dumetis et cultis, ad sepes regionis inferioris et montanae calidioris. — Circa Cetinje (Pč, Kn, Vukčević), Dobrsko selo supra Rijeka; Vir (Pč), Medun distr. Kuči (Sz), circa Njeguši (Pej, Ro), ad Podgorica; Borkovići distr. Piva, Mratinje sub monte Maglić Pivski, Viljuša ad fines Hercegovinae, sub monte Balj prope Andrijevica (Ro).

3000. *T. officinale* L. — In lapidosis et herbidis regionis inferioris mediterraneae. — Circa Bar et Ulcinj (Ro).

3001. *T. apulum* L. — In saxosis et vineis prope Klopot distr. Bratonožići et supra Dobrsko selo inter Rijeka et Čestinje (Pč).

*Laser* BORKH.

3003. *L. trilobum* (JACQ.) BORKH. — In dumetis vallis Morača superior sub monte Javorje planina (Pč).

*Laserpitium* L.

3005. *L. siler* L. subsp. *eusiler* HAY. — In glareosis, dumetis, saxosis regionis subalpinae et alpinae. — In valle Perućica sub monte Kom (Pt, Ro), in saxosis montis Durmitor et in pascuis Rogam dictis sub monte Kom (Pč), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja); Maglić Pivski; Goraňsko et Ledenica planina distr. Piva, Jablan vrh in Sinjavina planina, Štirnido sub Lola planina, ad latera montis Balj supra Andrijevica, in monte Lovćen versus Njeguši (Ro).

— subsp. *garganicum* (TEN.) HAY. — „Foliola elliptica vel oblonga 1–2 cm lata obtusiuscula mucronata basi attenuata, terminalia tria saepe basi confluentia et breviter decurrentia.“ — In glareosis Skala Rikavac distr. Kuči (Ba), Varda sub monte Kom et in monte Balj prope Andrijevica (Ba), in monte Rumija supra Bar (Do).

3007. *L. latifolium* L. — In silvis regionis subalpinae sub monte Durmitor versus Crvena Stijena (Pč, Ba), Brčeli prope Vir, Sutorman supra Bar (Eb).

3009. *L. marginatum* W. K. — In herbidis et saxosis ad Nedajno in Pivska planina cca 1500 m (Ro).

\*— var. *Gaudinii* (MORETTI) BECK. — In rupestribus et silvis ad Crno jezero sub monte Durmitor (Pt); Maglić Pivski, Borkovići, Zakamen, Ledenica planina distr. Piva; in montibus Ranisava et Durmitor; etiam in monte Balj supra Andrijevica (Ro).

*Daucus* L.

\*3016. *D. pumilus* (GOU.) BALL. — Phyllis involucri indivisis (non pinnatifidis) a sequentibus facile dignoscitur. — Ad litora maris prope Bar (Ba).

Adnot.: Quid sit planta a cl. PANČIĆ inter vineas ad Boljeviči distr. Crmnica lecta et sub nomine *Daucus maritimus* LAM. in Elench. Plant. 39 indicata, nescio.

\*3020. *D. guttatus* S. S. — A sequente dignoscitur: fructus aculei diametro mericarpii fere duplo longiores basi connati anguste confluentes, involucelli phylla linearis-setacea setulosa. — Circa Danilovgrad (Pt), in arenosis maritimis ad Štoj distr. Primorje (Ba), in campo ad Podgorica (Ho, Ro).

3021. *D. carota* L. — In pratis, cultis, ruderatis, ad vias regionis inferioris, montanae, subalpinae frequens.

— var. *sativus* DC. — Culta.

— var. *maior* VIS. — In litore ad Bar (Do).

### *Orlaya* HOFFM.

\*3023. *O. daucorlaya* MURB. — In lapidosis et graminosis regionis inferioris ad Spuž (Ho).

3024. *O. grandiflora* (L.) HOFFM. — In saxosis, lapidosis, ad vias, in cultis regionis inferioris, montanae, subalpinae usque ad 1500 m. — In valle fluminis Perućica sub monte Kom (Pt, Ro), circa Cetinje (Pč, Kn, Ba), ad Rijeka et Vir (Ho), ad Njeguši, Medun, Orahovo (Sz, Ba), Bioče, Jablan, Lopate, monastir Morača-Bistrica; in monte Pej supra Kolašin (Ja), circa Andrijevica (Ja, Ro), ad Viljuša; Varda distr. Piva et Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro) (confer ROHLENA: V. Beitr. pag. 45), Volovica prope Bar (Do), Limljani prope Vir, insula Vranina (Eb).

\*3025. *O. platycarpa* (L.) KOCH. — In lapidosis ad Cetinje (Ba).

### *Turgenia* HOFFM.

3026. *T. latifolia* (L.) HOFFM. — In arvis et campis ad Cetinje et Grahovo regionis montanae (Pč).

### *Caucalis* L.

3027. *C. daucoides* L. — In agris, cultis, fruticetis regionis inferioris, montanae, rarius subalpinae usque ad 1500 m. — Circa Danilovgrad (Pt), ad Cetinje et Vir (Pč), Njeguši sub monte Lovćen (Pč, Ro), in monte Kamenjak (Ho), in monte Pej supra Kolašin (Ja), ad pagum Kralje prope Andrijevka (Ro).

jevica (Ja, Ro), Viljuša ad fines Hercegovinae; Velestovo et Lastva Čevska distr. Katunska; Šavniki sub monte Ivica planina, supra coenobium Piva, in monte Jerinja glava supra Andrijevica, in valle fluminis Lim (Ro), in monte Rumija supra Bar (Do).

*Torilis* ADANS.

3030. *T. nodosa* (L.) GAERTN. — In ruderatis, ad sepes, inter vineas regionis inferioris et montanae calidioris. — Ad Vir, ad Klopot distr. Bratonožići (Pč), Bioče in valle fluminis Morača (Ja), circa Njeguši (Kn, Ro), circa Bar; Drušći prope Rijeka; Velestovo et Čevo distr. Katunska; in campo ad Podgorica (Ro).

3034. *T. arvensis* (HUDS.) LK. subsp. *euarvensis* HAY. (= *T. infesta* HOFFM.). — In fruticetis, cultis, ruderatis, ad vias regionis inferioris et montanae calidioris. — Ad Limljani prope Vir (Ho), inter Cetinje et Rijeka (Kš); Šavniki; circa Bar et Ulcinj (Ro, Do).

— subsp. *neglecta* (R. S.) THELL. — In calcareis ad Medun distr. Kuči (Sz), ad Rijeka (Ho).

3035. *T. anthriscus* (L.) GMEL. — In dumetis et fruticetis regionis montanae calidioris. — Circa Njeguši et Cetinje (Pč, Ro, Eb).

3036. *T. microcarpa* BESS. — „Caule graciliore, foliorum segmentis longioribus tenuioribusque, floribus magis radiantibus, fructu subduplo minore fere globoso aculeis brevisimis incurvis et valde adpressis obsito a praecedente differt“ (VELEN. Fl. bulg. 199). — In apricis aridis, in dumetis, ad sepes regionis montanae. — Ad Njeguši (Pt), sub monte Lovćen (Pč), in clivo Mali Lonac sub monte Sutorman (Pč), Vrojce distr. Kuči (Ba).

*Physocaulis* TSCH.

3038. *Ph. nodosa* (L.) TSCH. — In silvis, dumetis, ad sepes, in ruderatis regionis inferioris et montanae calidioris. — Circa Cetinje, Njeguši, Danilovgrad (Pč, Ro), Bar, Ulcinj, Rijeka, Vir, Bogetići, Nikšić, Podgorica, Kokoti, Zagarač (Ro).

*Chaerophyllum* L.

3040. *Ch. aromaticum* L. var. *brevipilum* MURB. — Caulis cum petiolis dense molliter breviterque pubescens. —

In fruticetis ripariis, silvis udis, in dumetis, ad sepes regionis inferioris, montanae, subalpinae. — „Per dicionem vulgare“ (PANČIĆ Elench. 39), in valle Tara prope Kolašin (Pč, Ja), circa Rijeka (Ba), Mali Šavnik et Trešnja supra Njeguši (Pej, Ro), in valle Lim prope Andrijevica (Ro, Sk), ad coenobium Piva, circa Viljuša (Ro); Cetinje (Ba).

3043. *Ch. aureum* L. — In pratis, ad rivulos, in fruticetis, ad margines silvarum regionis subalpinae et alpinae usque ad 1700 m. — In valle fluminis Perućica sub monte Kom (Pt, Ro), in valle Tara (Pt, Ja), ad pedem montis Durmitor (Pt, Ba, Ro), sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz), sub monte Ranisava prope montem Durmitor, in monte Jerinja glava supra Andrijevica, in montibus Varda et Ledenica planina distr. Piva; Štirni do sub Lola planina (Ro), Crna planina (Ba), Krivi do supra Aftovac ad confines Hercegovinae (De, Si).

— f. *glabriusculum* KOCH. — „Caulis glaber vel basi hispidus, folia margine et subtus ad nervos breviter pilosa.“ — Ad margines agrorum Benkaj territ. Trijepši distr. Kuči (Ba).

— f. *glabrum* KOCH. — Caulis cum foliis glaberrimus. — In valle Viruša dol sub Crna planina (Pt).

3044. *Ch. temulum* L. — In saxosis et ruderatis ad Njeguši et Danilovgrad (Pč).

3045. *Ch. bulbosum* L. — In fruticetis et dumetis, ad sepes et vias, in lapidosis regionis montanae et subalpinae. — Ad latera montis Lovćen (Ba), ad pagum Velika distr. Vasojevići (Ba), Trešnja et Šavnik supra Njeguši (Pej, Ro), circa Viljuša, Konjuhe prope Andrijevica (Ro).

\*3046. *Ch. laevigatum* VIS. Fl. Dalm. III: 65. — „Glaberrimum leve geniculis tumidis, foliis tripinnatipartitis, lacinulis lanceolato-linearibus elongatis acuminatis, superiorum linearibus, invocellis glabris, fructibus linearis-subclavatis“ (VISIANI I. c.). Caulis maculatus (confer BECK: Flora Bosne III: 375). — In valle Perućica infra montem Kom (Pt), Bostur in monte Lovćen (Kš), Ječmeni do in Šinjavina planina (Ba). Potius varietas speciei praecedentis.

3048. *Ch. cicutaria* VILL. (= *Ch. hirsutum* L. p. p.). — In locis humidis, ad ripas et fontes, in pascuis pinguibus, in silvis regionis subalpinae. — In valle Perućica sub monte Kom (Pt), in silvis sub monte Durmitor (Pt, Pč), Mokra sub

monte Dziebeze distr. Kuči (Sz), in valle Lim ad Andrijevica et Berane (Ro).

3049. *Ch. coloratum* L. — Ab omnibus praecedentibus petalis luteis differt. — In locis apricis, lapidosis, saxosis, inter dumeta e regione inferiore, montana usque ad subalpinam frequens. — Circa Rijeka et Danilovgrad (Pt, Pč, Ro), ad latera montis Lovćen (Pč), Tudjemile supra Bar (Ba, Ro), ad pagum Orahovo (Sz), Gradjani (Ba), ad monastir Morača (Ja), Krstac prope Njeguši (Gi, Pej, Ro), Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Kokoti, Viljuša, Cetinje, Šavniki, coenobium Piva, Gorańsko, Zagarać; in montibus Jerinja glava et Balj supra Andrijevica; Konjuhe sub monte Kom (Ro), in monte Rumija supra Bar (Do), in valle rivi Vrbnica prope Orak distr. Piva; Krivi do ad confines Hercegovinae supra Aftovac (De, Si).

*Anthriscus* PERS.

3051. *A. nitidus* (WAHLENB.) GARCKE. — In saxosis silvestribus vallis Viruša distr. Gornji Vasojevići (Pt, Pč).

3052. *A. silvester* (L.) HOFFM. — In fruticetis ad ripam fluminis Piva sub monte Maglić prope pagum Mražtinje (Ro).

3053. *A. nemorosus* M. B. — A praecedente differt fructu magis ovato et breviore, semper ± setulosoechinato et basi serie pilorum cincto (BECK Flora Bosne III: 380). — In silvis et dumetis regionis montanae et subalpinae. — Kovčice sub monte Durmitor (Pt); in declivi montis Maglić Pivski; Crkvica in Pivska planina; in declivi montis Lovćen versus Njeguši (Ro).

— f. *Baldacci* HAYEK. — Caulis sparse pilosus, folia glaberrima; involucelli phylla non ciliata. — Strenj vrh ad Velki Mikulić distr. Primorje (Ba). Sec. MALÝ Glasnik XXII, 1910 haec varietas = *A. fumarioides* (W. K.) SPRENG. f. *calvescens* MALÝ l. c.; cf. BALDACCI Iter alban.-mont. VI. 1898 No 24.

3054. *A. fumarioides* (W. K.) SPR. — In fruticetis, silvis, lapidosis regionis montanae, subalpinae, alpinae. — In saxosis vallis Morača super. sub rupe dicta Tijentača (Pč); in montibus Što et Gradište supra Kolašin (Ba), inter Njeguši et Cetinje (Ld), Treblješ luka prope Lukavica planina (Ro),

Rikavac distr. Kuči (Ba), in monte Lovćen (To), Krivi do supra Aftovac distr. Piva (De, Si).

— f. *bosniacus* (BECK) MALÝ. — Krstac in valle rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

— subvar. *glaber* EVERS. — Krivi do et Krstac distr. Piva (De, Si).

3055. *A. Vandasii* VELEN. Fl. bulg. 219. — A praecedente dignoscitur caule glabro crasso elatiore jam in parte inferiore multiramoso, foliis maioribus magis divisus (3—4 pinnatisectis), segmentis l. ordinis longe petiolulatis, ultimae ordinis pinnatifidis, laciniis longioribus angustioribusque, petiolis angulatis et sulcatis, umbellis oppositis vel saepius verticillatis, fructibus maioribus (7—9 mm longis), rostro erecto fructu plus quam 5-plo breviore. „Planta statura gigantea patule multiramosa, foliorum limbo tenero flaccido ob magnam divisionem eximie decoro“ (VELENOVSKÝ l. c.). — In lapidosis et rivularibus frondosis regionis alpinae. — Lukavica planina (Ho), Sjekirica planina (Ro).

3056. *A. cerefolium* (L.) HOFFM. — Ad muros et in fruticosis ad Podgorica (Ro).

— var. *trichospermus* (SCHULT.) ENDL. — Fructus setoso-hispidi. — Ad Cetinje, Dobrsko selo supra Rijeka, circa Vir (Pč), ad Andrijevica (Ro).

### Scandix L.

3060. *S. pecten-veneris* L. — In agris, lapidosis, fructicetis e regione inferiore ad subalpinam usque ad 1500 m. — Konjsk planina (Ho), circa Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Danilovgrad, Zagarać, Njeguši; etiam in monte Jerinja glava prope Andrijevica (Ro); ad Šavnik sub monte Lovćen occurunt etiam formae, quae fructibus longioribus (usque ad 8 cm), rostro parte seminifera 3—4-plo longiore, involucelli phyllis profundius fissis ad var. *graecam* HAUSSKN. spectant.

3061. *S. macrorhyncha* C. A. MEY. — A praecedente dignoscitur foliorum laciniis linearis-setaceis brevioribus, umbellae radiis demum parum incrassatis, involucelli phyllis saepissime integris (rarius bidentatis), fructu minore (cum rostro 3—5 cm longo), rostro a dorso parum compresso (in parte superiore subcylindrico), stylis stylopodium aequantibus vel

vix longioribus. — In lapidosis et graminosis regionis subalpinae. — In montibus Balj et Jerinja glava supra Andrijevica, etiam ad Goraňsko supra coenobium Piva (Ro).

### *Myrrhis* ADANS.

3064. *M. odorata* (L.) SCOP. — In pratis, glareosis, silvis regionis subalpinae. — Ad pagum Kovčice sub monte Durmitor (Pt), Mojanska rijeka sub monte Kom Kučki (Ho), in valle Jelovica sub Bjelastica planina usque ad 1400 m (Ro), Jablan vrh supra Kolašin (Ba).

### *Pleurospermum* HOFFM.

3065. *P. austriacum* (L.) HOFFM. — In marginibus silvarum regionis subalpinae vallis Tara infra montem Kom (Pt).

### *Hladnikia* KOCH.

3066. *H. golaka* (HACQ.) RCHB. f. — In silvis, fruticetis, saxosis, herbidis regionis subalpinae et alpinae usque ad 2000 m. — In pratis silvaticis sub monte Durmitor versus jugum Štulac (Pč, Ba), sub monte Kom Vasojevički (Ba), Crvena greda et Valoviti do in monte Durmitor, vallis Perućica sub monte Kom, in monte Vojnik; Ledenica planina distr. Piva (Ro).

### *Danaa* ALL.

3068. *D. cornubiensis* (TORN.) BURM. (= *Physospermum aquilegifolium* KOCH). — In pratis, silvis, fruticetis regionis montanae et subalpinae usque ad 1600 m. — In dumetis vallis fl. Tušina et Morača super. sub monte Javorje (Pč), ad Cetinje (Ba), in pascuis Štavna sub monte Kom Vasojevički (Ba), ad Matoševo in valle Tara, in montibus Peh et Glave supra Kolašin (Ja), ad Kralje sub monte Kom (Ja, Ro); circa Andrijevica locis pluribus; Zabrgje, Jerinja glava, Visitor, Balj (Ro, Sk), in monte Ključ supra Kolašin (Ba).

### *Conium* L.

3070. *C. maculatum* L. — In fruticetis, lapidosis, ruderatis regionis inferioris et montanae calidioris. — Danilovgrad (Pč); in silvaticis ad Dedići terr. Krajna distr. Primorje (Ba), Viljuša; Bijela prope Šavniki; Krstac prope Njeguši; ad pedem montis Balj prope Andrijevica (Ro).

*Smyrnium* L.

3072. *S. olusatrum* L. — In rupestribus et ad muros regionis inferioris mediterraneae. — Circa Bar (Ro).

3075. *S. perfoliatum* L. — In fruticetis, nemorosis, ad sepes, vias, margines silvarum regionis inferioris et montanae calidioris usque ad 1450 m. — Sub monte Štirovnik et ad coenobium Morača (Pč), ad Krstac prope Njeguši (Ld), circa Ulcinj, Bar, Vir, Rijeka, Podgorica, Danilovgrad, Zagarač, Viljuša, Šavniki, Njeguši, Andrijevica; in monte Sutorman supra Bar; Ljut sub Ledenica planina, Goračko, coenobium Piva, Borkovići distr. Piva (Ro), Nikšić (Ba), Mikulići sub monte Rumija (Do), in valle Vrbnica distr. Piva (De, Si).

3076. *S. rotundifolium* MILL. — A praecedente, cui primo aspectu valde simile est, differt caule angulato-striato (nec angulato-sulcato) angulis non alatis, foliis superioribus suborbicularibus obtusis. — In saxosis ad coenobium Ostrog (Pč); Bogetiči prope Nikšić (Ba).

*Prangos* LINDL.

3081. *P. ferulacea* (L.) LINDL. — In fruticetis et saxosis regionis inferioris, montanae, subalpinæ usque ad 1800 m. — Vrh Suta versus Crmnica; Medjurečka planina et supra Velki Mikulić supra Bar (Ba), inter Boljevići et Srednja Mahala prope Vir, Korita rovačka et Širni do sub Lola planina (Ro).

*Bifora* HOFFM.

3088. *B. radians* M. B. — In agris, cultis, inter segetes. — Circa Bar et ad pedem montium Balj et Jerinja glava prope Andrijevica (Ba, Ro); prope pagum Orak distr. Piva (De, Si).

**Plumbaginaceae**

*Plumbago* L.

3090. *P. europaea* L. — In saxosis et lapidosis reg. infer. et mediae calidioris. — Ad Ostrog, Vir et Boljevići (Pč), ad Njeguši; Valać rupe sub monte Lovćen (Pej, Ro).

*Statice* L.

\*3112. *St. cancellata* BERNH. var. *glabra* BOISS. — Tota planta glabra. — In rupestribus et arenosis maritimis

ad Ulcinj (Ro). Secundum cl. HAYEK haec varietas cum St. *anfracta* SALMON identica esse videtur.

\*3114. *St. cosyrensis* GUSS. subf. *maior* (BOISS.) HAL. — Verosimiliter hucce spectat planta a cl. BALDACCI ad Pristan Bar lecta et sub nom. *St. dichotoma* GUSS. in Malpighia V: 77 publicata.

*Armeria* WILLD.

3118 + 3120. *A. canescens* HOST.\* — Folia rosularia exteriora interioribus breviora et latiora (*A. vulgaris* WILLD. habet folia rosularia omnia conformia.) — In herbidis et rupestr. reg. mont., subalp. et alp. in tota dizione frequens.

— var. *eucanescens* NOV. f. *typica* NOVÁK l. c. p. 4. — Frequens.

— f. *latifolia* (VIS. pro var. non alii) NOVÁK l. c. p. 7. — Folia exteriora 1—4 cm longa, 4—6 mm lata, folia interiora usque ad 12 cm longa et 4—6 mm lata, utrimque sensim attenuata, apice acute acuminata, distincte trinervia, plana, margine anguste scariosa; scapi usque ad 70 cm alti; capitula cca 25 mm lata; calyces cum aristis 7—8 mm longi. — In monte Lovčen (Pej, Ro).

\*— f. *angustifolia* NOVÁK l. c. p. 8. — Folia exteriora usque ad 5 cm longa usque ad 3 mm lata, interiora usque ad 12 cm longa, 1—1,6 mm lata in plantis exsiccatis non raro convoluta vel complicata simulate setacea et tantum 0,5 mm lata. — Ad Njeguši loco Zanovetni brije (Ro).

\*— f. *pubiscapa* NOVÁK l. c. p. 8. — Folia exteriora 1—4 cm longa, 2—4 mm lata, folia interiora longiora et angustiora, scapi 25—35 cm alti basi pilis patentibus puberuli, capitula 20—25 mm lata, calyces cum aristis 7—7,5 mm longi, petala rosea. — In subalp. montis Ledenica planina cum formis ad var. *majellensem* vergentibus (Ro).

\*— f. *Pantocsekii* (STROBL pro sp.) NOVÁK l. c. p. 8. — Folia interiora usque ad 9 cm longa, 0,5—1 mm lata, in plantis exsiccatis non raro convoluta simulate setacea; scapi 25—55 cm alti graciles; capitula 12—15(—18) mm lata, petala rosea. — Ad Njeguši loco Gornje polje (Pej, Ro), Varda et Božur planina supra monast. Piva (Ro).

\* Confer.: Dr. F. A. NOVÁK: „De Armeriis balcanicis nonnullis“ (Comment. Regiae Societatis scientiarum Bohemicae II. XXVII. 1938. Pragae.)

— — — f. *albiflora* BECK. — „Folia exteriora 1—4 cm longa, cca 3 mm lata, scapi cca 40 cm alti, capitula 18—20 mm lata, petala alba.“ — Ad latera montis Lovćen loco Vršanj dicto (Pej, Ro).

\*— — — f. *submajellensis* NOVÁK l. c. p. 10. — „Haec forma transitum ab *Armeria canescens* f. *typica* ad var. *majellensem* sistit.“ — Ledenica planina, mons Čevski Lisac distr. Katunjska, Piperska Lukavica, Sinjavina planina et mons Zeletin supra Andrijevica (Ro).

— — var. *dalmatica* (BECK) NOVÁK l. c. p. 11 (= *A. dalmatica* HAYEK Prodr. Florae penins. Balcan. II: 12) f. *typica* NOVÁK l. c. p. 12. — In graminosis ad latera montis Lovćen locis Zeleni put et Vršanj dictis (Pej, Ro).

\*— — — f. *rosea* BECK (conf. NOVÁK l. c. p. 12). — Petala rosea. — In pascuis Krivi do distr. Piva, cca 1200—1300 m (De, Si).

\*— — — f. *pseudodalmatica* NOVÁK l. c. p. 13. — Est forma intermedia inter var. *dalmaticam* et *canescens*. — Vršanj sub monte Lovćen (Pej, Ro).

— — var. *majellensis* (BOISS.) HALÁCSY. — A var. *eucanescenti* praesertim scapis humilioribus et involucri phyllis dorso macula purpurea instructis differt. — In alpinis omnium montium dic. septentr. — Maglić Pivski, Durmitor, Ledenica planina, Vojnik, Bjelastica, Kom Kučki et Kom Vasojevički (Ro et alii). Non raro occurunt formae ad var. *eucanescens* f. *typicam* vergentes (= f. *subcanescens* NOVÁK l. c. p. 21).

\*— — — f. *dolichophylla* NOVÁK l. c. p. 16. — Folia exteriora usque ad 5 cm longa et 2 mm lata, interiora 8—10 cm longa cum exterioribus aequilata vel latiora usque ad 2,5 mm lata. — In alpinis montis Kom Vasojevički, cca 2200 m (No).

\*— — — f. *microphylla* NOVÁK l. c. p. 16. — Folia exteriora 15—20 mm longa, 1—3 mm lata recurvata, interiora usque ad 30 mm longa, sed saepe breviora, cca 1 mm lata, recurvata vel erecta, margine anguste scariosa glabra rarius ad margines et nervos ciliata (= subf. *dasiphylla* NOVÁK), scapi 8—18 cm alti glabri, rarius basi puberuli (= subf. *dasypoda* NOVÁK). — In alpinis montis Volujak ad confines Hercegovinae (B); in monte Kom Kučki (Sz).

— — — f. *dasiphylla* ROHL. — Folia ad margines et nervos ciliata. — Cum typo in alpinis montis Durmitor (Ro).

— — — f. *dasypoda* (MURB.) NOVÁK. — Scapi in parte inferiore puberuli, pilis patentibus ± densis instructi. — In alpinis montis Vojnik (Ro) et in monte Durmitor (Ro, De, Si).

— — — f. *albanica* BECK. — Forma humilis et dense caespitosa; folia exteriora valde abbreviata, interiora usque ad 4 cm longa et 1,3 mm lata, scapi tenues 8—20 cm longi, glabri, calyces cum aristis 6—6,5 mm longi. — In alpinis montium Piperska Lukavica (Ro), in monte Kom Vasojevički forma ad var. *majellensem* typicam vergens (No).

## Pিrolaceae

### Ramischia OP.

3127. *R. secunda* (L.) OPIZ. — In silvis et saxosis silvestr. regionis subalp. et alp. — In monte Durmitor versus jugum Štulac et ad Crno jezero (Pč, Ro), Maglić Pivski (Ro), in valle Perućica sub monte Kom (Ro), ad latera montis Lovćen versus Njeguši (Pej, Ro).

### Pিrola L.

3128. *P. minor* L. — In silvis humidis regionis subalpinae. — Viruša dol sub monte Crna planina (Pt), vallis Perućica sub monte Kom (Sz), ad Crno jezero sub monte Durmitor (Ro).

3129. *P. media* SW. — In dumetis montis Mojan ad fines Albaniæ (Sz).

### Moneses SALISB.

3132. *M. uniflora* (L.) ALEF. — In silvis regionis subalpinae. — Sub monte Durmitor (Pč, Ro), Ljuban sub monte Kom (Ba), Sjekirica planina pr. Andrijevica (Ro).

### Monotropa L.

3133. *M. hypopitys* L. var. *glabra* ROTH. — In silvis regionis subalpinae. — Crno jezero et Štulac sub monte Durmitor (Pč, Ba).

— — — f. *hypophagos* ANDRES. — Stylus et stamina, saepe etiam petala ± pilosa. — Ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

— — — f. *Rohlenae* HAY. Prodr. II:15. — Ut praecedens, sed caulis elatior usque ad 30 cm altus squamis remotis; racemus

*multiflorus floribus infimis pedunculo ad 3 cm longo suffultis;*  
*petala basin versus non vel vix attenuata.* — In valle Tara  
pr. Matoševu (Ro).

### *Ericaceae*

#### *Arctostaphylos* ADANS.

3141. *A. uva-ursi* (L.) SPR. — In saxosis silvaticis  
et herbidis regionis alpinae. — In monte Kom et Durmitor  
(Pt, Ba, Ro), Sinjavina planina (Pt, Ro), Gradište supra  
Kolašin (Ro), Maglić Pivski (Ro), Lovćen (Ad), Sjekirica  
et Mokra planina supra Andrijevica (Ro), Savin Kuk in mon-  
tibus Durmitor (De, Si).

3142. *A. alpina* (L.) SPR. — In rupestribus et herbidis  
regionis alpinae. — In monte Kom (Pt, Lo, Ba, Ro), Sinja-  
vina planina: Što, Gradište, Jablan vrh (Ba, Ro); in monte  
Zeletin supra Andrijevica (Ro), Bjelastica planina supra Ko-  
lašin (Ro), Maglić Pivski (Ro), Durmitor (Ht, De, Si); e  
monte Lovćen adhuc non vidi.

#### *Erica* L.

3144. *E. arborea* L. — In dumetis regionis infer. mediter.  
— Ad latera montis Rumija (Ba), ad Topolica pr. Bar (Ro).

3145. *E. carnea* L. — In alpinis montis Durmitor loco  
Savin Kuk et Medjed (Ht).

#### *Vaccinium* L.

3149. *V. myrtillus* L. — In pascuis et silvis in omnibus  
montibus regionis septentrionalis frequens. — E monte Lovćen  
et Rumija dic. merid. adhuc non vidi.

3150. *V. uliginosum* L. — In silvaticis turfosis regio-  
nis alpinae septentrionalis. — In monte Kom (Pt, Ba, Ja),  
in monte Durmitor (Pč, Ba), in monte Pivljan pr. Andrijevica  
(Ja), Margarita et Planinica sub monte Kom (Ba), Velki  
Maglić et Crna planina, Jablan vrh et Kljuć supra Kolašin  
(Ba), supra lacum Lokva in montibus Durmitor (De, Si).

3152. *V. vitis-idaea* L. — In silva ad lacum Barno je-  
zero sub monte Durmitor, cca 1500 m (Ro), Savin Kuk et  
Medjed in montibus Durmitor (Ht).

## ***Empetraceae***

### *Empetrum* L.

3153. *E. nigrum* L. — In saxosis et lapidosis regionis alpinae. — Adhuc e monte Durmitor notum (Pč, Ro, Ht, Kš, De, Si).

## ***Primulaceae***

### *Primula* L.

\*3154. *P. vulgaris* Huds. (= *P. acaulis* HILL.). — In dumetis, pratis et ad margines silvarum regionis inferioris et montanae in dizione meridionali. — Ad Njeguši et Cetinje (Pč, Gi, Pej, Ro), ad latera montis Sutorman (Pč), in silvis montis Rumija (Ba), in monte Lovćen (Heider fide FRITSCH), circa Ulcinj, Bar, Vir et Danilovgrad (Ro), ad coenobium Morača (Ja).

3155. *P. elatior* (L.) HILL. subsp. *intricata* (GREN. et GODR.) WIDM. — In pratis regionis alpinae. — In monte Javorje planina (Pč), Maglić Pivski (Ro), in monte Kom Vasojevički et Zeletin supra Andrijevica, 1700—2400 m (Ro), in monte Durmitor loco Savin Kuk (De, Si, No).

3156. *P. veris* Huds. subsp. *Columnae* (TEN.) HAY. — In graminosis regionis montanae et subalpinae, rarius in regione inferiore. — Viruša dol sub Crna planina; vallis Peručica sub monte Kom (Pt), in saxosis sylvaticis ad Boljevići supra Vir (Pč), in pascuis alpinis sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz), inter Cetinje et Njeguši (Ld, Gi, Ki), in monte Planinica ad fines Albaniae (Ba), ad latera montis Rumija supra Bar (Ba), in valle Tara ad Matoševo (Ro), inter Cetinje et Rijeka (Ro), Sjekirica planina supra Andrijevica (Ro), in monte Pivljan distr. Vasojevići (Ja), ad Volujačko jezero (Ma), in monte Lovćen (To), in monte Durmitor loco Ledena pećina et supra lacum Lokva (De, Si).

3159. *P. Halleri* GMEL. (= *P. longiflora* ALL.). — In pratis alpinis. — In declivibus montis Durmitor excenso jugo Šljeme (Pč, Ba, Ht), Crvena ploča et Ječmeni do in Sinjavina planina supra Kolašin (Ba), Savin Kuk et supra Crno jezero in monte Durmitor (De, Si).

*Androsace* L.

3165. *A. villosa* L. — In pascuis et lapidosis alpinis. — In omnibus montibus dicionis septentr. (Maglić Pivski, Ledena, Durmitor, Sinjavina, Hum Orahovski, Kučke planine, Kom, Bjelastica etc.) frequens. E montibus dicionis meridionalis (Lovćen, Rumija) adhuc non vidi.

— var. *dasyphylla* (BUNGE) KAREL. et KIRIL (= var. *congesta* BOISS.; conf. HEGI Flora V/3: 1805, 1927). — In saxosis alpinis ad Jezera labolnicka pr. montem Žijovo distr. Kući (Ba). Etiam alibi cum typo (Ro).

3166. *A. obtusifolia* ALL. subsp. *hedraeantha* (GRIS.) ROHL. IV: 78. — In pascuis alpinis Bjelastica planina distr. Vasojevići (Ro), in excelsa jugo montis Kom Kučki, cca 2448 m (Ba sub *A. carneae*).

\*—— f. *elata* NOVÁK in Preslia 1940. — Foliis longioribus, usque 20 mm longis, scapis elatis, post anth. 15 cm altis. — Cum typo (Ro, No).

*Soldanella* L.

3172. *S. alpina* L. — In pascuis, glareosis et ad nives liquecentes regionis alpinae. — In monte Kom, Sinjavina planina, Durmitor, Crna planina (Pt, Ht, Pč, Ba). Verosimiliter loca hic enumerata partim (vel omnia?) ad subvarietatem sequentem pertinent. Maglić Pivski (Ro).

— subvar. *pyrolaefolia* (SCH. N. K.) VIERH. — Folia orbiculata sinu basali nullo. — In monte Durmitor, Sinjavina et Bjelastica planina, Kom, Sjekirica, Zeletin; etiam in valle Perućica sub monte Kom (Ro).

3175. *S. hungarica* SIMK. — A praeced. dignoscitur petiolis et pedunculis glandulis longius stipitatis (nec sessilibus vel brevissime stipitatis), corolla rubro-violacea, usque supra medium laciniata. — In graminosis circa pag. Kovčice sub monte Mali Durmitor (Pt, sub *S. montana* WILLD.).

*Cyclamen* L.

\*3181. *C. europaeum* L. — In dumetis regionis montanae ad Njeguši (Pej, Ro).

3183. *C. repandum* S. S. — In rupestribus regionis inferioris et montanae. — Ad coenobium Ostrog et supra Povije (Pč), ad Bar (Ba), sub monte Velki Maglić distr. Kući (Ba).

3185. *C. neapolitanum* TEN. — A praeced. dignoscitur floribus autumnalibus albis vel dilute roseis, segmentis ovato-lanceolatis basi semilunari-auriculatis, foliis saepissime 5-angulatis. — In saxosis et lapidosis regionis inferioris et montanae. — Ad Grahovo (Pč), supra coenobium Ostrog (Ho), circa Bar (Ba), Njeguši (Ba, Pej, Ro), Cetinje (Ro).

*Lysimachia* L.

3187. *L. nummularia* L. — In pascuis, in fossis et humidis regionis inferioris et mediae frequens. — Circa Rijeka et Danilovgrad (Pt, Ro), in incultis ad Plavnica (Sz, Ro), Planinica (Ho), circa Andrijevica, Podgorica, Bar, Vir, Ulcinj, Njeguši, coenob. Piva etc. (Ro), in monte Pivljan et ad Kolašin (Ja), Crmnica (Eb).

3190. *L. punctata* L. — In inundatis, fruticetis et umbrosis regionis inferioris et montanae. — Ad rivulum Sušica pr. Danilovgrad (Pt), in monte Sutorman (Ho), ad Njeguši, Cetinje et Vir (Ro), in monte Vjetnik; ad Matoševo in valle fl. Tara; supra coenob. Morača; ad Vrujica pr. montem Pej (Ja), ad Mikulići supra Bar (Do), in monte Lovčen (Eb).

3191. *L. vulgaris* L. — In paludosis, fruticetis et ad ripas regionis inferioris et montanae. — Circa Rijeka (Pt), in incultis ad Plavnica (Sz, Ro, Ja), Donja Zeta pr. Podgorica et circa Andrijevica (Ro).

— f. *glandulosovallosa* BECK. — Calyces et pedunculi glandulosovallosi. — Ad lacum Pošćensko jezero supra Šavniki (Ro).

*Asterolinum* HOFFMGG. et LK.

3194. *A. linum-stellatum* (L.) DUBY. — In lapidosis et arenosis regionis inferioris mediterraneae. — In litore ad Ulcinj, circa Bioče et Podgorica (Ro).

*Anagallis* L.

3196. *A. arvensis* L. — In incultis, lapidosis et in arvis regionis inferioris et montanae. — Ad Cetinje, Rijeka, Danilovgrad (Pt, Ho, Ro), Golo brdo et Njeguško polje pr. Njeguši (Pej, Ro), circa Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica, Andrijevica et Berane (Ro).

3197. *A. femina* MILL. — In incultis, agris et lapidosis regionis inferioris, montanae, rarius subalpinae. — Ad Cetinje

(Pt), in calcareis pagi Medun (Sz), circa Rijeka (Ho, Ro), ad coenobium Morača (Ba), Miljkovi dolovi sub monte Lovćen (Pej, Ro), Njeguško et Krstačko polje (Pej, Ro), ad Borkovići distr. Piva; sub monte Vojnik; ad Šavniki sub Ivica planina; circa Ulcinj, Bar, Podgorica et Kokoti (Ro), in monte Rasovatac pr. Vir (Eb).

### *Centunculus* L.

3199. *C. minimus* L. — In inundatis et graminosis humidis regionis inferioris. — Ad rivum Sušica pr. Danilovgrad (Pt), circa Bar (Ro).

### *Samolus* L.

\*3200. *S. Valerandii* L. — In pratis humidis regionis inferioris mediterraneae ad Bar (Ba, Ho, Ro, Do).

## **Convolvulaceae**

### *Convolvulus* L.

3213. *C. cantabricus* L. — In herbidis, asperis et fruticetis regionis inferioris et montanae calidioris. — Ad Cetinje et Grahovo (Pč), Dobrsko selo et Riječani pr. Rijeka (Ho, Kš), Bar (Ba, Ro, Do), Bioče pr. Podgorica (Ja), circa Ulcinj, Boljevići, Vir et Podgorica (Ro), insula Vranina (Eb).

3220. *C. arvensis* L. — In cultis, ruderatis et ad vias regionis inferioris et montanae frequens.

3224. *C. elegantissimus* MILL. (= *C. tenuissimus* S. S.). — In saxosis, lapidosis et collibus siccis regionis inferioris et montanae calidioris. — Ad Cetinje, Čevo et Vir (Pč, Ro), Rijeka (Ba, Ro), ad Konjuhe pr. Andrijevica (Ba), Bar (Ba, Ro, Do), inter Kotor et Krstac (Pej, Ro).

### *Calystegia* R. BR.

3225. *C. sepium* (L.) R. BR. — In dumetis et fruticetis, ad ripas regionis inferioris et montanae. — Ad Danilovgrad (Pt, Pč), ad lacum Scodranum (Pč, Ro), Tudjemile pr. Bar (Ba), in valle fl. Morača pr. coenobium (Ja), vallis Bistrica pr. Kolašin (Ja), circa Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica et Andrijevica (Ro).

3226. *C. silvestris* (WILLD.) R. S. — In dumetis et fruticetis regionis inferioris et montanae. — Plavnica (Sz).

circa Cetinje et Rijeka (Ba, Ro), in valle fl. Piva pr. Mražtinje; ad latera montis Jerinja glava pr. Andrijevica; Konjuhe sub monte Kom; Petrov do pr. Njeguši (Ro), Bar (Ba, Ro, Do).

3227. *C. soldanella* (L.) R. BR. — In arenosis maritimis ad Bar et Ulcinj (Ba, Ro).

### **Cuscutaceae**

*Cuscuta* L.

3233. *C. europaea* L. (= *C. maior* DC.). — In salicetis et fruticetis regionis inferioris, montanae et subalpinae. — Vallis Crmnica (Pč), Viljuša; Pošćensko jezero sub monte Ivica planina; Drežnica pr. Nikšić; Crvena Greda sub monte Durmitor (Ro).

3235. *C. planiflora* TEN. (= *C. alba* PRESL). — In herbidis et dumosis regionis inferioris, montanae et subalpinae. — In apricis Dobre Strane distr. Čeklići (Pč), Krstac pr. Njeguši (Vh, Pej, Ro), ad latera montis Štirovnik (Vh), in subalpinis Varda distr. Piva; circa Bar et Podgorica (Ro), ad Andrijevica (Ja), in monte Kosa supra Bar (Do).

— var. *approximata* (BAB.) ENGELM. — A typo differt floribus, calycis laciiniis membranaceis vix carnosis, stylis ovario subduplo longioribus. — In incultis pagi Orahovo distr. Kuči; in dumetis aversus Rupa Konjska ad pedem montis Vila (Sz), ad Cetinje (Kn).

3236. *C. epithymum* L. — In regione inferiore, montana et subalpina. — Ad Bar; Karugj pr. Rijeka; Štirni do pr. Lukavica planina; Bukovica sub monte Durmitor; in declivi supra coenob. Piva, Borkovići et Goračko distr. Piva; circa Njeguši (Ro), in declivi montis Lovćen (Pč, Ro), in monte Rumija supra Bar (Do).

— var. *macranthera* (HELD.R. et SART.) ENGELM. — A typo differt floribus subsessilibus, calyce basi obconico, antheris maioribus e corolla magis exsertis. — In silva Skrobotuša ad pedem montis Vila distr. Kuči (Sz).

### **Boraginaceae**

*Heliotropium* L.

3242. *H. spinum* L. — A sequente dignoscitur calyce cum fructu maturo deciduo, mericarpiis verrucosis (nec foveo-

lato-rugosis) non secedentibus. — In arenosis et lapidosis regionis inferioris mediterr. — Ad Rijeka (Pč, Ro), nahija Lješanska, Nikšić (Ba).

3244. *H. europaeum* L. — In incultis, ruderatis et arvis regionis inferioris et montanae. — Ad Rijeka (Pt, Ro), circa Njeguši, Cetinje et Grahovo (Pč), in calcareis circa Medun (Sz), ad Vir (Ho), Karugj pr. Rijeka, Lješanska nahija, Podgorica, Nikšić (Ro), ad Bioče pr. Podgorica (Ja), Bar (Do).

*Omphalodes* MCH.

3248. *O. verna* MCH. — In dumetis et in fissuris ru-  
pium regionis montanae. — Circa Njeguši (Ro), Belveder pr.  
Cetinje (Ld, Gi, Ki).

*Cynoglossum* L.

3250. *C. officinale* L. — In saxosis silvaticis, ad vias  
et sepes regionis inferioris, montanae et subalpinae. — Vallis  
Perućica sub monte Kom (Pt), Lukavica planina (Ho), Ce-  
tinje (Kn), Milušina pećina in Katunska nahija; circa Njeguši,  
Danilovgrad et Andrijevica (Ro), in valle fl. Piva pr. Krstac  
(De, Si).

3251. *C. columnae* TEN. — In herbidis, dumetosis et  
ad vias regionis inferioris et montanae. — Circa Medun (Sz,  
Ba), Krstac pr. Njeguši (Ld, Ro), ad Cetinje, Bar et Kokoti;  
ad latera montis Sutorman (Ro), in monte Vjetnik distr.  
Bratonožići et ad coenob. Morača (Ja).

3253. *C. creticum* MILL. — In lapidosis, ad sepes  
et vias regionis inferioris et montanae. — In asperis ad Limljani  
pr. Vir (Pč), ad Cetinje (Ba), Seljani (Ho), in monte Rasovatac  
pr. Vir (Eb), circa Podgorica, Danilovgrad et Bar (Ro).  
(Planta a cl. BALDACCI e Konjuhe pr. Andrijevica indicata  
potius ad spec. sequentem pertinet.)

3254. *C. montanum* HOEJER. — In graminosis et du-  
metis regionis subalpinae. — Ranisava pr. mont. Durmitor; Peru-  
ćica sub monte Kom; Sjekirica planina supra Andrijevica, Nje-  
guši (Ro), in valle fl. Piva pr. Krstac (De, Si).

— var. *parviflorum* (VIS.) HAY. — A typo dignoscitur  
nuculis inter aculeos dense tuberculatis. — Ad Vir (Pč).

### *Lappula* GILIB.

3264. *L. echinata* GILIB. — In incultis, ruderatis, in collinis asperis regionis inferioris et montanae. — Njeguši, Grahovo (Pt, Pč, Ro), Rijeka (Pt), sub monte Lisac (Ho), Konjuhe pr. Andrijevica et Vratlo supra Kolašin (Ba), Ruđine nikšićke (Ro), Velestovo distr. nahija Katunska; ad Godinje et Boljevići pr. Vir (Ro), Nožica pr. Lijeva Rijeka; supra coenob. Morača (Ja), in calcareis circa Medun distr. Kuči (Sz), Sutorman et Novi Bar (Do).

### *Asperugo* L.

3267. *A. procumbens* L. — In ruderatis et lapidosis regionis inferioris et montanae. — Ad Cetinje et Danilovgrad (Pč, Ro), circa Spuž, Šavnik, Andrijevica et Njeguši (Ro).

### *Sympodium* L.

3268. *S. officinale* L. — In salicetis et ad fossas regionis inferioris. — Ad Sinjac, Vir et Rijeka (Pč), Bar (Do).

3272. *S. tuberosum* L. — In silvis et fruticetis regionis inferioris, montanae et subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), vallis Perućica sub monte Kom (Pt, Sz), ad monastir Morača (Pč), in pratis sub monte Hum Orahovski (Sz), Njeguši (Gi, Ki, Ro), circa Bar, Ulcinj, Vir, Matoševo et Lijeva Rijeka (Ro), sub monte Kom Vasojevićki (Ja).

3273. *S. bulbosum* SCHIMP. — A praecedentibus dignoscitur praesertim fornicibus longe exsertis corolla dimidio longioribus, rhizomate elongato gracili tubera globosa vel subglobosa gerente. — In pratis udis regionis inferioris mediterraneae. — Ad Bar (Ro); Crmnica (Eb).

### *Anchusa* L.

3285. *A. officinalis* L. — In lapidosis, incultis, in arvis et ad vias regionis montanae et subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina, Kovčice sub monte Durmitor (Pt), ad Cetinje (Pč, Kn), ad Andrijevica (Ho, Ja), Krstac et Njeguši (Ld, Ro), Viljuša et Velestovo distr. Katunska nahija (Ro), Han Garančić et Matoševo in valle fl. Tara, supra monastir Morača (Ja).

— f. *undulatifolia* W. GR. — Folia margine undulata. — Hucce spectat verosimiliter planta a cl. PANČIĆ (Elench. 67) e Njeguši sub nomine *A. undulata* L. indicata.

— var. *microcalyx* (VIS.) ASCH. et KAN. — Humilis, saepe a basi ramosa, ramis tenuibus abbreviatis; calyx subsessilis, fructifer subglobosus, 5—8 mm longus. — In lapidosis ad Šavniki sub Ivica planina (Ro).

3286. *A. italic a* RETZ. — In lapidosis, arvis, incultis et ad vias regionis inferioris et montanae calidioris. — Ad Bosniči et Danilovgrad (Pč, Pt), Nikšićko polje (Ba), in calcareis ad Medun distr. Kuči (Sz, Ro), ad Cetinje et Bar (Ba, Ro), Sutorman supra Bar (Ho), circa Podgorica et Njeguši (Ro).

3291. *A. arvensis* (L.) M. B. (= *Lycopsis a.* L.). — In asperis ad Cetinje (Pč, Ba).

3293. *A. variegata* (L.) RCHB. — In cultis et ruderatis regionis inferioris mediterraneae, rarius montanae frequens. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica et Njeguši (Ro).

3295. *A. Barrelieri* (ALL.) VITM. — In herbidis et lapidosis regionis subalpinae. — Vratlo supra Kolašin (Pt), in silva Skrobotuša ad pedem montis Vila (Sz), Ljut, Varda et Božur planina supra coenob. Piva, in montibus Balj et Žoljevica supra Andrijevica (Ro).

#### *Nonnea* MED.

3299. ? *N. pulla* (L.) DC. — In agris sub monte Lovćen (Pč).

#### *Alkanna* TSCH.

3307. *A. scardica* GRIS. Spic. II:91. — Caulis dense hispidus eglandulosus; folia dense pubescentia pilis non nodulo insidentibus, basalia rosulata lanceolata ad basin angustata, caulinis oblongo-lanceolata basi attenuata sessilia; racemi terminales pauci (2—3) fructiferi vix elongati, bractae lanceolatae calyce sesquiloculares; flores subsessiles, pedicelli fructiferi demum cernui; corolla coerulea extus pilosa; nuculae valde curvatae reticulato-scrobiculatae. — In saxosis montis Kom (Pt).

\*3310. *A. boeotica* DC. — A praecedente dignoscitur corolla extus glabra, indumento longiore, pilis pluribus nodulo

insidentibus, foliis caulinis basi saepissime semiamplexicauli sessilibus, calyce longius (cca 3 mm) pedicellato fructifero non vel vix cernuo. (Planta nostra habet corollas coeruleas.) — In alpinis montis Sjekirica planina et ad Piševo supra Andrijevica (Ro).

\*3315. *A. tinctoria* (L.) TSCH. — Dense cano-velutina et setosa; foliis lanceolatis obtusis, inferioribus basin versus attenuatis, superioribus basi subdilatata semiamplexicaulibus, racemis fructiferis laxiusculis, bracteis calyce sublongioribus; corolla laete azurea extus glabra tubo calycem aequante vel parum superante (in var. *Matthioli* TSCH. em. HAY. calyce duplo longiore), nuculis irregulariter tuberculato-rugosis, hylo breviter stipitato. — In lapidosis et arenosis regionis inferioris mediterraneae. — Circa Bar, Ulcinj et Podgorica (Ro).

### *Pulmonaria* L.

3320. *P. officinalis* L. — In silvis regionis montanae et subalpinae. — In valle fl. Morača super.; Viruša dol sub Crna planina (Pč), ad coenob. Piva; in valle fl. Tara ad Matosjevo, in montibus Žoljevica et Sjekirica supra Andrijevica (Ro), in monte Kosa supra Bar (Do).

### *Myosotis* L.\*)

3321. *M. scorpioides* L. — In paludosis, fossis et spongiosis regionis inferioris et subalpinae. — Ad ripas lacus Scodrani pr. Vir et Sinjac (Pč), Kostića distr. Kući; Carine sub monte Kom; ad pedem montis Durmitor (Ba).

— f. *strigulosa* (RCHB.) HAY. — Caulis adpresso pilosus; folia caulina internodiis saepe breviora; cinnici laxi. — Ad litora lacus Scodrani pr. Plavnica (Sz), circa Danilovgrad (Ro).

3326. *M. idaea* BOISS. et HELDR. — A praeced. dignoscitur radice annua, caule densius piloso, corollae multo minoris limbo concavo, foliis radicalibus obovato-spathulatis, caulinis oblongo-linearibus. — In lapidosis et graminosis regionis montanae et subalpinae. — Sjekirica planina supra Andrijevica (Ro), Bajce pr. Cetinje (leg. Bierbach teste MALÝ).

\*) Confer K. DOMIN: Monografická studie o *Myosotis silvatica* ... in „Carpatica“ I. Orbis. Pragae 1939.

3329. *M. silvatica* (EHRH.) HOFFM. species collectiva sensu ampl. et em. DOMIN l. c. p. 283.

A) *Orthotrichae* DOM. — „Calyx setis rectis dense vestitus, pilis hamatis nullis vel rarius ad calycis basin solitariis.“

a) *M. alpestris* SCHMIDT. — Indicatur e locis pluribus regionis alpinae (Kom, Durmitor, Velki Maglič, Hum Orahovski, Lovčen, Treblješ luka, Vermoš, Širokar, Rapša), sed secundum cl. DOMIN loca hic enumerata saltem partim ad *M. suaveolentem* et *cyaneam* pertinere videntur.

B) *Uncinatae* DOMIN l. c. p. 265. — „Calyx pilis hamatis dispersis usque densis patulis infimis saepe retroversis vestitus, praeterea varium in modum dense setosus usque glabrescens.“

b) *M. eusilvatica* (HAYEK p. p.) DOMIN l. c. p. 266. — Indicatur e locis pluribus e regione montana et subalpina, sed ex opinione cl. DOMIN dubium esse videtur, an haec species in Montenegro crescat.

c) *M. cyanea* BOISS. et HELDR. ex HALÁCSY Fl. Graec. Consp. II: 354 (= *M. silvatica* subsp. *eusilvatica* f. *cyanea* HAYEK Prodr. II: 77; DOMIN l. c. p. 291). — „*M. eusilvaticae* proxime affinis; diffuso-caespitosa, rhizomate saepe subrepente; caules molles saepe ascendentis vel diffuso-ascendentes, cca 10—25 cm alti parce hirsuti; folia radicalia linearispathulata in petiolum longissimum attenuata; folia caulina ± oblonga, linearisoblonga vel lanceolato-oblonga, modo minora et vix 2 cm longa, modo maiora et ultra 4 cm longa sed etiam tunc haud ultra 7 mm lata, semper mollia et tenuia, molliter laxe hirsuta; calyx virescens foliaceus profunde in lacinias angustas divisus crebre glochidiatus, sed pilis (glochidiis) mollibus, fructifer fere 5 mm longus; corolla pulchre cyanea, sed tantum cca 4 mm diam., corollae tubus calycem aliquantum superans; pedicelli fructiferi gracillimi erecto-patentes vel nonnulli curvato-patentes, adpresso hirsuti, calycibus cca aequilongi.“

In territorio nostro occurrit in formis duabus: f. *polyphylla* DOMIN. — Caespitosa, caulis e rhizom. erectis usque ad inflorescentiam sat dense foliatis, foliis magnis tenerrimis asperulis spathulatis valde obtusis, caulinis inferioribus longiusculae petiolatis et cca 8 cm longis et 12 mm latis; pedicellis fructif. tenuibus elongatis calyce subduplo longioribus.“ — In regione

montana ad Njeguši (Ki) et Krstac njeguški (Pej). A me olim  
ut *M. aspera* VEL. publicata. Verosim. spectat hucce planta  
a cl. BIERBACH in monte Lovćen loco Blatište lecta et a cl.  
K. MALÝ ut *M. cyanea* determinata.

— f. *prorepens* (ROHL. Magy. bot. Lap. VI: 16, 1907) DOMIN l. c. p. 294. — „Subglabra; rhizoma repens; caules e basi procumbente adscendentibus simplices cca 10—16 cm alti molles et flexuosi; folia omnia tenuiter herbacea mollia, radicalia vel rosularum spathulata, petiolis 5—8 cm longis instructa; cincinni breves; calyces ad margines laciniarum dense argenteo villosos-setosi basi glochidiis dispersis muniti in facie laciniarum parum hirsuti; corollae tubus calycem haud excedens, limbus maior usque 6 mm diam.; pedicelli erecto-patentes sed graciles calyces fructiferos circa aequantes.“ — In lapid. et glareosis regionis alpinae ultra 2000 m. — Savin Kuk in monte Durmitor et in monte Kom Vasojevički (Ro).

d) *M. suaveolens* W. K. sensu ampl. (DOMIN l. c. p. 303). — In regione montana, subalpina et alpina. — In monte Kom Kučki (Sz, Ho), ad Njeguši et Cetinje (Ld, Ki, Pej, Ro), in monte Lovćen loco Štirovnik (Vh), Golo brdo supra Njeguši (Ki), in monte Durmitor et Maglić Pivski (Ro), Štirni do prope Lukavica planina; Mokra et Sjekirica planina pr. Andrijevica (Ro), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), Ledenica planina, Vojnik (Ro).

— f. *pygmaea* BECK et SZ. Pl. Cernag. 132. — In graminosis summi montis Velki Maglić (Sz).

\*— var. *pseudolympica* (ROHL.) DOM. (= *M. olympica* ROHL. olim non BOISS.; *M. silvatica* subsp. *alpestris* var. *pseudolympica* ROHL. 1935). — Folia utrimque pilis nodulo incrassato insidentibus ± dense tecta, calyces fructiferi usque ultra 8 mm longi pedicellis suis duplo longiores, laciinis longis angustis, cincinnis (rigidis et strictis) caulis parte foliosa brevi manifeste longioribus. — Habitat in pratis subalpinis montis Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

\*— var. *obtusifolia* DOMIN l. c. p. 314. — „*M. alpestrum* omnino aemulans, foliis caulinis quidem angustis, sed anguste spathulatis usque linearioribus vel lingulato-oblongis obtusis. Habitu *M. alpestrum* revocat, sed calycis indumento cum *M. suaveolente* conformis.“ — In alpinis montium Mokra planina

(Ro); in regione montana ad Njeguši, loco Gornje polje; Crvena greda sub monte Durmitor (Ro).

\*e) *M. Kerner i* DALLA TORRE et SARNTH. (DOMIN l. c. p. 315) var. *brachysiphon* DOMIN. — „Calyx sat dense glochidiatus, corollae tubus calycem haud excedens, limbus magnus (8—9 mm diam.), calyx fructifer satis elongatus foliaceus.“ — Sub monte Lovćen loco Zvērinačke rupe (Kš).

\*f) *M. myriantha* DOMIN l. c. p. 345. — „Ramosissima; caulis principalis ab ima basi caules laterales arcuato-adscendentes et eo paulo breviores emittens; caulis medius et caules laterales (e basi nascentes) hispida, iterum patentim ramosissimi; folia caulina ovata vel ovato-lanceolata; cincinni numerosissimi longissimi caulis foliiferis manifeste longiores; cincinnorum rhachis gracillima; flores parvi; calyx florifer dense uncinato-hispidus; corollae tubus calycem aliquantum excedens, limbus vix 3 mm diametris, sed ut videtur saltem posterius planus; calyx fructifer foliaceus, ultra  $\frac{2}{3}$  divisus cca 4 mm longus pedicellum circiter aequans.“ — In alpinis montium Ledena planina distr. Piva (Ro).

\* — f. *angustifolia* DOMIN l. c. p. 346. — Differt foliis caulinis oblongo-linearibus angustis acutis. — In subalpinis montis Varda planina supra monast. Piva cca 1000 m (Ro); in monte Rumija supra Bar (Do).

× *M. arvensis* × *suaveolens* = *M. microcalyx* (BECK) DOM. — Ad Andrijevica et in valle flum. Perućica sub monte Kom (Ro).

3331. *M. arvensis* (L.) HILL. — In agris, incultis et ad sepes regionis inferioris, montanae et subalpinae. — Ad Cetinje (Pt, Pč), in silva Skrobotuša ad pedem montis Vila (Sz), in valle Perućica sub monte Kom; circa Podgorica (Ro), ad Andrijevica (Ho, Ro), Sutorman supra Bar; in monte Rasovatac pr. Vir (Eb), Djevojački do pr. Njeguši (Pej, Ro).

3332. *M. collina* HOFFM. — In saxosis, lapidosis et graminosis regionis inferioris, montanae et subalpinae. — In monte Lovćen (Pč), in calcareis ad Medun (Sz), circa Njeguši (Sz, Gi), ad latera montis Hum Orahovski distr. Kući (Sz), circa Bar, Ulcinj, Podgorica et Andrijevica (Ro), Velki Mikučići sub monte Rumija (Do).

3337. *M. sparsiflora* MIK. — Ad muros et sepes regionis montanae pr. Andrijevica (Ro).

*Moltkea* LEHM.

3338. *M. petraea* (TRATT.) GRIS. — In rupestribus calcareis regionis montanae calidioris, rarius in regione alpina. — In monte Lovćen (Eb, Pč, Ba, Ad, Pej, Ro); ad Ostrog et Vir (Pč, Ro), Rijeka (Ba, Kn); Njeguši, Cetinje et Ceklin (Pej, Ro, Ho, Kš, Ma, Gi); in monte Rumija, Lisinj et Lonac distr. Primorje (Ba); Bogojeva glava supra Njeguši (Pej, Ro); Božljevići supra Vir (Ro); in monte Jastrebica=Orjen (Ad); Bioće pr. Podgorica (Ba, Ja); Medun distr. Kuči (Ba); Druščići distr. Lješanska (Ba, Ro); in monte Pej pr. Kolašin (Ja); ad Goraňsko et coenob. Piva (Ro); etiam in saxosis montis Durmitor loco Dobri do!! cca 2000 m (Ro); in monte Rasotavac pr. Vir (Eb).

— f. *linearifolia* LINDB. fil. — Frequens.

— f. *oblongifolia* LINDB. fil. — Inter Bajce et Cetinje (Ro).

*Lithospermum* L.

3343. *L. purpureo-coeruleum* L. — In fruticetis et ad margines silvarum regionis inferioris, montanae, rarius subalpinae. — Supra Limljani distr. Crmnica (Pč), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica; Danilovgrad, Zagarać, Njeguši, Cetinje, Viljuša, Andrijevica, ad latera montis Vojnik; ad Ljut et Goraňsko supra coenob. Piva (Ro), in monte Kosa supra Bar (Do), Crmnica (Eb).

3344. *L. officinale* L. — In dumetis et silvis regionis inferioris, montanae, rarius subalpinae. — In monte Sutorman sub clivo Mali Lonac (Pč), Rijeka (Ho, Ro), Bukovica sub monte Durmitor (Ba), circa Andrijevica (Ja, Ro), ad Bar, Vir, Podgorica, Skadarsko jezero, Njeguši, Čevo, Viljuša, Šavnik, Goraňsko, coenob. Piva, Ljut distr. Piva et ad latera montis Jerinja glava supra Andrijevica (Ro), Mali Bostur in monte Lovćen (Kš).

3345. *L. arvense* L. — In agris et incultis regionis inferioris et montanae frequens.

3346. *L. incrassatum* GUSS. — A praeced. dignoscitur pedicellis fructiferis obconicis valde incrassatis. — In herbidis et lapidosis regionis montanae calidioris. — Inter Njeguši et Cetinje (Ld), Krstac, Mali Šavnik pr. Njeguši (Kš, Gi), in monte Balj supra Andrijevica (Ro).

*Onosma* L.

3351. *O. stellulatum* W. K. — In lapidosis et rupestribus regionis superioris. — Crvena greda sub monte Durmitor, Maglić Pivski, Pošćensko jezero sub Ivica planina (Ro), Šavniki (Pč), Krivi do distr. Piva (De, Si), in monte Kom Kučki (Ho), Rumija (Ba). (Loca cetera e regione inferiore indicata forsan ad *O. \*Jávorkae* spectant.)

3359. *O. A u c h e r i a n u m* DC. subsp. *Jávorkae* (SIMK.) HAY. — In rupestribus et lapidosis regionis inferioris, montanae, rarius subalpinæ. — In calcareis ad Medun (Sz), ad Bar, Boljevići, Podgorica, Bioče, Grašina sub monte Lovćen, Njeguši, ad pedem montis Vojnik, inter Bukovica et Cetinje (Ro), in monte Rumija (Do), Krivi do distr. Piva (De, Si).

\*3361. *O. arenarium* W. K. — Ad Duklja pr. Podgorica in regione inferiore mediterranea (Ja).

3364. *O. Visianii* CLEM. — In saxosis et lapidosis regionis inferioris et montanae calidioris. — Čevo et Župa nikšićka (Pč), Gornje blato pr. Rijeka (Ho), Tudjemile supra Bar ad latera montis Rumija; ad Ostrog et Nikšić (Ba).

*Cerinthe* L.

3370. *C. minor* L. — In herbidis et lapidosis regionis montanae raro. — In monte Vjetnik distr. Bratonožići (Ja).

— f. *indigotisans* (BORB.) HAY. (= var. *maculata* ROHL. IV. Beitr. 71. vix VISIANI). — Corollæ tubus in parte superiore (cca  $\frac{1}{3}$ ) violaceus; folia ut in typo. — In calcareis ad latera montis Balj pr. Andrijevica (Ro).

3371. *C. lamprocarpa* MURB. — A praeced. dignoscitur radice perenni, calycis laciniis cordato-ovatis vel cordato-lanceolatis, corollæ limbo primum fusco, dein violaceo, demum virescente, nuculis atrofuscis vel nigris levibus (confer. var. *tuberculatam!*) nitidis. — In rupestribus et asperis regionis inferioris montanae calidioris: Nikšićka župa (Pč sub *C. auriculata*), Njeguši, Krstac (Pej, Ro, Ma, Gi, Ki), Zagarać supra Danilovgrad, ad latera montis Vojnik — 1200 m (Ro), in monte Lovćen (To), Sutorman supra Bar (Eb).

— f. *luteolaciniata* MALÝ. — Cum typo ad Njeguši (Pej, Ro).

— var. *tuberculata* (ROHL.) SAG. (= *C. minor* var. *tuberulata* ROHL. in FEDDE Rep. III:146). — Nuculis haud vel paulo lucidis tenuiter verruculosis, apice saepissime magis protractis. — Supra coenob. Piva pr. Goračko, cca 800 m (Ro), ad Rijeka (Ho), Petrovo Ljut pr. Njeguši (Pej, Ro).

3373. *C. glabra* MILL. — In saxosis et glareosis regionis alpinae. — In monte Durmitor (Pč, Pt, De, Si, Ro), Korita rovačka pr. Lukavica planina, 1700—2000 m (Ro).

### *Echium* L.

3376. *E. italicum* L. — In aridis collinis asperis regionis inferioris et montanae calidioris. — Ad Komani (Pt), Njeguši, Grahovo (Pč, Ro), Dobrsko selo pr. Cetinje (Kš), Ruđine nikšićke, Viljuša, Podgorica (Ro), Bar (Do), Peljev briješ distr. Bratonožići (Ja).

— var. *Biebersteinii* LAC. — Caulis a basi ramosus, ramis iteratim ramosis foliis suffulcrantibus longioribus, panicula late pyramidata. — Non raro cum typo.

3378. *E. vulgare* L. — In lapidosis, ruderatis et ad vias regionis montanae, subalpinae, rarius inferioris. — In valle Perućica sub monte Kom (Pt, Ho), ad Kovčice sub monte Durmitor (Pt), in dumetis supra Limljani distr. Crmnica et ad coenob. Morača (Pč), Cetinje (Kn), ad Andrijevica (Ja, Ro), circa Šavniki, Goračko, coenob. Piva, Njeguši et Boljevići supra Vir (Ro), in valle fl. Tara ad Han Garančić, Matošević et Kolašin (Ja).

\*3380. *E. plantagineum* L. — Foliis superioribus cordatis amplexicaulibus. — In lapidosis et incultis regionis inferioris mediterraneae ad Bar (Ro).

## Solanaceae

### *Atropa* L.

3389. *A. belladonna* L. — In silvis et caesuris silvarum regionis subalpinae. — In valle Perućica sub monte Kom (Pt), sub Javorje planina (Pč), in valle fl. Tara et Bistrica pr. Kolašin (Ja), in monte Lisa pr. Andrijevica; ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

*Hyoscyamus* L.

\*3391. *H. niger* L. — In incultis, ad sepes, vias et murros regionis inferioris et mediae frequens.

3393. *H. albus* L. — In ruderatis et inter vineas regionis inferioris mediterraneae. — Ad Klopot distr. Bratonožići (Pč), Rijeka (Ba), Ulcinj, Podgorica (Ro), Bar (Ro, Do).

*Physalis* L.

3396. *Ph. alkekengi* L. — In incultis et inter vineas regionis inferioris. — Ad Klopot distr. Bratonožići (Pč), ad Rijeka (Kn, Ho, Ro), Nikšićko polje (Ro).

— f. *grandiflora* ROHL. MBL. IV: 321. — Corolla multo maior 3 cm lata. — In fruticetis pr. Plavnica ad lacum Scodranum (Ro).

*Capsicum* L.

3396b. *C. annum* L. — In regione inferiore cultum et non raro subspontaneum.

*Solanum* L.

3399. *S. dulcamara* L. — In fruticetis, ad ripas et inter dumeta regionis inferioris, montanae et subalpinae. — Ad ripas lacus Scodrani (Pt, Pč, Ro), ad Ulcinj (Ho), ad Njeguši, Danilovgrad, Pošćensko jezero supra Šavnik, coenob. Piva et sub Lola planina (Ro), circa Kolašin et in monte Pivljan (Ja). — f. *indivisum* BOISS. — In monte Lovćen (Ro).

3402. *S. latum* MCH. — In ruderatis regionis montanae ad Medun (Sz).

\*3403. *S. luteum* MILL. — In ruderatis et ad vias regionis montanae calidioris. — Lastva čevska (Ho), Njeguši (Pej, Ro), Bar (Do).

3404. *S. nigrum* L. — In ruderatis, ad sepes et vias regionis inferioris et montanae frequens et vulgaris.

*S. tuberosum* L. — Ubique cultum.

3405. *S. lycopersicum* L. var. *esculentum* (MILL.) HAY. — In regione inferiore cultum et non raro subspontaneum.

*Datura* L.

3408. *D. stramonium* L. — In ruderatis et ad vias regionis inferioris et mediae. — Ad Cetinje et Grahovo (Pč, Ba), Rijeka (Ba, Ho, Kn), ad Bar et Nikšić (Ba, Ro), Vratlo supra Kolašin (Ba), circa Ulcinj, Njeguši, Viljuša, Šavniki, Goraško et coenob. Piva (Ro).

*Nicotiana* L.

3411b. *N. tabacum* L. et *N. rustica* L. — In regione inferiore mediterranea culta et non raro subsppontanea.

**Scrophulariaceae**

*Verbascum* L.\*)

3415. *V. thapsiforme* SCHRAD. — In lapidosis et ad margines silvarum regionis montanae calidioris, usque ad 1300 m. — In monte Lovćen et ad Grahovo (Pč, Ro), Njeguši, Čeklići, ad latera montis Vojnik et ad coenob. Piva (Ro), ad Bukovica pr. Njeguši (Ho sub *V. Velenovskýi*).

— f. *cuspidatum* SCHRAD. — Bracteis et foliis caulinis superioribus longissime cuspidatis. — Cum typo non raro.

\*3415=6. *V. Heuffelii* NEILR. subsp. *Vandasii* (ROHL.) MURB. Monogr. 92 (= *V. thapsiforme* B. *Vandasii* ROHL. in FEDDE Rep. 1921, pag. 34/418; *V. Vandasii* ROHL. VII. Beitr. 4/44). — Planta elata, usque 1—2 m alta, simplex vel rarius parce ramosa, tota indumento tenui, detersili, albido vel canescente tecta; foliis levissime crenulatis, fere integris, oblongis, ovato-oblongis, vel oblongo-lanceolatis, infimis apice obtusiusculis, mediis et supremis apice acutis, caulinis omnibus a folio ad folium latissime decurrentibus; spica densa, longissima, simplex, rarius parce ramosa; floribus fasciculatis, nonnullis in fasciculo breviter, ceteris longiuscule pedicellatis; pedicello calyce aequilongo vel longiore; calyce fere usque ad basin 5-partito, eius lacinias late obovatis vel ellipticis, apice acutis vel breviter acuminatis, bracteis obovato vel elliptico-lanceolatis, acuminatis, fasciculos parum superantibus, corolla explanata, diametro 3—3,5 cm ampla, antheris staminum longiorum adnato-decurrentibus, filamentis suis subduplo brevioribus, filamentorum breviorum lana albida; capsula ovata vel

\*) Confer: Dr. SW. MURBECK: Monogr. d. Gattung *Verbascum*, Lund 1933.

*elliptica*, apice acuta, calyce sesquii<sup>z</sup> vel subduplo longiora. — Habitat in alpinis montium Balj, Sjekirica et Jerinja glava supra Andrijevica; etiam in declivibus montis Kom versus Perućica, cca 1200—1800 m (Ro).

× *V. Heuffelii* subsp. *Vandasii* × *phlomooides*. — In monte Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

× *V. Heuffelii* subsp. *Vandasii* × *Nicolai* = *V. Černýi* ROHL. — In subalpinis montis Jerinja glava et Balj supra Andrijevica (Ro).

3417. *V. niveum* TEN. subsp. *Visianianum* (RCHB.) MURB. (= *V. mactrum* aut. mont. non TEN.). — In lapidosis et saxosis regionis inferioris et montanae calidioris. — Ad Njeguši, Cetinje, Bajce, Gornje blato pr. Rijeka, Drušići distr. Lješanska nahija et Podgorica; etiam ad latera montis Lovćen (Ro), inter Kotor et Cetinje (Čer), Belvedere pr. Cetinje (Ld).

× *V. niveum* TEN. subsp. *Visianianum* (RCHB.) MURB. × *pulverulentum* VILL. = *V. Gintlii* ROHL. — Inter parentes ad Njeguši et in monte Lovćen (Pej, Ro).

× *V. niveum* TEN. subsp. *Visianianum* (RCHB.) MURB. × *thapsiforme* SCHRAD. — Kunji do pr. Njeguši (Pej, Ro).

3418 ? *V. thapsus* L. — In lapidosis et saxosis regionis montanae et subalpinae. — Krstac et Njeguši (Gi), Konjuhe pr. Andrijevica, mons Korman in Sinjavina planina (Ba). Loca hic enumerata forsitan ad alias species spectant.

3419. *V. phlomooides* L. — In lapidosis, glareosis, caesuris silvarum regionis inferioris et subalpinae, usque ad 1400 m. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), vallis Tušina pr. Buan distr. Šavniki, ad Vir (Pč), ad Bajce, Cetinje et Nikšić (Ba), Konjuhe sub monte Kom (Ba, Ro), Medun distr. Kući, circa Šavniki, Rijeka, Drušići et Andrijevica (Ro), in decliv. montis Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro), in monte Rumija supra Bar (Do), in monte Vjetnik distr. Bratonožići, in valle Tara ad Han Garančić, Matoševo et Kolašin, Nožica ad Lijeva Rijeka (Ja).

× *V. phlomooides* L. × *pulverulentum* VILL. — Ad Lijeva Rijeka (Ro).

\*3423. *V. longifolium* TEN. subsp. *pannosum* (VIS.) MURB. — In pratis et pascuis regionis subalpinae et

alpinæ, 1000—1800 m. — In monte Kom, Balj et Sjekirica planina supra Andrijevica; etiam in valle fl. Perućica sub monte Kom (Ro), Vermoš planina cca 1400 m (Df).

✗ *V. longifolium* TEN. subsp. *pannosum* (VIS.) MURB. ✗ *lychnitis* L. = *V. pseudobalcanicum* ROHL. — Ad Andrijevica, cca 1000 m (Ro).

✗ *V. longifolium* subsp. *pannosum* ✗ *Nicolai*. — In pascuis alpinis sub monte Kom (Ro).

3428. *V. Nicolai* ROHL. in FEDDE Repert. III: 148; Acta botan. bohem. II: 14 (= *V. Guicciardi* ROHL. III. Beitr. 47 non B. H.). — Bienn; caule elato, simplicissimo usque ad 80 cm alto, tenuiter albo-tomentoso-pannoso dein glabratu subnitido, in racemum longum angustum laxissimum abeunti; foliis rosularum hornotinarum obovato-oblongis vel oblongo-lanceolatis, 5—20 cm longis, 1,5—6 cm latis in petiolum sensim attenuatis utrimque densissime lutescenti-tomentoso-pannosis, margine obtuse crenatis; caulinis infimis ovato-oblongis sequentibus oblongis vel oblongo-lanceolatis in petiolum sensim attenuatis, supremis linearie-oblongis basi angustata vel subrotunda sessilibus in bracteas lanceolatas sensim abeuntibus, omnibus (iis rosularum hornotinarum exceptis) paulum acutius crenulatis tenuiter albo-tomentoso-panniosis tandem glabrescentibus vel dein omnino glabris; floribus in fasciculis 2—5-floris bracteis linearie-lanceolatis ante anthesin fasciculos superantibus fulcratis, pedunculis floriferis inaequalibus, nonnullis calyces longitudine vix adaequantibus, aliis paulum superantibus, fructiferis calyce saepe sesquiesque usque subduplo longioribus; calyce albo tomentoso-pannoso, dein glabratu, fere ad basin in lacinias oblongo-lanceolatas 5—6 mm longas, 1—2 mm latas partito; corollis explanatis cca 2,5 cm amplis, extus tomentellis, filamentis staminum breviorum ad apicem usque, staminum longiorum solum in parte inferiore albo-lanatis, antheris antice 1,7—2,5 mm longis oblongis vel reniformi-oblongis breviter adnato-decurrentibus; capsula ellipsoidea vel oblongo-ellipsoidea, mucronulata calyce sesquiesque vel subduplo longiore. — In herbidis et pascuis regionis subalpinæ et alpinæ omnium montium dicionis septentr. 1000—2000 m. — Perućica sub monte Kom (Pt sub *V. garganicus heterophyllum*), Maglić Pivski, Durmitor, Sinjavina planina Kom, Balj et Sjekirica pr. Andrijevica, Štirni do prope Lukavica planina, Jablan vrh supra Kolašin (Ro), ad Zmijino jezero sub monte Durmitor (leg. Muravjev teste MURBECK);

in monte Prokletija inter Turjak et Rožaj (Ko); Kostiča distr. Kuči (Ba sub *V. prusiano*), in monte Kom (Pč), in monte Dziebeze (Sz).

3455. *V. speciosum* SCHRAD. — In lapidosis et dumetositis regionis montanae et subalpinae. — In monte Vjetrnik distr. Bratonožići, Jablan, Lopate, ad Lijeva Rijeka et circa Andrijevica (Ro, Ja).

3457. *V. pulverulentum* VILL. — In apricis, saxosis et ad vias regionis inferioris, montanae, rarius subalpinae. — Ad Cetinje (Pt, Pč, Čer), in silva Skrobočuša ad fines Albaniæ (Sz), in saxosis aversus Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz), ad Bar et Ulcinj (Ba, Ro), Zagarać supra Danilovgrad, Podgorica, Rijeka, Njeguši (Ro), ad Kolašin (Ja), insula Vranina (Eb).

× *V. pulverulentum* × *sinuatum*. — Ad Njeguši (Pej, Ro).

\*3462. *V. banaticum* ROCH. — Habitu *V. lychnitis* similis, sed foliis supra tenuiter puberulis, infimis ovatis basi auriculatis vel 1—2-lobis dignoscitur. — In dumetis vallis fl. Lim pr. Andrijevica, cca 800—1000 m (Ro).

3468. *V. lychnitis* L. — In glareosis, arenosis et ad vias regionis montanae. — Ad Buan in valle fl. Tušina pr. Šavniki (Pč), Borkovići distr. Piva (1200 m), Njeguši, Četinje, Lastva čevska, Lovčen, inter Žabljak et Nedajno distr. Piva (Ro), Trijepši distr. Kuči (Ba).

— var. *longicarpum* VELEN. — Folia inferiora elongato-lanceolata magis crenata, superiora linear-lanceolata longe acuminata; pedicelli cca 1 cm longi fructiferi apice ± incrassati; capsula calyce duplo longior. — Rarius cum typo.

× *V. lychnitis* L. × *niveum* TEN. subsp. *Visianianum* (RCHB.) MURB. = *V. Pejovičii* ROHL. — Njeguši (Pej, Ro).

× *V. lychnitis* × *pulverulentum*. — Ad Bukovica et Dubovik pr. Njeguši (Pej, Ro).

3471. *V. sinuatum* L. — In lapidosis et arenosis regionis inferioris mediterraneae et montanae. — Ad litora maris pr. Bar et Ulcinj (Ba, Ro, Do), ad viam e Kotor ad Njeguši (Ro).

3475. *V. Chaixii* VILL. — In lapidosis et fruticetis regionis montanae et subalpinae. — In valle fl. Lim et ad latera montis Žoljevica pr. Andrijevica, Cetinje (Ro).

— subsp. *austriacum* (SCHOTT) HAY. — In dumetis et ad margines silvarum regionis montanae et subalpinae. — Supra pagum Orahovo distr. Kuči (Sz), Njeguši, Cetinje, Sisunji distr. Katunska nahija, Donja Krivača sub monte Lovćen, Piperska Lukavica, Konjsk planina (olim a me sub *V. orientali* indicatum), Mratinje sub monte Maglić, ad coenob. Piva, Drežnica pr. Nikšić et circa Andrijevica 600—1600 m (Ro).

× *V. Chaixii* subsp. *austriacum* × *pulverulentum*. — Cum parentibus ad Njeguši (Pej, Ro).

3478. *V. durmitoreum* ROHL. in FEDDE Rep. III: 149. — Caule simplici cca 30—40 cm alto; foliis rosularum hornotinarum ovatis vel ovato-oblongis acutis in petiolum parum breviorem abrupte abeuntibus 4—10 cm long., 3—7 cm latis, caulinis inferioribus et mediis ovato-oblongis vel ovato-lanceolatis acutis, in petiolum alatum sensim attenuatis, superioribus basi angustata sessilibus, omnibus detersibile lutescenti-tomentoso-pannosis et glandulis luteis (in foliis inferioribus sparsius, in superioribus densissime) obsitis, inferioribus margine obtuse, superioribus acutius crenatis; spica simplici albido et lutescenti-tomentoso-pannosa et glandulosa, fasciculis saepissime 5-floris, bracteis anguste linear-lanceolatis pedicella saepissime superantibus, pedicellis inaequalibus, aliis calyce brevioribus, aliis sublongioribus (sub fructu parum elongatis); calyce usque ad basin in lacinias lanceolatas cca 5—6 mm longas, 1—2 mm latas (sub fructu parum maiores) partito; corolla cca 2,5 cm ampla extus parce tomentosa; filamentis omnibus purpureo-lanatis, antheris staminum omnium reniformibus corformibus; capsula ellipsoidea vel subglobosa calyce parum longiore. — In herbidis et glareosis regionis subalpinae et alpinae montium dicionis septentrionalis, usque ad 2000 m. — In monte Maglić Pivski et in Sinjavina planina loco Jablan vrh (Ro), in monte Durmitor (Ro, De, Si).

× *V. durmitoreum* × *Nicolaie* = *V. Kavinae* ROHL. — Cum parentibus in monte Jablan vrh supra Kolašin (Ro — olim ut *V. Baldaccii* f. *angustatum* indicatum). Etiam in decliv. septentr. montis Durmitor (Ro).

3479. *V. abi etinum* BORB. (= *V. Bornmülleri* VELEN.; *V. nigrum* var. *paniculatum* GRIS. apud PANTOCSEK Adnot.

68; *V. nigrum* aut. montenegr. non L.). — Ab affini *V. nigro* L. dignoscitur caule robustiore in paniculam pyramidatam amplam diviso, ramis paniculae robustis strictis simplicibus dense floribus obsitis (rarius laxiusculis), fasciculis 10—20 floris, foliis subtus molliter cano-tomentosis (confer etiam var. *lovćense* ROHL.). — In silvis et dumetis regionis montanae, subalpinae, rarius inferioris. — In monte Durmitor (Pč sub *V. nigro*, Ro, Muravjev), Žabljak sub monte Durmitor (Ro, Muravjev), in monte Maglić Pivski (Ro), ad Volujačko jezero (Ma), Treblješ luka pr. Lukavica planina (Ho), Nedajno in Pivska planina (Ro), Borkovići distr. Piva, Goraňsko supra coenob. Piva, Ledenica planina, ad latera montis Vojnik, in monte Balj et Jerinja glava supra Andrijevica et ad latera montis Lovćen versus Njeguši (Ro), in valle fl. Tara ad Matosjevo, Han Garančić et Kolašin (Ja), in valle fl. Lim ad Andrijevica (Ja), in valle fl. Perućica sub monte Kom (Sz, Ro), ad latera montis Dziebeze et ad pedem montis Vila distr. Kući (Sz sub *V. nigro*), Krivi do supra Kolašin (Ba sub *V. nigro*), circa Kovčice sub monte Durmitor (Pt sub *V. Wierzbickii*), infra Cetinje et Rijeka (Ba sub *V. nigro*).

— var. *lovćense* ROHL. in FEDDE Rep. III: 148. — Foliis omnibus subtus densissime niveo-tomentosis. — In monte Lovćen (Kš, Pej, Bo, Ro), in monte Orjen (Čer), ad Njeguši loco Gojanove grede et Radulica (Ro).

× *V. abietinum* × *Heuffelii* subsp. *Vandasii* = *V. Dominii* ROHL. — Perućica sub monte Kom, in monte Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

× *V. abietinum* × *longifolium* subsp. *pannosum* = *V. Horákii* ROHL. — In monte Balj supra Andrijevica (Ro).

× *V. abietinum* × *Nicolai* (= *V. Nicolai* × *Bornmüllerii* ROHL.; *V. Nicolai* var. *obtusifolium* ROHL. in FEDDE Repert. XVII: 34). — Inter parentes in alpinis Sjekirica planina (Ro).

3482. *V. glabratum* FRIV. — Rhizoma crassum fere lignosum; caulis inferne villosus et ± floccosus, superne glaberrimus; folia supra viridia glabrata subtus pubescenti-villosa, infima oblonga basi cordata longe petiolata, petiolis saepissime villosis, superiora ovato-lanceolata basi rotundata sessilia; flores fasciculati racemum laxum simplicem vel inferne subcompositum formantes; pedicelli valde inaequales.

unacum calyce minuto (ad summum 6 mm longo) glaberrimi; calycis laciniae lanceolatae vel ovato-lanceolatae; filamentorum lana purpureo-violacea; antherae omnes reniformes; capsula ovato-globosa calyce duplo longior. — In lapidosis et dumetis regionis inferioris et montanae. — Ad Medun et Orahovo distr. Kuči (Sz), Andrijevica (Ho), ad Bar, Ulcinj, Rijeka et Njeguši (Ro), Cetinje (Ro, Ba, Sa), Trešnja et Bukovica sub monte Lovčen (Ro), Obsovica (Gross), Kriva greda (Bierbach), Crmnica (Eb).

(3494.) —— subsp. *Brandzae* (FRANCH.) GRECESCU (= *V. leptocladum* PANČ. Elench. 69 non B. H.; *V. Pančići* ROHL. II. Beitr. p. 6; *V. Ostrogi* ROHL. in FEDDE Rep. I: 22; *V. Rohlenae* MALÝ). — „Bienne, inferne ad caulem et ad foliorum paginam inferiorem detersili-pannosum, tandem fere glabrum (nervis basique caulis exceptis), ceterum glaberrimum; foliis rosularum hornotinarum late ovatis vel late ovato-ellipticis basi angustata saepius 1—2 auriculis auctis, margine duplicato-crenatis, petiolo laminam subaequante; foliis mediis oblongo-ovatis sessilibus; panicula multiramosa, ramis virgatis pertenuibus; pedicellis plurimis binis (ad apicem ramorum tantum solitariis), pertenuibus calyce 4—5-plo longioribus, calycis laciniis linearibus glabris subacute corolla lutea glabra glandulis pellucidis dense conspersa duplo superatis; filamentis omnibus reniformibus non decurrentibus; capsula oblongo-elliptica glabra apice emarginata cca 4 mm longa calyce duplo longiore.“ — In lapidosis, ruderatis et dumetis regionis inferioris, montanae, rarius subalpinae. — Sub monte Javorje (Pč), ad Ostrog et Nikšić (Ho, Ro), ad pedem montis Balj pr. Andrijevica, Rudine nikšićke, Borkovići distr. Piva; ad coenob. Piva et inter Bar et Ulcinj (Ro), in monte Vjetnik distr. Bratonožići, Lijeva Rijeka, Lopate, inter Matoševu et Kolašin, in valle fl. Morača et inter coenob. Morača et Bistrica (Ja), ad Medun et Orahovo distr. Kuči (Sz), Velki Mikulići sub monte Rumija, in monte Kosa supra Bar (Do), in valle Vrbnica distr. Piva (De, Si).

(3476.) —— subsp. *bosnense* (MALÝ) MURB. — In formis ± ad subsp. praeced. vergentibus ad Medun distr. Kuči (Ba).

× *V. glabratum* × *niveum* subsp. *Visianianum* MURB. Monogr. 449. — Ad viam inter Cetinje et Rijeka (Sa).

3486. *V. blattaria* L. — In herbidis, dumosis, ad ripas et vias regionis inferioris et montanae. — Ad Rijeka (Pt, Ro), Kopilje (Ba), Njeguši, Bukovica pr. Cetinje, Bar, Vir, Rijeka, Spuž, Danilovgrad, Ostrog, Podgorica (cum f. *lilacina!*), et in valle fl. Lim pr. Andrijevica (Ro), ad coenob. Morača, circa Kolašin et ad Kralje supra Andrijevica (Ja).

— f. *brevipedicellatum* HAL. — Pedicelli calyce aequilongi vel parum breviores, bractae pedicellis aequilongae vel sublongiores. — Cum typo ad Ostrog, Njeguši et Podgorica (Ro).

— var. *gracilipes* MURB. Monogr. 566 (= *V. blattaria* L. var. *blattariforme* HAL. non GRIS.). — A typo differt foliis et bracteis minoribus et angustioribus, pedicellis calyce 4—5-plo longioribus. — Ad Rijeka et Komani (Pt), in dumetis ad Vir (Ba).

× *V. blattaria* × *pulverulentum*. — Ad Rijeka (Ro).

× *V. blattaria* × *sinuatum*. — Ad Bar (Ro).

3497. *V. phoeniceum* L. — In dumetosis et lapidosis regionis inferioris et montanae. — Sub monte Lovćen (Pč), in silvis montis Rumija supra Bar (Ba), ad Vir, Podgorica, Rijeka et Kokoti distr. Lješanska nahija (Ro).

#### *Antirrhinum* L.

3516. *A. orontium* L. — In ruderatis, cultis et ad vias regionis inferioris et montanae. — Ad Previs (Pt), ad Bar et Rijeka, Velestovo, Resna et Njeguši distr. Katunska nahija, Šavniki sub Ivica planina, Mratinje sub monte Maglić Pivski, ad Goraňsko et coenob. Piva (Ro), Berane et Kralje pr. Andrijevica (Ro, Ja).

#### *Linaria* HILL.

3522. *L. alpina* (L.) MILL. — In glareosis alpinis. — In monte Durmitor et Kom (Pč, Sz, Ro, Ba), in monte Gradište supra Kolašin (Ba), Kostića distr. Kuči (Ba), Fuša Rudnices sub monte Prokletija (Df).

3524. *L. pelisseriana* (L.) MILL. — In cultis, gramnosis et lapidosis regionis inferioris mediterraneae. — Volovica pr. Bar (Ba), Bioće in valle fl. Morača (Ro, Df), circa Podgorica, Spuž et Zagarać supra Danilovgrad (Ro).

3528. *L. peloponnesiaca* BOISS. et HELDR. — In rupestribus et lapidosis regionis montanae, subalpinæ et alpinæ

in tota ditione frequens. — A *L. vulgari* dignoscitur sepalis obtusis scarioso-marginatis, seminibus triquetris tenuiter granulatis.

— f. *albida* ROHL. MBL. VI: 159. — Flores albi. — Rarius cum typo.

— f. *latifolia* ROHL. V. Beitr. 95. — Folia lanceolata trinervia usque 6 mm lata. — Cum typo ad Šavniki sub Ivica planina (Ro).

3530. *L. dalmatica* (L.) MILL. — A praecedente dignoscitur sepalis acutis, caule basi non surculos steriles emittente, foliis multo latioribus basi + cordata subamplexicaulibus, corollis maioribus et seminibus muricato-rugosis. — In collibus apricis, in saxosis regionis inferioris mediterraneae et montanae calidioris dictionis meridionalis. — Ad monastir Duga (Pt), Čevo, Dobre Strane distr. Čeklići, Limljani distr. Crmnica (Pč), ad Gradjani (Ba), Ulcinj, Sutorman supra Bar (Ho, Ro), ad coenob. Ostrog (Pč, Ba), circa Viljuša, Njeguši, Vir, Bar et Podgorica (Ro), Peljev brije (Ja), Limljani pr. Vir (Do).

3533. *L. italic a* TREV. — In rupestribus regionis inferioris et montanae calidioris. — Orlova Skala sub monte Mali Durmitor? (Pt), inter Kotor et Njeguši, circa Bar (Ro), ad Cetinje (Kn), ad latera montis Lovćen (Pichler).

3534. *L. vulgaris* MILL. — In agris, lapidosis, arenosis et dumetis regionis montanae et subalpinae. — Medun distr. Kući (Sz), Čeklin (Ho), Njeguši (Ba, Ro), Velestovo et Lastva čevska distr. Katunska, Viljuša, Šavniki, Borkovići et coenob. Piva, Štirni do sub Lola planina (Ro), Andrijevica (Ro, Ja), ad coenob. Morača et in valle fl. Tara ad Han Garančić, Matoševo et Kolašin (Ja).

— f. *pubescens* VAND. — Caulis fere totus glandulosopubescens. — Cum typo ad Šavniki, inter Bukovica et Cetinje (Ro).

— f. *glaberrima* SCHUR. — Tota planta glaberrima. — Ad latera montis Lovćen versus Njeguši (Ro).

\*— f. *Janchenii* ROHL. IX. Beitr. 10. — Calycis laciniis angustioribus magis protractis linear-lanceolatis albo-marginatis et saepissime undulatis. — Ad Njeguši et in monte Lovćen (Ro, Pej).

3535. *L. cymbalaria* (L.) MILL. — In rupestribus et muris regionis inferioris mediterraneae. — Ad Strugari (Pt),

circa Vir et Ostrog (Pč, Ro), Bar, Ulcinj, Boljevići, Podgorica et Drušići (Ro), insula Vranina (Eb).

3536. *L. microcalyx* BOISS. — A praeced. dignoscitur caule et foliis longe crispule albo-ланatis, foliis 3—5lobatis, lobis obtusissimis, calycis laciniis ovatis obtusis minutis corollae tubo multoties brevioribus, calcare recto. — In fissuris rupium regionis inferioris mediterraneae. — Ad Bar (Ro).

\*3537. *L. pilosa* (L.) DC. — A praeced. dignoscitur foliis 5—7lobatis, lobis breviter acuminatis, calycis laciniis lanceolatis acutis tubo corollae dimidio brevioribus, corolla puberula. — Seljani ad ripam lacus Scodrani legit Reiser (teste LATZEL).

### *Kickxia* DUM.

3538. *K. spuria* (L.) DUM. — In incultis regionis montanae. — Trešnja et Zvjerinjak supra Njeguši (Pej, Ro).

3539. *K. elatine* (L.) DUM. — In aridis, cultis et ad vias regionis inferioris et montanae. — Ad Cetinje (Pč, Kn), circa Vir (Pč), supra Ostrog (Ho), Tudjemile supra Bar, Drušići distr. Lješanska nahija (Ba), Bar (Do), Njeguši, Uble distr. Kuči, Rijeka, Spuž, Danilovgrad et Ulcinj (Ro). Etiam e monte Korman in Sinjavina planina a cl. BALDACCI indicata; verosimiliter introducta.

\* — f. *parvifolia* ROHL. X. Beitr. 10. — Eglandulosa, folia multo minora, vix 1 cm longa. — Cum typo ad Njeguši (Ro, Pej).

— subsp. *Sieberi* (RCHB.) HAY. — A typo dignoscitur foliis et pedunculis dense patule villosis. — Circa Rijeka (Kn), Njeguši, coenob. Piva, Uble distr. Kuči (Ro), Bioče pr. Podgorica; Kralje supra Andrijevica (Ja), Bar (Do).

— var. *bombycina* (BOISS. et BLANCHE) HAY. — Tota planta dense sericeo-villosa; pedunculi folio suffulcrante saepe breviores. — Drušići distr. Lješanska (Ba).

3540. *K. commutata* (BERNH.) FRITSCH. — In collibus siccis, graminosis regionis inferioris mediterraneae. — Ad Čukovjevići et Bar (Ho), Ulcinj (Ba), Spuž (Ro).

### *Chaenorhinum* (DC.) LGE.

3544. *Ch. minus* (L.) WILLK. et LGE. (= *Linaria minor* L.; confer JANCHEN Oe. B. Z. 1919) subsp. *viscidum*

(MCH.) HAY. — In cultis, ruderatis et ad vias regionis inferioris, montanae et subalpinae. — Ad Rijeka (Pt), Cetinje (Kn), Sutoriman, Bar (Ho), circa Njeguši, Bukovica pr. Cetinje, Šavniki, coenob. Piva, inter Bogetići et Nikšić, Bukovica sub monte Durmitor, ad Danilovgrad et Andrijevica (Ro), in monte Rumija (Do).

— f. *brevipedunculatum* (SIMK.) HAY. — Pedunculi calyce duplo longiores. — Ad Kolašin (Ja).

— subsp. *litorale* (BERNH.) HAY. — A typo differt caule robustiore, pedunculis calyce aequilongis vel ad summum duplo longioribus, corolla 8—9 mm longa. — Ad Vir (Pč), supra coenob. Morača (Pč, Ja), Šavniki sub Ivica planina, Krstac pr. Njeguši (Pej, Ro).

### *Scrophularia* L.

\*3546. *S. peregrina* L. — In dumetis, ad sepes et muros regionis inferioris mediterraneae. — Ad Ulcinj, Bar et Vir (Ro), Crmnica (Eb).

3548. *S. bosniaca* BECK (= *S. aestivalis* PANTO-  
CSEK Adnot. non GRIS.). — A *S. nodosa* L. dignoscitur caule copiose dense et crispule glandulosopilosо minus conspicue angulato saepe subtereti, floribus in cymas axillares dispositis, sepalis saepe subacutis, capsula globosa. — In silvis regionis montanae, subalpinae et alpinae. — Crno et Srablje jezero sub monte Durmitor (Pt, Ro, De, Si), Kamenjak (Ho), ad latera montis Lovćen (Kš, Gi, Pej, Ro), Cetinje, Njeguši, Maglić Pivski, Vojnik, coenob. Piva, Sinjavina et Javorje planina, Pi-perska Lukavica, in monte Kom et Zeletin (Ro), Vjetrnik, Jablan, Lopate, in valle Svinjača pr. Kolašin (Ja), Vermoš planina ad fines Albaniae (Df), Volujačko jezero ad fines Bosniae (Ma).

3549. *S. Scopolii* HOPPE. — In silvis regionis subalpinae et alpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), sub monte Kom (Ba, Ja), Barno jezero, Žabljak et Ranisava sub monte Durmitor; Črtov do sub Ledenica planina; Balj et Piševo supra Andrijevica, Korita rovačka pr. Lukavica planina (Ro), Trešnjevik pr. Andrijevica, Kolašin (Ja), Vermoš planina ad fines Albaniae (Df).

— var. *balcanica* VELEN. Fl. bulg. 421. — A typo differt caule robustiore, foliis densissime praecipue subtus molliter pu-

bescendentibus, inferioribus profunde cordatis obtuse crenato-serratis, mediis e basi truncata vel subcordata triangulari-oblongis acutius crenato-dentatis, pedicellis calyce vix longioribus, laeviis calycinis ovato-orbiculatis fere nigris late fusco marginatis. — In pascuis subalpinis et alpinis. — Ad Groblje sub monte Kom, Sjekirica planina (Ro).

3551. *S. nodosa* L. — In silvis et ad ripas regionis inferioris et subalpinae frequens. — Circa Sladovo Kopito (Pt), sub monte Durmitor et in Javorje planina (Pč), circa Bar, Ulcinj, Vir, Plavnica, Danilovgrad, Šavniki et coenob. Piva (Ro); circa Kolašin et Andrijevica (Ja, Ro), in valle fl. Tara pr. Lever Tara (De, Si).

3552. *S. alata* GILIB. — Ad ripas et in fruticetis humidis regionis montanae. — Ad coenob. Morača (Pč, Ba, Ja), in valle fl. Tara circa Kolašin, in valle fl. Zlorječica et Lim pr. Andrijevica (Ro).

3556. *S. heterophylla* WILLD. subsp. *laciniata* (W. K.) MAIRE et PETITM. var. *Pantocsekii* GRIS. pro sp. — In rupestr. et glareosis regionis subalpinae et alpinae in tota dizione frequens.

3559. *S. canina* L. — In lapidosis, fruticetis, saxosis et ad vias regionis inferioris et montanae calidioris. — Ad Cetinje, Njeguši et Čevo (Sz, Ba, Pč, Ro, Gi), Velestovo distr. Katunska nahija, Viljuša, Šavniki, Vir, Boljevići et Rijeka (Ro), ad Bioče, Jablan et Nožica usque ad 1000 m (Ja), Limljani pr. Vir, Bar (Do), in monte Rasovatac pr. Vir (Eb).

### *Gratiola* L.

3564. *G. officinalis* L. — In fossis et pratis humidis regionis inferioris, rarius montanae. — Rijeka (Pt, Kn, Ro), Danilovgrad (Pt, Ro), ad ripam lacus Scodrani locis pluribus (Pč, Ro, Ja), ad Bar (Ro, Do), Nikšić (Ro), Vir (Eb).

— f. *tenuifolia* VELEN. — Folia imprimis superiora angustiora valde elongato-lanceolata. — Cum typo rarius (Ro).

### *Limosella* L.

3565. *L. aquatica* L. — In fossis et aquis stagnantibus regionis subalpinae. — Javorje et Konjsk planina (Ro).

*Veronica* L.

3569. *V. spuria* L. — In dumetis et ad margines silvarum regionis subalpinae, 1200—1600 m. — Božur planina, Zakamen et Varda distr. Piva (Ro).

3573. *V. spicata* L. subsp. *spicata* (L.) HAY. — In saxosis, lapidosis et declivibus asperis regionis montanae et subalpinae. — Ad coenob. Duga; Vučje Gornje pr. Gvožd Han et ad Lukovo supra Nikšić (Pt), ad Šavniki (Pč), Konjsk planina (Ho).

— var. *Prodanii* (DEG.) HAY. — Jasenovo polje sub monte Vojnik; Viljuša et Čevo distr. Katunska nahija; ad Borkovići et Goračko distr. Piva; ad latera montis Lovćen et circa Danilovgrad (Ro sub var. *squamosa* PRESL), ad Orahovo distr. Kuči (Sz).

— subsp. *orchidea* (CR.) HAY. — In saxosis ad Čafa Gvozdeča distr. Kuči (Ba). (An ad var. *praecedentem* pertinet?)

3576. *V. satureoides* VIS. Fl. dalm. II: 168. — Dense caespitosa multicaulis, caulis nanis basi suffruticosus; folia crassiuscula plana uninervia obovata vel oblonga basi angustata subsessilia apice integra vel parce dentata glabra vel parce pilosa dense imbricata; racemus terminalis 1— $1\frac{1}{2}$  cm longus villosulus; pedicelli eglandulosi calyce bracteaque breviores; corolla azurea glabra; capsula obcordata basi ± cuneata vel suborbicularis pilosa; semina lentiformia plana. — In rupestribus, glareosis et pascuis regionis alpinae, usque ad 2300 m montium dicionis septentrionalis. — Ledenica planina, Ranisava, Durmitor, Sinjavina et Kom (Ba, Ro, De, Si). E monte Lovćen adhuc non vidi.

3581. *V. alpina* L. — In rupestribus et pascuis regionis alpinae usque ad 2400 m. — In cacumine montis Maglić; Vališnica in monte Durmitor (Ro).

3582. *V. balcanica* VELEN. Fl. bulg. 431. — Ab affini *V. serpyllifolia* dignoscitur: „caulis tenuior, inflorescentia pauperior glandulosa, folia saepius integra radicalia orbiculata, corolla ubique azurea“ (VELEN. l. c.). — In humidis alp. ad Miočev do supra Kariman distr. Kuči (Ba).

3583. *V. serpyllifolia* L. — In graminosis, pascuis et incultis regionis montanae, subalpinae, rarius alpinae in tota ditione frequens.

— f. *integerrima* BECK. — Folia caulina media late ovata vel orbicularia integerrima; racemus laxus brevis pedicellis bractea brevioribus. — In herbidis alpinis montis Dibala supra Kostića distr. Kuči (Ba), Vermoš planina ad fines Albaniae (Df).

— f. *glandulosa* WIRTG. — Folia glandulosociliata. — Cum typo ad Andrijevica, in monte Sjekirica planina et in monte Maglič Pivski (Ro).

3587. *V. acinifolia* L. — In graminosis humidis, agris et cultis regionis inferioris et montanae calidioris. — Circa Bar, Ulcinj, Rijeka, Podgorica, Cetinje et Njeguši (Ro).

3588. *V. arvensis* L. — In cultis, graminosis et agris regionis inferioris et montanae. — Ad Njeguši et Cetinje (Pč), circa Bar (Ba, Ro), ad Podgorica, Kokoti (nahija Lješanska), Vir et Rijeka (Ro), Crmnica (Eb).

3593. *V. verna* L. — In graminosis, lapidosis regionis montanae et subalpinae. — Cetinje; Viruša dol sub Crna planina (Pt), supra coenob. Piva (—1400 m!), ad Andrijevica (Ro).

3595. *V. Tournefortii* GMEL. — In agris et ruderatis regionis inferioris et montanae. — Ad Njeguši et Cetinje (Kn, Ld), circa Ulcinj et Bar (Ba, Ro), Brotnik (Ho), Šavniki et Andrijevica (Ro).

3596. *V. polita* FR. — In agris et incultis regionis inferioris et mediae. — Circa Bar et Ulcinj (Ba, Ro), ad Andrijevica (Ho).

3599. *V. cymbalaria* BODARD. — Ad muros et in fissuris rupium regionis inferioris mediterraneae. — Circa Bar, Ulcinj, Vir et Podgorica (Ro).

3600. *V. hederifolia* L. — In fruticetis, cultis et ad muros regionis inferioris et mediae. — Ad Ulcinj (Ba), Andrijevica (Ro).

3602. *V. prostrata* L. — In herbidis regionis subalpinae ad pagum Kovčice sub monte Mali Durmitor (Pt), supra vallem Sušica ad Nedajno distr. Piva; in monte Durmitor loco Savin Kuk (De, Si).

3603. *V. teucrium* L. subsp. *pseudochamaedrys* (JACQ.) NYM. — In graminosis, silvis et dumetis regionis

subalpinae et alpinae. — Crna planina (Pt), Borkovići et Božur planina distr. Piva (Ro), in monte Durmitor (leg. Čurčić teste MALÝ).

— subsp. *crinita* (KIT.) VELEN. var. *Baldacci* HOZAK Oe.B.Z. L:209 pro subsp. — „A typo dignoscitur caule humiliore basi adscendente, foliis late ovatis sessilibus antice rotundatis grosse crenato-dentatis, racemis saepissime binis tenuiter pedunculatis (non stricte) densifloris ovato-confertis brevibus in parte terminali late rotundatis (ante anthesin) corollis maioribus, lobis earum late ovatis antice rotundatis.“ — In pratis alpinis Štirni do et Pavlova livada (Ho), Sjekirica et Bjelastica planina usque ad 2200 m (Ro).

3604. *V. austriaca* L. subsp. *dentata* (SCHM.) WATZEL. — A cl. HAYEK e Montenegro in Prodr. II:167 indicata. Locus mihi ignotus.

\* — subsp. *Jacquinii* (BAUMG.) MALÝ. — In rupestribus et graminosis regionis alpinae et subalpinae. — Carine et Margarita sub monte Kom (Ba, Ja), Sinjavina planina loco Jećmeni do et sub monte Durmitor; in monte Lovćen (Ba), Treblješ (Ho), Lopate et Han Garančić inter Kolašin et Podgorica (Ja), Jerinja glava et Balj pr. Andrijevica (Ro), Građovo (Pč), Krivi do distr. Piva (De, Si).

— f. *bipinnatifida* KOCH. — Folia bipinnatifida segmentis margine saepe revolutis. — Cum typo in monte Lovćen versus Njeguši et in Božur planina distr. Piva (Ro).

— var. *tenuis* (VELEN.) WATZL. — Caulis tenuis; folia subglabra bipinnatifida segmentis anguste linearibus usque ad nervum medianum revolutis; bractae anguste lineares; capsula et calyx ± glabri. — Ad Matoševo in valle fl. Tara (Ja).

— var. *Nejčeffii* (DEG.) WATZL. — Caulis dense patule albo-lanatus; folia villosa bipinnatisecta; sepala hispida. — In formis appropinquatis ad Matoševo pr. Kolašin (Ja).

— var. *valida* (VELEN.) HAY. — Robustior patule pilosa; folia bipinnatisecta segmentis 2—4 mm latis; racemi densi multiflori; pedicelli calyce breviores, flores maiores. — In alpinis circa Andrijevica in montibus: Balj, Sjekirica, Žoljevica et Jerinja glava saepissime in forma *robusta* ROHL. („Folia simpliciter pinnatifida“) (Ro).

— subsp. *orbicularis* (A. KERN.) MALÝ. — Humilis, gracilis, glabriuscula; folia inferiora saepissime ovata crenata

superiora pinnatifida vel bipinnatifida ea turionum steriliū plerumque indivisa; capsula orbicularis glabra. — In rupestrībus et graminosis regionis inferioris, montanae et subalpinae frequens. — In valle Perućica sub monte Kom loco „Orlova Skala“ (Pt, Ro), circa Bar, Ulcinj, Vir, Andrijevica, Njeguši, in monte Lovčen, Ledenica et Varda supra coenob. Piva et in monte Maglić Pivski (Ro), Bijela Skala sub monte Rumija in f. *Celakovskiana* (ASCH.) MALÝ (Ba), Volovica pr. Bar (Do).

— f. *hercegovinica* (K. MALÝ) WATZL. — Folia inferiōra crenato-serrata, superiora angusta inciso-dentata vel pinnatiloba. — Ad Grahovo (Ad).

— var. *emarginata* K. MALÝ. — Capsula saepissime emarginata. — Rarius cum typo (Ro).

\*3608. *V. chamaedrys* L. — In pratis, pascuis et in dumetis in tota dictione frequens.

— f. *pilosa* (SCHM.) BENTH. — Caulis circumcirca pilosus et bifariam dense villosus. — In pascuis alpinis sub monte Kom (Pt).

\*— f. *Sternbergii* ČELAK. — Ut praecedens, sed indumentum densum villosum. — In monte Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro).

— f. *lamiifolia* HAYN. — Folia etiam superiora longiuscule petiolata. — Non raro cum typo: circa Bar, Ulcinj, Vir, Andrijevica, Borkovići distr. Piva et ad latera montis Lovčen (Ro), in monte Rumija (Do).

3609. *V. urticifolia* JACQ. — In silvis, fruticetis et ad rupes regionis montanae et subalpinae dicionis septentrionalis frequens. — E monte Lovčen et Rumija adhuc non vidi.

— f. *fallax* ROHL. III. Beitr. 47. — Folia in petiolum 2–3 mm longum subito attenuata. — Rarius cum typo (Ro).

3611. *V. officinalis* L. — In silvis et saxosis silvaticis regionis montanae et subalpinae in tota dictione frequens.

3613. *V. montana* L. — In silvis humidis regionis montanae et subalpinae raro. — Vallis Viruša dol sub Crna planina (Pt), in monte „Cura“ (Tzura) supra Han Garančić in valle fl. Tara (Ja).

3614. *V. aphylla* L. — In pascuis et glareosis regionis alpinae dicionis septentrionalis. — In monte Maglić Pivski (Ro),

in monte Durmitor, Korita rovačka, Sinjavina planina et Kom (Pt, Pč, Ht, Ba, Ro), Kostića distr. Kuči (Ba), Prokletija loco Buni Jezerce ad fines Albaniae (Df). E monte Lovćen et Rumija adhuc non vidi.

\*3616. *V. scutellata* L. — In fossis et aquis stagnantibus regionis inferioris raro. — Ad Rijeka et Danilovgrad (Pt).

3618. *V. beccabunga* L. — Ad rivulos et in scaturiginosis regionis inferioris, montanae et subalpinae. — Ad riyulum Bijela sub monte Kom (Pt), in recessibus lacus Scodrani in locis pluribus (Pč, Ro), ad latera montis Kljuć supra Košlašin (Ba), Ponikvica (Ho), Mratinje sub monte Maglić Pivski, Mlinski potok sub monte Durmitor, ad latera montis Balj supra Andrijevica, in valle fl. Lim et Tara (Ja, Ro), Kralje supra Andrijevica (Ja).

3620. *V. anagalloides* GUSS. — In aquis, incultis, fossis et inundatis regionis inferioris mediterraneae. — Ad Cetinje (Pt), circa Rijeka et Plavnica (Pt, Sz, Ro).

3621. *V. anagallis-aquatica* L. — In paludosis, ad ripas regionis inferioris, montanae, rarius subalpinae. — In humidis ad Rijeka (Pt, Ba), Cetinje (Kn), Šavnik sub Ivica planina; Andrijevica, Danilovgrad, Vir, Bar et Ulcinj (Ro).

\* — f. *ambigua* KROESCHE. — Pedicelli fructiferi ± patentes, saepe curvati. — In lacu „Koritnik“ sub monte Lovćen (Pej, Ro).

### *Wulfenia* JACQ.

3623. *W. carinthiaca* JACQ. — In pascuis et ad margines silvarum regionis subalpinae et alpinae. — Sjekirica planina supra Andrijevica (Ro), in monte Visitor supra Andrijevica (Sk), Fuša Rudnices et Maja Jezerce sub monte Prokletija ad fines Albaniae (Penthaler, Df).

### *Digitalis* L.

3625. *D. ferruginea* L. — A sequente dignoscitur bracteis calyce brevioribus, calycis laciinis ovato-ellipticis vel oblongis obtusis late scarioso-marginatis, corolla fulva ferrugineo-reticulata. — In silvis regionis montanae et subalpinae. — Ad Konjuhe sub monte Kom (Ba), Sinjac et Šepangrad in valle fl. Piva, in monte Sjekirica, Zeletin et Balj pr. Andrijevica (Ro, Sk).

\* — f. *longibracteata* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Bractae calyce longiores et pedicellus longior quam in typo. — In monte Prokletija (Boš).

— f. *pallida* ROHL. V. Beitr. 94. — Corolla pallide viscenti-flava. — Cum typo in monte Balj, Zeletin et Sjekirica (Ro, Sk).

3626. *D. laevigata* W. K. — In silvis, lapidosis et dumetis regionis montanae et subalpinae. — Ad Cerovo (Pt), supra Ostrog (Pč), Andrijevica, Sinjavina planina, Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro), in valle fl. Tara pr. Lever Tara (De, Si).

3630. *D. grandiflora* LAM. (= *D. ambigua* MURR.). — In silvis, herbidis et dumetis in tota dizione, praecipue in regione subalpina frequens.

#### *Bartschia* L.

3633. *B. alpina* L. — In pascuis alpinis montium Kom et Durmitor (Pt).

#### *Parentucellia* VIV.

\*3636. *P. latifolia* (L.) CAR. — In locis lapidosis et graminosis regionis inferioris et montanae calidioris. — Circa Bar, Ulcinj, Vir et Njeguši (Ro), ad Cetinje (Če, Pej).

#### *Odontites* HALL.

3637. *O. lutea* (L.) RCHB. — In locis graminosis apries, lapidosis et in rupestribus regionis inferioris, montanae, rarius subalpinae. — Sub Javorje planina et in valle fl. Zeta pr. Danilovgrad (Pč), Ječmeni do in Sinjavina planina (Ba), circa Njeguši et Bukovica sub monte Lovćen; ad Pošćensko jezero supra Šavnik; ad coenob. Piva (Ro).

— f. *montenegrina* HORÁK OeBZ. L : 209. — Caule elatiore florendi tempore folioso, foliis latioribus, ramis paucioribus sed magis elongatis racemo laxo longiore terminatis, floribus paulo maioribus valde dissitis, calycis angustioris longioris dentibus angustius lanceolatis. — In Župa (Ho).

3638. *O. glutinosa* (M. B.) BENTH. — A praeced. dignoscitur caule simplici vel stricte ramoso glandulosopubescenti, foliis glandulosis, corollae tubo glanduloso, limbo mar-

gine glabro, antheris inclusis, ad insertionem lanatis. — In glaz  
reosis subalpinis montis Jerinja glava supra Andrijevica cca  
1200 m (Ro).

3641. *O. rubra* GILIB. subsp. *verna* (BELL.) WETTST.  
— In graminosis et agris regionis montanae. — Ad Njeguši et  
Andrijevica (Ro).

— subsp. *serotina* (LAM.) WETTST. — In graminosis,  
lapidosis et ad vias regionis montanae et subalpinae. — Bijela  
pr. Šavniki (Ba), Cetinje (Kn), Njeguši, Mratinje in valle  
fl. Piva (Ro), circa Andrijevica et Kolašin (Ro, Ja); etiam  
in monte Pivljan pr. montem Kom, usque ad 1500 m (Ja).

\* — var. *canescens* (RCHB.) HAY. — Ad Njeguši (Ro).  
Occurrunt etiam formae, quae bracteis flores superantibus et  
dentibus calycinis latitudine multo longioribus ad subsp. *vernā*  
(BELL.) WETTST. spectant (f. *transiens*).

### *Euphrasia* L.

3642. *E. Rostkoviana* HAYNE subsp. *Rostkoviana*  
(HAYNE s. s.) WETTST. — In pratis regionis montanae et sub-  
alpinae. — Danilovgrad (Pt), Nikšićka župa, Ivica planina (Pč),  
in pascuis sub monte Kom (Pč, Ho), sub monte Durmitor  
(Ba), Pošćensko jezero supra Šavniki, Mratinje sub monte  
Maglič in forma ad subsp. *montanam* (JORD.) WETTST.  
verg.; in monte Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).  
— f. *minutiflora* BORB. — Flores fere duplo minores. —  
In pratis siccis non raro cum typo ad Kralje, Kolašin et in monte  
Pivljan (Ja, Ro).

? 3644. *E. stricta* HOST a cl. PANTOCSEK (Adnot.  
71) e valle Viruša dol sub Crna planina et e valle Perućica sub  
monte Kom indicata, verosimiliter ad spec. sequentem pertinet.

3645. *E. pectinata* TEN. subsp. *eupectinata* HAY.  
— In herbidis regionis inferioris, montanae et subalpinae. —  
Ad Njeguši et Cetinje (Kn, Ro), Milušina pećina distr. Ka-  
tunska nahija, Mratinje in valle fl. Piva, circa Rijeka et Pod-  
gorica, Njeguši (Ro), Han Garančić et in monte Trešnjevik  
pr. Kolašin (Ja). Occurrunt etiam formae ad var. *albanicam*  
HAY. et ad subsp. sequent. vergentes.

— subsp. *tatarica* (FISCH.) HAY. — Caulis saepius  
ramosus; folia semper setulosa; bracteae basi rotundatae denti-

bus utrimque 4—7 aristatis. — Inter Njeguši et Kotor (Gi, Ma), in monte Lovćen loco Štirovnik (Ad teste WETTSTEIN), supra Njeguši, Simunj distr. Katunska nahija, Srablje jezero sub monte Durmitor, Varda et Božur planina distr. Piva, in monte Vojnik, circa Andrijevica in monte Jerinja glava et Balj (Ro). Verosimiliter loca hic enumerata (saltem p. p.) ad subsp. *euepectinatam* pertinent.

3646. *E. liburnica* WETTST. — In graminosis regionis montanae et subalpinae. — Circa Njeguši (Pej, Ro, Sa), in monte Lovćen loco Štirovnik (Vh), Viljuša (Ro), Kralje pr. Andrijevica (Ja), Volujačko jezero (Ma).

3647. *E. minima* JACQ. — In pascuis subalpinis et alpinis montis Kom Kučki (Sz); etiam in monte Pej et ad Košašin (Ja).

\*3649. *E. drosocalyx* FREYN. — In alpinis montis Durmitor loco Bobotov Kuk (leg. Czergö fide K. MALÝ).

\*3650. *E. brevipila* BURN. et GREMLI. — In saxosis subalp. ad Vunsaj pr. Gusinje ad fines Albaniæ (Df).

3651. *E. hirtella* JORD. — In graminosis et pascuis regionis alpinae et subalpinae, usque ad 2100 m. — Maglić Pivski, lacus Barno jezero sub monte Durmitor (Ro), Lisa supra Bar (Ba).

3652. *E. salisburgensis* FUNCK. — In pratis, pascuis et glareosis regionis alpinae et subalpinae in omnibus montibus frequens, usque ad 2300 m.

— subvar. *subalpina* GREN. — Caulis humilior saepe ramosus, folia latiora, spicae densae. — Vališnica do in monte Durmitor (Ro).

3653. *E. illyrica* WETTST. — In rupestribus et glareosis regionis montanae et subalpinae. — Milušina pećina et Lastva čevska distr. Katunska nahija, Bogojeva glava et Trešnjevo ždrijelo supra Njeguši; in monte Lovćen et Kom (Ro).

3654. *E. dinarica* (BECK) MURB. — A praeced. dignoscitur foliis glabris linear-lanceolatis vel linearibus latitudine 10—15-plo longioribus dentibus longius acuminatis; bracteis glabris, dentibus utrimque 2—3, calyce fructifero magis aucto. — In graminosis et pascuis subalpinis et montanis. — Brotnik (Ho), inter Njeguši et Krstac (Kn, Ro), Velje osoje et Bogo-

jeva glava supra Njeguši (Pej, Ro), ad latera montis Lovćen (Vh, Ro).

*Alectrolophus* BOEHM.

3657. *A. rumelicus* VELEN. Fl. bulg. 433. subsp. *rumeleicus* (VEL.) MALÝ. — Ab affini *A. hirsuto* (LAM.) ALL. dignoscitur caule, foliis, bracteis et calycibus glandulosopilosus. — In pratis et pascuis regionis montanae, subalpinae et alpinae. — Circa Njeguši, ad latera montis Lovćen, Lastva čevska, Poščensko jezero supra Šavniki, Korita rovačka et Štirni do pr. Lukavica planina, Groblje et Mokro pr. montem Kom, Sinjavina planina, montes Balj et Sjekirica pr. Andrijevica (Ro), in valle fl. Tara inter Han Garančić et Kolašin et in valle fl. Lim pr. Andrijevica (Ro, Ja); in monte Rudo brdo (Ja); Vernoš planina ad fines Albaniae (Df). Hucce spectant verosimiliter plantae a cl. PANČIĆ e monte Velka Jastrebica et e pratis sub monte Durmitor et plantae a cl. BALDACCI ad Cetinje lectae et sub *A. hirsuto* publicatae.

— subsp. *abbreviatus* (MURB.) MALÝ. — „Caulis in parte infer. ramosus ramis elongatis arcuato-ascendentibus, folia caulina dense denticulata numerosa internodiis saepissime longiora; inter ramos supremos et spicam terminalem foliorum intercalarium paria 3—4—(6); flores parum minores.“ — In pascuis subalpinis et alpinis montium Sjekirica planina et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

— subsp. *Sagorskii* (SEML.) MALÝ. — A praeced. dignoscitur caule humiliore (15—20 cm alto) foliorum intercalarium paribus 0—2, calyce fructifero atrovioletaceo. — In subalpinis montis Rudo Brdo pr. Kolašin (Ja).

3661. *A. major* (EHRH.) RCHB. subsp. *major* (EHRH.) WETTST. — In satis regionis montanae ad Njeguši et Cetinje (Pč), Bobotov groblje pr. Krstac ad fines Hercegovinae (leg. Reiser, det. Dr A. BEHRENSEN).

— subsp. *montanus* (SAUT.) WETTST. — A cl. HAYEK e Montenegro indicatus; locus mihi ignotus.

3663. *A. mediterraneus* STERN. subsp. *mediterraneus* (STERN.) MALÝ. — In pratis et herbidis regionis montanae. — Ad Njeguši (Pej, Gi, Ma, Ro), Čevski Lisac distr. Katunska nacija (Ro), ad Cetinje (teste STERNECK).

— subsp. *arvernensis* (CHAB.) K. MALÝ. — A typo dignoscitur foliis caulinis internodiis longioribus, foliorum inter-

calarium paribus 2. — In pratis subalpinis. — Ad latera montis Dziebeze distr. Kuči (Sz), in monte Vojnik (Ro), ad Njeguši (Sa).

3666. *A. ovifugus* (CHAB.) STERN. — A praeced. dignoscitur calyce glabro solum in margine parce scabridulo dentibus in margine minime glandulosis, bracteis glabris late rhombeo-triangularibus earum dentibus paucis valde profundis longius aristatis ad apicem bractearum subito decrescentibus. — — subsp. *eu-ovifugus* (CHAB.) HAY. — Caulis simplex vel parce breviter ramosus supra ramos supremos aphyllus; folia caulina internodiis subbreviora. — In herbidis subalpinis et alpinis. — In monte Maglić Pivski (B), ad Pošćensko jezero supra Šavniki (Ro), Krivi do distr. Piva (De, Si).

— — subsp. *divaricatus* (STERN.) HAY. — Caulis inferne longe ramosus ramis arcuato-adscendentibus supra ramos supremos foliorum intercalarium paribus 3—5 instructus; folia caulina internodiis longiora. — In pratis et silvis subalpinis. — Perućica sub monte Kom Kučki (Sz teste STERNECK), in pascuis ad pedem montis Kom (Ro).

3668. *A. angustifolius* (GMEL.) HEYNH. (? = *Rhinanthus alpinus* PANT. Adnot. 72) subsp. *subalpinus* (STERN.) WETTST. — In pratis regionis subalpinae et alpinae usque ad 2200 m. — In monte Durmitor, Bukovica sub monte Durmitor, in valle fl. Jelovica pr. Andrijevica, Bjelastica planina supra Kolašin (Ro), Piva planina: ad Nedajno (De, Si).

— — subsp. *angustifolius* (GMEL.) WETTST. — In herbidis et glareosis montanis et subalpinis. — Viruša dol sub Crna planina, Perućica sub monte Kom (Pt), Bukovica et Žabljak sub monte Durmitor, ad Mratinje sub monte Maglić Pivski, Ledenica, Božur planina, Zakamen et Varda distr. Piva, 800—1600 m (Ro).

— — subsp. *lanceolatus* (KOV.) WETTST. — Caule ramoso ramis longis arcuato-adscendentibus et foliis caulinis internodiis suis longioribus cum subsp. *euangustifolio* bene congruit, sed differt foliorum intercalarium paribus 0—2 (nec 2—7). — In pascuis alpinis montis Durmitor (Ro).

3671. *A. sperulus* MURB. (OeBZ. XLVIII : 41) subsp. *Rohlena* STERN. ap. MALÝ Glasn. XXXI: 64. — Ab omnibus speciebus praeced. dignoscitur dente labii superioris.

brevi quadrato vel breviter triangulari cca 1 mm longo; caulis simplex vel superne breviter ramosus usque ad 40 cm longus, bifarium pilosus; folia caulina internodiis breviora, intercalaria nulla; bracteae virides subglabrae triangulari-ovatae acute dentatae (non aristatae) dentibus apicem versus sensim decrescentibus; calyx breviter puberulus, corolla favea aperta. — In pratis subalpinis et alpinis, 1600—1800 m. — Štirni do pr. Lukavica planina (Ro).

3673. *A. minor* (EHRH.) W. GR. — In pascuis et pratis regionis montanae, subalpinae et alpinae. — Ad Cetinje (Pt), in monte Kom (Pč), Viruša dol sub Crna planina (Ba), Mokra sub monte Dziebeze (Sz, Ro), Perućica sub monte Kom; circa Andrijevica et in Sjekirica planina (Ro), Carine sub monte Kom et in monte Lisa supra Kolašin (Ba); circa Kolašin (Ja), Vermoš planina ad fines Albaniæ (Df), in monte Lovćen (To).

*Pedicularis* L.

\*3676. *P. palustris* L. — In pratis humidis regionis subalpinæ. — Viruša dol sub Crna planina; Pašina Voda sub monte Durmitor (Pt).

3677. *P. comosa* L. (= *P. Sibthorpii* aut. mont. non BOISS.). — In pascuis et herbidis regionis subalpinæ et alpinae. — In montibus Durmitor, Kom, Sinjavina et Javorje (Pt, Pč, Ba, Ro), Maglić Pivski (B); in monte Vrh-Suta distr. Crmnica; Bijela Skala et Medjurečka planina distr. Primorje (Ba). Loca hic enumerata verosimiliter partim ad alias species pertinent. ? — var. *glabricalyx* PANT. Adnot. 72. — Caule glabriusculo, calyce et dentibus glabris. — In pascuis alpinis montis Kom (Pt).

3679. *P. brachyodontata* SCHLOSS. VUK. — A praeced. dignoscitur calycis dentibus triangulari-ovatis latitudine vix longioribus ciliatis, corollae labio superiore apice truncato vel breviter bidentato, labii inferioris favea bigibbosi lobis denticulatis non ciliatis. — In pascuis et pratis subalpinis et alpinis. — In montibus Maglić, Dziebeze, Hum Orahovski, Kunj Kostića, Dibala, Vila, Planinica, Mojan et Strunga distr. Kući (Sz, Ba), in montibus Maganik et Lukavica planina (Ho), Sjekirica et Bjelastica planina (Ro), Vrtljeka, Han Garančić, vallis Svinjača pr. Kolašin; montes Pivljan et Margarita pr. montem Kom (Ja), Pišće et Nedajno in Pivska planina, supra

lacum Crno jezero in monte Durmitor (De, Si), Kom Kučki (Lo).

— — subsp. *Grisebachii* (WETTST.) HAY. — Caulis humilior densius pilosus; spica densa ovata vel capitata; bracteae inferiores trifidae vel tricuspidatae, superiores indivisae. — In pascuis alpinis montis Vila pr. Rikavac distr. Kuči (Df).

— — f. *fallax* (BECK) HAY. ap. JANCHEN. — Bracteae inferiores foliaceae. — Non raro cum typo (Ja).

3681. *P. Malyi* JKA.\* — A praeced. dignoscitur caule magis villoso, calycis villosi dentibus lanceolatis latitudine longioribus et tubo subbrevioribus. A *P. Fridericii-Augusti* dignoscitur corolla glabra. — In pratis et pascuis alpinis et subalpinis. — In montibus Kom Kučki et Vasojevički, Maglić Pivski (Ro), Lovćen (Ro, Bo), in monte Rumija (Do) et Durmitor (De, Si).

\* — — var. *bosniaca* (BECK) MALÝ. — In monte Durmitor loco Savin Kuk, Ledena pećina et supra lacum Crno jezero (De, Si), Kom Kučki (Lo).

\*3681b. *P. leucodon* GRIS. — In alpinis montis Durmitor loco Savin Kuk rarissime (De, Si teste MALÝ).

3682. *P. Fridericii-Augusti* TOMM. f. *montenegrina* (EBEL) HAY. — A typo differt caule elatiore et densius foliato, bracteis magis patentibus. — In herbidis elatis montis Vrh-Suta (Sutorman) supra Bar (Ba, Ebel).

3685. *P. petiolaris* TEN. — Radices vix vel paulo incrassatae, caulis humilis gracilis 10—25 cm altus lanuginosus vel basin versus glabrescens, folia anguste bipinnatisecta subglabra, pinnae subpetiolatae, pinnulae lanceolatae angustae, inferiores dentatae, spica breviter cylindracea vel capitata densa fructifera + elongata; bracteae inferiores foliaceae floribus cca 2 cm longis multo longiores superiores lanceolatae subintegrale calycem pa- rum superantes; calycis dense villosi et glandulosi dentes lanceolati acuminati villosi tubo suo breviores; corolla rosea subglabra labio superiore galeato vix rostrato truncato breviter bidentato, labio inferiore trilobo, lacinia media orbiculari; capsula ovata breviter acuminata. — In pascuis alpinis. — In monte Maglić Pivski et Bjelastica planina (Ro), sub monte Kom Kučki et in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), in monte Prokletija (Df),

\*) Confer: MALÝ K.: Bulletin de l' Inst. Botan. de l' Univ. de Beograd II. 1931-32.

Struga planina (leg. Havelka fide MALÝ), Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

3689. *P. Hoermanniana* K. MALÝ Glasnik IX : 145 (= *P. Hacquetii* aut. mont. non GRAF.). — In pratis et pascuis subalpinis et alpinis dicionis septentrionalis. — In monte Durmitor (Pt, Pč, Ba), in monte Kom (Pč, Ho, Ba), Sinjavina planina (Ba, Ro), Štirni do pr. Lukavica planina; Sjekirica et Bjelastica planina (Ro), Piva planina: pr. Pišće et Nedajno (De, Si).

3694. *P. verticillata* L. — In graminosis et glareosis subalpinis et alpinis in omnibus montibus dicionis septentrionalis et orientalis. — E monte Lovćen et Rumija adhuc non vidi.

### *Melampyrum* L.

3696. *M. cristatum* L. — In graminosis et ad margines silvarum regionis subalpinae et montanae. — Supra Kolašin (Pč), Malošin do distr. Katunska nahija (Ro), Konjuhe pr. Andrijevica et in Sinjavina planina loco Ječmeni do (Ba).

3697. *M. arvense* L. — In cultis et dumetis regionis montanae et subalpinae. — Sub monte Lovćen (Pč), ad Orahovo distr. Kuči (Sz), Velestovo distr. Katunska nahija (Ro), circa Andrijevica (Ro, Ja).

3699. *M. fimbriatum* VANDAS (= *M. pseudobarbatum* ROHL. non SCHUR). — In fruticetis et herbidis regionis montanae et subalpinae (Ho), ad Viljuša, Rudine nikšiće et Čevo distr. Katunska nahija (Ro), Cetinje (Kn).

3700. *M. barbatum* W. K. subsp. *carstiense* RONN. — In herbidis et dumetis regionis inferioris, montanae et subalpinae frequens. — Ad Komani (Pt), in pratis silvaticis montis Durmitor (Pč, Ba), Orahovo distr. Kuči (Sz), in arvis ad Kunja et Možura planina distr. Primorje (Ba), Borkovići et Sinjac distr. Piva; Zagarač, Lješanska nahija, Čevski Lisac, Bar et Ulcinj (Ro), circa Njeguši (Gi, Ma, Ro), Drežnica pr. Nikšić (Ro), in monte Rumija supra Bar (Do), in monte Rasovatac pr. Vir (Eb). (Plantae in campo Njeguško polje lectae ad subsp. *eu-barbatum* RONN. vergunt.

3704. *M. Hoermannianum* K. MALÝ subsp. *bosniacum* (RONN.) K. MALÝ. (= *M. nemorosum* var. *subalpi-*

*num* ROHL. non JUR.). — Caulis internodiis multis brevibus; ramorum paria 6—10 caule aequilonga vel longiora; inter ramos supremos et racemum terminalem foliorum intercalarium paria 1—4; bracteae superiores ± violaceae; calycis tubus numquam pilosus, dentibus anguste lanceolatis porrectis apice breviter aristatis tubo suo duplo longioribus, sinibus acutis; flores in racemos laxos secundos dispositi; corollae tubus subrectus calycis laciniis multo longior, interne inter insertiones staminum fasciculis pilorum binis parvis praeditus, fauce subaperta. — In fruticetis regionis subalpinae. — Circa Kolašin locis pluribus 950—1200 m (Ja), sub monte Maglić prope Mratinje, in silvis sub monte Durmitor, ad Šavniki et coenob. Piva (Ro).

\*3705. *M. Dörfleri* RONN. — A praeced. dignoscitur calyce saepe ad nervos longe piloso, corollae tubo interne ad insertionem filamentorum longiorum fasciculo pilorum multo maiore praedito, calycis laciniis margine setulosis; inter ramos supremos et racemum terminalem foliorum intercalarium paria 0—1. — In dumetis regionis alpinae supra Vunsaj pr. Gusinje cca 1800 m (Df).

— — subsp. *montenegrinum* JANCHEN OeBZ. XCVIII: 271, 1919 (= *M. nemorosum* ROHL. non L.). — A typo differt caule ramosissimo, ramis magis divaricatis (nec erecto-patulis), foliis paulo minoribus et pro longitudine latioribus, floribus paulo minoribus. — In dumetis et ad margines silvarum regionis montanae. — Ad Kralje et Andrijevica (Ja, Ro).

3706. *M. scardicum* WETTST. var. *scardicum* RONN. — A praeced. dignoscitur foliis angustioribus (5—7 mm latis), caule saepissime simplici, calycis tubo breviore (cca 2 mm longo) dentibus sursum curvatis, corollae minoris (cca 10—17 mm) tubo supra basin valde prono curvato calycis laciniis vix longiore. — In pascuis alpinis inter Plav et Dečani ad fines Albaniæ (Df).

\*3709. *M. pratense* L. subsp. *vulgatum* (PERS.) RONN. — In dumetis regionis montanae et subalpinae. — In valle flum. Lim et Zlorječica et ad latera montis Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro), in monte Lovćen? (To).

\*3710. *M. silvaticum* L. subsp. *subsilvaticum* (RONN.) SOÓ. — In silvis reg. subalp. — Ad lacum Crno jezero sub monte Durmitor; supra Andrijevica (Ro).

*Tozzia* L.

3711. *T. alpina* L. — In humidis et scaturiginosis reg. alpinae raro. — Ad lacum Crno jezero sub monte Durmitor (Pt), in silva ad latera septentr. montis Kom (Ro).

*Lathraea* L.

3712. *L. squamaria* L. — In silvis reg. montanae. — Ad latera montis Maglić Pivski versus Mratinje (Ro), inter Cetinje et Rijeka (Gi), ad pedem montis Gola Kosa (Reiser fide MALÝ).

**Lentibulariaceae**

*Pinguicula* L.

3716. *P. leptoceras* RCHB. (= *P. alpina* aut. monten. non L.; *P. vulgaris* var. *alpicola* ROHL. non RCHB.). — In scopolis muscosis et humidis reg. subalp. et alp. dic. septentr. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), in monte Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ba, Ro), Javorje planina, Ranisava (Ro), Sinjavina planina (Ba, Ro), Rikavac, Širokar et Velki Maglić distr. Kući (Ba, Df).

**Orobanchaceae**

*Orobanche* L.

3727. *O. nana* NOE. — In regione inferiore ad Boljevići supra Vir (Ro).

3729. *O. Mutelii* F. SCHULTZ. — In regione inferiore pr. Bar (Ro).

- \*3733. *O. purpurea* JACQ. — In regione montana ad Njeguši (Pej, Ro).

3739. *O. gracilis* SM. — In regione montana et subalpina. — Supra Njeguši; Lastva čevska; Štirni do pr. Lukavica planina (Ro).

- \*3745. *O. crenata* FORSK. — In regione montana ad Njeguši, loco Bogojev do et Djekojački do (Pej, Ro).

- \*3754. *O. minor* SUTT. — In reg. infer. dicionis mediterraneae prope Bar (Ro, Do).

- f. *adenostyla* VIS. — Corolla parce glandulosopilosa demum glabrescens, spica plerumque laxiflora. — Cum typo ad Bar (Ro, Do).

\*3756. *O. pictidis-hieracoidis* F. SCHULTZ. — In reg. infer. dic. mediter. — Ad Boljevići supra Vir et ad Bar (Ro).

3758. *O. lutea* BAUMG. — In reg. subalp. — Vallis Perućica sub monte Kom (Pt).

3760. *O. caryophyllacea* SM. — In monte Lovćen (To), Sutorman supra Bar (Eb).

3762. *O. Pančićii* BECK. — A specie sequente dignoscitur spica densiflora, calycis segmentis saepissime bidentatis (radius indivisis), corolla ochroleuca non raro faucem versus violascens, stigmate vitellino purpureo-cinco. — In pascuis reg. subalp. sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz).

3763. *O. alba* STEPH. — In reg. infer., mont. et subalpina. — Perućica sub monte Kom (Pt), ad Cetinje (Pč), in pascuis sub monte Hum Orahovski et sub monte Dziebeze distr. Kuči (Sz); in monte Rumija supra Bar (Ba); Lastva čevska distr. Katunska nahija; Boljevići et Godinje pr. Vir; ad Rijeka (Eb, Ro).

— var. *subalpina* BECK. — Caulis firmus, spica densior, corolla ultra 2 cm longa nervis purpureis pulchre picta. — Ad Drežnica pr. Nikšić, cca 1200 m (Ro).

— var. *rubiginosa* (DIETR.) WALP. — Flores rubri vel purpurei; stigma luteum vel aurantiacum. — Cum typo sub monte Hum Orahovski (Sz).

3764. *O. reticulata* WALLR. (= *O. scabiosae* KOCH) var. *pallidiflora* (W. GR.) BECK. — In reg. mont. et subalp. — Sinjavina planina, lacus Riblje et Crno jezero sub monte Durmitor (Pt), inter Bojetići et Nikšić; ad Seljani inter Vir et Rijeka, Lastva čevska distr. Katunska nahija (Ro).

— f. *adusta* (PANČ.) BECK. — „Filamenta 2 mm supra basin corollae inserta glaberrima vel basi paulo pilosula; stylus copiosissime glanduloso-pilosus.“ — Ad Mrčenov do sub monte Kom (Pč).

## Gesneraceae

### Ramonda RICH.

\*3766. *R. serbica* PANČ. (= *R. Nathaliae* BALD. non PANČ. et PETROVIĆ). — In rupibus calcareis locis humidis

ad latera montis Rumija versus Bar locis pluribus: Dobra Voda, Bijela Skala, Mali Mikulić, Lisinj et Medjurečka planina (Ba, Ro, Do).

## Acanthaceae

*Acanthus* L.

3772. *A. longifolius* HOST. — In fruticetis, silvaticis et saxosis reg. infer. mediterr. et montanae calidioris. — Nikšićka župa (Pč), Nikšićko polje (Ba, Ro), Cetinje (Gi, Ma), in vineis ad Boljevići supra Vir, circa Bar, Viljuša, Kokotí distr. Lješanska nahija, Zagarać supra Danilovgrad, Njeguši, Goraňsko distr. Piva, Andrijevica (Ro), ad coenob. Morača, in monte Vjetnik supra Peljev brije (Ja), Krivi do distr. Piva (De, Si).

3774. *A. spinosissimus* PERS. — In fruticetis, lapidosis reg. infer. dic. mediterr. frequens. — Zagarać supra Danilovgrad (Pt), Sinjac (Pč), Bar (Ba, Ro), Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Danilovgrad, Lješanska nahija (Ro), Bioče in valle fl. Morača et sub monte Vjetnik (Ja).

## Verbenaceae

*Verbena* L.

3776. *V. officinalis* L. — In ruderatis et ad vias reg. infer., mont., rarius subalp. in tota dictione frequens.

*Vitex* L.

3781. *V. agnus-castus* L. — In dumetis, fossis et ad ripas reg. infer. mediterr. — Ad Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Plavnica et Podgorica (Eb, Pt, Pč, Ba, Ho, Kn, Ro).

## Labiatae

*Aiuga* L.

3782. *A. reptans* L. — In graminosis humidis et umbrosis reg. infer., mont. et subalpinae frequens. — Viruša dol infra Crna planina (Pt), Cetinje (Ba), Bijela Voda sub monte Kom; circa Bar, Ulcinj, Vir, Danilovgrad, Podgorica, Njeguši et Andrijevica (Ro), circa Kolašin (Ja).

3783. *A. genevensis* L. — In graminosis et dumetis reg. infer., mont. et subalp. — Circa coenob. Duga (Pt), ad Cetinje et Rijeka (Pč), Brotnik (Ho), Viljuša et Malošin do

distr. Katunska nahija, circa Andrijevica (Ro), Crmnica (Eb), Crvena Stijena et Pajova dolina supra Njeguši (Pej, Ro).

3784. *A. pyramidalis* L. — In pascuis subalp. circa ovilia Javorce in monte Crna planina (Pt).

3788. *A. laxmannii* (MURR.) BENTH. — Caulis patule pilosus; folia pilosa indivisa oblonga, caulinata basi rotundata semiamplexicauli-sessilia integra vel apicem versus crenato-dentata, floralia floribus multoties longiora; flores in verticill-lastris bifloris dispositi breviter pedicellati, corolla flava purpureo-venosa, labio superiore fisso. — In saxosis et herbidis reg. mont. Nikšićka župa (Pč), sub monte Vojnik (Ba).

3790. *A. chamaepitys* (L.) SCHREB. — In pascuis, locis siccis et lapidosis reg. infer. mediterr., rarius montanae. — Bioće pr. Podgorica (Pt, Ro), circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Duklja, Danilovgrad et Zagarać; etiam ad Andrijevica (Ro), in monte Kosa et Rumija supra Bar (Do).

— f. *grandiflora* VIS. — Corolla 10—12 mm longa, flores bracteis paulo breviores; nuculae evidenter transverse rugosae. — Frequentior ac typus.

\*3791. *A. chia* (POIR.) SCHREB. — A praeced. dignoscitur tomento densiore albo-hispido, floribus bracteas saepeissime superantibus, calycis dentibus tubo suo brevioribus, corolla 2 cm longa calyce 5-plo longiore, nuculis transverse corrugatis. — In asperis, lapidosis et incultis reg. infer., mont., rarius subalpinae. — Ad Ostrog (Pč, Ho), Sinjavina planina loco Korman? (Ba), ad Bar (Ho). Forsan loca hic enumerata partim ad spec. praeced. pertinent.

### *Teucrium* L.

3795. *T. Arduinii* L. — In saxosis et dumetosis reg. infer., mont. et subalp. — Komani (Pt), Njeguši, Cetinje (Pč, Ro, Gi, Kn), Čevo et Grahovo (Pč), ad Ostrog (Pč, Ba), ad latera montis Lovćen (Ba, Pej, Ro), ad Kolašin et in monte Kljuć (Ba), Rijeka (Ho), Rudine nikšićke et Pošćensko jezero supra Šavniki (Ro), Lopate, mons Pej, Mala Rijeka pr. Nožica, Jablan et ad latera montis Vjetnik ad pagum Klopot (Ja).

3804. *T. scorodium* L. — In pratis paludosis et in fossis reg. infer. — Ad Vir (Pč), circa Rijeka (Kn), in humidis pagi Plavnica (Sz). „Cum forma typica erecta crescit promiscue

alia diffusa, foliis brevioribus et verticillis longius pedunculatis, in *T. scordioidem* quasi transitum modulans" (PANČIĆ Elench. pag. 77).

3805. *T. scordioides* SCHREB. — In humidis ad Rijeka (Pt), ad ripam lacus Scodrani (Ro).

3807. *T. flavidum* L. — In rupestribus reg. mont. supra coenob. Ostrog (Pč, Ba).

3810. *T. chamaedrys* L. — In dumetis et rupestribus reg. infer., mont. et subalp. — Circa Šavniki (Pt, Ro), ad latera montis Lovćen (Pč, Kš, Ro, Pej), ad Njeguši et Cetinje (Sz, Kn, Ro), Medun distr. Kući (Sz), Viljuša, coenob. Piva et Vir (Ro), Bar, Sutorman (Do), supra coenob. Morača (Ja), ad Kralje et Andrijevica (Ja, Ro).

— var. *villosum* HIRC. — Kračeva glavica pr. Njeguši (Pej, Ro).

— f. *illyricum* BORB. et BORNM. — Ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

3812. *T. montanum* L. — In rupestribus e reg. infer. usque in alpinam in tota dictione frequens et vulgaris.

— f. *supinum* (L.) RCHB. — Folia linearia 1—2 mm lata margine valde revoluta. — Non raro cum typo.

3817. *T. polium* L. — In rupestr., dumetosis et lapid. reg. infer., mont., rarius subalp. dicionis austro-orient. frequens et vulgaris. — Ulcinj, Bar, Vir, Rijeka, Cetinje, Njeguši, mons Lovćen, mons Jastrebica, mons Lisinj, mons Rumija, Sutorman, Podgorica, Medun, Orahovo, Ostrog, Nikšić, Lukovo sub monte Vojnik, Šavniki, Viljuša, mons Vjetrnik etc. saepissime floribus rubro purpureis (= f. *purpureum* VIS.). Forma floribus albis vel pallide roseis (= f. *vulgare* BENTH.) multo rarius.

### *Rosmarinus* L.

\*3819. *R. officinalis* L. — In rupestribus et dumetis reg. infer. mediterr. — Limljani distr. Crmnica (Pč), Boljevići supra Vir, Ulcinj (Ro).

### *Prasium* L.

3820. *P. maius* L. — In saxosis ad pedem montis Rumija supra Bar, cca 100 m (Ro), collis Volovica pr. Novi Bar (Do).

*Scutellaria* L.

3822. *S. alpina* L. — „A basi ramosissima; caulis decumbens adscendentibus pubescentibus; foliis ovatis vel oblongis crenatis pubescentibus inferioribus breviter petiolatis, superioribus subsessilibus, floralibus dense imbricatis purpurascensibus integris calyces occultantibus; floribus in axillis solitariis non secundis, spicam densam formantibus; corolla pubescente flava, rarius labio inferiore purpurascente.“ — In glaeriosis et gramin. reg. subalp. et alp. — Viruša dol sub Crna planina (Pt, Ro), in monte Javorje planina (Pč, Ro), in monte Velki Maglič distr. Kuči (Sz), Lijeva Rijeka, Sinjavina planina loco Crvena ploča (Ba), Štirni do et Treblješ luka (Ho, Ro), Pišperska Lukavica, Pavlova livada (Ro), in monte Lovćen (Ro, Pej), Matošovo pr. Kolašin (Ja), Fuša Rudnica sub monte Prokletija (Df).

3823. *S. Columnae* ALL. — A sequente differt caule inferne tomentoso, superne cum foliis floralibus et calycibus glandulosos-villoso, foliis floralibus calyce parum longioribus, corolla maiore 25—28 mm longa purpurea quam calyx 6-plo longiore, nuculis tenuissime stellato-pilosis. — In nemoribus regionis inferioris et montanae raro. — Ad Boljevići pr. Vir, Drušići pr. Rijeka, Bukovica pr. Njeguši (Ro), ad pagum Mikulići sub monte Rumija (Do), in monte Troica pr. Vir (Eb).

3825. *S. altissima* L. — In dumetis et silvis reg. mont. et subalp., rarius infer. — Sub monte Durmitor (Pč), Rupa Konjska et in silva Skrobotuša sub monte Vila (Sz), Kostića et mons Dibala distr. Kuči (Ba), ad Njeguši et Cetinje (Ld, Gi, Pej, Ro), ad latera montis Lovćen (Kš, Ro), Zagarać supra Danilograd, Plavnica ad ripam lacus Scodrani, Viljuša, Šavnik, coenob. Piva et in monte Vojnik (Ro), in monte Vjetnik, supra coenob. Morača, in valle Bistrica et Svinjača pr. Kolašin (Ja), ad Kralje et Andrijevica (Ja, Ro).

\* — f. *micrantha* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Flores ad summum 12 mm longi. — In monte Prokletija loco Zastan (Boš).

3831. *S. galericulata* L. — In paludosis, in fossis et ad ripas reg. infer., mont. et subalp. — Ad Vir (Pč), Pošćensko jezero supra Šavnik, Barno jezero sub monte Durmitor, lacus Scodranus ad Godinje et Plavnica (Ro).

— — f. *pauciflora* (PANT. Adn. 62) HAY. — Caulis erectus simplex humilis usque 15 cm altus. — In humidis ad lacum Riblje jezero infra montem Mali Durmitor (Pt).

*Lavandula* L.

3833. *L. spica* L. — In hortis culta.

*Marrubium* L.

3840. *M. incanum* DESR. (= *M. candidissimum* aut. mont. non L.). — In rupestr., lapid. et ruderat. reg. infer., mont. et subalp. frequens. — Čevo distr. Katunska nahija et Danilovgrad (Pč), in monte Orjen (Ad), circa Njeguši et Cetinje (Sz, Pč, Kn, Ba, Ro etc.), ad latera montis Lovćen (Ho, Pej), in monte Rumija supra Bar, Medun distr. Kući (Ba), Drušći distr. Lješanska nahija, Malo brdo et Golubovci pr. Podgorica, Viljuša, Rudine nikšićke, Šavniki sub Ivica planina, Goraško et Ljut supra coenob. Piva (Ro), ad latera montis Vjeternik (Ja), in monte Kosa supra Bar (Do), insula Vranina (Eb).  $\times M. incanum \times vulgare$  var. *lanatum* = *M. montenegrinum* SAG. OeBZ. LV:27. — Ad Njeguši (Sa).

3843. *M. vulgare* L. — In ruderatis et lapid. reg. infer. et mont. calidioris. — Insula Vranina (Eb), circa Sindžon (Pt), Rijeka (Ho), Podgorica (Ro), Njeguši (Gi, Ma, Kn, Pej, Ro), Bioče in valle fl. Morača, in monte Jablan (Ja).

— — var. *lanatum* BENTH. — Folia minora suborbiculata utrimque albo-lanato-tomentosa. — Ad Njeguši (Ba, Kn), in insula Vranja lac. Scodrani, Drušći pr. Rijeka, Nikšić, Tudje-mile supra Bar, ad latera montis Rumija (Ba, Ro, Do).

*Sideritis* L.

3845. *S. montana* L. — In lapidosis et herbidis reg. inf. et mont. — Circa pagum Previs (Pt), ad Riječani (Ho), Viljuša et Šavniki (Ro).

3847. *S. romana* L. — In apricis et lapid. reg. infer. — Ad Dobrsko selo pr. Rijeka (Pt), ad Vir (Pč), in insula Vranja lacus Scodrani (Ba), inter Kotor et Njeguši (Pej, Ro), ad Mikulici sub monte Rumija (Do), insula Vranina (Eb).

— — var. *approximata* GUSS. — „Spica elongata, verticilli numerosi contigui“ (PANČ. Elench. 77). — Ad Vir cum typo.

3848. *S. purpurea* TALBOT. — A praeced. differt indumento longiore, calyce basi minus gibboso, corollae purpureae maioris limbo magis exserto. — In lapid. et ad vias reg. infer. et montanae calidioris. — Circa pagum Ceklin (Pt), Cetinje, Podgorica, Kokoti, Drušići, Rijeka, Vir, Boljevići, Bar et Ulcinj (Ro), ad Bioče in valle fl. Morača (Ja, Df), Volovica pr. Novi Bar (Do).

*Nepeta* L.

3856. *N. cataria* L. — In lapid., fruticetis et ad sepes reg. infer. et mont. calidioris. — Danilovgrad (Pč), Drušići distr. Lješanska nahija et ad Nikšić (Ba), Rijeka (Ho), Cetinje (Kn), ad latera montis Lovćen, ad Njeguši, Spuž, coenob. Piva et ad ped. montis Balj pr. Andrijevica (Ro), in monte Vjetnik distr. Bratonožići et inter coenob. Morača et Bistrica (Ja), Suštorman et mons Kosa supra Bar (Do).

3866. *N. pannonica* L. (= *N. nuda* aut. mont.). — In rupestribus et herbidis in tota dizione e reg. infer. usque in alp. frequens.

\*— f. *angustifrons* ROHL. XI. Beitr. 14. — Folia caulina media et superiora apicem versus longius angustata ad basin non subcordata nec truncata ut in typo, sed ± in petiolum attenuata. — Ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

\*— f. *longidens* ROHL. XI. Beitr. 14. — Calycis dentes (sub flore) tubo evidenter longiores. — Cum typo in monte Lovćen (Pej, Ro).

— f. *densiflora* SAG. — Verticillastris multifloris sese attinet gentibus. — Cum typo ad Njeguši (Sa).

*Glecoma* L.

3869. *G. hederacea* L. — In cultis, gramin. et pratis reg. mont. — Ad Cetinje et Njeguši (Pč, Ro), Viljuša, Vojkovići et Resna distr. Katunska nahija (Ro).

3871. *G. hirsuta* W. K. — Vermoš planina ad fines Albaniae cca 1100 m (Df).

— f. *longidens* ROHL. IV. Beitr. 78. — Calycis dentes tubo longiores. — In dumetis ad Andrijevica cca 800 m (Ro).

*Prunella* L.

3874. *P. grandiflora* (L.) JACQ. — In lapidosis, pasuis et herbidis regionis montanae et subalpinae. — Ad Vučje

Gornje pr. Gvozd sub monte Vojnik (Pt), Ivica planina (Pč), in monte Brotnik (Ho), Lovćen, Lastva čevska, Malošin do et Velestovo distr. Katunska nahija (Ro).

× *P. grandiflora* × *vulgaris* = *P. spuria* STAPF. — In monte Lovćen (Ro, Pej).

3875. *P. vulgaris* L. — In graminosis, pratis, pascuis et ad vias reg. infer., mont. et subalp. — Sub monte Durmitor (Pt, Ba), ad Vir (Pč), Plavnica (Sz), sub monte Kom Kučki (Ho), circa Bar, Ulcinj et Njeguši (Ro), Kolašin (Ja), Kralje et Andrijevica (Ja, Ro), circa Viljuša, coenob. Piva et Danišlovgrad (Ro).

\*— f. *paludosa* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Caulis ad 40 cm altus; internodia foliorum ad 12 cm longa. — Ad ripas lacus Plavsko jezero (Boš).

× *P. laciniata* × *vulgaris* = *P. pinnatifida* PERS. — In declivibus montis Lovćen (Ro, Pej), Bar (Do), sub monte Prokletija (Boš).

3876. *P. laciniata* L. — In silvis, fruticosis, lapidosis et graminosis reg. infer., mont. et subalp. in tota dizione frequens.

— f. *subintegra* HAMILTON. — Folia + integra. — Ad Njeguši et Medun (Sz, Ro), Borkovići distr. Piva (Ro), Bar (Do).

### *Melittis* L.

3877. *M. melissophyllum* L. — In silvis et dumetis reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Viljuša, Šavniki, Nikšić, coenob. Piva, Mratinje sub monte Maglić Pivski, Njeguši, Mosori pr. Podgorica et ad pedem montis Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro), Han Garančić pr. Kolašin (Ja), Sutorman supra Bar (Eb).

— f. *oblongifolia* ROHL. II. Beitr. 9. — Folia oblonga basin versus angustata. — Inter Cetinje et Rijeka (Ro).

### *Phlomis* L.

? 3880. *Ph. lanata* WILLD. — A cl. BALDACCI ex insula Vranja lacus Scodrani indicata; verosimiliter ad spec. sequentem pertinet.

3881. *Ph. fruticosa* L. — In rupestribus et fruticetis reg. infer. dic. mediterr. — Ad Vir et Boljevići (Pč, Ro), ad

latera montis Lisinj supra Bar (Ba), circa Bar (Ho, Ro, Do), Malo brdo pr. Podgorica, Kokoti distr. Lješanska nahija, Lipovik pr. Rijeka (Ro), Limljani pr. Vir; insula Vranina (Eb).

### *Galeopsis* L.

3887. *G. ladanum* L. subsp. *latifolia* (HOFFM.) GAUD. — In incultis, lapidosis et in dumetosis reg. mont. et subalp. — Žabljak et Barno jezero sub monte Durmitor, Šavnik, Viljuša, Njeguši et in decliv. montis Lovčen (Ro), Kolašin et Kralje pr. Andrijevica (Ja).

3888. *G. tetrahit* L. — In silvis et ad sepes reg. mont. et subalp. — Circa Kolašin (Pč, Ja), sub monte Kom Kučki (Ho), circa Andrijevica et Kralje (Ja, Ro).

3889. *G. pubescens* BESS. f. *Walteriana* (SCHLECHTD.) ROHL. — Caulis setosus pilis mollibus paucis vel nullis. — In dumet. reg. subalp. ad latera montis Balj pr. Andrijevica (Ro).

3890. *G. bifida* BOENNIGH. — Ad marg. silvarum reg. subalp. in valle flum. Jelovica sub monte Bjelastica planina (Ro).

3891. *G. speciosa* MILL. subsp. *speciosa* (MILL.) BRIQ. — In silvis humidis, ad ripas et in herbidis reg. subalp. et alp. dicionis septentrionalis. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), Perućica sub monte Kom (Pt, Ro, Ho), circa pagum Kovčice sub monte Mali Durmitor (Pt), in valle flum. Tara (Pt, Ro), Rupa Konjska sub monte Vila distr. Kuči (Sz), Borkovići et Mratinje distr. Piva, Šavnik, Štirni do pr. Lukavica planina, in montibus Balj, Sjekirica et Velki Krš pr. Andrijevica (Ro).

— f. *interrupta* PORSCHE. — Ad latera montis Lovčen (Pej).

### *Lamium* L.

3892. *L. galeobdolon* (L.) CR. subsp. *montanum* (PERS.) HAY. — In silvis mont. et subalp. — Crna planina et Kom (Pt), Ljut, Ledenica planina et Božur supra coenob. Piva, Orani do distr. Katunska nahija; ad latera montis Lovčen; Matoševo in valle fl. Tara et Velki Krš pr. Andrijevica (Ro), ad lacum Volujačko jezero (Ma), Savin Kuk et Medjed in monte Durmitor (Ht), Krivi do distr. Piva (De, Si).

\*— f. *incisum* ROHL. V. Beitr. p. 100. — Folia ad  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  incisa. — Cum typo in monte Božur planina distr. Piva (Ro).

— — subsp. *vulgare* (PERS.) HAY. — In subalp. Vermoš planina ad fines Albaniae (Df).

3893. *L. orvala* L. — In silvis reg. subalp. vallis Viruša infra Crna planina (Pt).

\*3893b. *L. Lovćenicum* ROHL. IX. Beitr. 8. — Radix perennis ± repens; caulis erectus usque ad 50 cm altus simplex vel parce ramosus (i. e. ex axi foliorum rami breves exeuntes) infra glaber, in medio et supra pilis brevissimis adpressis sparse tectus; folia 3—8 cm longa, 2—4 cm lata, ovata, ovato-lanceolata vel triangulari-lanceolata, basi rotundata, retusa vel paulum in petiolum contracta, infima longiuscule, media mediocriter, superiora breviter petiolata argute dentata ad apicem saepe protracta subglabra solum subtus ad nervos breviter pilosa; verticillastra remota foliis suffulcrantibus breviora; bracteae linearis-lanceolatae ciliatae calyce 2—3-plo breviores; calyx saepe glandulis pellucidis sessilibus ± dense tectus, ceterum glaber, solum in parte superiore ad nervos parce breviterque pilosus, intus glaberrimus, in parte infer. et medio tubulosus ad faucem sensim ampliatus usque 18 mm longus dentibus lanceolatis ± longiuscule aristatis margine breviter setosis tubo brevioribus rarius subaequilongis sub flore erectis, sub fructu saepe divaricatis; corolla alba usque 30—35 mm longa tubo recto vel parum curvato faucem versus infundibuliformi ampliato, labio superiore galeiformi extus superne dense albo-piloso, margine albo-lanato apice apiculato utrimque dentibus 2—3 obsito rarius sub-integro, labio inferiore ± trilobo, lobo medio elongato lateribus multo maiore intus striis fusco-rubris ± ornato margine denticulato vel ± dentato-fimbriato, lobis lateralibus sparse longe fimbriatis; corollae tubus intus ad nervos breviter pilosulus ad basin usque ad 2—3 mm glaber, dein annulo obliquo parum evidenter praedito; antherae oblongo-ellipticae cca 1,8 mm longae fusco-bruneae glaberrimae; filamenta sparse albo-lanata; stylus glaber, fructus triquierter (duobus faciebus planus tertius ± convexus), glaber, bruneus. — In fruticetis et dumetis ad Garčevići, Zalazi, Obod et Njeguši sub monte Lovćen, cca 1000 m (Ro, Pej).

3896. *L. maculatum* L. — In ruderatis, lapid. et dumet. reg. infer., mont. et subalpinae in tota dicione frequens.

— — var. *nemorale* RCHB. f. *pallidiflorum* BECK. — Folia cordata acuta grosse duplicata-serrata; calycis dentes longe acu-

**minati** tubo longiores; corolla pallide lilacina fere albida. — Vrtnica pr. Volujačko jezero distr. Piva (Ma), in valle rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

— — — f. *longearistatum* NEJČ. — Dentes calycini longe subulati tubo multo longiores. — Ad Njeguši et in monte Pišperska Lukavica (Ro).

3897. *L. g a r g a n i c u m* L. subsp. *g l a b r a t u m* (GRIS.) BRIQU. var. *inflatum* (HEUFF.) BRIQU. (= *L. longiflorum* PANČ. Elench. 75 non TEN.). — A *L. albo* dignoscitur corollae tubo recto faucem versus sensim infundibuliformi ampliato intus non annulato-piloso. — In rupestr. reg. subalp. — Ad Crvena Stijena sub monte Durmitor et in valle Tušina (Pč).

3898. *L. p i c t u m* BOISS. et HELDR. — A praeced. dignoscitur caule procumbente, foliis minoribus reniformibus vel late cordatis obtusis, verticillastris pauci-(2—4)-floris, calycis dentibus breviter acutis tubo multo brevioribus, corolla pallide rosa. — In alpinis ad Fuša Rudnices sub Prokletija planina ad fines Albaniæ (Df).

3899. *L. b i f i d u m* CYR. — Annum; caulis adscendens vel erectus medio saepe nudus; folia triangulari-ovata crenata vel inciso-dentata, inferiora longe petiolata saepissime cordata; calycis hirti dentes lanceolato-subulati tubo breviores deum patentes; corolla alba pubescens tubo recto intus non annulato-piloso calyce 3—4-plo longiore, galea bifida lobis ovatis, antherae hirsutae, achenia granulata. — In ruderatis et lapid. maritimis ad Ulcinj (Ro), in cultis ad Njeguši loco „Ljut“ (Pej, Ro).

3900. *L. p u r p u r e u m* L. — In cultis et ruder. reg. infer. et mont. — Ad Njeguši et Cetinje (Pč), Malošin do et Velestovo distr. Katunska nahija, circa Bar et Vir (Ro), ad Ulcinj (Ba, Ro).

3901. *L. a m p l e x i c a u l e* L. — In cultis et ruder. reg. infer. et mont. — Circa Bar et Ulcinj (Ba, Ro), Čevo, Resna et Velestovo distr. Katunska nahija (Ro).

### *Leonturus* L.

\*3905. *L. c a r d i a c a* L. — In fruticetis et ad sepes reg. infer. et mont. — Danilovgrad (Pč, Ro), Cetinje (Ba), Rađovče polje (Ho), Viljuša, Šavnik, Njeguši, Nikšić, Zagarać, Berane (Ro), Andrijevica (Ja, Ro).

— f. *glaber* (GILIB.) ABROM. et SCHOLZ. — Krstačko polje pr. Njeguši (Ro, Pej).

*Ballota* L.

3907. *B. nigra* L. subsp. *fœtidia* (LAM.) HAY. — In ruderatis et lapidosis reg. montanae. — Sub monte Lovćen (Pč), Njeguši, Andrijevica et coenob. Piva (Ro).

— f. *villicaulis* (BORB.) HAY. — Cum typo ad Njeguši (Pej, Ro).

\*— subsp. *ruderalis* (SW.) BRIQU. — Dentes calycini (3—5) ovati vel triangulares longius aristato-acuminati post florendum erecto-patentes (nec subrecurvi). — In lapidosis ad Simunj distr. Katunska nahija (Ro).

3909. *B. acuta* (MCH.) BRIQU. — In rupestr. et lapid. reg. infer. et montanae. — Ad Cetinje, Njeguši et sub monte Lovćen (Pč, Kn, Pej, Ro), circa Bar, Rijeka, Ostrog et Drušići (Ba), ad Godinje pr. Vir, Medun, Podgorica, Goraňsko et coenob. Piva (Ro).

*Stachys* L.

3912. *St. J acquinii* (GREN. GODR.) FRITSCH var. *lanata* (SCHILLER) HAY. (= *Betonica Alopecurus* aut. mont.). — Corolla ochroleuca tubo calycem non superante intus ad basin annulo piloso praedito dense pilosa, folia subtus dense lanata; spica ovata plerumque non interrupta. — In rupestr., pratis et pascuis reg. subalp. et alpinæ in tota dicione (etiam in monte Lovćen) frequens.

3917. *St. officinalis* (L.) TREVIS. (= *Betonica off.* L.) subsp. *eu-officinalis* HAY. — In pratis et dumetis reg. mont., subalp. et alp. — Sub monte Lovćen (Pč, Ro), in pratis sub monte Durmitor (Pč, Ro), ad Viljuša, Njeguši, coenob. Piva et Andrijevica (Ro).

— f. *danica* (MILL.) HAY. — Folia latiora ± ovata; calyx dentes lanceolati tubo parum breviores. — In pratis ad Po-prat distr. Kući (Ba), ad Njeguši (Pej, Ro).

— f. *glabricalyx* ROHL. V. Beitr. p. 100. — Calyces extus glabri. — In montibus Ledenica, Maglič Pivski et Durmitor (Ro).

\*— subsp. *velebitica* (A. KERN.) HAY. — In gramin.

mont. et subalp. — In monte Vjetnik, Rudo brdo, mons Peh et Glave pr. Kralje (Ja), ad Njeguši in formis intermed. (Ro). —— subsp. *serotina* (HOST) HAY. — Ad Cetinje (Kn). —— var. *crnagorae* (BECK et SZYSZ.) HAY. — Scapus 4—5 paribus foliorum praeditus, sicut tota planta copiose=villosus; folia crenata in basi subincisa; superiora in duobus paribus supremis oblonga angusta brevissime petiolata subsessilia subcristata; spica interrupta saepe ramosa (BECK et SZ. Pl. crnag. 140). — Cum formis intermediis in reg. subalp. et alp. — In du metis pagi Orahovo; in pasc. alp. montis Hum Orahovski (Sz), Velki Štulac in monte Durmitor et supra coenob. Piva; in monte Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

\*——— f. *albiflora* ROHL. — In montibus Balj et Jerinja glava supra Andrijevica multo frequentior ac typus (Ro).

3920. *St. cretica* L. var. *salviifolia* (TEN.) HAY. — In pratis reg. infer. medit. ad Bar (Ro).

3925. *St. germanica* L. subsp. *eugermanica* HAY. — In herbidis, lapid. et silvaticis reg. infer., mont. et subalp. — Ad Cetinje (Pč, Kn), Grahovo (Pč), Njeguši (Sa, Ro), infra montem Što et Gradište in Sinjavina planina; ad Kolašin (Ba), Lisac (Ho), Andrijevica (Ro), Bioče et Jablan inter Podgorica et Kolašin (Ja), Sutorman supra Bar (Eb, Do), Podgora pr. Vir (Eb).

\*——— f. *dasyantha* HIRC. — Ad Viljuša, Šavnik et Jasenovo polje sub monte Vojnik (Ro), Kračeva glavica pr. Njeguši (Pej, Ro).

3926. *St. Reinertii* HELDR. a cl. HAYEK Prodr. II: 286 e Montenegro indicata pertinet ad *St. alpinam* subsp. *dinaricam* MURB. (fide MURBECK).

3927. *St. obliqua* W. K. — A sequente differt caule molliter villosa eglandulosa, foliis oblongo=lanceolatis basi rotundatis vel leviter cordatis, verticillastris 6—10 (nec 30—50) floris, inferioribus remotis, calycis villosi dentibus lanceolato= subulatis, corolla sulfurea vel ochracea. — In silvis reg. subalp. et alp. — In monte Durmitor et Sjekirica planina cca 1600—2000 m (Ro).

3928. *St. alpina* L. subsp. *dinarica* MURB. Beitr. 61 (= *St. Reinertii* BECK et SZYSZ. Plantae Crnagorae 140, non HELDR.). — „Folia pube densa molli canescentia, basi leviter

cordata obtusa; caulis superne sparse glandulosopilosus; mericarpia paulo longiora quam latiora." — In herbidis subalp. et alp. dicionis septentrionalis et orient.; e montibus dicionis meridionalis (Lovćen et Rumija) adhuc non vidi. Typicam *St. alpinam* e Montenegro non vidi; in monte Sjekirica planina legi formas, quae foliis profundius cordatis, acutius dentatis et caule in parte super. magis glandulosopiloso *St. alpinam* typicam revocant, sed seminum forma cum *St. dinarica* bene congruant (= f. *intercedens* ROHL. V. Beitr. 101).

3931. *St. silvatica* L. — In silvis et dumet. reg. subalp., alpinae, rarius inferioris. — In monte Durmitor jugo Štulac (Pč), Sinjavina planina loco Crvena ploča (Ba), in valle fl. Morača supra Bioče, Njeguši, ad latera montis Lovćen, Veles-tovo, Malošin do et Milušina pećina distr. Katunska nahija, ad coenob. Piva et Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro), Kolašin, Kralje et Andrijevica (Ja, Ro).

\*3932. *St. palustris* L. — In fossis et locis humidis reg. infer. et subalp. non frequens. — Circa Rijeka et Danilovgrad (Pt), in valle fl. Tara pr. Kolašin, ad coenob. Piva et ad Mratinje distr. Piva (Ro).

3939. *St. grandiflora* HOST non BENTH. (= *St. menthaefolia* VIS.). — Perennis; caulis dense breviter glandulosopuberulus et sparse longe pilosus; folia breviter glandulosopuberula et sparse pubescentia dentato-serrata ovato-lanceolata vel lanceolata, inferiora basi subcordata, cetera basi rotundata vel ± attenuata breviter petiolata, floralia subcordato-ovata vel subcordato-lanceolata subsessilia, bracteae linearis-setaceae minutae; verticillastri 6—10-flori dein in spicam longam contigui; calyces campanulati cca 12 mm longi hirsuti et glandulosi bilabiati, dentibus ovato-lanceolatis mucronatis, superioribus 3 ultra medium coalitis; corolla ochroleuca, labio inferiore saepe punctis rubris seriatis picta, tubo intus annulo piloso praedita; planta siccata saepe nigrescit. — In rupestr. et frutic. reg. infer. mediter. et mont. calid. dicionis meridionalis. — Cetinje (Pč, Kn, Kš, Ba), Njeguši (Ba, Gi, Pej, Ro), Vir (Pč, Ro), Ostrog (Pč), Spuž (Ho), Medun (Ba, Ro), Godinje pr. Vir (Ro), Bar, mons Lisinj, Velki Mikulić sub Rumija planina (Ba), Bioče pr. Podgorica et in monte Vjetnik distr. Bratonožići (Ja), in monte Kosa supra Bar (Do).

— f. *puberula* (ROHL.) HAY. — Caulis solum breviter

glandulosopuberulus non longe pilosus. — Cum typo ad Bar (Ro).

? 3941. *St. pubescens* TEN. — In reg. alpina. — In monte Crna planina, Carine et in saxa Orlova skala nominata infra montem Kom (Pt), Carine sub monte Kom, Sinjavina planina loco Crvena ploča et in monte Durmitor (Ba). Vero similiter loca hic enumerata ad aliam speciem pertinent, nam vera *St. pubescens* in reg. infer. praecipue in arenosis maritimis crescit.

3945. *St. Beckeana* DOERFL. et HAY. — Ex affinitate *St. rectae* L. — Caulis basi copiose ramosus longe lanatos-villosus; folia adpresso cano-lanata crenata, caulinata inferiora cordato-ovata longiuscule petiolata rotundato-obtusa, cetera ovata basi rotundata breviter petiolata, verticillastri approximati spicam terminalem formantes; calyx dense villosus et glanduloso-sessilibus obsitus cca 8 mm longus vix bilabiatus, dentibus triangulari-lanceolatis aristato-acuminatis; corolla cca 12—15 mm longa pallide flava labio inferiore 8—10 mm longo. — In sax. et glareosis reg. subalpinae. — Piperska Lukavica (Ro), in valle fl. Tara ad Vrtijelika, Han Garančić, Matošev et Kolašin cca 950—1700 m (Ja).

3946. *St. anisochila* VIS. et PANČ. — A praeced. dignoscitur caule dense crispule piloso, foliis crispule pubescentibus viridibus, calyce 10—11 mm longo distinete bilabiato, dentibus superioribus plerumque inter se coalitis. — In rupestr. et glareosis reg. alp. dic. septentrionalis. — In monte Kom Kučki (Ho), in monte Maglić Pivski et Durmitor (Ro), Mar-garita et mons Pivljan distr. Vasojevići (Ja), Piperska Lukavica et Štirni do (Ro).

— f. *Sendtneri* (BECK) HAY. — Calycis dentes superiores liberi. — Frequens cum typo.

3947. *St. recta* L. subsp. *labiosa* (BERTOL.) BRIQU. — E monte Durmitor (in sax. jugi Šljeme) a cl. PANČIĆ et BALDACCI indicata. Vero similiter ad aliam subspeciem pertinet.

— subsp. *sarajeensis* (K. MALÝ) HAY. — In rupestr. et glareosis reg. subalp. et alp. — In monte Čafa Mala et Kariman distr. Kuči; etiam sub monte Kom (Ba).

— subsp. *subcrenata* (VIS.) BRIQU. — In saxosis ad Njeguši et Vir (Pč, Ro), inter Kotor et Njeguši, ad Nikšić,

circa Andrijevica (Ba, Ro), Viljuša, in rupestr. montis Durmitor (Ro), in monte Jastrebica (Ad), in monte Lovćen (Kš), Konjsk planina (Ro), Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

— — — f. *hercegovina* (K. MALÝ) HAY. — Calyx glandulosopilosus. — Rarius cum typo ad latera montis Lovćen, ad Njeguši et Rijeka (Ro).

\* — — — f. *glabricalyx* ROHL. X. Beitr. 14. — Tota planta parcissime pilosa, calyces glaberrimi. (*Calycibus glabris f. scutariensem* JANČH. revocat, sed planta nostra habet calyces 8—10 mm longos et evidenter bilabiatus.) — In campo ad Podgorica (Ro).

— — — var. *karstiana* (BORB.) HAY. — In rupestr. et lapid. reg. subalp. dic. septentr. — Kaniesto? (Pichler), circa Andrijevica (Ja, Ro), in valle fl. Perućica sub monte Kom; Božur planina distr. Piva (Ro).

— — — f. *conferta* (MURB.) HAY. — Folia inferiora longiuscule petiolata, spica magis interrupta. — Cum typo in subalp. sub monte Maglič et in Božur planina distr. Piva (Ro), Krstac in valle rivi Piva (De, Si).

— — — f. *eriocalulis* (K. MALÝ) HAY. — Caulis albolanato-villosus. — Sjekirica planina et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

— — — subvar. *Omblae* (LINDB. f.) HAY. — Folia caulina obtuse grosse crenata; spica ovata densa, calyx longe glandulosopilosus. — In rupestr. ad Krstac pr. Njeguši in formis appropinquis (Pej, Ro).

— — — subvar. *montenegrina* (K. MALÝ) HAY. — „Caulis inferne patule pilosus; folia oblongo-ovata grosse crenato-serata utrimque hispida; spica magna densa usque 12 cm longa; calyx 9—11 mm longus subbilabiatus parum pronus curvatus dense glandulosopilosus; corolla magna usque 17 mm longa; tota planta sicca indigotisans.“ — In saxosis ad Trijepši distr. Kuči (Ba), Zanovetni brije et Krstac pr. Njeguši; ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

— — — var. *hyssopifolia* TEN. — Caulis saepe a basi valde ramosus pilosus; folia anguste lanceolata vel linearilanceolata subintegra subglabra vel sparse pilosa; calyx breviter pilosus. — Cum typo ad Podgorica et sub monte Lovćen (Ro), in incultis ad Medun et Orahovo distr. Kuči (Sz).

— — subsp. *recta* BRIQU. var. *Kümmerleana* (JÁV.) MALÝ.  
— Velki Krš supra Andrijevica (Ba sub *St. labiosa* BERT.).  
— — subsp. *Baldaccii* (K. MALÝ) HAY. — „Caulis patule pilosus vel glaber longe ramosus, ramis arcuato-adscendentibus simplicibus florigeris; folia laxe pilosa vel glabra, infima late ovata grosse serrata longiuscule petiolata, sequentia minora multo brevius petiolata, superiora lanceolata; verticillastri 2—4 congesti vel infimus ± remotus; calyx 7 mm longus fere regula- riter 5-dentatus densiuscule glandulosopilosus; corolla pallide citrina labio inferiore 8—9 mm longo“ (HAYEK Prodr. II: 296). — In rupestr. et sagosis reg. infer. et montanae calidioris.  
— Ad Tudjemile et Šostani pr. Bar (Ba), ad latera mont. Vjet- nik distr. Bratonožići (Ja), inter Kotor et Krstac (Ja), inter Njeguši et Cetinje loco Golo brdo (Gi), Limljani pr. Vir, Su- torman et Rumija supra Bar (Do).

— — — f. *scutariensis* JANCH. — In monte Rumija et in angustiis Sutorman in forma foliis angustissimis ad var. *Malyi* HAY. vergente (Do).

— — — var. *chrysophaea* PANČ. Elench. 76. — Verticillastri numerosi 5—9, distantes spicam interruptam formantes; calyx glaberrimus. — In sax. supra Šavniki sub monte Ivica (Pč).

3961. *St. annua* L. — In ruder. et cultis reg. infer., mont., rarius subalp. et alpinae. — Njeguši (Pč, Ro, Pej), Cetinje (Pt, Kn, Ro), Kovčice sub monte Durmitor (Pt), in monte Korman in Sinjavina planina (Ba), circa Bar, Podgorica, Vil- juša, Šavniki, Mratinje sub monte Maglič, Andrijevica et Be- rane (Ro); etiam in monte Durmitor loco Valoviti do cca 1950 m verosimiliter introducta (Ro).

— — subvar. *adenocalyx* (C. KOCH) HAUSSKN. — Folia floralia et calyces praeter glandulos sessiles etiam glandulosopilos. — Ad Bar, Dragovoljići et Bojetići pr. Nikšić (Ro), in monte Rumija (Do).

\*— — var. *longidens* ROHL. — Calycis dentes longius aristati tubo aequilongi vel longiores. — Cum typo ad Njeguši (Pej, Ro).

3963. *St. spinulosa* S. S. — In gramin. et lapidos. reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Cetinje (Ba), supra Bar (Ro).

### *Salvia* L.

3967. *S. verticillata* L. — Ad vias, in fruticosis et lapidosis reg. infer., mont. et subalpinae in tota dicione frequens.

3971. *S. officinalis* L. — In lapidosis, saxosis et fruticosis reg. infer. mediterr. et montanae calidioris in dizione meridion. (Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Spuž, Danilovgrad, Nikšić, Viljuša, Cetinje, Njeguši) frequens et vulgaris. In dizione septentr. rarius: in monte Vjetnik usque ad pagum Klopot (Ja), Konjuhe sub monte Kom (Ba), Šavniki sub monte Ivica, ad coenob. Piva et sub Borkovići distr. Piva (Ro). — f. *pallida* PANT. — Corolla alba, calyx flavescentia viridis. — Krstac pr. Njeguši (Ld), ad Podgorica frequens (Ro).

— f. *auriculata* VIS. — Lamina foliorum basi auriculata. — Ad Njeguši raro (Pej, Ro).

3978. *S. verbena* L. — In gramin. reg. infer. mediter., rarius montanae. — Circa Bar (Ba, Ro), ad Ulcinj, Boljevići pr. Vir et circa Podgorica (Ro); etiam ad Konjuhe pr. Andrijevica! (Ro), inter Cetinje et Podgora (Eb).

3981. *S. glutinosa* L. — In silvaticis et dumet. reg. mont. et subalpinae. — In monte Vojnik et Durmitor (Pč), in valle fl. Tara supra Kolašin (Pč, Ja, Ro), in silva Škroboštuša sub monte Vila ad fines Albaniae (Sz), Konjuhe sub monte Kom (Ba, Ro, Ho), supra coenob. Morača (Ja), circa Kralje et Andrijevica (Ja, Ro), in monte Balj et Jerinja glava supra Andrijevica; Stubica pr. Nikšić, ad latera montis Lovćen et ad Njeguši, Viljuša, Šavniki, coenob. Piva et Borkovići distr. Piva (Ro).

3984. *S. sclarea* L. — In gramin. et rupestr. reg. infer. et montanae calidioris. — Sub monte Ostrog (Pč), ad Zubci supra Bar (Ba), inter Njeguši et Kotor (Pej, Ro).

? 3992. *S. virgata* AIT. — A cl. PANTOCSEK (Adnot. 60) in pratis ad Cetinje lecta verosimiliter ad aliam speciem pertinet.

3994. *S. Bertolonii* VIS. — In gramin. et lapid. reg. infer., mont., rarius subalpinae. — Circa Šavniki (Pt, Ro), ad Njeguši (Pč, Pej, Ro), ad latera montis Lovćen (Kš, Ro), ad Poprat distr. Kuči (Ba), Lastva čevska distr. Katunska nahija (Ro sub *S. pratensis* var. *parviflora* ČEL.), Viljuša, coenob. Piva, Borkovići distr. Piva, Kokoti distr. Lješanska nahija (Ro), in valle rivi Vrbnica pr. Orak distr. Piva (De, Si).

\* — f. *eglandulosa* ROHL. IX. Beitr. 14. — Inflorescentia eglandulosa. — Ad Borkovići distr. Piva, cca 1400 m (Ro).

? 3997. *S. nemorosa* L. — In lapidosis, herbidis et ad marginem silvarum reg. infer., mont. et subalp. — Nikšićka župa (Pč), ad Lukić pr. Bar (Ba). Loca hic enumerata verosimiliter ad spec. sequentem spectant.

3998. *S. amplexicaulis* LAM. — A praeced. dignoscitur caule breviter patule villoso, foliis subtus  $\pm$  hirsutis, mediis basi cordato-amplexicaulibus oblongis, floralibus cordato-ovatis calyce brevioribus, verticillastris approximatis, calyce patule piloso. — In graminosis et ad marg. silv. reg. infer., mont. et subalpinae. — Ad Medun distr. Kući (Sz), Lopate sub monte Vjetnik distr. Bratonožići (Ja), Lješko polje et circa Podgorica, Mratinje sub monte Maglić Pivski, Sinjac pr. coenob. Piva, Borkovići et Varda distr. Piva (Ro), circa Andrijevica (Ja, Ro), Pošćensko jezero supra Šavniki, Štirni do pr. Lukavica planina, Nikšićka župa (Ro).

### *Melissa* L.

4001. *M. officinalis* L. — In frutic., dumet. et lapidos. reg. infer. et montanae calidioris. — Danilovgrad (Pt), ad Rijeka (Pč, Ba, Ro), supra coenob. Morača (Ja), Viljuša, Njeguši, Simunj distr. Katunska nahija, Zagarać supra Danilovgrad, Kokoti distr. Lješanska nahija, coenob. Piva et circa Andrijevica (Ro), ad Novi Bar et in monte Rumija loco Osnovica (Do). — f. *villosa* BENTH. — In monte Lovćen (To).

### *Satureia* L.

4006. *S. montana* L. — In saxosis et lapid. reg. infer., mont. et subalp. — Grahovo, Mrčenov do sub monte Kom (Pč), in calc. pagi Medun distr. Kući (Sz), ad Cetinje (Kn), in monte Orjen (Ad), circa Njeguši (Gi, Ma, Ro), Brotnik (Ho), Bar (Ba), Viljuša, Nikšić et Podgorica; etiam in monte Vojnik (Ro), Bioče in valle fl. Morača, in valle fl. Mala Rijeka, ad Lopate distr. Bratonožići, in valle fl. Tara ad Han Garančić et Matoševo, supra coenob. Morača (Ja), Sutorman et Rumija supra Bar (Do).

\* — var. *subquadrangula* ROHL. XI. Beitr. 16. — Caulis evincter quadrangulus. — Torinje, Ilina glavica et Bogojeva glava pr. Njeguši (Pej, Ro).

4010. *S. subspicata* VIS. — In rupestribus reg. mont., subalp., rarius alpinae. — Lastva čevska supra pagum Vojnići (Pt),

Cetinje (Kn), Orahovo distr. Kuči (Sz), Radovče polje, Košljije et Brotnik (Ho), Njeguši, Lovćen, Viljuša, coenob. Piva, Mratinje sub monte Maglić, Konjsk planina, Šavniki sub monte Ivica (Ro).

— f. *Blavii* (ASCHERS.) MALÝ. — Folia superiora aristato-acuminata. — Popratit distr. Kuči (Ba), Čulice et Velji vrh pr. Njeguši (Ro).

\* — var. *scabrifolia* ROHL. — Folia utrimque pilis brevibus scabra. — Cum typo ad Njeguši loco Velji vrh et Krivača (Pej, Ro).

— var. *obcordata* (HORÁK) HAY. — Caulis humilis parum ramosus circumcirca puberulus; folia inferiora cuneato-ovata truncata, media late cuneata truncata, superiora late elliptica obtusiuscula. — Ad Rijeka (Ho), sub monte Balj et Jerinja glava prope Andrijevica, Dobri do in monte Durmitor (Ro).

\* — f. *transiens* ROHL. Acta bot. boh. II:17. — Caulis subglaber, solum folia infima obcordata, media et superiora ut in typo. — In monte Durmitor (Ro).

4012. *S. cuneifolia* TEN. — A praeced. dignoscitur: caules teretes unicum ramulis cano-puberuli, folia breviter hirta, floralia abbreviata floribus breviora vel aequilonga, cymae breviter pedunculatae vel subsessiles, spicae angustae elongatae, calyces hirti. — In rupestr. et lapid. reg. infer. et montanae calidioris. — Ad Bar (Ba), Krstac pr. Njeguši (Pej, Ro).

— f. *hirsutissima* VANDAS. — Densius et longius hirsuta. — Cum typo ad Zalazi pr. Njeguši (Ro).

#### *Micromeria* BENTH.

4014. *M. Julianæ* (L.) BENTH. — In rupestr. et lapid. reg. infer. mediterr. et mont. calidioris dicionis meridionalis usque ad 1000 m. — Ad Grahovo, Ostrog et Vir (Pč), in calcareis pagi Medun distr. Kuči (Sz), ad Cetinje (Kn), insula Vranina lacus Scodrani (Eb, Ba), ad Nikšić et Bar (Ba), Rijeka (Ho), Krstac pr. Njeguši (Gi, Ro), Velestovo, Malošin do et Čevo distr. Katunska nacija, circa Podgorica (Ro), in valle flum. Morača ad Bioče et supra coenob.; in monte Vjeternik usque ad pagum Klopot (Ja), Limljani et Karugj sub angustiis Sutorman (Do), Boljevići pr. Vir (Eb).

4020. *M. parviflora* (VIS.) RCHB. — Caules numerosi adscendentes tenues retrorsum pubescentes; folia inferiora ovata

vel cordato-suborbicularia breviter petiolata, media et superiora linearia sessilia margine ± revoluta subglabra vel pilis brevibus scabra; cymae longe pedunculatae 1—3-florae, floribus longe et tenuiter pedicellatis; calyx subglaber fauce breviter barbulatus, dentibus lanceolatis tubo triplo brevioribus; corolla rosea vel purpurea; nuculae obtusae. — In saxosis, lapidosis et ad muros reg. infer. mediterr., montanae, rar. subalpinae calidioris. — Ad Rijeka (Pt, Pč, Ba, Ho, Ro), Ceklin (Pt), Cetinje (Pč, Kn), Vir (Pč, Ro), Grahovo (Pč), Lješanska nahija (Ba, Ro), circa Bar (Ba, Ro, Do), Nikšić (Ba), Timar pr. Šavnik! (Ba), Njeguši (Gi, Ba, Ro), Krivača et Mali Šanik sub monte Lovćen! (Kš, Ro), Viljuša, Lastva čevska distr. Katunska nahija, Boljevići et Godinje pr. Vir, circa Rijeka (Ro), in monte Kosa et Rumija supra Bar usque ad 1400 m (Do), insula Vranina, in monte Rasovatac et Troica pr. Vir (Eb).

4023. *M. croatica* (PERS.) SCHOTT. — A praeced. dignoscitur foliis omnibus fere homomorphis, etiam mediis et superioribus ovatis densis, caulis humilioribus parum ramosis, calycis hirtelli fauce villosi dentibus tubo parum brevioribus. — In rupestr. et glareosis reg. subalp. et alp., rarius montanae. — Sinjavina planina in montibus Jablan vrh, Crvena ploča et Građište (Ba, Ro), Kamenjak (Ho), in monte Maglić Pivski, Vojnik et Durmitor (Ro), supra Grahovo et in monte Vučji Zub-Bijela Gora (Pč sub *M. Piperella*); supra Nikšić (Ba).

— f. *longidens* ROHL. V. Beitr. 103. — Calycis dentes longiores angustissime lanceolato-subulati. — Cum typo ad Goraško distr. Piva (Ro).

4027. *M. dalmatica* BENTH. — A sequente differt foliis breviter setuloso-pilosis, calyce dense setuloso-puberulo, dentibus patulis triangulari-subulatis tubo parum brevioribus. — In rupestribus reg. infer. et montanae calidioris. — Inter Kotor et Njeguši (Ba, Ro), ad latera montis Lovćen et ad coenob. Morača (Ba).

4029. *M. thymifolia* (SCOP.) FRITSCH. — In rupestr. reg. mont. et subalp. — Ad Bogetići supra Danilograd (Pt), supra Povije et inter Ostrog ad Nikšićka župa (Pč), Timar pr. Šavnik, Nikšić, Žanjev do sub monte Lovćen (Ba), Tičnjak (Ho), in monte Vojnik, Goraško et Mratinje distr. Piva, Šavnik sub monte Ivica planina (Ro), in monte Orjen (Visišani), supra coenob. Morača (Ba, Ja), in monte Pej distr. Vasojevići — 1500 m (Ja).

\*— f. *picta* ČELAK. et ROHL. (Acta botan. boh. I:3). — *Calycibus atro-violaceis.* — Cum typo in monte Orjen (Če).

*Calamintha* ADANS.

4031. *C. grandiflora* (L.) MCH. — In dumetis et silvis reg. mont. et subalp. (rarius alpinae) in tota dicione frequens. — var. *oblongifolia* ROHL. II. Beitr. 10. — Folia oblongo-ovata utrimque attenuata.

— var. *rhombifolia* ROHL. l. c. — Folia latitudine vix longiora basi truncata. — Rarius cum typo ad Milušina pećina distr. Katunska nahija (Ro).

4032. *C. officinalis* MCH. — In rupestr., frutic. et silvat. reg. infer., mont. et subalp. — Sub monte Durmitor (Pč), ad Cetinje (Kn), Ostrog (Ho), Bar (Ba), Njeguši, Simunj distr. Katunska nahija, supra coenob. Piva, ad ped. montis Balj pr. Andrijevica (Ro).

— f. *menthifolia* (HOST) HAY. — In monte Lovćen (Pej, Ro).

\*— var. *vilosissima* BENTH. — Velja greda supra Njeguši (Ro).

? 4033. *C. subnuda* (W. K.) HOST. — In saxosis ad Cetinje a cl. PANČIĆ et ad Spuž a cl. HORĀK indicata. Positus ad aliam speciem pertinet.

4035. *C. nepeta* (L.) SAVI. — In saxosis reg. infer. et montanae calidioris. — Nikšićka župa versus Gvozd (Pč), Ceklin (Ho), Bioće pr. Podgorica et in monte Vjetrenik distr. Bratonožići (Ja), Dubovik (Pej, Ro).

\*— var. *subisodonta* (BORB.) HAY. f. *hirsutissima* PANT. Adnot. 61. — Tota planta hirsutissima. — Ad Drušći pr. Rijeka (Ro), Bar (Do), Njeguši (Pej, Ro).

4039. *C. suaveolens* (S. S.) BOISS. — A sequente (cui valde affinis) dignoscitur verticillastris 5—9-floris, corolla rosea. — In campo ad Dedići distr. Primorje (Ba).

— var. *viridis* HELDR. et HAUSSKN. f. *montenegrina* (SAG.) HAY. — Caulis purpureus ad angulos pilosus; folia elliptica margine ciliata ceterum glabra; dentes calycini tubo longiores. — A cl. SAGORSKI e Monten. (OeBZ. LIII: 20) indicata.

4040. *C. alpina* (L.) LAM. subsp. *maioranifolia* (MILL.) HAY. (= *Calamintha patavina* HOST et aut. mons ten.). — A subspecie *eualpina* dignoscitur caule robustiore usque 40 cm alto, foliis longioribus (cca 1,5 cm), nervis lateralibus subtus modice prominentibus valde curvatis et demum fere parallele decurrentibus in dentibus desinentibus, dentibus calycinis superioribus quam inferiores vix latioribus sub fructu porrectis. — In rupestr. reg. infer. et montanae (an subalp.?). — Ad latera montis Dziebeze distr. Kuči (Sz), in decliv. montis Rumija pr. pag. Mali Mikulić (Ba, Do), ad Krstac pr. Njeguši (Gi), ad Njeguši et Cetinje (Kš, Ro), Mirkovi dolovi supra Njeguši (Kš), ad latera montis Lovćen (Vh, Ro), circa Bar, Boljevići pr. Vir et Podgorica (Ro), ad Podgora et Brčeli pr. Vir (Eb). Fortasse loca hic enumerata partim ad subsp. sequentem pertinent.

\*— — — f. *hirsutior* ROHL. IX. Beitr. 3. — Caulis patule dense que hispidus. — Ad latera montis Lovćen (Ro).

— — subsp. *hungarica* (SIMK.) HAY. — A praeced. differt nervis lateralibus subtus valde prominentibus demum in margine foliorum decurrentibus, dentibus calycinis superioribus quam inferiores duplo latioribus sub fructu patulis. — In calcareis reg. mont. calid. ad pag. Medun pr. Podgorica (Sz), in monte Durmitor (No).

— — subsp. *eualpina* HAY. — In rupestr. et glareosis reg. subalp. et alpinae in omnibus montibus; etiam in monte Lovćen (!).

— — — f. *hirsuta* PANT. — Caulis et calyces longe pilosi; folia margine et ad nervos ciliata. — Non raro cum typo.

4041. *C. acinos* (L.) CLAIRV. — In lapid., rupestr. et ad vias reg. infer., mont. et subalp. — Cetinje (Pt), Rijeka (Ho), Krstac pr. Njeguši (Ki, Ro), Kolašin, Kralje pr. Andrijevica (Ja), Viljuša, Podgorica, Šavniki, Danilovgrad, Njeguška planina (Ro).

— — f. *villosa* (PERS.) HAY. — Tota planta dense patuleque villosa. — Resna distr. Katunska nahija, Šavniki (Ro), ad Cetinje (Kn), Golo brdo supra Njeguši (Gi, Ma), ad latera montis Lovćen (Kš, Pej, Ro).

— — f. *lanceolata* MURB. — „Folia infima elliptica, media lanceolata in petiolum lamina dimidio tantum brevius sensim attenuata, floralia linearis-lanceolata rigida erecta; omnia sub-

integra vel apicem versus sparse denticulata; nervi foliorum floralium validi, medius in acumen rigidum productus" (MURB. Beitr. 59). — Cum formis intermed. sub monte Lovćen (Ro).

4044. *C. vulgaris* (L.) DRUCE. — In dumetis, in silvis et ad sepes reg. infer., mont. et subalp. — In valle Zeta sub Danilovgrad et Spuž (Pč, Ro), in incultis pagi Medun distr. Kući (Sz), ad Rijeka (Ho), ad coenob. Morača (Ja), circa Kolašin et Andrijevica (Ja, Ro), inter Bogetići et Nikšić; ad latera montis Vojnik; supra coenob. Piva et circa Viljuša (Ro). — — f. *glabrata* (VANDAS) HAY. — Cum typo sub monte Lovćen loco Stare lazine (Pej, Ro).

— — var. *parviflora* (ROHL. III. Beitr. 51) HAY. — Corolla 8—9 mm longa calyce aequilonga vel vix longior, calyx angustius tubulosus, ad faucem minus dilatatus. — In lapid. et gramin. reg. subalp. et alpinae. — Jevik sub monte Lovćen; Crvena greda sub monte Durmitor; supra coenob. Piva; Štirni do, Korita rovačka et Piperska Lukavica; in valle Perućica sub monte Kom (Ro).

### *Hyssopus* L.

4051. *H. officinalis* L. subsp. *pilifer* (GRIS.) MURB. — „Subglaber; folia caulina superiora et bracteae in aristam 2—3 mm longam exeuntia; inflorescentia laxa; bracteae calyce subaequilongae.“ — In rupestr. et dumet. reg. infer., montanae, rarius subalpinae. — Ad Vučje Gornje pr. Gvožđe Han sub monte Vojnik (Pt); inter Tušina et Bijela distr. Drobnjaci (Ba); Krivača, Radoljev vrh et Bjelice pr. Njeguši (Pej, Ro), Kokoti distr. Lješanska nahija; Goraško et Šarišnik supra coenob. Piva; Borkovići distr. Piva; Jasenovo polje sub monte Vojnik (Ro).

### *Origanum* L.

4052. *O. vulgare* L. subsp. *euvulgare* HAY. — In dumet. et silvaticis reg. infer., mont. et subalp. in tota dicione.

— — — f. *glabrescens* BECK. — Bracteae glabrae. — In incult. pagi Orahovo distr. Kući (Sz), sub monte Lovćen (Pej, Ro).

— — — f. *latebracteatum* BECK. — Spicae ovatae valde approximatae, bracteis late ovatis intense purpureis. — Ad latera montis Dziebeze distr. Kući (Sz), ad Cetinje (Kn), Krstac (Vh, Pej, Ro), Kralje pr. Andrijevica (Ja).

— — f. *prismaticum* GAUD. — Spicae cylindricae vel prismaticae 12—20 mm longae. — Dugi do et Krstačko polje pr. Njeguši (Pej, Ro). Etiam forma bracteis viridibus (= f. *pallidum* ROHL.).

— — subsp. *viride* (BOISS.) HAY. — Caulis et folia sparse pilosa; spicae racemoso-paniculatae; bracteae virides, flores albi. — Ivanov laz et Bukovica sub monte Lovćen (Pej, Ro), Dobrsko selo pr. Cetinje (Ba).

\*4053. *O. heracleoticum* L. — A praeced. differt (an specificē?) caulibus et foliis hirtis, bracteis calycibusque glandulosō-punctatis. — In saxosis ad descensum de Bijela Gora versus Krivošije (Pč).

### *Thymus* L.

\*4060. *Th. bracteosus* VIS. — In gramin. reg. mont. calidioris. — Circa Viljuša (Ro).

— — var. *neglectus* LYKA. — Rami floriferi pilis angulo recto-potentibus, in parte superiore longioribus, in inferiore brevioribus obsiti. — Cum typo ad Viljuša (Ro).

4062. *Th. striatus* VAHL. var. *acicularis* W. K. (= *Th. striatus* FRITSCH Excurs. Fl.). — In rupestr. et lapid. reg. mont., subalp. et alpinae in tota ditione.

— — var. *Velenovskýi* (ROHL. III. Beitr. pag. 65) RONN. — A *Th. aciculari* differt ramis floriferis saepissime longioribus goniotrichis, pilis brevibus; inflorescentia elongata, verticillo-immo remoto; labio calycis superiore quam inferius longiore tubum triplo superante; dentibus superioribus calycis subulatis. — In pascuis reg. alp. supra Barni do in declivibus montis Ljevno prope Javorje planina cca 2000 m (Ro).

— — var. *oriensi* RONN. — „Differt a *Th. aciculari* ramis perfecte goniotrichis, capitulis parvis, foliis floralibus crassinerviis, labio calycis superiore tubum aequante aut sesquies vel duplo superante quam labium inferius paulo longiore.“ — Cum typo in monte Durmitor, Lovćen, Lukavica planina, Vojnik et Kapa njeguška; etiam ad Podgorica, Čevo distr. Katunska nahija et ad Krstac pr. Njeguši (Pej, Ro), Rumija supra Bar (Lo).

\*— — var. *lovćenicus* ROHL. et RONN. — Differt a *Th. oriensi* caulis internodiis superioribus (1—2) holotrichis. — Cum praeced. sub monte Lovćen locis pluribus: Longor rupa,

Duge, Šanički vrh et Krstac (Ro, Pej); in monte Rumija supra Bar (Do).

\*4074. *Th. longidens* VELEN. var. *dessareticus* RONN.  
— E sect. *Eurepentes*: caules procumbentes basi lignosi; rami floriferi simplices holotrichi breviter retrorso-pilosii; folia anguste lanceolata 8—9 mm longa, cca 2 mm lata, in media parte latissima, subcoriacea basi ciliata glandulis parvis sparsim punctata, non elevatim nervosa, nervis camptodromis; pedicelli breviter retrorso hirti, pilis longis patentibus intermixtis; calyx parvus (cca 3,5 mm longus) villosus, tubo quam labium breviore, dentibus tenuiter acuminatis patenter et longe ciliatis. — In gramin. reg. subalpinae ad Borkovići distr. Piva cca 1400 m (Ro).

\*4083. *Th. moesiacus* VELEN. var. *adenocalyx* RONN.  
— Pseudorepens vel eurepens; caules simplices prostrati radicantes, rami floriferi simplices tenues unacum stolonibus undique breviter retrorso-pilosii, folia glabra ramorum sterilium basalia rosulata subulata, media et superiora maiora obovata vel obovato-spathulata 10—12 mm longa, 3—5 mm lata margine subrevoluta, basi margine ciliata nervis parum prominulis; folia caulis procumbentis et surculorum sterilium maiora, sparse et minute glandulosopunctata; bracteae foliis similes; pedicelli pilis et glandulis stipitatis obsiti; calyx breviter late campanulatus cca 3 mm longus, circumcirca villosus, labiis tubo sublongioribus dentibus superioribus subulato-attenuatis. — In gramin. et lapid. reg. mont. et subalp. — Circa Andrijevica locis pluribus: in valle fl. Lim, ad latera montis Žoljevica et Jerinja glava (Ro).

\*4085. *Th. Malýi* RONN. — A praeced. dignoscitur praesertim ramis floriferis dense ± patenter villosis, foliis in faciebus dense longeque pilosis. — In rupestr. et gramin. reg. montanae et subalp. — Ad Šavnički sub Ivica planina, ad Bukovica sub monte Durmitor; Goraško distr. Piva cca 800—1400 m (Ro).

\*4087. *Th. Jankae* ČEL. var. *serbicus* PETROVIĆ. — In alp. montis Durmitor loco Savin Kuk cca 2000—2300 m (De, Si).

4105. *Th. pulegioides* L. subsp. *montanus* (W. K.) RONN. — A *Th. ovato* MILL. differt foliis crassiusculis nervis subtus conspicue prominentibus, basi non vel sparse ciliatis, calycis tubo glabro vel in ventre piloso, dentibus superioribus

glabris. — In gramin. reg. subalp. — Carine et Konjuhe sub monte Kom; Murino sub Velika pr. Andrijevica (Ba).

— var. *ruplicola* H. BRAUN. — Calycis tubus in ventre pilosus, dentes superiores glabri; folia elliptico-oblonga, inflorescentia capitulata, calyx ruber. — Ad Kralje pr. Andrijevica (Ja).

\*— var. *amplificatus* (SCHUR) RONN. — A praeced. dignoscitur foliis multo maioribus 13—18 mm longis, 7—9 mm latis, ovatis vel ovato-rotundatis, inflorescentia longe spicata. — In valle flum. Tara ad Kolašin (Ja).

4108. *T. h. alpestris* TAUSCH (= *T. sudeticus* OPIZ). — A cl. RONNIGER in HAYEK Prodromus II: 375 e Monten. indicatus. Ad Ponikvica, Maganik et Pavlova livada (Ho).

4109. *T. longicaulis* PRESL. — In monte Pivljan (Ja), ad Bar, Ulcinj, Matoševo pr. Kolašin; Šavnik sub monte Ivica planina (Ro).

— var. *Freynii* RONN. — Folia omnia linearispathulata vel linearia 1—2 mm lata. — Rarius cum typo (Ro).

— var. *intermedius* POSP. — Differt caule robustiore, foliis latioribus (10—17 mm longis, 3—7 mm latis); calyx saepe subglaber glandulis stipitatis nullis. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

\*— var. *salonianus* RONN. — Planta robusta; folia superiora et media ramorum floriferorum et folia surculorum sterilium usque ad 12 mm longa, 4 mm lata; calyx 3—4 mm longus aequo longe pilosus et copiose stipitato-glandulosus. — In monte Lovčen; Šavnići sub Ivica planina; in monte Balj et ad Andrijevica (Ro), Velki Mikulić supra Bar (Lo).

\*— var. *scabrifolius* ROHL. et RONN. — Folia in facie superiore papillis brevissimis dense tecta; calyx pilosus et glandulis stipitatis sparse obsitus; pedicelli retrorse pubescentes et glandulis stipitatis sparse praediti. — Kunji do sub monte Lovčen, Goraško distr. Piva (Ro).

\*— var. *dalmaticus* (RCHB.) RONN. — Folia ramorum floriferorum plerumque angusta; calyx (dentibus inferioribus exceptis) glaber. — Krstac et Velje osoje ad Njeguši (Pej, Ro).

4110. *T. Rohlena* VELEN. — E sect. *Eurepetens* vel *Pseudorepentes*: a praeced., cui affinis et habitu similis, dignoscitur praesertim calyce 3 mm longo brevissime campanulato.

glandulis rubellis magnis dense consperso praeterea unacum pedicellis glandulis pedicellatis (microscopicis!) dense vestito, foliorum nervis crassiusculis subtus magnis prominuluis; stolones longe repentes radicantes ramosi remote foliosi unacum caulibus florentibus bifariam pilosi vel fere glabri; folia omnia conformia oblongo-linearia glabra basi parce ciliata glabra margine subrevoluta glandulis rubellis magnis crebre conspersa; calycis dentes inferiores superioribus brevissime late triangularibus paulo breviores. — In gramin. et pasc. reg. infer. et montanae calidioris. — Ad Ulcinj (locus classicus!), praeterea etiam ad Podgorica, Čevo et Rudine nikšićke distr. Piva; ad latera montis Lovčen et ad Velje osoje pr. Njeguši (Ro, Pej), inter Cetinje et Rijeka (Kš). (Vidit RONNIGER; confer HAYEK Prodr. II: 377 adnotat. 1.)

\*— subvar. *dilatatus* RONN. — Planta robusta; folia per magna et latissima, ramorum floriferorum 9 mm lata, stolonum 15—17 mm longa, 5—7 mm lata. — Non raro ad Njeguši et ad latera montis Lovčen: Kapa njeguška, Velje osoje et Ždrije (Pej, Ro), Rumija supra Bar (Lo).

\*4113. *Th. longicaulis* × *striatus* = *Th. Korbii* RONN. — Inter parentes in monte Lovčen et in monte Kapa njeguška supra Njeguši (Pej, Ro).

\*4116. *Th. zygiformis* H. BR. — In monte Visitor supra Andrijevica (Lo).

4117. *Th. balcanus* BORB. — Caulis longe reptans; rami floriferi imperfecte goniotrichi, distiche tantum pilosi, sub inflorescentia holotrichi; folia subcoriacea vel coriacea glabra [vel in var. *Vandasii* (VELEN.) RONN. supra pilosa], infima parva oblonga vel elliptico-oblonga, 4—5 mm longa, 1—1,5 mm lata, ad basin ramorum florifer. dense conferta, media spathulato-rotundata vel oblongo-spathulata, floralia rotundato-elliptica vel elliptica; folia surculorum sterilium margine a basi usque ad  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  ciliata; nervi pseudomarginati (vel in var. *Beckii* RONN. plane marginati), in formis umbrosis satis tenues (confer RONNIGER in HAYEK Prodr. II: 380 adnot. 1!); calyx 3 mm longus in dorso glaber in ventre pilosus. — In gramin. et pasc. reg. subalp. et alpinae in omnibus montibus dicionis septentrionalis frequens. — Maglić Pivski, Ledenica, Ranisava, Ivica planina, Durmitor, Bukovica sub monte Durmitor, Vojnik, Korita rovačka, Štirni do, Piperska Lukavica,

Javorje planina, Kom Vasojevički, usque ad 2200 m (Ro), in monte Kom Kučki (Ho). E montibus dic. merid. (Lovćen et Rumija) adhuc non vidi.

\* — var. *decorus* RONN. — Volujačko jezero; Vlasuja planina cca 2000 m (Havelka fide MALÝ).

\* — var. *Vandasii* (VELEN.) RONN. — In alp. montis Maglić Pivski et Durmitor (Ro, De, Si), in pratis montanis Krivi do distr. Piva (De, Si).

— var. *Beckii* RONN. — In alp. montis Maglić Pivski et Durmitor (Ro).

\* — var. *brevidens* (VELEN.) HAY. — Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

\* — var. *montenegrinus* ROHL. et RONN. — Rami floriferi in parte infer. subglabri, in parte super. brevissime gonostrichi; folia glabra utrimque glandulis pellucidis dense punctata. — Cum typo in monte Vojnik et sub monte Durmitor (Ro).

### *Lycopus* L.

4119. *L. europaeus* L. — In humidis, fossis et ad ripas reg. infer. et subalp. — Ad Danilovgrad (Pt, Ro), circa Vir (Pč, Ro), circa Bar, Ulcinj, Podgorica et supra Šavniki (Ro), Andrijevica (Ja, Ro), supra coenob. Morača (Ja).

— f. *mollis* (A. KERN.) BRIQU. — Caulis longe molliter villosus; folia subtus dense pubescentia vel villosa. — Cum typo ad Bar, Ulcinj et Podgorica (Ro).

\*4120. *L. exaltatus* L. f. — Ad rivulum pr. coenob. Piva (Ro).

### *Mentha* L.

4121. *M. pulegium* L. — In humidis, incultis et in fossis reg. infer. et montanae. — Ad rivulum Sušica pr. Danilovgrad (Pt), ad Vir (Pč), Rijeka (Pč, Ba, Ho, Kn), Cetinje (Kn), Plavnica (Sz), circa Podgorica, Nikšić et Viljuša (Ro).

— var. *erecta* WIRTG. f. *subhirsuta* (H. BR.) HAY. — Caulis, petioli calycesque dense pilosi. — Cum typo ad Plavnica (Sz), Golo brdo, Krstačko polje et Kunji do ad Njeguši (Pej, Ro), in lacu Skadarsko jezero (f. *communis* TOP.) (Ro).

\* — var. *subtomentella* H. BR. — Caulis erectus dense appresse pilosus; folia parva vel mediocria, imprimis inferiora

pilis patulis albidis dense vestita. — Ad Podgorica et inter Nikšić et Bogetići (Ro).

\*— f. *hirsuta* PÉR. — Caulis patule hirsutus. — In aren. marit. ad Bar (Do).

4122. *M. arvensis* L. subsp. *austriaca* (JACQ.) BRIQU. f. *deflexa* (DUM.) TOP. — In pascuis humidis reg. mont. et subalp. — Šavnik; Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

4127. *M. aquatica* L. — In recessibus lacus Scodrani (Pč).

4131. *M. spicata* HUDES. f. *minutodonta* (TOP.) HAY. — Folia oblongo-lanceolata dentibus accumbentibus minutis. — E Monten. a cl. TOPITZ indicata (Ba).

4132. *M. longifolia* L. subsp. *longifolia* BRIQ. — In fossis, humidis et ad vias reg. infer., mont., rarius subalpinae. — Ad Sinjac pr. Vir et sub Danilograd (Pč), Andrijevica (Ho), Čevo distr. Katunska nahija; Mratinje sub monte Maglić (Ro).

— f. *Eisensteiniana* (OPIZ) BRIQU. — In pinguibus Mokra sub monte Dziebeze distr. Kuči (Sz).

— f. *anisodons* TOP. — Folia oblongo-elliptica cca 6 cm longa, 1,8—2,5 cm lata, acuminata subtus tomentella valde irregulariter acute dentata; spicae graciles. — Ad Njeguši (Sa).

— subsp. *grisella* BRIQU. (= *M. mollissima* BORKH. et aut. monten.). — Ad Vir et Rijeka (Pč, Pt), Njeguši, Višnjuša, Šavnik, coenob. Piva, mons Vojnik, Plavnica (Ro), Cetinje (Kn), Kolašin et Matoševo in valle fl. Tara (Ja), Bar (Do).

— ad f. *Ehrenbergii* BRIQU. verg. — Cum praeced. ad Njeguši (Ro, Pej).

— f. *montenegrina* TOP. — Ad Belveder pr. Cetinje (Bierbach).

— f. *paramecophyllum* TOP. — Ad Djinova brda (Bierbach).

— var. *Wierzbickiana* (OPIZ) HAL. f. *terasia* TOP. — Ad Cetinje (Bierbach).

\*4133. *M. microphylla* C. KOCH. var. *illyrica* (BORB. et H. BR.) HAY. — A praeced. dignoscitur imprimis pilis

saltem pro parte taeniatis et ramosis (nec simplicibus). — In humidis reg. infer. ad Rijeka (Kn).

4135. *M. longifolia*  $\times$  *rotundifolia* = *M. niliaca* JACQ. f. *Burghardiana* OPIZ. — Caulis valde ramosus; folia magna 4—10 cm longa late oblongo-elliptica acuta supra viridia dense breviter pilosa, subtus cano- vel albido-tomentosa, acute serrata dentibus apice saepe subrecurvis; spicae compactae vel basi subinterruptae 4—7 cm longae. — In pascuis pinguibus Mokra sub monte Dziebeze distr. Kuči (Sz).

## Globulariaceae

*Globularia* L.

4140. *G. Willkommii* NYM. — In lapid. et gramin. siccis reg. mont. et subalpinae. — Nikšićka župa (Pč), in monte Lisa pr. Andrijevica (Ba); Radovče polje et Konjsk planina (Ho), ad Viljuša et in monte Vojnik (Ro).

4142. *G. cordifolia* L. subsp. *bellidifolia* (TEN.) HAY. — In lapid. et rupestr. reg. mont., subalp. et alpinae in ditione frequens.

— subsp. *cordifolia* (L.) HAY. — Cum typo.

## Plantaginaceae

*Plantago* L.

4145. *P. psyllium* L. — In locis apricis et in arenos. marit. ad Ulcinj (Ro).

\*4147. *P. indica* L. — In arenosis reg. infer. medit. — Topolica pr. Bar (Do).

4151. *P. altissima* L. — In salsis reg. mont. ad Nikšić (Ro), Bar (Do).

4152. *P. lanceolata* L. var. *communis* SCHLD. — In gramin., pratis, ruderat. et ad vias reg. infer., mont. et subalp. in tota ditione.

— var. *sphaerostachya* M. K. — A typo differt scapo minus sulcato, sed dense appresse sericeo, foliis angustioribus 3—5-nerviis, spicis post anthesin globosis vel ovatis, bracteis calyce-brevioribus. — Ad Cetinje (Kn), in monte Lovćen (To).

— var. *eriophylla* DECNE. — Folia breviora oblonga vel oblongo-lanceolata ut scapi tenues, imprimis basi dense albo-

lanata, spicae ovatae vel globosae pallidae. — In lapid. et are-  
nosis reg. infer. et mont. calidioris. — Circa Podgorica, Nje-  
guši et Nikšić (Ro), ad Cetinje (Kš).

— var. *desertorum* VELEN. — Ad Podgorica (Ro).

\*4153. *P. lagopus* L. — In lapid., inundatis et ad vias  
reg. infer. mediterr. — Circa Bar (Ro, Do). (Etiam in gramin.  
montis V. Maglić distr. Kuči a cl. SZYSZYLOWICZ indicata;  
verosimiliter introducta e reg. inferiore, nam haec species in  
reg. alp. non crescit).

4154. *P. major* L. — In pascuis, fossis, ad vias et ripas  
reg. infer., mont. et subalp. in tota dicione.

— f. *intermedia* (GILIB.) DECNE. — Annua; folia bre-  
viter petiolata solo adpressa, basin versus grosse dentata; scapi  
prostrati vel adscendentibus; spica brevis. — In pratis Korita  
dictis sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Ba).

— var. *minima* (DC.) WIMM. GRAB. — Annua, nana;  
folia longe petiolata ovata integerrima vel parce denticulata  
unacum scapis + dense appresse pilosa. — In pratis humidis  
ad Žabljak sub monte Durmitor (Ro).

— var. *paludosa* (LED.) BÉGUIN. — In gramin. ad pag.  
Kovčice sub monte Durmitor (Pt), Gornje polje pr. Njeguši  
(Pej, Ro).

\*4154b. *P. pauciflora* GILIB. — Ad vias pr. Njeguši  
(Pej, Ro).

4155. *P. reniformis* BECK. — A praeced., cui similis et  
affinis, dignoscitur imprimis scapis folia 2—3-plo superantibus,  
foliis longe petiolatis reniformibus vel suborbicularibus, basi  
saepe cordatis, antheris albis et capsulae loculis monospermis.  
— In pascuis reg. alp. et subalp. dic. septentrionalis. — In  
monte Ranisava et ad Bukovica sub monte Durmitor, in mon-  
tibus Ledenica et Maglić Pivski; Štavna sub monte Kom; Sjeki-  
rica planina supra Andrijevica (Ro), Poljana pr. Volujačko  
jezero (Ma).

4157. *P. media* L. — In pratis et gramin. reg. infer.,  
mont. et subalp. in tota dicione.

— f. *plicata* (SCH. N. K.) BECK. — Folia lata late acumi-  
nata magis pilosa; filamenta obscure violacea, corolla nivea. —  
In pasc. montis Kom (Pt).

4158. *P. argentea* CHAIX. — In gramin. et lapid. reg. mont., subalp. et alpinae. — Carine sub monte Kom (Pt), ad Medun supra Podgorica et in pascuis pinguibus Mokra sub monte Dziebeze distr. Kuči (Sz), Konjsk~~s~~planina (Ho), in monte Lovčen (Vh, Pej, Ro), in monte Jastrebica (Ad), supra Njeguši (Pej, Ro), ad Šavniki, Borkovići et Črtov do distr. Piva, in valle Perućica sub monte Kom; Sjekirica~~s~~planina, Zeletin supra Andrijevica, Kom Vasojevički (Ro), Sinjavina planina (Ba, Ro), in monte Durmitor jugo Šljeme (Pč), Čafa velja pr. Rikavac (Df), Rumija supra Bar (Do), supra lacum Crno jezero in monte Durmitor, Piva planina pr. Nedajno (De, Si).

— f. *capitata* (HOPPE et HORNSCH.) BÉGUIN (= var. *gracilis* ROHL. V. Beitr. 86). — Folia anguste lanceolata 3-nervia; scapus gracilis cca 10 cm altus foliis parum longior; spica breviter ovata. — Davidov do supra Njeguši (Pej, Ro).

4159. *P. montana* HUDS. subsp. *attrata* (HOPPE) PILG. — In pascuis, apricis, ad nives deliquescentes reg. subalp. et alpinae. — In monte Jastrebica et Bijela Gora ad fines Hercegovinae (Pt, Pč, Ba, Ro), Javorje planina (Pč), Crna planina (Ba), Volujačko jezero (Ma), Maglić Pivski; Bjelastica et Zeletin supra Andrijevica (Ro), inter Vermoš et Širokar distr. Kuči (Df).

— var. *angustifolia* HAL. et BALD. — Humilis; folia glabra rigida valde angusta; spica pauciflora; bracteae acuminatae late ovatae in lateribus pallidae. — In herb. alp. summi montis Žijovo distr. Kuči (Ba), in monte Maglić Pivski (Ro).

\*— var. *durmiturea* NOVÁK in litt. ad me. — Bracteae late rotundatae vel late rhomboideae paulum latiores quam longae in lateribus obscure fuscae glabrae, carina interdum parce pilosa, folia angusta 6—10 mm lata et usque ad 65 mm longa supra crispula villosa vel lanuginosa subtus ad nervos appresse sericeo-villosa, scapi suberecti foliis duplo longiores patenter lanuginosi, spicae densiflorae 20—50-florae globoso-ovatae. — In pascuis alpinis montis Durmitor (No); Čirova et Ledena Pećina in monte Durmitor (De, Si).

4163. *P. Bellardii* ALL. — In lapid., arenos. et in pascuis reg. infer. mediterr. — Circa Bioče in valle fl. Morača; ad coenob. Duga et in distr. Bratonožići (Pt), circa Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica et Danilovgrad (Ro).

4165. *P. coronopus* L. — In apricis, incultis et lapid. reg. infer. dic. medit. — Ad Bioče (Pt), circa Bar, Rijeka, Podgorica, Spuž et Danilovgrad (Ro).

4167. *P. carinata* SCHRAD. — In rupestr., in locis apricis et lapid. reg. infer., mont. et subalp. frequens. — Šavnik (Pt, Ro), Cetinje (Pč, Kn), Grahovo (Pč), Njeguši (Sz, Pej, Ro), Rijeka (Ho), Kostića distr. Kući; Durmitor, Gvozd-Han et Nikšić (Ba), in monte Vojnik (Ba, Ro), Višljuša, Borkovići distr. Piva, Lastva čevska et Velestovo distr. Katunska nahija; Podgorica; etiam in monte Lovćen (Ro), Krivi do distr. Piva (De, Si).

— f. *bidens* MURB. Beitr. 51. — Folia plurima in utroque margine dente subulato 3—5 mm longo instructa. — Cum typo et cum f. *longebracteata* KOCH ad Podgorica (Ro).

## Gentianaceae

### *Centaureum* HILL.

4170. *C. spicatum* (L.) FRITSCH. — In fossis et locis humidis reg. infer. mediterr. — Ad Vir (Pč), Plavnica (Ro), Bar (Ro, Do).

4172. *C. umbellatum* GILIB. — In graminosis, du mosis et ad marg. silvarum reg. mont. et subalpinae. — Circa Ploča et Kovčice (Pt), supra coenob. Morača (Pč, Ja), Krs tačko polje (Ho, Pej, Ro), ad latera montis Vojnik et Lovćen (Ro), circa Andrijevica et Kralje (Ja, Ro), Bar, Rumija (Do). Verosimiliter loca hic enumerata (saltem partim) ad subspec. sequent. pertinent.

— subsp. *transiens* (WITTR.) RONN. — „Calyx sub flore corollae tubum fere aequans; corollae laciniae longitudine  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$  tubi; antherae 2—3 mm longae filamentis aequilongae vel sublongiores; inflorescentia densa.“ — Ad Njeguši et Podgorica (Ro).

— f. *pallens* (FREYN) K. MALÝ (an f. *pallidiflorum* ROHL. V. Beitr. 91). — Corollae albidae. — Ad Podgorica et in monte Bogojeva glava pr. Njeguši frequens (Ro).

4175. *C. tenuiflorum* (HOFFMG. et LK.) FRITSCH (confer ROHLENA V. Beitr. 88). — In fossis, inundatis et pratis humidis reg. infer. mediterr. — Ad Rijeka (Pt), circa Vir, Plavnica, Podgorica et Bioče (Ro), Bar (Do).

4176. *C. pulchellum* (SW.) DRUCE. — In aren. et pratis humidis, in fossis reg. infer., mont., rarius subalpinae. — Circa Danilovgrad (Pt, Pč), ad lacum Riblje jezero sub monte Durmitor (Pt), ad Boljevići et Vir (Pč, Ho), circa Rijeka (Kn, Ho), Bukovica sub monte Durmitor (Ba), Drušići distr. Lješanska nahija, Podgorica et Andrijevica (Ro).

4177. *C. maritimum* (L.) FRITSCH. — In pratis et gramin. reg. infer. medit. — In valle fl. Zeta circa coenob. Ždrebani et ad Martinići (Pt), in arenosis et lapid. planitiei ad Podgorica: Lješko polje et Gornja Zeta (Ro).

*Gentiana* L.

4178. *G. lutea* L. subsp. *symphyandra* MURB. — Antherae inter se coalitae; stigmata elongata filiformia post anthesin non revoluta. — In pratis et gramin. reg. alpinae. — Crna planina (Pt), Kom, Sinjavina, Durmitor (Pt, Pč, Ro, Ba), Javorje planina (Pč), Korita rovačka (Ho, Ro), Žijovo planina, Rogam et Varda (Ba), Maglić Pivski, Lukavica planina; Štirni do, Bukovica sub monte Kom (Ro).

4179. *G. punctata* L. — In pascuis alp. in monte Bjelasica planina supra Kolašin cca 2000 m (Ro).

4181. *G. cruciata* L. — In gramin., pascuis et dumetis reg. mont., subalp. et alpinae in tota dicione frequens.

\*4182. *G. asclepiadea* L. — In silvaticis, pratis et dumet. reg. subalp. et alp. in omnibus mont. dic. sept. et septentr. orient. — E montibus dic. merid. Lovćen et Rumija adhuc non vidi.

4183. *G. pneumonanthe* L. — In salicetis ad lacum Scodranum (Pč).

4185. *G. Kochiana* PERR. et SONG. — In pratis et pascuis reg. alpinae dic. septentr. — In monte Kom (Pt, Ro, Lo), Gradište supra Kolašin (Ba), in monte Maglić Pivski; in montibus Sjekirica, Bjelastica et Zeletin supra Andrijevica (Ro), Štavna sub monte Kom (Ja), in monte Prokletija ad confines Albaniæ (Df).

4188. *G. verna* L. — In pratis et pascuis reg. subalp. et alp. in omnibus montibus dicionis septentrionalis frequens. — E mont. dic. merid. (Lovćen et Rumija) adhuc non vidi.

— f. *angulosa* WAHLB. — In monte Kom et Visitor pr. Andrijevica (Lo).

— subsp. *tergestina* (BECK) HAY. — Volujačko jezero sub monte Maglić (Ma), Ališnica in monte Durmitor (Ht), Ledena et Čirova pećina in monte Durmitor (De, Si), in monte Kom Vasojevički (Lo). Verosimiliter etiam alibi.

4189. *G. utriculosa* L. — In gramin., pascuis, et lapid. reg. mont., subalp. et alpinae in tota dictione frequens. Etiam in monte Lovćen!

— f. *montenegrina* BECK et SZ. — Nana uniflora, calyx minus alatus. — Ad latera montis Dziebeze distr. Kuči (Sz).

4192. *G. ciliata* L. — In calcareis supra Njeguši cca 950 m (Pej, Ro).

4193b. *G. levicalyx* ROHL. (= *G. campestris* var. *laevicalyx* ROHL. V. Beitr. p. 87; *G. durmitoreum* ROHL. in sch.; ? *G. campestris* PANČ.). — Floribus tetrameris et calycis laciniis valde inaequalibus (duobus latis angustiora tegentibus) in affinitatem *G. campestris* spectat, sed differt floribus multo minoribus (cca 12–15 mm), calycis laciniis pro more angustioribus acutioribusque margine levibus (nec papilloso-ciliatis), ovario longiuscule stipitato utrimque attenuato; flores (in sicco!) lutescentes videntur; an semper? — In pascuis alp. montis Durmitor loco „Savin Kuk“. — Planta ulterius observanda, nam legi tantum specimen unicum.

4194. *G. crispata* VIS. — Caulis erectus ramosus; folia basalia oblongo-spathulata obtusa, caulinis oblonga internodiis aequilonga vel longiora, superiora acuta; calyx 5-fidus segmentis fere aequilatis margine undulato-crispis et atratis; corolla violacea (rarius flavescentia vel alba) fauce fimbriatim barbata; ovarium stipitatum. — In praeruptis et pascuis reg. subalp. et alp. in omnibus montibus (etiam in monte Lovćen!) frequens.

Secundum cl. Ivo PEVALEK\*) (Zagreb) occurunt quatuor subspecies:

\*1. subsp. *Bošnjakii* PEV. l. c. p. 327. — „Caulis parce vel non ramosus; internodia pauca; folia internodiis longiora vel aequilonga, media acuta vel obtusa; flores parvi 12–18 mm

\*) Confer: Dr. Ivo PEVALEK: Prilog poznavanju oblika Gentiana crispata in Glasnik Prirodoslovnog društva Zagreb 1939.

longi; gynophorus brevis ad maximum 1 mm longus". — In regione alpina. — Durmitor: Savin Kuk (Boš).

\*2. subsp. *Visianii* PEV. l. c. p. 328. — „Habitus congestus; caulis jam a basi vel tantum in parte super. ramosus; folia inferiora internodiis longiora vel aequilonga (rarius breviora), media acuta vel obtusa internodiis longiora; flores 19—30 mm longi; gynophorus 1—3 mm longus". — In regione montana frequens.

\*3. subsp. *amblyphylla* BORB. — „Caulis solum in parte superiore ramosus; folia caulina omnia obtusa rarius media acutiuscula internodiis 3—5-plo breviora; flores 19—30 mm longi; gynophorus 1—3 mm longus". — In regione mont., rarius subalpina. — In monte Vila distr. Kuči (Ba), ad Kolašin (Ja), Pepići pr. Andrijevica (Lo). Verosim. etiam alibi.

\*4. subsp. *autumnalis* PEV. l. c. p. 332. — „Habitus congestus; caulis jam a basi valde ramosus; folia internodiis ± aequilonga vel ad maximum 2-plo breviora, media acuta". — In reg. mont. vel subalp. — Pitomine sub monte Durmitor (Boš). Forsan etiam alibi.

4195. *G. germanica* WILLD. subsp. *austriaca* (A. et J. KERN.) HAY. — In pratis pinguis reg. subalp. dic. septentrionalis. — Ad Kolašin (Pč), supra Tušina distr. Drobnjaci; Carine sub monte Kom; in monte Lisa pr. Andrijevica (Ba), Ivica planina supra Šavnik (Pč, Ba). Verosimiliter loca hic enumerata aut ad var. *lutescens* (VELEN.) HAY. aut ad subsp. *carpathicam* (WETTST.) HAY. pertinent.

— — — var. *lutescens* (VELEN.) HAY. — Jerinja glava, Visitor supra Andrijevica (Ro, Sk), Pepići pr. Andrijevica (Lo).

### *Sweertia* L.

4199. *S. perennis* L. — In humidis et spongiosis reg. subalp. — Ad pagum Kovčice sub monte Durmitor (Pt), circa lacum Riblje jezero sub monte Durmitor (Pč).

### *Blackstonia* HUDS.

4200. *B. perfoliata* (L.) HUDS. — In asperis, glaucoisis et inter dumeta reg. infer. et montanae calidioris. — Ad Ploča et Rijeka (Pt, Ro), Limljani distr. Crmnica; Grahovo (Pč), Medun distr. Kuči (Ba), circa Bar, Ulcinj, Boljevići pr. Vir et Podgorica (Ro).

4201. *B. serotina* (KOCH) BECK. — In humidis et graminosis reg. infer. et montanae calidioris. — Ad Rijeka et Njeguši (Ro), in monte Kom Kučki? (Ho).

— var. *aestiva* K. MALÝ. — In pratis arenosis ad Bar (Do).

### *Microcalia* HOFFMG et LK.

4202. *M. filiformis* (L.) HOFFMG et LK. — In pratis humidis reg. infer. medit. ad Topolica pr. Bar (Ro).

## ***Menyanthaceae***

### *Menyanthes* L.

4203. *M. trifoliata* L. — In humidis et paludosis reg. subalp. — Circa lac. Riblje et Crno jezero sub monte Durmitor (Pt, Ro); lacus Pošćensko jezero supra Šavnik (Ro), in lacu montis Lovčen (Pej, Ro).

### *Nymphoides* HILL.

4204. *N. flava* HILL. — In recessibus lacus Scodrani ad Rijeka, Vir et Plavnica (Pč, Eb, Ro, Ja).

## ***Apocynaceae***

### *Vinca* L.

\*4205. *V. major* L. — In fruticetis reg. infer. dic. mediter. ad Ulcinj (Ba). (An subsppontanea?)

## ***Asclepiadaceae***

### *Periploca* L.

4213. *P. graeca* L. — In dumetis ad ripam lacus Scodrani (Pč, Ro).

— f. *vestita* ROHL. V. Beitr. 84. — Caulibus, petiolis et foliis puberulis. — Cum typo ad Plavnica (Ro).

### *Cynanchum* L.

4218. *C. Huteri* (VIS. et ASCHERS.) PITTONI. — Dignoscitur imprimis corolla flavo-virescente intus pilosa laevigata triangularibus. — In fruticetis, olivetis et saxosis reg. infer., montanae, rarius subalpinae. — Carine sub monte Kom

(Ba), ad Bar (Ba, Ro), circa Ulcinj, Podgorica et Njeguši (Ro), Drežnica sub Konjsk-planina; Štirni do pr. Lukavica planina (Ro), ad Cetinje (Ld, Ki).

— f. *albanicum* (BALD.) HAY. — Petoli tenuiter tomentosi; cymae + pedunculatae. — Petkove rupe sub monte Lovćen (Pej, Ro).

4221. et 4222. *C. vincetoxicum* (L.) PERS. (= *Vincetoxicum hirundinaria* MED.; *V. officinale* MCH.; *V. contiguum* GREN. GODR.). — In rupestr. et gramin. reg. subalp. — In sax. „Orlova skala“ sub monte Kom (Pt).

— f. *laxum* (BARTL.) HAY. — Kamenjak (Ho).

— var. *nivale* (BOISS. et HELDR.) HAY. — Caulis humilior (10–50 cm altus); folia brevissime petiolata, ovata vel lanceolata; corolla ochroleuca, maleolens. — In monte Lovćen (Pč, Ho, Ba, Ro), in monte Soko distr. Kući (Ba), in monte Rumija et Lonac supra Bar; Vratlo supra Kolašin (Ba), Vun-saj pr. Gusinje (Df), ad Njeguši (Pej, Ro), Savin Kuk in monte Durmitor; Pivska planina (De, Si).

— var. *Daniloi* (ROHL. IV. Beitr. 70). HAY. — Caule elato gracili pruinoso, foliis basi rotundatis vel in petiolum longiusculum + attenuatis non cordatis pertenuibus diaphanis discoloribus subtus glaucis, mediis oblongis longe acuminatis, supremis anguste lanceolatis, floribus candidis. — In dumetis umbrosis reg. infer. mediterr. ad Danilovgrad (Ro).

\*4226. *C. fuscatum* (VIS.) LK. — In rupestr. reg. subalp. ad Kamenjak (Ho).

### *Marsdenia* R. BR.

\*4227. *M. erecta* (L.) R. BR. — In rupestr. et frutic. reg. infer. medit. ad Bar et Ulcinj (Ba, Ho).

## Oleaceae

### *Fraxinus* L.

4228. *F. ornus* L. — In fruticetis et silvis reg. infer. et montanae vulgaris; in reg. subalp. dic. sept. multo rarius. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Cetinje, Njeguši, Viljuša et Grahovo frequens (Ro et alii), Medun (Sz), Lastva čevska et Velestovo distr. Katunska nahija; ad latera montis Vojnik; Šavnik sub monte Ivica planina; ad

Goraško, coenob. Piva et Borkovići distr. Piva; supra Andrijevica in monte Jerinja glava (Ro), ad coenob. Morača; Bištrica pr. Kolašin; in monte Pej et Vjetnik (Ja).

— var. *rotundifolia* (LAM.) TEN. — „Foliola 1,5—3 cm longa rhomboidea vel late rotundata obtusa subtus glaberrima vel ad nervum medianum sparse albo-pilosa; samara linearis spathulata.“ — Rarius cum typo.

\*4229. *F. excelsior* L. — In silvis reg. infer. et subalp. — In valle fl. Morača infer.; distr. Čeklići et Cuci (Pč), ad Podgorica (Sz, Ro), Milušina pećina distr. Katunska nahija; Goraško et coenob. Piva distr. Piva, circa Viljuša et Andrijevica, in monte Jerinja glava (Ro). (Adnot.: *F. rostrata* GUSS. a cl. BALDACCI e Drušići pr. Rijeka indicata verosimiliter ad spec. praeced. pertinet.)

### *Syringa* L.

4234. *S. vulgaris* L. — In saxosis et dumet. reg. infer. et mont. raro. — Ad Ostrog (Pč), Medun et Podgorica (Sz), Andrijevica et coenob. Piva (Ro).

### *Phillyrea* L.

4235. et 4236. *Ph. latifolia* L. et *Ph. media* L. — In sax. et fruticetis reg. infer. dic. mediterr. — Ad Vir (Pč, Ro), Šavica distr. Komani (Pč), Rijeka (Ho, Ro), Ulcinj, Bar, Podgorica (Ro), Bioče in valle Morača (Ja), Nikšić (Ba), Cetinje? (Ba).

### *Olea* L.

4238. *O. europaea* L. subsp. *oleaster* (HOFFMG. et LK.) FIORI. — Frutex ramosissimus ramis partim spinosis; folia parva elliptica vel ovata. — In sax. et fruticet. sempervirentibus reg. infer. in dic. australi. — Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica.

— subsp. *sativa* (HOFFMG. et LK.) FIORI. — In dic. mediterr. ad Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić et ad coenob. Duga in valle flum. Zeta culta et subspontanea.

### *Ligustrum* L.

4239. *L. vulgare* L. — In fruticetis et ad sepes reg. infer. et montanae. — Ad Danilovgrad (Pt, Pč, Ro), Rijeka (Sz, Ro), circa Bar (Ba, Ro), Ulcinj, Vir, Podgorica, Spuž, Nikšić et coenob. Piva (Ro), Andrijevica (Ja, Ro).

## Rubiaceae

### Oldenlandia PLUM.

4243. *O. capensis* THUNB. — In inund. ad ripas fluvii Rijeka Crnojevićka pr. Rijeka (Kn).

### Putotia PERS.

\*4244. *P. calabrica* (L. f.) DC. — In rupestribus reg. infer. mediterr. ad Bar et Ulcinj (Ba, Ho, Ro, Do).

### Sherardia L.

4245. *S. arvensis* L. — In agris, incultis et lapid. reg. infer. et mont. frequens. — Ad Rijeka et Danilovgrad (Pt, Ro), Cetinje, Grahovo (Pč), Bar (Ba, Ro), ad Ulcinj, Rijeka, Viljuša, Šavniki, coenob. Piva et Andrijevica (Ro).

### Asperula L.

4251. *A. arvensis* L. — In arvis, incultis et ad vias reg. infer., mont., rarius subalpinae. — Ad Cetinje (Kn), Bogeći et Drežnica pr. Nikšić; circa Bar (Ba, Ro), ad Ulcinj, Rijeka, Podgorica, Njeguši et Andrijevica (Ro).

4252. *A. taurina* L. — In silvis et dumet. humidis et ad ripas reg. mont. et subalpinae, rarius inferioris. — In valle flum. Tara ad Matoševo et Kolašin (Pt, Pč, Ro); Kurlaj sub monte Kom (Ba), Tušina pr. Šavniki (Ba, Ro), ad latera montis Balj et alibi circa Andrijevica; Mratinje sub monte Maglić Pivski; supra coenob. Piva; Lijeva Rijeka; Boljevići supra Vir (Ro).

4254. *A. Dörfleri* WETTST. — Perennis; caulis tenuis quadrangulus nitidus glaber, rarius in parte super. ± hispidulus, erectus usque 6 cm altus simplex vel basi parum ramosus; folia 6—8-na verticillata lanceolata apice subito obtuso-acuminata  $1\frac{1}{2}$ —2 mm lata internodiis saepissime longiora, in pagina super. glabra, in margine et nervo mediano prominulo paginae infer. breviter setuloso-scabra; folia involucralia caulinis latiora flores 4 mm longos subaequantia; capitulum densum; corolla infundibuliformis rosea glabra, lobis 4 obtusis inappendiculatis, tubo subaequilongis; germen glabrum; stylus bifidus corolla multo longior. — In rupestr. et glareosis reg. alpinae in montibus dic. orient. ad fines Albaniae. — In monte Kom (Pč sub *A. hirta*; Ba et Ho sub *A. pilosa*; Ro), in montibus Dibala.

Planinica et Mojan (Ba), in monte Vila pr. Rikavac (Ba, Df), ad Fuša Rudnices sub monte Prokletija; inter Plav et Dečani (Df), Sjekirica planina supra Andrijevica loco Štit (Ro).

\*4255b. *A. intermedia* BOŠNJAČKI in Glasnik, Zagreb 1938. — „Caulis glaber, uniceps ad triceps, ad maximum 15 cm altus, in nodo foliorum hirtus; folia sena, ad 1,5 cm longa et ad summum 2 mm lata, linearilanceolata, in margine et nervo mediano hirta, internodiis multo, etiam plus quam duplo breviora; folia fulcrantia lanceolata hirtaque sicut folia caulinata. Ulterius observanda, nam ante anthesin collecta est.“ — In alpibus montium Prokletija loco Rusolija (Bos).

4256. *A. pilosa* (BECK) DEG. — A praeced. dignoscitur caule elatiore (10—20 cm alto) dense breviter piloso, foliis linearibus acutis longioribus (8—20 mm) et angustioribus ( $1\frac{1}{2}$ —1 mm) quam internodia (saltem superiora) brevioribus utrimque breviter pilosis, foliis involucralibus quam flores (cca 5—6 mm longi) brevioribus, stylo non exerto. — In saxosis reg. alpinae. — Sub cacumine montis Kom Kučki loco „Rupe“ et ad latera montis Vila (Sz teste DEGEN).

4260. *A. odorata* L. — In silvis reg. subalpinae. — Crna planina et sub monte Kom (Pt), in valle flum. Tara (Pč, Ro, Ja), Andrijevica (Ho, Ro), in monte Jerinja glava et Balj supra Andrijevica; Šavniki sub Ivica planina; ad coenob. Piva et Mratinje sub monte Maglić Pivski; Bijela sub monte Lola planina (Ro), ad ped. montis Durmitor (Pč, Ro), Vermoš planina ad fines Albaniæ (Df), Zvjerinačke rupe in monte Lovćen (Pej, Ro).

4262. *A. glauca* (L.) BESS. — In sax. reg. mont. Lukovsko polje ultra Nikšićka župa (Pč).

4264. *A. scutellaris* VIS. — Caules elati erecti quadran-guli ad angulos scabri paniculato-ramosi; folia inferiora 4-na oblongo-obovata, reliqua 4—8-na anguste linearia margine revoluta scabra suprema opposita; flores ad apicem ramorum singuli vel bini breviter pedicellati; corolla 1 mm longa late campanulata alba vel rubescens laciniis ovatis tubo vix distincto longioribus. — In rupestr. reg. infer., montanae et subalpinae frequens, rarius in reg. alp. — Ad Rijeka (Pt, Kn), Bogetiči pr. Nikšić (Pt), Cetinje (Pč, Kn), ad latera montis Lovćen (Kš, Pej, Ro), in monte Jastrebica (Ad), ad Medun (Sz, Ba, Ro), in monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz), Njeguši (Ba, Pej, Ro), Do-

brsko selo inter Rijeka et Cetinje (Ba), ad Bar et in montibus Sutorman, Rumija et Lisinj distr. Primorje; Nikšić, Ostrog (Ba, Ro), Timar pr. Šavniki (Ba), ad Gorańsko, coenob. Piva et ad latera montis Maglič Pivski versus Mratinje; Simunj distr. Katunska nahija, Podgorica (Ro), Bioče in valle flum. Morača; in calcar. pr. Kolašin (Ja).

— f. *latifolia* HORÁK. — Robustior, foliis latioribus planis. — Cum typo ad Rijeka (Ho).

— f. *hispida* HORÁK. — Tota planta aculeato-scabra; folia breviora late linearia. — Cum praeced. (Ho).

— f. *levicaulis* ROHL. — Caules ad angulos glaberrimi et leves. — Cum typo rarius.

? 4279. *A. Staliana* VIS. — A cl. PANTOCSEK (Adnot. 57) e monte Mali Durmitor (reg. alpina!) indicata; verosimiliter ad spec. sequentem pertinet, nam vera *A. Staliana* in reg. infer. dic. mediterr. crescit.

4280. *A. aristata* L. subsp. *longiflora* (W. K.) HAY. — In saxosis et lapid. e regione infer. in reg. alp. in tota dizione frequens.

— f. *glabra* (KOCH) HAY. — Caulis et folia glabra, corolla extus puberulo-scabra. — Frequens, imprimis in reg. infer. et media.

— f. *leiantha* (A. KERN.) HAY. — Planta glabra, corolla extus glabra et levis, folia margine scabra. — Cum praecedente frequens.

— f. *levifolia* ROHL. — Folia levissima. — In alpinis Štirni do sub Lola planina (Ro).

— f. *semiglabra* KOCH (= f. *subglabra* HAYEK Prodr. II: 451). — Planta a basi ad medium hirta, superne glabra, flores scabri. — Cum typo supra coenob. Piva (Ro).

— f. *hirta* (KOCH) HAY. — Tota planta dense breviter pubescens; corolla extus pubescenti-scabra. — Mali Šavnik in monte Lovćen, Sjekirica planina et Jerinja glava supra Andrijevica, Crvena Stijena et Valoviti do in monte Durmitor, Zakan men supra coenob. Piva, cca 1000—2000 m (Ro), supra lacum Crno jezero sub monte Durmitor (De, Si).

— var. *condensata* HELDR. — Caules numerosi humiles (5—15 cm alti) saepe dense caespitosi adscendentibus vel erecti paucis et breviter ramosi vel simplices; folia breviora; cymae

abbreviatae saepe capitatae; corolla rosea extus pubescenti-scabra 5—7 mm longa. — In glareosis et pascuis reg. alpinae. — Korita rovačka pr. Lukavica planina; in monte Maglić Pivski (Ro), Margarita sub monte Kom; mons Pivljan supra Košlašin (Ja).

\*—— var. *Wettsteinii* (ADAM.) HAY. — Praecedenti similis, sed tota planta dense breviter pilosa; corolla rosea cca 5 mm longa extus breviter pilosa laciniis tubo parum brevioribus. — In glareosis reg. alpinae. — In monte Durmitor et Maglić Pivski (Ro).

\*4283. *A. cynanchica* L. — In pascuis reg. subalpinae. — Bijele Carine sub monte Kom (Pt), Rijeka? (Ho), Kolašin et Kralje distr. Vasojevići (Ja), Bukovica sub monte Durmitor; Andrijevica, mons Balj, Jerinja glava et Sjekirica planina (Ro).

4289. *A. suberosa* S. S. — Planta alpina dense pulvinato-caespitosa; caules humiles simplices unacum foliis dense breviter velutini; folia 4-na linearia rigida breviter acuta (non aristata!) subtus bisulca; cymae pauciflorae subsessiles verticillastros 2—3 approximatos formantes; corolla rosea extus breviter puberula infundibuliformis laciniis tubo 3—4-plo brevioribus; fructus velutini. — In saxosis summi montis Kom (Pt, Ba).

\*—— var. *Bebii* BALD. — Caulibus paulo ramosis, floribus in spicas paucifloras corymbosodispositas congestis, corollae tubo laciniis vix 1—1 $\frac{1}{2}$ -plo longiore. — In herbidis et praeruptis montis Durmitor loco Savin Kuk et ad jugum Šulac (Ba).

### *Galium* L.

4291. *G. sylvaticum* L. — In silvis reg. subalp., rarius infer. — In valle fl. Morača et Tara (Pč), Rupa Końska sub monte Vila (Sz), Crna planina et Kurlaj sub monte Kom, in silvis sub monte Durmitor (Ba), in valle fl. Tara pr. Lever Tara (De, Si).

—— f. *angustifolium* HEUFF. — Folia linearilanceolata. — Inter dumeta ad Rijeka et in valle flum. Tara sub monte Kom (Pt).

4294. *G. aristatum* L. — In silvis et dumet. reg. subalp. — Circa Lukovo (Pt), ad Radeča Velja pr. Kostiča distr. Kuči

(Ba), in monte Dziebeze distr. Kuči (Sz). Anne (partim) ad spec. sequentem pertinet?

4295. *G. Schultesii* VEST. — In silvis reg. subalp. et mont. — Šavniki sub Ivica planina; Zakamen supra coenob. Piva (Ro), ad Matošovo et Kolašin (Ro, Ja), Andrijevica (Ja), in monte Orjen (Če).

— f. *lineare* BORB. — Folia anguste elongato-lanceolata cca 2 (—3) mm lata. — Ad Njeguši loco „Velje osoje“ (Ro).

4296. *G. mollugo* L. subsp. *mollugo* (L.) HAY. — In fruticetis, pratis et ad sepes reg. mont. et subalp. — Circa ovilia „Javorce“ dicta in monte Crna planina; in valle flum. Perućica sub monte Kom (Pt), in calc. ad Medun distr. Kuči (Sz), Andrijevica (Ho).

— var. *elatum* (THUILL.) H. BR. — Ad Cetinje (Kn).

— subsp. *erectum* (HUDS.) BRIQU. — In pratis alp. sub monte Kom (Ba).

4297. *G. lucidum* ALL. subsp. *Gerardii* (VILL.) HAY. — In aridis, saxosis et lapid. in tota dizione e reg. infer. usque in alpinam.

— var. *dumetorum* ROHL. V. Beitr. 54. — Caulis elatior (usque 80 cm altus), panicula ampla, pedicelli longiores (3—5 mm longi) et saepissime divaricati, folia margine fere levia, striae nitidae nervi mediani nullae vel brevissimae. — Ad latera montis Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro).

— subsp. *corrugae folium* (VILL.) HAY. — Cum typo, sed, ut videtur, rarius.

? 4298. *G. cinereum* ALL. — A praeced. differt caule pruinoso glauco et foliis glaucis nervo mediano sine striis longitudinalibus nitidis. — In saxosis vallis Perućica dol loco „Orlova Skala“ infra montem Kom (reg. subalpina!) in societate speciei praecedentis a cl. PANTOCSEK lecta. Mihi dubium vis detur, nam verum *G. cinereum* in reg. infer. dic. mediterr. crescit.

4302. *G. pseudoristatum* SCHUR. — Habitu similis *G. Schultesii*, a quo dignoscitur foliis utrimque viridibus plerumque 9-nis linearilanceolatis basin versus sensim attenuatis 3—4 mm latis, corolla vix 2 mm lata laciniis breviter acuminatis (non aristato-acuminatis).

— f. *scabrum* (GRIS.) HAY. — Caulis inferne unacum

foliis praecipue ad nervos breviter pilosus. — In dumetis reg. mont. et subalp. — Zabrgje et Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro); in valle fl. Morača supra coenob. (Ja).

4308. *G. anisophyllum* VILL. — In herbidis, rupestr., muscosis et glareosis reg. alpinae (rar. subalp.) in omnibus mont. dic. septentr. et orientalis frequens. E dic. merid. (m. Lovćen et Rumija) adhuc non vidi. E monte Jastrebica ad fines Dalmatiae a cl. PANČIĆ indicatum.

4312. *G. verum* L. — In pratis, herbidis et pascuis pinguis reg. infer., mont. et subalpinae. — Ad Danilovgrad et in monte Sutorman supra Bar (Pč), Mokre et Livade sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz), circa Andrijevica (Ho, Ro, Ja), Ivica planina supra Šavnik, in monte Balj supra Andrijevica; ad coenob. Piva, in monte Vojnik (Ro); ad Kolašin et Kralje (Ja).

— f. *pallidum* ČEL. — Flores ochroleuci. — Cum typo ad Njeguško polje (Pej, Ro).

— f. *trachyphyllum* WALLR. — Caulis dense pubescens, folia scabra. — Ad Njeguši et ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

\*— f. *pubifolium* ROHL. et DOSTÁL. — Folia etiam supra pilis brevibus patentibus dense tecta. — In aren. ad Bar (Do).

4313. *G. firmum* TSCH. (= *G. aureum* VIS.). — Habitu *G. mollugo* revocat, sed dignoscitur floribus flavis, antheris nigris et fructibus aureis demum rufescentibus. — In dumet. et rupestr. reg. infer., montanae, rarius subalpinae. — Circa coenob. Duga et in saxis Orlova Skala dictis infra Kom (Pt), in calc. ad Medun distr. Kuči (Sz, Ba), ad coenob. Ostrog (Ba), Njeguši (Ba, Pej, Ro), Konjuhe sub monte Kom (Ba, Ro), Šavnik, Goraško, coenob. Piva; Varda et Zakamen distr. Piva, ad latera montis Balj supra Andrijevica (Ro), circa Bar (Ba, Ro, Do), in monte Rumija et Kosa supra Bar (Do).

— f. *euboeum* HAL. — Caulis dense breviter pilosus, folia saltē subtus pilosa. — Cum typo ad Krstac pr. Njeguši et ad latera m. Lovćen (Ro).

\*— var. *antibarensse* BALD. Malpighia IV:71. — „Caespitosum, caulinibus debilibus, ovario nigricante.“ — In vetere vallo urbis Bar (Ba).

4319. *G. purpureum* L. — In rupestribus et dumet. reg. mont. et subalp. — Sub monte Kom (Pč, Ho), in incultis

pagi Orahovo (Sz), Konjuhe in valle fl. Perućica (Ba, Ro), circa Šavnik (Ba, Ro), Rikavac distr. Kuči (Ba), in monte Vojnik; circa Andrijevica, Viljuša et Goraňsko; Varda et Zakanen supra coenob. Piva, ad latera montis Balj supra Andrijevica, Simunj distr. Katunska nahija, Golo brdo supra Njeguši (Ro), in monte Rumija supra Bar (Do).

— f. *luteoviride* ROHL. V. Beitr. 54. — Flores flavescenti-virides. — Cum typo in monte Balj supra Andrijevica (Ro).

4327. *G. Baldacci* HAL. OeBZ. 1890: 165. — „Totum scabrido-hirsutum; caulis pumilis (cca 5—10 cm longis) ex rhizomate crasso lignoso basi suffruticosus adscendentibus vel erectis quadrangulis dense foliosis; foliis parvulis 6—9-nis, 3—5 mm longis, 1 mm latis, linearis-lanceolatis obtusiusculis subtus concavis elevatim nervosis nervo et margine praesertim scabris; cymis breviter pedunculatis 2—3-floris bracteolatis racemos angustos breves foliatus formantibus; bracteis oblongis acutis; pedicellis flore subaequilongis erectis vel subnutantibus; corollis parvis (cca 1—1½ mm longis) luridis extus patule hirsutis lobis ovatis obtusis trinerviis; antheris ovatis nigricantibus, fructu patule hispido; calycis limbo obsoleto. — In fissuris rupium reg. infer. mediterr. supra urbem Bar ad pedem montis Rumija (Ba, Ho, Do), ad Spilica Voda pr. Bar (Ba).

4333. *G. aparine* L. — In dumetis, ad sepes et agros steriles reg. infer., mont. et subalp. in tota dicione frequens.

\*4334. *G. spurium* L. f. *echinospermum* (WALLR.) HAY. — In dumetis et ad vias reg. mont. — Krstac pr. Njeguši (Pej, Ro).

— var. *tenerum* (GAUD.) GREN. GODR. — Caulis tenuissimus internodiis elongatis; folia latiora imprimis inferiora obovata vel oblongo-spathulata; cymae pauciflorae saepe uniflorae. — In valle flum. Lim pr. Andrijevica cca 800 m (Ja).

4337. *G. parisense* L. f. *leiocarpum* TSCH. — In lapid. et arenos. reg. infer. dic. medit. — Circa Bar, Ulcinj, Podgorica, Donja Zeta et in Lješanska nahija (Ro).

— f. *trichocarpum* TSCH. (= *G. tenellum* ROHL. non JORD.). — Fructus setoso-hispidi. — Cum praeced. ad Bar, Ulcinj et Vir (Ro).

4338. *G. divaricatum* LAM. — In aren., lapid. et incultis reg. infer. mediterr., montanae, rarius subalpinae (usque

ad 1400 m). — Ad rivulum Sušica pr. Danilovgrad (Pt), circa Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Šavniki et Viljuša; Borkovići distr. Piva; Drežnica pr. Nikšić (Ro).

4344. *G. palustre* L. subsp. *eupalustre* HAY. — In humidis, fossis et turfosis reg. subalpinae. — In valle Viruša dol sub Crna planina; circa lac. Riblje jezero sub monte Durmitor (Pt), sub monte Ranisava et ad Andrijevica (Ro).

— subsp. *elongatum* (PRESL) G. BECK. — In humidis ad rivum Sušica pr. Danilovgrad (Pt), in aren. marit. ad Bar (Do).

\*4347. *G. tricornе* WITH. — In cultis et dumetis reg. mont. — Ad Andrijevica cca 800 m (Ja).

4349. *G. murale* (L.) ALL. — In lapid., aren. et ad vias reg. infer. medit. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka et Podgorica (Ro).

4351. *G. rotundifolium* L. — In silvis reg. subalp. et alp. — Sub monte Javorje planina; in valle flum. Tara et Veruša (Pč), in valle Perućica sub monte Kom (Sz, Ro), Sinjavina planina (Ba), in monte Sjekirica et Balj supra Andrijevica (Ro), Kolašin (Ja).

4352. *G. boreale* L. — In pratis pinguibus reg. subalp. et alp. — Sub monte Durmitor (Pt, Ba, Ro), Carine sub monte Kom (Ba), Borkovići distr. Piva (Ro).

\*— var. *vestitum* ROHL. — Caulibus et foliis (inferioribus in pag. infer., superioribus utrimque) dense patule puberulis. — Cum typo in monte Ivica planina supra Šavniki (Ro).

4355. *G. cruciata* (L.) SCOP. — In silv., dumet. et ad sepes in tota dizione frequens.

\*— f. *levicaulis* ROHL. X. Beitr. 8. — Caulis glaberrimus levissimus, folia solum ad marginem breviter pilosa, ceterum glabra, pedicelli parum pilosi. — In pratis alpinis ad Štirni do (Ro).

4356. *G. vernum* SCOP. — In saxosis et glareosis reg. infer. et montanae. — Ad Cetinje et Vir (Pč).

— f. *pseudocruciata* ROHL. — Caulibus, cymae ramis et florum pedicellis patule dense hirtis. — In glor. alp. montis Kom Vasojevići supra Štavna (Ro).

4357. *G. pedemontanum* ALL. — In pratis, dumet. et lapid. reg. mont. et subalp. — Velestovo distr. Katunska na-

hija, in omnibus montibus circa Andrijevica, Konjuhe sub monte Kom, Matoševu in valle flum. Tara, Zagarač supra Danilovgrad, Goraško et Varda supra coenob. Piva (Ro), in monte Rumija loco Lumetić (Do).

*Valantia* L.

4359. *V. muralis* L. — In lapid., incultis, ad vias et in fissuris rupium reg. infer. medit., rarius montanae. — Circa Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica et Njeguši (Ro), Bar (Ro, Do).

*Rubia* L.

4361. *R. tinctorum* L. — In dumetis et ad sepes reg. infer. et mont., rarius subalp. — Poščensko jezero supra Šavnik, ad ped. montis Žoljevica et in valle fl. Lim ad Andrijevica, Dragovoljići pr. Nikšić, Podgorica et Njeguši (Ro).

4363. *R. peregrina* L. — In frutic. et ad sepes reg. infer. medit. — Ad Bar et Ulcinj (Ba, Ro).

*A doxaceae*

*Adoxa* L.

4365. *A. moschatellina* L. — In silvis et dumet. umbrosis reg. mont. et subalp. raro. — Ad Radeča Mala prope Kostiča distr. Kuči (Ba), ad latera montis Lovćen versus Njeguši, in decliv. montis Durmitor versus Žabljak (Ro).

*Caprifoliaceae*

*Sambucus* L.

4366. *S. ebulus* L. — Inter dumeta et ad marg. silvarum reg. infer., montanae et subalpinae in tota dicione.

4367. *S. nigra*. — In dumet. et silvis reg. infer., mont. et subalp. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), in valle fl. Zeta (Pč), ad Vir (Pč, Ro), circa Bar, Ulcinj, Njeguši et coen. Piva; Jasenovo polje sub monte Vojnik (Ro).

\*4368. *S. racemosa* L. — In silvis reg. subalp. — In valle fl. Tara inter Matoševu et Kolašin (Ja).

*Viburnum* L.

4369. *V. opulus* L. — In frutic. et silv. reg. infer. et mont. — In valle fl. Zeta sub Danilovgrad (Pč), ad Vrbica sub Goraško distr. Piva (Ro).

4370. *V. lantana* L. — In dumet. reg. mont. et subalp. — Viruša dol sub Crna planina; Perućica sub monte Kom; Lipovo pr. Kolašin (Pt), ad lat. montis Hum Orahovski distr. Kuči (Sz), circa Andrijevica (Ro, Ja), Lisinj et Rumija supra Bar (Ba), Goraňsko et coenob. Piva (Ro).

— f. *viride* KERN. — Folia subtus subglabra. — Ad latera montis Maglić Pivski (Ro).

— var. *discolor* HUT. (conf. ROHLENA V. Beitr. 51) (= *V. maculatum* PANT.). — Folia subtus albo-tomentosa.

— In apricis dic. merid. frequens. — In monte Lovćen (Ad, Ro), Orjen (Ad), Njeguši (Sz, Pej, Ro), Krstac (Ld, Sa, Gi), Rumija supra Bar cca 1500 m (Do), Nikšić, Viljuša, Jasenovo polje sub monte Vojnik (Ro), in monte Pej (Ja). Conf. JANCHEN OeBZ. 1919.

### *Lonicerca* L.

4373. *L. xylosteum* L. — In silvis et dumet. reg. mont. et subalp., rarius infer. — Sub monte Sutorman (Pč), Vratlo supra Kolašin (Ba), ad Bar, Ulcinj, Njeguši et Višnja ljuša; supra coenob. Piva, Perućica sub monte Kom, circa Andrijevica, Jerinja glava, Mali et Velki Krš supra Andrijevica (Ro), in valle fl. Tara pr. Lever Tara (De, Si).

— f. *elliptica* BECK. — Folia elliptica utrimque attenuata. — Cum typo ad Njeguši, Šavniki et ad Ljut supra coenob. Piva (Ro).

— subvar. *coriacea* ROHL. — Folia elliptica crassa rigida subcoriacea. — In apricis dic. merid. (Ro).

4374. *L. glutinosa* VIS. — A praeced. dignoscitur pendunculo communi quam flores rosei multo longiore et dense glandulosopilos, ramis novellis unacum foliis dense glandulosopuberulis et baccis in unicam coalitis. — In sax. montis Jastrebica (Ad).

4376. *L. alpigena* L. — In silvis et frutic. reg. subalp. et alp. in omnibus montibus dic. septentr. frequens.

— subsp. *Formánekiana* (HAL.) HAY. — Ovaria et baccae omnino liberae vel tantum basi per paria inter se connata.

— Javorje planina; Jerinja glava supra Andrijevica, Zakamen supra coenob. Piva (Ro), Lovćen et Njeguška planina (Ho, Pej, Ro).

4377. *L. nigra* L. — In silvis vallis Jelovica sub Bjelastica planina, cca 1200—1400 m (Ro); in monte Durmitor loco Ledena pećina, cca 1900 m (De, Si).

4378. *L. coerulea* L. — In silvis et frutic. reg. alp. et subalp. — Ad latera montis Durmitor (Pč, Ro, De, Si), in monte Ranisava, Maglić Pivski et supra coenob. Piva loco Zasakamen (Ro), ad Matoševe pr. Kolašin (Ba).

4380. *L. periclymenum* L. — In dum. et ad sepes reg. infer. medit. — Ad Rijeka (Pt).

4381. *L. etrusca* SAVI. — In dumetis reg. infer. et mont. — Ad Čevo distr. nahija Katunska; pr. Vir (Pč), ad Orahovo et Trijepši distr. Kući (Sz, Ba), circa Bar (Ba, Ro), ad Ulcinj, Podgorica et Farmaki (Ro). Loca reg. subalp. mihi dubia videntur: supra Vratlo pr. Kolašin; Bukovica sub monte Durmitor (Ba).

4382. *L. caprifolium* L. — In dumetis reg. infer., mont. et subalp. — Ad Cetinje (Pč), Bar, Podgorica, Danilovgrad, Njeguši, Viljuša, Goračko supra coenob. Piva; Perućica sub monte Kom, ad latera montis Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro), Sutorman supra Bar (Eb), in valle fl. Tara pr. Lever Tara (De, Si).

4383. *L. implexa* AIT. — In rupestribus et frutic. reg. infer. mediterr. — Ad Bar et Nikšić (Ba), inter Kotor et Njeguši (Pej, Ro).

## Valerianaceae

### *Valerianella* MOENCH.

4387. *V. coronata* (L.) DC. — In gramin. et inter viñeras reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Cetinje et Klopot distr. Bratonožići (Pč); circa Podgorica (Ro).

4389. *V. discoidea* (L.) LOIS. — A praeced. dignoscitur caule saepissime a basi divaricatum ramoso, calycis limbo subrotato intus piloso fructu duplo longiore, fructu obconico subtrigono, antice sulco profundo ovato-orbiculari pro viso, loculis sterilibus fertili fere aequalibus. — In arvis, pascuis et gramin. reg. infer. mediterr. — Circa Bar et Ulcinj (Ro).

4391. *V. eriocarpa* DESV. — In arvis et herbidis reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Bar (Ba, Ro), Cetinje, Rijeka,

Podgorica, Bioče (Ro), etiam e reg. subalp. „in sax. ad Velika distr. Vasojevići“ a cl. BALDACCI indicata.

4392. *V. dentata* POLL. — In herbidis et agris reg. infer. et mont. — Cetinje (Pt), Podgorica, Bar, Rijeka, Njeguši (Ro), in valle fl. Tara ad Matoševo (Ja). Occurrunt formae fructibus hirsutis [= var. *eriosperma* (WALLR.) JANCH.] vel glabris (= var. *leiosperma* WALLR.).

4396. *V. timosa* BAST. — In agris et gramin. reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Cetinje (Pt), Bioče pr. Podgorica (Ro).

4397. *V. pumila* (WILLD.) DC. — Calycis limbus oblique late et brevissime tridentatus, dente postico erecto maiore lateralibus fere obsoletis; fructus subglobosus dorso convexus lateribus et antice sulco profundo praeditus, loculis sterilibus inflatis cavis fertili latioribus, pericarpium loculi fertilis non spongioso-incrassatum. — A cl. HAYEK in Prodr. II: 486 e Montenegro indicata, verosimil. in dic. litorali.

\*4398. *V. turgida* (STEV.) BETCKE. — Fructus inflatus globoso-trigonus antice pariete orbiculari-membranacea excavatus postice convexus, loculis sterilibus fertili duplo maioribus, pericarpium loculi fertilis non spongioso-incrassatum; calyx e tuberculis 3 parvis formatus. — In incultis reg. infer. mediterr. ad ripam lacus Scodrani pr. Vir (Ro).

4399. *V. locusta* (L.) BETCKE. — In cultis et dumet. reg. inf., mont. et subalp. — Ad Vir et Cetinje (Pč), Ulcinj, Njeguši; Varda supra coenob. Piva (Ro).

4401. *V. carinata* LOIS. — In asperis, gramin. et cultis reg. infer. et mont. — Ad Vir (Pč), ad Bar et Andrijevica (Ro).

#### *Valeriana* L.

4403. *V. officinalis* L. — In pratis pinguibus, ad ripas et ad marg. silvarum reg. infer., mont. et subalp. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), sub monte Durmitor (Pt, Pč), in valle flum. Tara (Pt, Ja), circa Danilovgrad (Pt), Perućica sub monte Kom (Pt, Ro), ad Garač distr. Katunska nahija, Šavnik sub Ivica planina (Ro), in monte Balj et circa Andrijevica (Ba, Ro), in monte Lovćen (To).

— var. *angustifolia* (TSCH.) KOCH. — In pratis siccis et in rupestribus. — Borkovići distr. Piva; ad coenob. Piva;

Ljut et Črtov do sub Ledenica planina, Štirni do pr. Lukavica planina; in monte Lovćen et circa Njeguši (Ro).

— — — f. *parva* PANT. Adn. 36. — „Vix pedalis; foliorum segmentis linearibus angustissimis (2—8 mm:  $\frac{1}{2}$ —2 mm) integrerrimis setosis.“ — Ad rivulum Pašina Voda pr. pagum Kovčice ad pedem montis Mali Durmitor (Pt).

4404. *V. sambucifolia* MIK. var. *subalpina* (BECK) HAY. — A typo differt foliolis subsessilibus, terminali sub-rhombideo, foliorum superiorum angustioribus longe acuminatis. — In silva Skrobotuša ad pedem montis Vila ad fines Albaniae (Sz).

\*4405. *V. Dioscoridis* S. S. — A specie sequente dignoscitur radice fasciculata napulis aggregatis elongatis fusiformi-incrassatis, caule multo crassiore et elatiore, foliis (ut caulis) saepe pilosis segmentis latioribus, fructu dorso (nec utrimque) inter nervos hirto. — In humidis et fissuris rupium reg. intermedit. ad Dobra Voda pr. Bar (Ro).

4406. *V. tuberosa* L. — In saxosis et apricis reg. mont. et subalp., rarius alpinae. — In monte Rumija supra Bar (Ba), inter Kotor et Njeguši (Ki, Ld), Ledenica planina distr. Piva; Štirni do pr. Lukavica planina; Njeguši (Ro).

\*4408. *V. dioica* L. var. *simplicifolia* RCHB. — In pratis humidis reg. subalp. ad Barno jezero et ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro). — Secundum opinionem cl. JANCHEN planta nostra speciem propriam sistit (= *V. Schilleri* JANCHEN in schedis). Ego vidi tantum plantam fructiferam.

4409. *V. bertiscea* PČ. Elench. 42. — Rhizomate tenui repente surculos breviter repentes stoloniformes emittente; caule erecto glabro solum ad foliorum insertionem papillari-hirto; foliis glabris rosularibus ac caulinis infimis longe petiolatis integris ellipticis, mediis sessilibus lyrato-pinnatipartitis, supremis pinnatisectis aut integris; cymis terminalibus umbellatis compactis involucratis, bracteis linearibus acuminatis flores carneos aequaliter quantibus vel parum superantibus; antheris oblongo-ellipticis, stylis subinclusis; fructibus obverse lingulatis glabris, facie 1-dorso 3-costatis, costis filiformibus, pappo 18-radiato. — In rupestre. et glareosis reg. alpinae rarissime. — Sub monte Kom loco „Visoke Grede“ (Pč), Kom Kučki et Rogam (Ba), Maglić Pivski (Ro), Struga planina cca 2200 m (leg. Havelka fide MALÝ).

\*— f. *integrifolia* ROHL. V. Beitr. 56. — Folia indivisa et integra, solum suprema margine ± dentata. — Maglić Pivski, cca 2000 m (Ro).

4412. *V. montana* L. — In pratis, pascuis et rupestr. reg. subalp. et alp., praecipue in dicionis septentrionali frequens; in montibus dicionis meridionalis (Lovćen et Orjen) multo rarer (conf. ROHLENA IV. Beitr. 57).

— f. *integrifolia* BECK. — In alp. Štirni do pr. Lukavica planina (Ro), in m. Durmitor (De, Si).

\*— var. *pubescens* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Caulis tota longitudine usque in inflorescentiam plus minus copiose pubescens. — In alp. montium Prokletija loco Rusolija (Boš).

4416. *V. Pančićii* HAL. et BALD. OeBZ. XLI: 408. — „Rhizome perenni obliquo pluricipiti ad collum squamoso; caule erecto simplici 4—8 cm alto glaberrimo tereti; foliis integrerrimis glabris, radicalibus ovalibus obtusis in petiolum attenuatis, caulinis duobus oppositis oblongis sessilibus; floribus albis in cymas breviter pedunculatas capitulum vel racemum formantes dispositis, bracteis linearibus glabris, corollae tubo limbum excedente, acheniis glabris unilocularibus.“ — In rupestribus reg. alpinae, rarius subalpinae; adhuc e montibus dicionis septentr. orientalis nota. — Javorje planina (Pč), Kom Kučki et Vasojevićki (Pt, Ba, Ho, Ro), Rogam, Ljuban et Carine sub monte Kom (Ba), in monte Velki Maglić distr. Kuči (Sz, Ba), in montibus ad fines Albaniae: Dibala, Vila, Miočev do, Pešnjak, Crna planina, Planinica, Čafa Velja (Ba), in monte Sinjavina planina: Jablan vrh, Gradište, Žijovo et Ploča (Ba, Ro), in cacumine montis Zeletin et Visitor supra Andrijevica (Ro, Sk), Fuša Rudnices sub monte Prokletija (Df).

## Dipsacaceae

### *Dipsacus* L.

4425. *D. silvester* HUDS. — Ad vias et in fruticetis reg. inferioris et montanae. — Inter Bogetiči et Nikšić; Nikšičko polje (Ro), ad coenob. Morača (Ja).

4426. *D. laciniatus* L. — In dumetis reg. infer. et montanae. — Ad coenob. Morača (Pč, Ja), ad Konjuhe et Andrijevica; Šavniki sub Ivica planina, supra coenob. Piva (Ro).

— var. *Pejovićii* ROHL. V. Beitr. 78. — Capitulis mino-  
ribus (cca  $25 \times 25$  mm), involucri phyllis angustioribus, non-  
nullis capitulo longioribus, paleis in cuspide subito attenuatis  
margine setis longis et rigidis tectis. — Ad Bar (Pej!).

4427. *D. pilosus* L. — In alnetis et ad ripas reg. mont.  
et subalp. — Konjuhe sub monte Kom (Ba), ad Kolašin (Pč).

### *Cephalaria* SCHRAD.

4428. *C. transsilvanica* (L.) SCHRAD. — In pratis  
vallis flum. Zeta sub Danilovgrad (Pč).

4431. *C. leucantha* (L.) SCHRAD. — In rupestr., lapid.  
et herbidis reg. infer. et mont. calidioris in dizione meridionali.  
— Grahovo (Pč), Ostrog (Pč, Ba), ad Njeguši et Čevo (Pč,  
Ro), Cetinje (Kn), Medun distr. Kuči (Ba), Lješanska nahija,  
Nikšić, Bogetići, Bar (Ba), Peljev Brijež et mons Vjetrnik  
distr. Bratonožići; Bioče in valle fl. Morača (Ja), Zagarač  
supra Danilovgrad; Podgorica, Viljuša (Ro), Rijeka. (A cl.  
HORÁK e monte Kom indicata sub. *C. corniculata*.)

— var. *latisecta* POSP. — Non raro cum typo. — Zanovetni  
brijež pr. Njeguši (Ro).

? 4432. *C. laevigata* (W. K.) SCHRAD. — A cl. BAL-  
DACCI e Krstac pr. Njeguši et ad Timar pr. Šavniki indicata.  
Verosimiliter planta e primo loco ad *C. leucantham*, planta  
e loco Timar ad *C. pastricensem* pertinet.

4435. *C. flava* (S. S.) SZABÓ. — A *C. leucantha* dig-  
noscitur epicalyce apice dentibus 8 distinctis alternatim lon-  
gioribus coronato, foliorum segmentis plurijugis ovatis vel ob-  
longis, involucri phyllis rufescentibus tomentellis interioribus  
oblongis acutiusculis. — In saxosis reg. mont. ad Bogetići pr.  
Nikšić (Pt).

\*4437. *C. pastricensis* DOERFL. et HAY. OeBZ.  
1921 p. 19. — „Perennis fere 2 m alta; caulis erectus glaber  
superne ramosus; folia dilute viridia non nitentia in pagina  
inferiore ad nervos minute puberula ceterum glabra, 5—6-juga  
pinnatisecta segmentis oblongo-lanceolatis longitudine latitudi-  
nem 6—7-plo superante sensim acutatis anguste serratis, basi  
ad rhachidem usque ad foliolum proximum anguste decurrenti-  
bus, summis late decurrentibus, terminali lateralibus subbreviore,  
infima longe, caulina breviter petiolata, summa tantum 3-juga;

pedunculi elongati glaberrimi; capitula globosa plusquam 3 cm longa et lata; phylla involucri triangularia breviter cuspidato-acuminata hamato-recurva nigricantia extus sericea; corolla ochroleuca extus sericea; paleae apice atrofuscae triangulares; epicalyx apice in denticulos 8 minutos exiens." — In reg. subalp. ad Ravno distr. Piva (leg. Havelka fide MALÝ), in valle rivi Vrbnica pr. Orak distr. Piva (De, Si).

### Succisa MCH.

4438. *S. pratensis* MCH. — In pratis pinguibus reg. subalp. in territorio septentr. — Sub monte Durmitor (Pč, Ro), in valle flum. Tara (Pč), supra Lipovo et Vratlo pr. Košlašin (Ba), in monte Vrtijelika et Pivljan (Ja).

— f. *glabrata* (SCHOTT) PETERM. — Caulis et folia glabrescentia vel glabra. — Ad rivulum sub monte Žoljevica pr. Andrijevica; Barno jezero sub monte Durmitor (Ro).

### Knautia L.

4443. *K. integrifolia* (L.) BERTOL. var. *hybrida* (ALL.) SZ. — In gramin. et lapid. reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Rijeka (Pt), Ostrog (Pč, Ba), Cetinje (Kn), Njeguši (Kn, Pej, Ro), ad latera montis Lovćen (Ho), sub monte Maganik (Ho), Lješanska nahija (Ba), ad Medun distr. Kući (Sz), Donja Zeta et Bioče pr. Podgorica (Ro), insula Vranina (Eb), in monte Lovćen (To).

— f. *lyrata* (KOCH) HAY. — Folia saltem pro parte lyrato-pinnatifida. — Cum typo frequens. — Bar, Ulcinj, Podgorica, Danilovgrad, Bogetići, Nikšić, Njeguši (Ro).

? 4447. *K. arvensis* (L.) COULT. — In pratis et cultis reg. montanae et subalp. — In campo ad Cetinje (Pč, Ba), in pascuis sub monte Hum Orahovski (Sz), in pago Orahovo distr. Kući (Sz). A me non lecta. Verosimiliter loca hic enumerata ad alias species pertinent.

4449. *K. albanica* BRIQ. (= *K. longifolia* ROHL. non L.). — A *Kn. arvensi* dignoscitur caulis subtomentoso-velutinis subscaposis aphyllis vel foliorum pari uno instructis, foliis saepissime indivisis longe acuminatis dense subsericeo-appresso pilosis, floribus rubro-lilacinis. — In pratis regionis

montanae, subalpinae, cca 1000—1600 m. — Lastva čevska; Varda et Zakamen supra coenob. Piva (Ro), Rudo brdo pr. Kralje, montes Peh, Glave et Vrtijelika (Ja), in pratis ad Korita pr. Orahovo distr. Kuči (Ba), supra vallem rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

4450. *K. purpurea* (VILL.) BORB. var. *illyrica* (BECK) SZABÓ. — In pratis subalp. — Pavlova livada (Ho), Kralje pr. Andrijevica (Ja).

— var. *montenegrina* (BECK) SZABÓ. — In herbidis et lapid. reg. infer. et subalp. — Ad Bar et Njeguši, in declivibus montis Lovćen, in valle flum. Perućica sub monte Kom (Ro), Kapetanova rijeka pr. Kolašin (Ja), sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz sub *Kn. pubescens* W. K. et *Kn. Timeriyi* JORD.).

\*— f. *indivisa* ROHL. IX. Beitr. 8. — Folia omnia indivisa solum parum dentata basalia et caulina inferiora spathulata in petiolum alatum attenuata, caulina superiora (par unicum) oblongo-lanceolata; ceterum ut in typo. — Ad Mratinje sub m. Maglić Pivski (Ro).

— var. *Visianii* (SZABÓ) SAG. — Cum praeced. ad Njeguši et sub monte Lovćen loco Trešnja (Ro, Pej).

\*4456. *K. drymeia* HEUFF. var. *nympharum* (BOISS. et HELDR.) SZABÓ. — A typo dignoscitur foliis angustioribus magis oblongis densius pilosis, subtus cano-pubescentibus. — In subalp. ad Volujačko jezero sub monte Maglić Pivski cca 1500 m (Ma).

4458. *K. dinarica* (MURB.) BORB. — A *Kn. silvatica* L. Europae mediae differt parte inferiore caulis densissime strigoso-hispida, superiore glandulis numerosis subviscida, foliis angustioribus ovato-lanceolatis vel elongato-lanceolatis, omnibus utrumque pilis longis rectis flavescentibus dense strigoso-hirsutis (MURB. Beitr. 111).

— f. *strigosa* SZABÓ. — Caulis inferne setis flavis rigidis dense obsitus; folia appresse strigosa. — In pratis reg. subalp. et alp. (1000—1800 m). — In monte Vojnik (Ro), in valle flum. Kapetanova rijeka pr. Kolašin (Ja).

— f. *serulata* (BORB.) SZABÓ subf. *sericea* SZABÓ. — Caulis inferne pilis modice rigidis vel mollibus dense obsitus; pedunculi glandulosi; folia rosularia albido-strigosa, caulina elliptico-lanceolata. — In reg. subalp. et alp. cca 1000—1800 m. —

In valle Jelovica sub Bjelastica planina; Korita rovačka et Štirni do pr. Lukavica planina (Ro).

— f. *macrophylla* SZABÓ. — A praeced. differt foliis rosularibus magnis usque ad 35 cm longis et 5—6 cm latis dense flavescenti-strigosis. — In reg. subalp. et alp. cca 1200—2000 m. — In monte Balj supra Andrijevica, in monte Maglić Pivski, Durmitor et Ranisava (Ro).

— f. *Malyana* SZABÓ. — „Caulis inferne pilis mollibus dense obsitus et cano-puberulus; folia supra fere sericeo-appresse pilosa, subtus sparse pilosa; pedunculi dense glandulosi.“ — In pratis subalp. — Orinca et Dugi dolovi in Sinjavina planina cca 1500 m (Boš).

— f. *croatica* SZABÓ. — „Caulis inferne dense longe villosus; folia caulina supra sparse appresse longe pilosa; pedunculi eglandulosi.“ — Rarius sub m. Lovćen (Ro).

\*— subsp. *Kušanii* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Caulis humilior ad 20 cm altus simplex monocephalus sub capitulo longius pilosus, tota longitudine pubescens et copiose glandulosus excepto internodio infimo setis subrigidis horizontalibus obsito et plus minus pubescente sed eglanduloso; folia basalia setoso-hispida tempore anthesis emarcida; inferiora latius, media in petiolum alatum decurrentia basi amplectentia, supra copiose strigulosohispida; infra minus hispida; duo suprema opposita lanceolata acuta cordato-sessilia pubescentia plus minus glandulosa et pilis longioribus praesertim in margine praedita; capitulum cca 2—5 cm in diametro; folia involucralia capitulo breviora ovato-lanceolata pubescentia copiose glandulis parvis obsita et margine pilis longioribus ciliata. — In alp. montis Prokletija loco Rusolija (leg. Dr. Kušan).

4460. *K. sarajeensis* (BECK) SZABÓ. — A praeced. dignoscitur praesertim caule glabro, foliis rosularibus appresse albo-pilosis lanceolatis acutis, caulinis coriaceis ciliatis, superioribus basi lata sessilibus, pedunculis puberulis apice villosis. — In pratis subalp. et alp. 1600—2000 m. — In monte Maglić Pivski (Ro), ad lacum Volujačko jezero (Ma).

Adnotatio: Nescio, quid sit: 1. *Kn. silvatica* a cl. PANTOCSEK in valle Viruša dol sub Crna planina, in valle Perućica sub monte Kom et ad Kovčice sub monte Durmitor lecta. 2. *Kn. longifolia* in silva Perućica (Pt), ad Gvozd distr. Drobnjaci (Pč) et in monte Ivica planina (Ba).

*Scabiosa* L.

4469. *S. c. graminifolia* L. — In rupestribus et glareosis reg. mont., subalp. et alp. usque supra 1600 m. — Supra Grahovo (Pč, Pej), in monte Lovćen (Pej, Kš, Ro), Carine sub monte Durmitor (Ro).

4471. *S. c. crenata* CYR. subsp. *eucrenata* HAY. — Basi suffruticosa multiceps; caules humiles usque ad 25 cm alti simplices vel parce ramosi, monocephali glabri vel glabrescentes; folia infima spatulata dentata, cetera 1—2 pinnatisecta, laciniis oblongo-linearibus saepe dentatis; involucri phylla oblongo-vel ovato-lanceolata corollis rubro-lilacinis tomentellis radiantibus ter breviora; involucelli albo-villosi, tubo foveolis subaequilongo; limbus epicalycis 20—24-nervius tubo longior; setae calycinae limbo epicalycis ter longiores. — In rupestr. reg. infer., montanae et subalpinae raro. — In monte Lovćen (Pč, Pej, Ro), supra Rijeka et secus viam ad Bjelosi; Varda sub monte Kom (Ba), ad Cetinje (Kn), in monte Rumija supra Bar (Do).

4473. *S. c. argentea* L. subsp. *ucranica* (L.) HAY. — Perennis vel biennis; caulis stricte erectus ramis brevibus pilosus vel glaber; folia appresse pilosa, radicalia oblongo-linearia dentata, caulina saepissime pinnatipartita laciniis oblongo-linearibus vel linearibus saepe dentatis; involucri phylla linearis-lanceolata capitulo aequilonga vel parum longiora; flores ochroleuci, rarius subcoerulentes, marginales radiantes; limbus epicalycis 20—24-nervius dentatus tubo basi albo-hirsuto apice profunde 8-foveolato et glabro brevior; setae calycinae saepissime fulvae limbo epicalycis 3—4-plo longiores. — In rupestribus et glareosis reg. mont. calidioris. — Gračanička rijeka pr. Nikšić (Pč), ad Medun distr. Kuči (Ba).

4484. *S. c. leucophylla* BORB. — Ab affini *Sc. columbaria* dignoscitur foliis (saltem subtus) pilis fasciculatis (nec simplicibus) cano-vel albo-tomentosis, surculis foliiferis elongatis. — In pratis subalpinis. — Radovče polje (Ho), Božur planina supra coenob. Piva, in decliv. montis Maglič Pivski versus Mratinje (Ro) (= var. *typica* FREYN).

\*4485. *S. c. Hladnikiana* HOST. — In pratis subalp. — Ad latera montis Dziebeze (Sz), sub monte Žijovo (Ba), ad lacum Volujačko jezero sub monte Maglič Pivski (Ma).

4487. *S. c. columbaria* L. subsp. *columbaria* (L.)

**ROUY et FOUC.** — In gramin. reg. mont., subalp. et alp. — Ad Ceklin; in valle fl. Tara, ad Lipovo pr. Kolašin, Šavnik; Kovčice sub monte Durmitor (Pt), in pratis ad Gvozd sub monte Vojnik et in silva Kukura Brdo sub monte Kom (Pč), Rogam et Varda sub monte Kom; in monte Balj supra Andrijevica (Ba) (verosimiliter loca hic enumerata partim ad subsp. sequentem pertinent); Štirni do et Korita rovačka pr. Lukavica planina (Ro).

— subsp. *Portae* (A. KERN.) HAY. — „Folia pilis simplicibus dense appresse pilosa saepe subsericea, inferiora indivisa ovata vel rhombea crenata, sequentia lyrata segmento terminali magno rhombeo, superiora pinnatisecta segmento terminali maiore.“ — In pratis reg. subalp. et alp. frequens. — Lopate, Kolašin, Rudo brdo, Vrtijelika, Pivljan, Peh, Glave (Ja); Perućica sub monte Kom; m. Balj pr. Andrijevica, Šavnik, supra coenob. Piva, in monte Maglić Pivski, Barno jezero sub monte Durmitor, Rudine nikšićke, Ršave doline sub monte Lovćen (Ro), Durmitor (Ht). (Hucce spectant verosimiliter plantae a cl. PANTOCSEK in sax. Orlova Skala sub monte Kom et in valle Perućica et a cl. PANČIĆ in asperis sub monte Kom loco „Jelića Platno“ lectae et sub *Sc. holosericea* publicatae.)

— f. *albanica* JÁV. — Folia indivisa. — In monte Durmitor (Ro).

\*— var. *virescens* ROHL. — Folia viridia utrimque parum pilosa vel subglabra. — In pratis humidis ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

\*— var. *lovćenica* ROHL. — Folia pilis rigidis multo longioribus et saepissime + patentibus tecta. — In monte Lovćen locis pluribus (Pej, Ro).

— subsp. *gramuntia* (L.) ROUY et FOUC. var. *agrestis* W. K. — Folia superiora usque ad nervum medianum simpli- citer pinnatipartita segmentis cca 1 mm latis; setae calycinae limbo epicalycis ad summum duplo longiores, nonnullae non raro abortivae. — In saxosis et lapid. reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Grahovo et Vir (Pč), Rudine nikšićke (Ro).

— f. *leiocephala* (HOPPE) HAY. — Setae calycinae nullae. — Rudine nikšićke (Ro).

\*4489. *Sc. ochroleuca* L. subsp. *eurochroleuca* HAY. — In gramin. et ad vias reg. mont. et subalp. — Ad Borkovići distr. Piva; supra coenob. Piva et ad Cetinje (Ro).

\* — var. *Pejovicii* ROHL. XI. Beitr. p. 17. — Folia rigida subcoriacea, caulina inferiora et media ambitu oblongo-lanceolata simpliciter lyrato-pinnatiloba, segmenta lateralia pauca linearis lanceolata integerrima, segmento terminali magno anguste lanceolato integro solum irregulariter + inciso-dentato, folia suprema indivisa linearis lanceolata. — In rupibus calcareis ad Krstac pr. Njeguši (Pej, Ro).

— — var. *Webbiana* DON. — Ad Rijeka et in Orlova Skala sub monte Kom (Pt), sub monte Balj pr. Andrijevica (Ro).

4492. *S. silaifolia* VELEN. — In aridis prope Ceklin (Ba), inter Bogetići et Nikšić; in calcareis pr. Andrijevica; circa Njeguši et ad latera montis Lovćen (Ro), ad Krstac distr. Piva (De, Si). — Plantae nostrae foliis valde divisis et lacinias angustissimis optime cum plantis bulgaricis congruunt, sed setae calycinae ferrugineo-vel pallide lutescentes (nec brunneae) sunt (= f. *pallidiseta*).

4493. *S. triniaeefolia* FRIV. — Folia basalia tenuiter puberula tripinnatis-partita segmentis angustissimis dense approximatis breviter linearibus, caulina 2—3-pinnatis-partita segmentis anguste linearibus; setae calycinae pallide fuscae limbo epicalycis 3—5-plo longiores. — In rupestr. reg. alp. in Crvena Stijena sub monte Durmitor (Pč).

\*4494. *S. fumarioides* VIS. et PANČ. — A praeced. dignoscitur caule tenuiter puberulo, foliorum inferiorum segmentis linearis-oblongis obtusis capillaceo-mucronatis, floribus non radiantibus et setis calycinis limbo epicalycis brevioribus vel nullis. — In pratis mont. et subalp. ad Dućići, Bežijovo et Orahovo distr. Kuči (Ba).

4496. *S. silenifolia* W. K. — In rupestr. reg. alpinae dicionis septentr. et septentr.-orientalis. — In monte Durmitor (Pč, Pt, Ba, No, Ro), Sinjavina planina: m. Stožac, Crvena Ploča, Jablan Vrh et Gradište (Ba), in monte Vojnik et Maglić Pivski (Ro), in montibus ad fines Albaniae: Hum Orahovski (Sz), Velki Maglić, Žijovo et supra Jezera labodnicka (Ba).

## Campanulaceae

### *Campanula* L.

4511. *C. lingulata* W. K. — Biennis, hispida; folia subundulata crenato-serrata, inferiora oblongo-spathulata in pe-

tiolum attenuata, superiora sessilia oblonga vel lanceolata; flores sessiles in capitulum terminale (confer. subvar. *cichoriaceam*) involucratum congesti; calycis appendices reflexae ovatae tubo longiores laciniis oblongis obtusis vix breviores; corolla anguste tubulosa limbo infundibuliformi violacea calycis laciniis 3—4-plo longior; stigmata 3; capsula prope basin poris dehiscaens. — In dumosis et silvis reg. infer., montanae et subalp. usque ad 1500 m. — Viruša dol sub Crna planina, Perućica sub monte Kom; in valle fl. Tara; ad Kovčice sub monte Durmitor (Pt), in calc. pagi Orahovo distr. Kuči (Sz), Crna planina; Velki Mikulić supra Bar (Ba), Njeguši (Ho, Pej, Ro), Čeklići, Vir, Zagarać, Bar (Ro), ad coenob. Morača; in monte Pej et in valle Lim pr. Andrijevica (Ja), inter Bukovica et Cetinje (Ro), in m. Rasovatac pr. Vir (Eb), Oštra glavica sub m. Lovćen (Pej, Ro), Orak distr. Piva (De, Si).

— subvar. *cichoriacea* (S. S.) GRIS. (= *C. capitata* SIMS.). — A typo differt caulibus ramosis, fasciculis florum axillaris et terminalibus. — Cetinje (Pč, Kn), supra coenob. Ostrog (Pč), Krstac pr. Njeguši (Gi, Ma), Borkovići et Goraňsko distr. Piva; in monte Vojnik; ad Andrijevica (Ro).

\*? 4513. *C. sibirica* L. — In saxosis reg. montanae. — Ad Cetinje (Ba).

4523. *C. macrostachya* KIT. — Biennis; caulis erectus simplex usque ad 1 m altus dense setosus; folia dense setoso-hispida crenata vel integerrima, radicalia elliptica in petiolum attenuata sub florendo emarcida, caulina inferiora lanceolata vel oblonga sessilia, superiora ovato-lanceolata basi cordata sessilia; flores sessiles, inferiores singuli in spicam longissimam interruptam congesti; calyx setoso-hispidus laciniis linearibus obtusiusculis, sine appendicibus; corolla 15—20 mm longa pallide coerulea. — In pratis et fruticetis reg. subalp. — Viruša sub Crna planina; vallis Perućica et Tara, Kovčice sub monte Durmitor (Pt). (An ne partim ad *C. moesiaca* pertinet?)

4527. *C. moesiaca* VELEN. (= *C. hirsuta* PANT. Adnot. 54 fide cl. HAYEK). — Ab affini *C. glomerata* dignoscitur: indumentum multo mollius, fere canum; radix biennis (nec perennis) verticalis simplex; folia supra breviter hirsuta, subtus dense patule pubescentia, inferiora oblonga in petiolum alatum subito contracta, superiora e basi sessili late cordata lanceolato-acuminata. — In pratis humidis reg. subalp. et alp. in ditione septentrionali frequens.

4528. *C. glomerata* L. var. *euglomerata* HAY. — In pratis reg. subalp. et alp. in tota dizione septentr. et septentr.-orientali frequens; e dizione meridion. adhuc solum in Lastva čevska lecta (Ro).

— var. *aggregata* (WILLD.) KOCH. — Perućica sub monte Kom (Pt), Sjekirica, Balj et Jerinja glava supra Andrijevica; Varda supra coenob. Piva (Ro).

— f. *longifolia* WALLR. — Folia caulina omnia lanceolata utrimque attenuata. — Mokro distr. Kuči; Črtov do sub-Ledenica planina; Lastva čevska (Ro).

— f. *pedunculata* ROHL. V. Beitr. 80. — Florum fasciculi laterales pedunculis nudis  $\frac{1}{2}$ —4 cm suffulti. — Ad Borzovići distr. Piva cca 1400 m (Ro).

— f. *glabra* BLUFF et FGH. — In montibus Ranisava et Maglić Pivski (Ro).

— var. *salviaefolia* WALLR. (= var. *farinosa* ROCHEL). — Caulis hirsutus; folia supra appresse breviter pilosa, subtus dense pilosa canescens. — Štirni do pr. Lukavica planina (Ho), Kapetanova rijeka pr. Kolašin (Ja), Božur planina distr. Piva (Ro).

4529. *C. foliosa* TEN. (= ? *C. glomerata* var. *macrodon* PANČ. Elench. 63\*). — A praeced. dignoscitur foliis maioribus irregulariter biserratis, caulinis late elliptico-ovatis vel cordato-ovatis, omnibus (supremis exceptis) petiolatis, petiolis alatis, capitulis fere semper terminalibus (lateralibus subnullis), foliis involucralibus ovato-acuminatis flores subaequantibus vel parum superantibus margine et ad nervos albociliatis; calycis dentibus anguste lanceolatis ciliatis tubo glabro 3—4 plo longioribus. — In pratis et pascuis reg. alpinae. — Sub monte Kom (Pt, Ho, Ro), Štirni do pr. Lukavica planina; Sjekirica planina et Visitor supra Andrijevica (Ro, Sk).

4541. *C. cochleariifolia* LAM. subsp. *croatica* HRUBY.\* — Saepissime fere glabra, parce ramosa; corollae infundibuliforme-campanulatae; pollinis granula flava. — In glareosis et rupestr. reg. alp. — In monte Durmitor (Führer).

\*) PANČIĆ 1. c. „Excellit dentibus calycinis linearibus tubo bis longioribus, corollae medium longe superantibus ac foliis involucrantibus maioribus.“ — In pascuis Rogam sub monte Kom (Pö).

\*\*) Confer: HRUBY „Campanulastudien innerhalb der Vulgares und ihrer Verwandten“ in „Magy. Botan. Lapok“ 1930.

teste HRUBY); in monte Kom (Pt), Carine sub monte Kom (Ba).

\*4543. *C. Witasekiana* VIERH. var. *typica* HRUBY (Magy. Botan. Lap. 1930: 212). — In pratis subalp. et alp. — Volujačko jezero sub monte Maglić Pivski (MALÝ sub *C. pseudolanceolata*), in monte Durmitor et Maglić (Ro), Rudo Brdo, Vrtijelika; m. Peh et Glave pr. Kralje (Ja), Kovčice sub monte Durmitor (Pt sub *C. Scheuchzeri*).

— var. *intercedens* HRUBY l. c. 210. — Velki Štulac in monte Durmitor (Führer fide HRUBY).

— f. *angustifrons* HRUBY. — Konjsk planina; m. Sjekirica et Balj pr. Andrijevica (Ro).

— var. *praticola* HRUBY. — In pratis sub Velki Krš pr. Andrijevica; in pascuis Varda sub monte Kom Vasojevički (Ba sub *C. pseudolanceolata*).

— f. *angustifrons* HR. — Sub monte Kom (Ro).

— f. *latifrons* HR. — In monte Durmitor et Maglić Pivski (Ro).

\*— var. *vestita* ROHL. IX. Beitr. 4. — Caulis et folia (rarius etiam rami inflorescentiae) dense patule breviter pubescentia; folia anguste lanceolata (ut in f. *angustifrons*); flores mediocres; racemi pluriflori; dentes calycini ultra  $\frac{1}{2}$  usque  $\frac{3}{4}$  corollae longi. — In pratis pinguibus loco „Mokro“ distr. Kući (Ro).

4544. *C. linifolia* SCOP. var. *albanica* (WITASEK) HR. — In rupestr. reg. subalp. et alp. — In monte Kariman supra Rikavac distr. Kući (f. *simplex* HR.), in monte Prokletija in f. *ramulosa* HR. (Ba sub *C. carnica*).

4545. *C. balcanica* (ADAMOVIC) HRUBY l. c. 234 (= *C. rotundifolia* aut. montenegr. non L.). — In pratis et pascuis reg. montanae, subalp. et alpinae frequens.

— var. *balcanica* (ADAM.) HRUBY l. c. 245. — Ad Njeguši, in monte Lovćen et Lastva čevska (Ro, Pej).

— f. *pinifolia* (UICHTR.) HR. — In monte Lovćen cum f. *tenuissima* (BORB.) HR. (Ro, Pej).

— f. *latifrons* HRUBY. — Ad Njeguši et in monte Lovćen (Pej, Ro).

\*— f. *Rohlenae* HR. in litt. — Laxe caespitosa, caulis valde flexuosus, folia infima ovato-rhombea dentato-angulata, caulina

longissime et tenuissime petiolata 4—8 cm longa et 3—6 mm lata valde curvata plana, calycis laciniae patentes vel reflexae. — Ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

— f. *saxatilis* HR. subf. *umbrosa* HR. — In monte Durmitor et Javorje (Pč? fide HRUBY).

— var. *velebitica* (BORB.) HR. — In pratis alp. montis Durmitor cum subf. *humili* HR. (Ro).

— f. *Borbasiiana* WITAS. — In alp. montis Lovćen, Ledenica et Durmitor (Ro).

— f. *parviflora* WITAS. — Dobri do in monte Durmitor (Ro). Etiam forma caule in parte infer. + piloso (= subf. *pilosa*).

— f. *incerta* WITAS. — In alp. montis Vojnik (Ro).

— f. *racemosa* (KRAŠAN) HR. — In rupestr. montis Žijovo planina distr. Kuči ad fines Albaniae (Ba).

— f. *farinulenta* (A. KERNER et WETTST.) HRUBY l. c. 239. — In rupestr. montis Durmitor loco Crvena Greda (Ro).

\*4545b. *C. tarana* MALY Glasnik 1923 pag. 126. (= *C. taranensis* HRUBY l. c. 252). — In gramin. reg. subalp. et alpinae.

— f. *genuina* HR. — In monte Vojnik (Ro).

— subf. *angustifrons* HR. — Lovćen, Maglić, Ranisava; Varda et Božur supra coenob. Piva (Ro).

— f. *pinifolia* (UICHTR.) HR. — In monte Lovćen (Pej, Ro).

— f. *simplex* HR. — In monte Ranisava (Ro).

— f. *saxiphila* HR. — Maglić, Mratinje (Ro).

— f. *squarrosa* HR. — Jeline doline supra Njeguši (Pej, Ro).

4547. *C. trachelium* L. — In silvis et fruticetis reg. infer., mont. et subalp. — Ad Šavniki sub Ivica planina (Pč, Ro), ad Cetinje et Rijeka (Kn), in silva Skrobotuša sub monte Vila et in pascuis sub monte Hum Orahovski (Sz), inter Cetinje et Bjeloši (Ba), sub monte Kom Kučki (Ho), Konjuhe pr. Andrijevica (Ba, Ro), Vratlo supra Kolašin (Ba), in valle flum. Tara et circa Kolašin (Ja, Ro), Kralje pr. Andrijevica (Ja), ad Viljuša, Njeguši et sub monte Vojnik (Ro), in monte Lovćen (To).

— f. *dasyarpa* M. K. — Cum typo ad Njeguši; Šavnik in monte Lovćen (Pej, Ro).

\*— f. *calvescens* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Caulis in parte inferiore et folia inferiora glabra. — In alp. montis Prokletija (Boš).

4548. *C. latifolia* L. — In dumetis reg. subalp. — In valle fluminis Tara ad Matoševo (Pt).

\*4549. *C. rapunculoides* L. — In agris, incultis et dumetis reg. infer. et montanae. — Ad coenob. Ostrog et Morača (Pč), Župa (Ho), Šavniki (Ro).

4550. *C. bononiensis* L. — In dumetis et ad sepes reg. infer., mont. et subalp. — Ad Danilovgrad (Pč), ad pašum Orahovo distr. Kuči (Sz), Konjsk planina et Radovče polje (Ho), Konjuhe sub monte Kom (Ba), ad latera montis Lovćen; circa Njeguši, Viljuša, Borkovići distr. Piva; Bjelice distr. Kaštunska nahija; Šavniki, Drežnica pr. Nikšić; Goraňsko et coenob. Piva; in monte Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro), sub monte Balj (Ba, Ro), in monte Vjetnik et ad Kralje (Ja), supra vallem Vrbnica distr. Piva (De, Si).

\*— f. *levidens* ROHL. IX. Beitr. pag. 3. — *Calycis laciniae glaberrimae* (nec margine hirtae ut in typo). — Ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

4551. *C. pyramidalis* L. — Ad rupes, muros et dumeta reg. infer., montanae, rarius subalp. — Ad Cetinje (Pč, Kn), circa Čevo, Ostrog et Grahovo (Pč), in calc. pr. Medun; in silva Skrobotuša ad pedem montis Vila (Sz), Treblješ luka (Ho), circa Bar et Bojetiči (Ba), ad Viljuša, Podgorica, Njeguši et ad latera montis Lovćen (Ro), coenob. Morača, Bioče, Klopot, Vjetnik, Mala Rijeka, Lopate (Ja), in valle fl. Tara et ad Kolašin (Ja, Ro), Bukovica pr. Cetinje (Ro), in monte Kosa supra Bar (Do).

4556. *C. erinus* L. — In lapid., gramin. et ad sepes reg. infer. mediterr. — Ad Rijeka (Pt, Ro), Drušići et Lješanska nahija (Ba), ad Bioče in valle flum. Morača (Ja, Ro), circa Bar, Ulcinj, Vir et Podgorica; inter Kotor et Njeguši (Ro). (E valle flum. Perućica sub monte Kom loco Konjuhe a cl. BALDACCI indicata; verosimiliter introducta.)

4558. *C. persicifolia* L. — In dumet. et silvis reg. mont. et subalp. — Vallis Perućica sub monte Kom (Pt), inter

Cetinje et Rijeka (Ba), ad Njeguši (Ho, Pej, Ro), Kamenjak (Ho), circa Andrijevica, in monte Balj, Jerinja glava; ad Šavniki sub Ivica planina; Žabljak sub monte Durmitor (Ro), in decliv. montis Lovćen (To, Ro).

4560. *C. patula* L. — In pratis et silvis reg. subalp. et alp. in tota dic. septentr. et septentr.-orientali; in dic. merid. legi solum in Lastva čevska; e montibus Lovćen et Rumija adhuc non vidi.

— ? subsp. *abietina* (GRIS. et SCHENK) SIMK. — Calycis lacinia linear-lanceolata vel subulato-lanceolatae, corolla 2—2,5 cm longa intense violacea dimidio breviores. — In pratis subalp. — Viruša dol sub Crna planina (Pt).

4561. *C. rapunculus* L. — In herbidis, dumetis et silvis reg. infer., mont. et subalp. in tota dicione frequens.

— f. *pratensis* PANČ. (= f. *nitida* BECK). — Caulis et folia glabra. — Sub monte Hum Orahovski (Sz), Pivska planina (Ro).

— f. *hirta* PETERM. — Caulis et folia breviter pilosa. — Frequens.

— f. *subspicata* EBEL. — Pedicelli abbreviati calycis tubo breviores. — Ad Danilovgrad (Pt), in monte Troica supra Vir; Sutorman supra Bar (Eb).

4562. *C. sparsa* FRIV. subsp. *sphaerothrix* (GRIS.) HAY. — A praeced. dignoscitur radice annua, caulis acutius angulatis magis asperis, foliis radicalibus sub anthesi emarcidis, panicula saepissime pyramidata, pedunculis filiformibus, calycis laciniis setaceis corollae 12—16 mm longae subaequigonis. — In silva ad latera montis Balj (reg. subalp.) supra Andrijevica (Ro).

4564. *C. ramosissima* S. S. — Annua; folia crenata, inferiora obovato-spathulata in petiolum attenuata, reliqua ovato-lanceolata vel lanceolata sessilia, radicalia sub anthesi jam emarginata; flores 1—3 cm longi solitarii longe pedunculati; calycis lacinia linear-lanceolatae + trinerviae tubo multo longiores corolla lilacina infundibuliforme rotata longiores vel aequilongae. — In herbidis, asperis et saxosis reg. infer. mediterr. et mont. calidioris. — Ad Boljevići (Pč, Ro), Ostrog (Pč, Ba), circa Njeguši (Kn, Gi, Ma, Pej, Ro), sub monte Rumija (Ba, Do), circa Ulcinj, Bar, Vir et Podgorica (Ro), in monte Kosa supra

Bar (Do); in monte Rasovatac pr. Vir (Eb). Etiam e reg. subalp. ad Vratlo supra Kolašin a cl. BALDACCI indicata; verosimiliter introducta.

— f. *cassandra* NADIJ. — Caulis simplex vel subsimplex 1—pauciflorus. — In monte Golo brdo supra Njeguši (Pej, Ro).

### *Legouzia* DUR.

4571. *L. speculum-veneris* (L.) FISCH. — Inter segetes, ad vias reg. infer. mediterr. et mont. calidioris. — Ad Komani et Vojnići (Pt), Cetinje (Pč), ad Vir et Boljevići (Pč, Ro), circa Njeguši (Gi, Ma, Pej, Ro), in valle flum. Piva sub monte Maglić; Čevo, Bar, Ulcinj, Podgorica et Andrijevica (Ro), Brčeli et Limljani pr. Vir; Sutorman supra Bar (Eb).

— f. *pubescens* (DC.) MALÝ. — Planta breviter pubescens. — Cum typo ad Njeguši et in monte Bogojeva glava sub monte Lovćen (Pej, Ro), ad Velki Mikulići supra Bar (Do).

— f. *cordata* (VIS.) K. MALÝ. — Folia superiora basi dilatata subcordata semiamplexicaulia, capsulae longiores. — In rupestr. inter Njeguši et Kotor (Pej, Ro).

4573. *L. hybrida* (L.) GÉRARD. — In lapid. et aren. reg. infer. mediterr. — In campo ad Podgorica (Ro).

### *Asyneuma* GRIS. et SCHENK.

4579. *A. trichocalycinum* (TEN.) K. MALÝ. — Caulis simplex erectus glaber vel inferne ± hirtus; folia tenuia glabra sessilia vel brevissime petiolata ovata vel oblonga grosse inaequaliter acute dentato-serrata, superiora acuminata; flores in racemo singuli vel 2—3-ni distincte tenuiter pedicellati bractea setacea suffulti; calycis laciniae setaceae patentes tubo 3-plo longiores; corolla coerulea glabra in lacinias lineares fere ad basin partita, calyce duplo longior; capsula nutans poris basilaribus dehiscens. — In silvat., umbrosis et humidis reg. subalp. et alp. in omnibus montibus dicionis septentr. — E montibus dic. merid. (Lovćen et Rumija) adhuc non vidi.

\*4582. *A. canescens* (W. K.) GRIS. et SCHENK. — In herbidis et dumetis ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

\*— f. *leianthum* ROHL. IX. Beitr. pag. 2. — Calyx et corolla glabra (folia et caulis incano-puberula ut in typo). — In monte Čekanjska glavica supra Njeguši (Pej, Ro).

— f. *leve* ROHL. V. Beitr. 83.; VI. Beitr. 21 (= *Phyteuma c.* var. *laeve* ROHL. 1923). — Caulis glaber et levis; folia glabra solum subtus ad nervos pilis solitariis simplicibus praedita. — Cum typo in monte Lovćen (Pej, Ro). Vix identicum cum var. *nodiflora* DAVIDOV, quod glabritie cum nostra planta congruit, sed foliis multo angustioribus differt.

\* — var. *lovćenicum* ROHL. IX. Beitr. pag. 2. — Caulis tenuis simplex 25(—30) cm altus fere glaber subnitidus, folia glabra vel interdum ad marginem parum puberula; inflorescentia simplex, flores singuli 1—2 infimi bini; calyx tubulosus (nec breviter campanulatus ut in typo) saepe breviter puberulus, laciniae tubo breviores; corolla glabra. — Cum typo in monte Čekanjska glavica sub monte Lovćen (Pej, Ro).

4586. *A. limonifolium* (L.) JANČH. — A praeced. dignoscitur caule inferne foliato, superne subnudo (nec usque ad apicem dense aequaliter foliato), foliis lanceolatis in petiolum longe attenuatis, bracteis minutis triangularibus. — In saxosis, collibus aridis reg. infer. mediterr., montanae calidioris, rarius subalpinae. — Cetinje, monastir Duga; Lastva supra Vojnići (Pt), Njeguši (Pč), Mali Lonac et Kosa supra Bar (Pč, Ba, Do), ad Ostrog et Grahovo (Pč), ad Pristan Bar (Ba, Do), Jezerski vrh in monte Lovćen (Ho), Krstac pr. Njeguši (Gi, Ma), Medun et Rikavac distr. Kuči (Ba), Konjuhe pr. Andrijevica (Ba), in calcareis ad Orahovo distr. Kuči a cl. SZYSZYLOWICZ ut var. *alpinum* (BOISS.) BORNM. indicatum.

— f. *heterophyllum* ROHL. V. Beitr. 83. — Folia basalia et caulina infima oblongo-elliptica apice obtusa duplo vel subduplo longiora quam lata. — Ad Njeguši cum typo (Ro, Pej).

— f. *canescens* (BOISS.) BORNM. — Totum breviter cañescenti-scabridum (confer ROHLENA II. Beitr. 4). — Ad Bar, Ulcinj et in Kakarička gora pr. Podgorica (Ro), in monte Rumija et Kosa supra Bar (Do).

### *Phyteuma* L.

4589. *P. spicatum* L. — In silvis reg. subalp. dic. septentr. — Circa Kovčice sub monte Durmitor (Pt); Crvena Ploča in Sinjavina planina (Ba), ad Nedajno distr. Piva (De, Si).

— var. *coerulescens* BOGENH. — Flores pallide coerulei vel dilute coeruleo-lilacini. — In silvis sub monte Durmitor (Pč, Ro).

— — — f. *rhombifolium* ROHL. V. Beitr. 80. — Folia basalia basi rotundata vel subito attenuata ambitu rhombea. — Ad lacum Barino jezero sub monte Durmitor cca 1500—1600 m (Ro).

4593. *Ph. orbiculare* L. subsp. *flexuosum* R. SCHULTZ Monogr. 115. — In pascuis et pratis reg. subalp. et alp. dic. septentr. — In monte Javorje planina (Pč), Durmitor (Pt, Pč, Ba, De, Si, Ro), Sinjavina planina (Ba, Ro), Carine, Planinica, Mojan (Ba), in monte Kom et Maglić Pivski (Ro), Maganik et Pavlova livada (Ho), ad Brčeli supra Vir? (Eb), sed solum in foliis lectum.

— — — f. *hungaricum* R. SCH. — In monte Prokletija supra Gusinje (Df).

— — — f. *lanceolatum* DC. — Omnia folia caulina breviter petiolata, infima basalibus similia. — Crno jezero sub monte Durmitor (Ro).

× *Ph. orbiculare* subsp. *flexuosum* × *pseudorbiculare* ROHL. V. Beitr. 81 (= *P. Pančićii* ROHL. l. c.; *P. orbiculare* var. *cordatum* PČ. El. 62; *Ph. pseudorbiculare* R. SCHULTZ Monogr. 62 non PANT.). — Inter parentes in alp. montis Kom (Pč, Ro).

4594. *Ph. pseudorbiculare* PANT. Adn. 53. — A *Ph. orbiculari flexuoso* dignoscitur foliis basalibus breviter petiolatis suborbicularibus, inferioribus obtusis saepe breviter petiolatis ceteris sessilibus superioribus acutis, foliis involucr. e basi cordata late ovatis vel ellipticis. — In pascuis reg. subalp. dic. septentrionalis. — In monte Mali Durmitor (Pt), Kom (Pt, Pč, Ro), Sjekirica planina; sub Bjelastica planina (Ro), in monte Vila distr. Kuči (Df).

### *Edraianthus* DC.

? 4598. *E. dalmaticus* DC. — A sequent. dignoscitur calycis laciniis late triangularibus tubo multo brevioribus. — In humidis silvat. ad veterem typographiam pr. Rijeka (Ba). Sec. cl. HAYEK dubius.

4600. *E. tenuifolius* (W. K.) DC. — In rupestribus reg. infer. mediterr. et montanae calidioris dic. merid. — Ad Sindžon et Slivje (Pt), Orahovo distr. Kuči (Sz), ad Cetinje et Njeguši (Kn, Ba, Ld, Ro, Gi, Pej, Če), Velestovo distr. Katunska nahija; supra Rijeka (Ro), Bijela Skala et Medjurečka

planina pr. Bar; Miočev do supra Rikavac (Ba), Podgorica et Rudine nikšićke (Ro).

\*4600b. *E. Glišićii* ČERNJAVSKI et SOŠKA (Bulletin de l'Inst. botan. de l'Univers. de Beograd. Tome III. 1936-37). — „Perennis; rhizomate lignoso crasso longi-obliquo vel erecto diviso, reliquiis foliorum anni praecedentis siccatis ochraceis membranaceis obsito; caulis caespitosus erectus vel ascendens ad 18 cm altus glaber; folia linearia apice spathulato-dilatata subacuta integerrima, margine rigide setaceo-ciliata, ceterum glabra; basalia basi 1—2 mm, apice ad 4 mm lata, ad 15 cm longa, caulina semiamplexicaulia, breviora; capitulum uniflorum; folia involucralia viridia, interioria ad 9 mm, exteriora ad 32 mm longa calycem superantia, basi ovata non inflata apice + attenuata, margine rigide setoso-ciliata, ceterum glabra; calycis laciniae ad 18 mm longae ellipticae acutae (appendicibus inter lacinias deficientibus!), tubo 2—3-plo longiores margine rigide setoso-ciliatae, ceterum glabrae vix lilacinae; pilis rigidis ad 1 mm longis sparse verruculosis, verruculis parvis; corolla ad 5 cm longa, 18—25 mm lata, coerulea tubulosocampanula, extus perfecte glabra, lobis ellipticis 12—15 mm longis; stigma quadri- (vel tri-?) partitum lobis linearibus patentibus; capsula tri- vel quadrilocularis, omnino intera ovoidea, superne intra calycem plana, apice et a latere membranacea irregulariter lacera; semina multa ovata compressa, ad 1,5 mm longa, 0,75 mm lata.“ — In fauce fl. Tara ad rupes calcareas prope Sokoline et Čurovac supra pagum Tepce, cca 1500 m (legit V. Blečić).

4601. *E. graminifolius* (L.) DC. subsp. *coeruleus* JANCH. — In rupestribus et gramin. reg. subalp. et alp. in omnibus montibus dicionis septentr. et orient. frequens; etiam in monte Lovćen; in reg. infer. rarius.

— var. *Ginzbergeri* LINDB. f. — In calcar. reg. mont. calid. ad Podgorica et Njeguši (Ro), in monte Kosa supra Bar (Do).

— var. *alpinus* (WETTST.) JANCH. — In reg. alpina frequens.

— f. *montenegrinus* (HORÁK OeBZ. L: 163) HAY. — In alp. montis Maganik et in Pavlova livada (Ho).

— subvar. *Baldaccii* JANCH. — In monte Lovćen (Ro, Pej).

4602. *E. Wettsteinii* HAL. et BALD. OeBZ. XLI: 371.  
— A praeced. dignoscitur foliis margine regulariter setaceo-ciliatis in pagina superiore pilis griseis strictis appressis dense obsitis, infra glabris et nitidis; foliis involucr. lanceolatis apicem versus vix angustatis, supra albo-hirsutis marginibus setoso-ciliatis, infra glabris nitidis, calycis laciniis late lanceolatis pilosis et ciliatis. — In saxis apricis m. Rumija et in Medjurečka planina pr. Bar (Ba, Do), in monte Kosa et Lonac supra Bar (Do).

4605. *E. serpyllifolius* (VIS.) DC. — Ab omnibus spec. praeced. dignoscitur foliis spathulatis emarginatis. — In rupestr. et pascuis reg. alpinae, rarius subalp. — In monte Jasstrebica (Ad), in praeruptis montis Kom (Pč, Sz, Ba, Ro, Ja), Rikavac, Planinica, Mojan, Širokar, Carine, Rogam (Ba), in monte Durmitor (Ba, Ro), Maglić Pivski, Ledenica planina, Vojnik (Ro).

— f. *pilosulus* BECK. — Folia supra sparse pilosa. — Cum typo in monte Durmitor et Vojnik (Ro).

### *Jasione* L.

4609. *J. orbiculata* GRIS. — In pascuis reg. alp., rarius subalp. in omnibus montibus dicionis septentr.-orientalis ad fines Albaniæ. — In monte Kom (Pt, Pč, Ba, Ho, Ro, Ja), Žijovo, Mali et Velki Maglić distr. Kuči (Sz, Ba), Ljuban, Planinica, Carine et Rogam sub monte Kom (Ba), Mokro distr. Kuči; m. Balj, Pišev, Sjekirica planina; Krivi do et Bjelastica planina (Ro), in monte Rudo brdo et Pivljan (Ja), inter Vunsaj et Dečani supra Gusinje (Df).

## **Compositæ**

### *Eupatorium* L.

4613. *E. cannabinum* L. — In umbrosis, glareosis, ripariis, fruticetis et in silvis reg. infer., mont. et subalp. in toto territorio.

— f. *simplicifolium* HAL. (= var. *indivisum* BOISS.). — Ad Bar; Bajce pr. Cetinje (Ro).

### *Solidago* L.

4614. *S. virgaurea* L. subsp. *euvirgaurea* HAY. — In silvis et dumetis reg. mont. et subalp. — In silva Skrobotuša

sub monte Vila et ad latera montis Dziebeze (Sz), Konjuhe pr. Andrijevica (Ba), Han Garančić, Matošovo et Kolašin in valle fl. Tara (Ja), circa Viljuša, Njeguši, coenob. Piva, Šavniki et ad latera montis Lovćen (Ro).

— subsp. *alpestris* (W. K.) GAUD. — In reg. subalp. et alp. — Perućica sub monte Kom; Kovčice sub m. Durmitor (Pt, Ro), Rogam sub m. Kom (Ba).

— var. *vestita* HAL. — Caulis et folia ± dense pubescentia tomentosa. — In alp. m. Maglič, Durmitor et Lovćen (Ro).

### *Bellis* L.

4617. *B. perennis* L. — In pascuis et pratis reg. infer., mont. et subalpinae in tota dic. frequens.

\*4618. *B. hybrida* TEN. — In marit. ad Pristan Bar (Ba).

4619. *B. silvestris* CYR. — In pratis reg. infer. et mont. calidioris. — Circa Bar (Ba, Ro), Krstac pr. Njeguši (Ba, Pej), Crmnica (Eb).

### *Aster* L.

4624. *A. bellidiastrum* (L.) SCOP. — In rupestr. et lapid. reg. subalp. et alp. in omnibus mont. dic. septentr. et septentr. orient. frequens; e dic. merid. adhuc tantum e monte Jastrebica nota.

— subf. *humilis* BECK. — Inter Kotor et Njeguši (Kn), Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

4625. *A. alpinus* L. subsp. *dolomiticus* (BECK) HAY. — In sax. reg. alp. — In monte Durmitor (Pč, Ro), Kom (Ho, Ro, Ba), Crvena ploča in Sinjavina planina (Ba), Javorje planina, Piperska Lukavica (Ro).

4626. *A. amellus* L. — In vineis reg. infer. — Ad Boljevići pr. Vir (Pč).

4632. *A. illyricus* (MURB.) K. MALÝ (= *Galatella rigida* var. *ill.* MURB.). — Caulis erectus strictus scabridus; folia impunctata lanceolata vel elliptico-lanceolata obtusiuscula vel apicem versus in mucronem brevem subito contracta semi-amplexicaulia integerrima margine et ad nervos pilis papilliformibus scabra ceterum glaberrima; panicula terminalis; phylla involucri imbricata lanceolata obtusiuscula, interiora margine

scariosa, omnia valde viscida; flores disci flavi, ligulae lilacinae steriles; pappus rufescens; achenia strigoso-sericea. — In dumetis reg. mont. calidior. ad Dobre Strane distr. Cuci (Pč).

\*4634. *A. linosyris* (L.) BERNH. — In pratis saxosis reg. subalp. sub monte Durmitor (Pč).

### *Erigeron* L.

4636. *E. polymorphus* SCOP. var. *glabratus* (HOPPE) VIERH. (= *E. alpinus* et *uniflorus* aut. monten.). — In pascuis reg. alpinae in omnibus montibus frequens. — In m. Lovćen etiam in forma, quae involucro densius cinerascenti-hirto ad var. *graecum* VIERH. spectat.

— var. *montenegrinus* VIERH. — Elatus, flaccidus, folia tenuia. — In umbrosis rarius.

4641. *E. atticus* VILL. — Dignoscitur indumento glandulosopiloso. — In rupestr. et glareosis reg. alpinae raro. — In monte Durmitor (Pč), Štirni do pr. Lukavica planina; in monte Lovćen (Ro).

× *E. atticus* VILL. × *polymorphus* SCOP. — Inter parentes in monte Lovćen (Pej, Ro).

4642. *E. acer* L. — In silvis, pascuis et lapid. reg. infer., mont. et subalp., rarius alp. — Perućica sub m. Kom (Pt, Sz, Ro), sub m. Hum Orahovski (Sz), ad Cetinje (Ba), Rijeka (Ba, Ho), Rogam sub monte Kom (Ba), Ljut et Zakamen supra coenob. Piva; Šavnik, Njeguši, Golo brdo sub m. Lovćen, Velestovo distr. Katunska nahija; Bukovica sub m. Durmitor; Štirni do pr. Lukavica planina usque ad 1800 m (Ro), in monte Trešnjevik et circa Kolašin (Ja), Vermoš planina ad fines Albaniæ (Df), in monte Rumija (Do).

\*4643. *E. crispus* POURR. — Ab *E. canadensi* distinguuntur: capitula duplo maiora, involucri phylla dense hirta; caulis pilis longis et praeterea pilis brevibus dense tectus; indumentum foliorum idem ut in caule, densum, ob hoc tota planta colore cinereum habet; achenia pilis erecto-patulis tecta. — In lapid. et saxosis reg. inferioris. — Collis Volovica pr. Novi Bar (Do).

4644. *E. canadensis* L. — In lapid., incultis et ad vias reg. infer. et mont. — Ad Cetinje (Pt, Pč), Sindžon (Pt), Njeguši, Rijeka (Pč), Ceklin pr. Njeguši (Kš), Gornje Blato, Podgorica, Zagarać, Andrijevica, Bar (Ro).

*Micropus* L.

\*4646. *M. erectus* L. — In lapidosis ad viam sub Krstac pr. Njeguši (Ho).

*Eva x* GAERTN.

4649. *E. pygmaea* (L.) PERS. — In lapid. et aren. reg. infer. mediterr. — A cl. HAYEK e Monten. *indicata*; verosimiliter in marit. ad Bar et Ulcinj.

*Filago* L.

4656. *F. germanica* L. — In aren., lapid. et agris reg. infer., mont., rarius subalp. — Ad Sindžon (Pt), Danilovgrad (Pt, Pč), Šavica distr. Lješanska nahija (Pč), Goraňsko distr. Piva; Andrijevica, Konjuhe, Podgorica, Boljevići supra Vir, Njeguši, Rudine nikšićke et in monte Vojnik (Ro), Bar (Ro, Do), Bioče in valle fl. Morača; supra coenob. Morača versus Bistrica; Kralje pr. Andrijevica (Ja).

— var. *lanuginosa* (DUBY) DC. — Cinerascenti-albido-tomentosa; involucri phylla exteriora usque ad  $\frac{2}{3}$  dense lanato-tomentosa brevius acuminata. — Ad Danilovgrad (Pt).

4657. *F. spathulata* PRESL. — In aren. marit. ad Ulcinj (Ro).

4658. *F. arvensis* L. — In lapid., incultis agris et ad vias reg. mont. et subalp. — Ad Cetinje et Njeguši (Pč), Velika distr. Vasojevići (Ba), Kralje supra Andrijevica (Ja, Ro), in valle fl. Lim et Zlorječica (Ro).

4659. *F. montana* L. — In asperis reg. infer. medit. ad Danilovgrad (Pč).

4660. *F. gallica* L. — In rupestr., glareosis et sterilibus reg. infer. mediterr. — Bioče pr. Podgorica (Pt), Danilovgrad; supra Limljani pr. Vir (Pč), in aren. marit. ad Bar et Ulcinj (Ho, Ro), circa Spuž et Podgorica (Ro).

*Antennaria* GAERTN.

4661. *A. dioica* (L.) GAERTN. — In pascuis et gramin. reg. subalp. et alpinae in omnibus mont. dic. septentr. — Etiam in monte Orjen. E monte Lovćen et Rumija dic. merid. adhuc non vidi.

— var. *australis* GRIS. — Folia utrimque tomentosa; capitulo maiora, involucrum etiam capitulum femineorum albostomentosum. — Typo frequentior.

*Leontopodium* R. BR.

\*4662. *L. alpinum* CASS. — In rupestr. et pasc. reg. alp. rarissime. — In monte Ranisava pr. Durmitor leg. Knapp anno 1869 teste MALÝ; in monte Trojan supra Gusinje leg. Führer teste MALÝ; in monte Orjen ad fines Dalmatiae leg. Neumayer fide VISIANI; in fauce fl. Tara ad rupes calcareas pr. Sokoline et Čurovac supra pag. Tepce (leg. Blečić); in monte Durmitor locis Lojanik et Žuta Greda supra Dobri do (Boš). (Quid sit *Gnaphalium alpinum* L. a cl. BALDACCI e monte Durmitor jugo Štulac in „Altre Notizie“ p. 73 indicatum, nescio.)

*Gnaphalium* L.

4663. *G. uliginosum* L. — In humidis, aren., fossis et pascuis reg. infer. et subalp. — Ad Rijeka (Pt, Pč), Vir (Pč), Cetinje (Ba); sub monte Stožac in Sinjavina planina; Vratlo supra Kolašin; in monte Lisa pr. Andrijevica (Ba), sub monte Vojnik; ad Danilovgrad, Andrijevica et coenob. Piva (Ro), Kamenjak (Ho).

4664. *G. luteoalbum* L. — In humidis, arenosis et fossis reg. infer. et mont. — Ad lacum Scodranum (Pč), Kolašin (Ba).

4665. *G. silvaticum* L. — In rupestr., pascuis et silvis reg. subalp. et alpinae in toto territorio; in reg. infer. solum ad Rijeka a cl. PANTOCSEK lecta.

— var. *stramineum* MURB. — A typo differt anthodiis omnino stramineis albostiridibus, paleis anthodii intimis pappo floribusque sublongioribus, inflorescentia angustissima (MURB. Beitr. 106). — Tursko ždrijelo (Ho), Mali Šanik et Njeguška planina sub monte Lovćen (Pej, Ro), sub monte Hum Oraščevski (Sz), in valle fl. Tara ad Han Garančić, Matoševo et Kolašin; in monte Kom Kučki forma foliis latioribus et brevioribus (Ja), Torinje et Kruševica supra Njeguši cum formis intermediis (Pej, Ro).

4666. *G. norvegicum* GUNN. — In pratis reg. subalp. et alp. — Pavlova livada (Ho), in monte Balj supra Andrijevica; Bjelastica planina usque ad 2000 m (Ro).

4667. *G. Hoppeanum* KOCH. — In pascuis reg. alp. — In monte Kom (Pt, Pč, Ro), Crno jezero sub monte Durmitor (Pt), Konjuhe sub monte Kom (Ba), Maglić Pivski, Ledenica planina; Vališnica in monte Durmitor (Ro), Buni Jezerce in Prokletija planina (Df). Planta in monte Jastrebica ad fines Dalmatiae a cl. PANČIĆ lecta potius ad sp. sequent. pertinet.

4668. *G. Roeseri* BOISS. et HELDR. var. *Pichleri* (MURB.) HAY. — A praeced. dignoscitur caule graciliore albo-tomentoso, foliis apicem versus sensim attenuatis, sericeo-albo-tomentosis, capitulis perpaucis longe pedunculatis spicam laxissimam interruptam formantibus, involucri phyllis margine anguste stramineo-brunneis, acheniis pilis densis adpressis latitudine achenii longioribus et basim pappi omnino tegentibus seriecis (conf. MURBECK Beitr. 106; ROHLENA V. Beitr. 64). — In rupestr. reg. alp., subalp., rarius montanae. — In monte Lovćen (Pichler, Pej, Kš, Ho), supra Cetinje (Ba, Kn), in montibus ad fines Albaniae: Hum Orahovski, Kunj Kostića, Žijovo, Rikavac, Dibala, Vila (Ba), Maganik et Pavlova livada (Ho), Kom Kučki et Vasojevički (Ro, Lo), in monte Vojnik (Ro), Fuša Rudnices sub Prokletija planina (Df), Jastrebica (Pč).

4669. *G. spinum* L. — In pascuis reg. alp. in omnibus mont. dic. septentrionalis frequens. E montibus dic. merid. (Lovćen et Rumija) adhuc non vidi.

— f. *subacaule* (WAHLENB.) BALD. — Caules brevissimi vel subnulli, capitula inter folia basalia ± sessilia. — In herbidis excenso jugo Šljeme in monte Durmitor cca 2500 m (Ba).

### *Elytrium* GAERTN.

4677. *E. italicum* (ROTH) DON. — In saxosis reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Boljevići supra Vir (Pč), Dubovik pr. Cetinje (Pej, Ro), Zvjerinjak pr. Njeguši (Pej, Ro), Bar (Do).

— var. *microphyllum* (WILLD.) BOISS. — Folia cca 1—2 cm longa, internodiis breviora. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

### *Inula* L.

4681. *I. helenium* L. — In silvis, salicetis et dumetis reg. infer. et mont. — Ad Sladovo Kopito (Pt), Danilovgrad (Pč), supra coenob. Piva; ad Kolašin; Godinje pr. Vir (Ro).

4682. *I. germanica* L. — In silvis et dumetis reg. infer. — Circa Gradac et Danilovgrad (Pt), Kokoti in Lješanska nahija (Ro).

4683. *I. salicina* L. subsp. *eusalicina* HAY. — In fruticetis, herbidis et silvis reg. infer., mont. et subalp. — Lastva čevska pr. Vojnići; Danilovgrad (Pt, Ro), Rijeka (Ho), Drušići pr. Rijeka; Spuž, ad latera montis Garač et Tvrdjak distr. Katunska nahija (Ro), inter Brčeli et Boljevići pr. Vir (Eb).

\* — — f. *subhirta* C. A. MEY. — Cum typo ad Njeguši (Pej).

— — subsp. *aspera* (POIR.) HAY. — Ad rivum Sušica pr. Danilovgrad (Pt), ad Njeguši et ad lat. mont. Lovćen; supra coenob. Piva; Spuž; Čevo distr. Katunska nahija; Bukovica sub monte Durmitor; in monte Žoljevica pr. Andrijevica (Ro).

× *I. stricta* TAUSCH = *I. ensifolia* L. × *salicina* L. — Bogojeva glava pr. Njeguši (Pej, Ro).

4684. *I. spiraeifolia* L. — In sax. et frutic. reg. infer., mont. et subalp. — Ad Boljevići pr. Vir (Pč), Cetinje (Kn), Simunj distr. Katunska, Mali Šanik sub monte Lovćen (Ro), Bar (Do).

— — f. *simplex* ROHL. V. Beitr. 62. — Caulis 1—2cephalus. — In dumet. ad Mratinje distr. Piva (Ro).

— — f. *dentata* ROHL. — Folia argutius dentata. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

— — f. *scaberrima* ROHL. IV. Beitr. 60. — Folia utrimque, imprimis supra, glandulis pellucidis scaberrima. — Ad Njeguši et in decliv. mont. Lovćen (Pej, Ro).

4686. *I. ensifolia* L. — In rupestr. et dumet. reg. mont. et subalp. — Šavniki sub Ivica planina (Pč), Radovče polje (Ho), ad Njeguši et in monte Bogojeva glava sub monte Lovćen (Pej, Ro), in monte Pješevac et Stražica supra Velestovo distr. Katunska; Viljuša, Rudine nikšićke; Borkovići distr. Piva, m. Vojnik; Crvena greda sub monte Durmitor (Ro).

— — f. *lancifolia* BECK. — Folia 4—7 mm lata. — In asperis ad Simunj distr. Katunska (Ro), Zanovetni briješ supra Njeguši (Pej, Ro).

4687. *I. britannica* L. — In pratis humidis, in fossis et ad vias reg. infer. et montanae. — Ad Rijeka (Pt, Ho, Kn), Vir et Danilovgrad (Pč), circa Plavnica (Sz, Ja, Ro), Medun

(Sz), Njeguši (Ba, Pej, Ro), Podgorica, Viljuša, Nikšić, Vrbica, Lastva čevska (Ro).

— f. *parviceps* HAY. (= var. *microcephala* ROHL. non VELEN.). — Capitula minora, achaenia glabra vel subglabra. — In valle fl. Tara ad Han Garančić (Ro).

\*— f. *sericeo-lanuginosa* DOMIN SBGW. 1905. — Cum typo ad Njeguši loco Krstac (Ro).

\*— f. *glabriuscula* A. GR. — Glabriuscula, foliis scabridulis. — Ad Lipovik pr. Rijeka (Ro).

— f. *microcephala* VELEN. — Folia angusta valde elongata semiamplexicaulia; capitula minora densius corymbosa. — Njeguško polje; inter Bukovica et Cetinje (Ro, Pej).

4688. *I. oculus-Christi* L. — In lapid. et gramin. siccis reg. infer., mont. et subalp. in toto territorio frequens.

— var. *scabra* ROHL. III. Beitr. 39. — Folia angustiora rigidiora breviter appresse hirsuto-scabra (nec tomentosa) et evidenter glandulosa, caulis pilis brevibus scaberrimus sub inflorescentia longius patule hirsutus et glandulosus, involucrum phylla appresse hirta et glandulosa. — In subalp. ad Drežnicu pr. Nikšić (Ro).

4690. *I. conyzoides* DC. — In silvis et frutic. reg. infer., mont. et subalp. — Supra coenob. Morača et pr. Vir (Pč), Cetinje (Kn, Ro), Ostrog (Ho), Danilovgrad; Jasenovo polje sub monte Vojnik; in monte Vjetnik; Njeguši; Rudine nikšićke; Simunj distr. Katunska; in monte Žoljevica pr. Andrijevica (Ro), in monte Jablan (Ja).

4694. *I. crithmoides* L. — In rupestr. et lapid. mari- timis. — Ad Bar et Ulcinj (Ro).

4695. *I. viscosa* L. — In fossis, arenosis et olivetis reg. infer. mediterr. — Ad Vir (Pč), Rijeka (Kn), circa Bar, Ulcinj, Danilovgrad et ad ripas lacus Scodrani; inter Kotor et Njeguši (Ro), insula Vranina (Eb).

4696. *I. graveolens* (L.) DESF. — In cultis inter vi- neas et in ruder. reg. infer. et mont. calid. — Ad Njeguši et Grahovo, pr. Vir (Pč).

#### *Pulicaria* GAERTN.

4698. *P. vulgaris* GAERTN. — In humidis et ad fossas reg. infer. et montanae. — Ad Rijeka (Pt), Vir (Pč), Orahovo, distr. Kuči (Sz), ad Plavnica (Ro).

4700. *P. dysenterica* (L.) GAERTN. — In humidis et salicetis reg. infer., mont., rarius subalp. — Ad Vir (Pč), inter Rijeka et Cetinje; Orahovo distr. Kući (Sz), Bar (Pej, Ro, Do), sub monte Kom (Ho), in valle fl. Perućica pr. Konjuhe; circa Andrijevica; Mratinje distr. Piva (Ro), supra coenob. Morača versus Bistrica (Ja), in valle rivi Piva pr. Krstac (De, Si).

*Pallenis* CASS.

4703. *P. spinosa* (L.) CASS. — In rupestr., in herbidis et ad muros reg. infer. medit. — Sindžon (Pt), Danilovgrad; Šavica distr. Lješanska (Pč), Ulcinj (Ho), ad Drušići, Spuž, Danilovgrad et Bar (Ro).

— f. *croatica* (GRAEBN.) HAY. — Perennis, robustior, caulis minus dense pilosus. — Ad Bar (Ba).

*Bupthalmum* L.

\*4704. *B. salicifolium* L. — In gramin. reg. subalp. ad Ječmeni do in Sinjavina planina (Ba).

*Telekia* BAUMG.

4705. *T. speciosa* (SCHREB.) BAUMG. — Ad ripas, in fruticet., umbrosis humidis reg. subalp. et alpinæ in tota dic. septentr.; e ditione merid. solum ad Cetinje a cl. KNEUCKER indicata.

*Asteriscus* MOENCH.

\*4707. *A. aquaticus* (L.) LESS. — In aren. et lapid. reg. infer. pr. Bar (Ro, Do).

— f. *nanus* BOISS. — Caulis humilis 1—2cephalus capitulis minoribus. — Cum typo (Ro).

*Xanthium* L.

4712. *X. strumarium* L. — In incultis et ad vias reg. infer. et mont. — Bogetići pr. Nikšić (Pt), Mratinje sub monte Maglić; ad Plavnica, Podgorica, Njeguši, Danilovgrad et Andrijevica (Ro).

4713. *X. saccharatum* WALLR. subsp. *italicum* (MOR.) HAY. — Ad vias et in ruderatis inquilinum. — Plavnica (Ho), Bar, Plavnica, Njeguši et Šavnik (Ro).

4714. *X. spinosum* L. — In ruder. et ad vias inquilineum.  
— Cetinje (Pt), Bogetići pr. Nikšić (Ba), Bioće pr. Podgorica  
(Ja, Ro), Viljuša, Nikšić, Podgorica, Lješko polje, Lijeva Ri-  
jeka, Njeguši, Čevo, Bar, Vir; Velestovo distr. Katunska (Ro).

### *Helianthus* L.

4715. *H. annuus* L. — Cultus et subspontaneus.

### *Bidens* L.

4717. *B. cernuus* L. — In arundineto ad rip. lacus Scodrani pr. Sinjac (Pč).

4718. *B. tripartitus* L. — In palud., fossis reg. infer.  
et subalp. — Ad Sinjac et Vir ad ripam lacus Scodrani (Pč),  
Pošćensko jezero supra Šavniki (Ro).

### *Anthemis* L.

4725. *A. tinctoria* L. — In dumetosis, collinis apricis et  
ad vias reg. infer., mont. et subalp. — Circa Danilovgrad (Pč),  
Rijeka (Ho), Varda supra coenob. Piva; Konjuhe sub monte  
Kom; Jerinja glava supra Andrijevica; in valle fl. Lim (Ro),  
Kralje pr. Andrijevica (Ja).

— f. *discoidea* (WILLD.) VAHL. — Rarius cum typo.

4726. *A. Triumfetti* (L.) ALL. var. *rigescens* (WILLD.)  
FIORI. — A praeced. dignoscitur pappo coronulam scariosam  
cca 1 mm longam formante, capitulis maioribus (cca 4–5 cm  
diametro) et ligulis albis. — In saxosis et dumet. reg. inferioris,  
mont. et subalpinae. — Danilovgrad; Perućica sub monte Kom  
(Pt, Sk), Crvena Stijena sub monte Durmitor (Pč); in sax.  
Skala Rikavac distr. Kući (Ba), in monte Vojnik; Varda distr.  
Piva; Piševo, Jerinja glava et Balj pr. Andrijevica; Podgorica  
(Ro), Pivska planina ad Pišće, Lever Tara et Nedajno (De, Si).

— f. *nigrescens* ROHL. V. Beitr. 57. — Anthodii squamis  
lanceolatis apice protractis, margine late fusco-atris. — In alp.  
montis Sjekirica planina (Ro).

4728. *A. cota* L. — In lapid. apricis dic. mediterr. —  
Crmnica (Eb).

\*4731. *A. brachycentros* GAY. — In lapid. et ruder.  
reg. mont. calid. — Kopilje (Ho), Cetinje (Kš), Goraňsko,

Borkovići, coenob. Piva (Ro), in valle Vrbnica distr. Piva (De, Si).

4734. *A. orientalis* (L.) DEG. subsp. *carpathica* (W. K.) HAY. — In rupestr., glareosis et pascuis reg. alp. — In monte Kom et Durmitor (Pt, De, Si, Ro), in monte Maglič Pivski (Murbeck).

\*— var. *macedonica* GRIS. (= *A. cinerea* PČ.). — In alp. montis Sjekirica planina; etiam in valle fl. Lim et Zlorječica pr. Andrijevica (Ro).

4746. *A. arvensis* L. — In agris et ruderatis reg. infer., mont., rar. subalp. — Šavnik (Pt), Cetinje (Pč), Medun (Sz), Velki Bostur in monte Lovćen (Kš), Njeguši (Pej, Ro), circa Bar, Vir et Andrijevica (Ro), Han Garančić et Kolašin in valle fl. Tara (Ja), Crmnica (Eb).

— var. *incrassata* (LOIS.) BOISS. — Ad Bar (Ba), Korčman in Sinjavina planina? (Ba), Bioče et Podgorica (Ro).

4757. *A. cotula* L. — In incultis, ruder. et ad vias reg. infer. et mont. — Inter Njeguši et Cetinje (Kn), Plavnica (Sz), Andrijevica (Ho, Ro), Podgorica (Ro), Bar (Do), Crmnica (Eb).

### *Achillea* L.

\*4761. *A. ageratifolia* (S. S.) BOISS. subsp. *aizoon* (GRIS.) HEIM. var. *serbica* (NYM.) HAY. — Caulis albo-tomentosus corymboso-oligocephalus; folia adpresso albo-cineo-tomentosa, inferiora cuneato-lineari-lanceolata, reliqua linearia vel linear-lanceolata integra vel leviter crenato-serrata; capitula 15–18 mm diametro, ligulae albae involucro aequilongae vel parum longiores. — In rupestr. calc. reg. mont. et subalp. in dic. septentr. — In monte Balj supra Andrijevica cca 1000 m; in valle flum. Piva sub Goraňsko et Mratinje (Ro).

4762. *A. lingulata* W. K. — Affinis *A. ptarmicæ* L., a qua dignoscitur foliis apice rotundatis, basalibus obovato-spatulatis, caulinis lingulatis, ligulis paucioribus (6–9). — In pratis alpinis dic. septentr. — Carine sub monte Kom; Javorce in Crna planina; Sinjavina planina (Pt), Bjelastica planina (Ro), sub monte Kom (Ja).

4766. *A. abrotanoides* VIS. Fl. dalm. II:81. — Suf-fruticosa piloso-cinerea, foliis circumscriptione ovalibus ovatis-

que bipinnatipartitis punctatis, radicalibus petiolatis caulinis sessilibus, summis pinnatipartitis omnium laciniis floralibusque linearibus vel linearilanceolatis 0,5—1 mm latis acutis breviter mucronatis; capitula 11—12 mm diametro in corymbum densum disposita; ligulae albae 8—9, involucro aequilongae. — In rupestr. reg. subalp., alpinae (rarius montanae) in toto territorio frequens. Etiam in valle flum. Zlorječica et Peručica sub monte Kom et in valle fl. Piva sub Maglić (Ro).

— f. *montenegrina* BECK et SZ. — Caules, imprimis pedunculi, folia et involucri squamae crispule patentim copiose pilosa. — In gramin. montis Velki Maglić; in sax. summi montis Hum Orahovski (Sz).

\*— f. *riparia* ROHL. IX. Beitr. pag. 1. 1933. — Foliis maioribus, caulinis minus divisis fere simpliciter pinnatifidis, laciniis longioribus et latioribus (cca 1—2 mm latis) obtusiusculis. — Ad ripam fluvii Zlorječica pr. Andrijevica (Ro).

4767. *A. Clavennae* L. — In rupestr. reg. alp. in omnibus mont. dic. septentrion. frequens, saepissime in var. *argentea* VIS. (= var. *Visianii* BECK). — In dic. merid. solum in monte Velika Jastrebica ad fines Dalmatiae a cl. PANČIĆ lecta. E monte Lovćen et Rumija adhuc non vidi.

— f. *megapetala* ULLEP. — Ligulae duplo maiores. — In alp. montis Durmitor loco Valoviti do (Ro).

— var. *intercedens* HEIM. — A typo differt foliis basalibus profundius pinnatilobis vel pinnatipartitis, caulinis inferioribus pinnatifidis, superioribus dentatis vel subpinnatilobis, corymbo polyccephalo, saepe composito. — In saxosis ad Fuša Rudnices sub monte Prokletija (Df).

4771. *A. Fraasii* SCHULTZ=BIP. — Sericeo-tomentosa; caulis usque ad 40 cm altus superne subnudus; folia inferiora oblongo- vel linearilanceolata petiolata in laciniis 2—3-fidas integras obtusas bipinnatisecta, superiora pinnatipartita sessilia, corymbus compositus congestus; ligulae 5—7 albae involucro di midio breviores transverse latiores. — In rupestr. reg. subalp. rarissime. — In monte Vila ad fines Albaniae (Ba).

— f. *korabensis* KUEMM. et JAV. — Ligulae maiores, usque ad 4 mm longae involucrum subaequantes. — In monte Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro, Sk).

4776. *A. nobilis* L. var. *ochroleuca* BOISS. — In collibus apricis et lapidosis reg. inferioris, montanae, rarius subalpinae. — Vir (Pč), Cetinje (Ba), in monte Žijovo et Starac (Ba), in incultis pagi Orahovo distr. Kuči (Sz), circa Danilovgrad, Njeguši et Podgorica (Ro), circa Andrijevica (Ro, Ja), supra coenob. Morača; in valle rivi Bistrica pr. Kolašin; in decl. montis Vjetrnik; in valle fl. Tara (Ja), in monte Rumija supra Bar (Do).

4779. *A. crithmifolia* W. K. — A praeced. dignoscitur rachide integerrima, a sequente foliis circumscriptione latioribus et segmentis magis remotis, ligulis supra ± ochroleucis. — In graminosis, fruticosis et saxosis reg. infer., montanae, rarius subalpinae. — Danilovgrad (Pt), Cetinje (Kn), Drušići pr. Rijeka (Ba), ad latera montis Balj supra Andrijevica (Ro).

4780. *A. millefolium* L. subsp. *eumillefolium* HAY. — In pratis et herbidis reg. infer., mont. et subalpinae. — Carine sub monte Kom; Kovčice sub monte Durmitor (Pt), Cetinje, Grahovo (Pč), Viljuša, Njeguši, Velestovo, Čevo (Ro), Rijeka, Andrijevica (Ho), in monte Žijovo (Ba).

— — — f. *tubiflora* ROHL. V. Beitr. 58. — Ligulae nullae, flores disci marginales maiores, subradiantes. — Ad Njeguši (Pej, Ro).

— — — subsp. *collina* (BECKER) WEISS. — Ad Andrijevica (Ro).

— — — var. *lanata* KOCH. — In monte Korman in Sinjavina planina (Ba), Pavlova livada (Ho), Krstac pr. Njeguši (Pej, Ro), Kolašin; Kralje pr. Andrijevica (Ja), in monte Rumija (Do).

4782. *A. setacea* W. K. — In lapid. et herbidis reg. mont. et subalp. — In monte Korman in Sinjavina planina (Ba), Čevo et Čevski Lisac distr. Katunska (Ro).

4783. *A. tanacetifolia* ALL. subsp. *eutanacetifolia* HAY. — In pratis et pascuis reg. alp. et subalp. — Inter Vunsaj et Dečani pr. Plava (Df), sub monte Kom et Durmitor (Pt, Ro), Štirni do pr. Lukavica planina (Ro), in valle fl. Perućica (Pt, Ho, Ro). Verosimiliter loca hic enumerata partim ad var. *distantem* (W. K.) pertinent.

— — subsp. *stricta* (SCHLEICH.) HAY. — In pascuis ad Krnovo sub monte Vojnik (Ro), Margarita sub monte Kom (Ja).

*Leucanthemum* ADANS.

4804. *L. atratum* (JACQ.) DC. subsp. *chloroticum* (KERN. et MURB.) HORV. f. *simplex* HORVATIC. — Dignoscitur foliis caulinis anguste linearibus integerrimis vel dentibus paucis remotis extrosum curvatis. — In herbidis, lapidosis reg. mont., subalp., rarius alpinae. — In monte Jastrebica (Pč), in monte Lovčen (Pichler, Ad, Pč, Pej, Ro), ad Cetinje; in monte Lisinj supra Bar; in monte Jablan et Gradište in Sinjavina planina; Maganik et Pavlova livada (Ho), Čevski Lisac distr. Katunska nahija (Ro), Kunj Kostića distr. Kuči (Ba).

\*— subsp. *croaticum* HORVATIC var. *illyricum* HORVATIC\*) sub *Chrysanthemo*. — „Caulis simplex erectus foliosus striatus 20—60 cm altus; folia omnia carnosa caulina infima obovata vel obovato-cuneata longe petiolata in apice subtruncata vel subrotunda, in marginis parte superiore profunde inciso-crenata vel inciso-serrata, sequentia longe alato-petiolata, laminis angustioribus profunde inciso-serratis, media et superiora sessilia inciso-serrata; capitula 3—6 cm lata; involucri squamae anguste brunneo vel ferrugineo marginatae, rarius exteriores + pallide virides; achenia florum radii corona completa vel auriculiformi donata.“ — In herbidis in monte Durmitor loco Medjed (Boš), in monte Durmitor, Maglić Pivski et Vojnik (Ro), supra lacus Crno jezero et Lokva sub monte Durmitor (De, Si).

4805. *L. vulgare* LAM. subsp. *triviale* (GAUD.) BRIQU. — In pratis reg. infer., mont. et subalp. in toto territorio.

\*— var. *laticeps* BRIQU. — Planta robusta, caulis plurimque simplex monocephalus 30—60 cm altus; folia caulinata valde lata (1—2 cm) ovalia; capitula cca 5 cm lata; involucri squamae atro-brunneo marginatae. — In reg. subalp. Žabljak et Zmijino jezero sub monte Durmitor (Boš), Poljana pr. Volučko jezero (Ma).

\*— var. *praestans* BRIQU. et CAV. (= var. *hispidum* BOENN.). — In monte Lovčen et ad Krstac pr. Njeguši (Pej, Ro).

\*) Confer: HORVATIC „Oblici sekcije Leucanthemum...“ in Acta Botan. Instit. Botan. Univers. Zagrebensis vol. II. 1928 et vol. X. 1935 (Neuer Beitrag).

\*— var. *pratense* TIMB. et LAGR. — In monte Lovčen et ad Bukovica pr. Cetinje (Pej, Ro).

\*— var. *autumnale* (ST. AM.) BRIQU. et CAV. — Folia omnia inciso-lobata vel lobato-pinnatifida. — Secus viam ad fl. Tara pr. Kolašin (Ba).

\*— var. *Gaudinii* D. TORRE (= *Chr. Leucanthemum* b. *atratum* KOCH). — Folia caulina infima in apice lobulis obtusis 3-lobata, cetera crenato-dentata vel serrata; omnia parva; planta gracilis, caulis 10–30 cm altus et simplex; involucri squamae late atrobrunneo marginatae. — Ad lacum Volujačko jezero cca 1500 m (Ma).

\*— subsp. *Rohlena e* HORVATIĆ l. c. pag. 93, 1935. — Caulis usque ad 80 cm altus, inferne breviter pilosus, superne + glaber, in ramos elongatos monocephalos divisus; folia basalia et ea surculorum longe petiolata, profunde laciniato-pinnati-lobata, laciis apice subrotundatis et + profunde inciso-pinnati-lobata laciis obtusis integris vel incisis; folia superiora sessilia parva remote laciniato-pinnati-lobata; capitula cca 3–4 cm lata; involucri squamae omnes pallide virides; achenia florum disci epapposa, florum radii papposa. — In pratis humidis et paludosis ad Plavnica (Ro).

— subsp. *heterophyllum* (WILLD.) BRIQU. var. *lanceolatum* PERS. — In pratis subalpinis. — Ad lacum Volujačko jezero cca 1500 m (Ma), in monte Hum Orahovski et Dziebeze (Sz), in monte Durmitor, Maglič Pivski et Vojnik (Ro).

\*— var. *glossopodium* BRIQU. et CAV. — Ad latera montis Lovčen (Pej, Ro).

— var. *adustum* (KOCHE) HORVATIĆ. — In valle fl. Perućica sub monte Kom (Ro).

— subsp. *leucolepis* BRIQU. et CAV. var. *pallidum* FIORI. — Folia caulina inferiora obovato-spathulata, margine crenata; media et superiora oblonga rarius oblongo-lanceolata, margine serrata, basi dilatato-amplexicaulia et + profunde incisa; capitula mediocria, involucri squamae pallide virides; achenia radii coronula completa vel auriculiformi donata. — In graminosis ad Rijeka (Pt, Ro, Ho), ad latera montis Lovčen, Bukovica pr. Cetinje; Kračeva glavica et Krstačko polje pr. Njeguši (Pej, Ro).

\*— f. *vallisumbrosae* (FIORI) HORVATIĆ. — „Diese

Form unterscheidet sich durch die stark verzweigten, im unteren Teile ± weichhaarigen Stengel und oft einigermassen insbesondere gegen den Blattgrund zu eingeschnitten-gezähnten Blätter.“ — *Rarius* cum typo sub monte Lovćen (Pej, Ro).

\* — — — var. *asperulum* (N. TERRACIANO) HORVATIC. — „Stengel ± rauhhaarig; Blätter etwas dicklich, beiderseits höckrig rauh, selten beiderseits weichhaarig.“ — Kračeva glavica pr. Njeguši (Pej, Ro).

*Tanacetum* L.

4809. *T. cinerariaefolium* (VIS.) SCHULTZ-BIP. — In rupestr. reg. infer. et mont. calidioris in territorio meridionali. — Circa Komani (Pt), in monte Jastrebica=Bijela Gora, circa Čevo et Grahovo (Pč), Njeguši, Lovćen (Pč, Ad, Pej, Gi, Ma, Ro), Dobrsko selo pr. Cetinje, Vrojca distr. Kući, Nikšić; sub monte Sutorman; Medjurečka planina, montes Lišnj et Bijela Skala supra Bar; Mikulić sub monte Rumija (Ba, Ro), circa Vir, Boljevići, Podgorica; Zagarać supra Danilovgrad; Čevski Lisac distr. Katunska (Ro), Bar (Ro, Do), in monte Kosa supra Bar (Do), in monte Rasovatac pr. Vir (Eb).

— f. *incanescens* (ROHL. IV. Beitr. 59) HAY. — Folia supra appresse cano=pilosa. — Cum typo.

4810. *T. larvatum* (GRIS.) KANITZ. — „Perenne, adscendens, superne nudiusculum, pilis tenuibus patulis undique puberulum, monocephalum; foliis imis tripinnatisectis, caulinis paucis decrescentibus, segmentis extimis linearibus cuspidiatis integerrimis vel dentiferis; involucri squamis radio albo subaequilongis, margine nigris, laceris obtusiusculis, exterioribus decrescentibus; receptaculo nudo conico=convexo; acheniis cylindricis, in coronulam laceram triplo breviorem apice productis.“ — In rupestr. et glareosis reg. alp., rarius subalpinae in dizione septentr. et septentr.=orientali. — E montibus dic. merid. (Lovćen et Rumija) et e monte Maglić Pivski adhuc non vidi. — In m. Kom (Pt, Pč, Ro, Ba), Durmitor (Pč, Ba, Ro), Maganik, Pavlova livada (Ho), Gradište in Sinjavina planina, Hum Orahovski, Dibala, Pešinjak supra Rikavac (Ba), Margarita sub monte Kom (Ja), Korita rovačka, Vojnik, Želatin, Hasanac planina, Sjekirica et Perućica (Ro), Fuša Rudnica sub monte Prokletija (Df), in monte Visitor pr. Andrijevica (Sk).

4813. *T. parthenium* (L.) SCHULTZ-BIP. — In fruticetis rivi Drcka Rijeka pr. Kolašin (Ro).

4814. *T. corymbosum* (L.) SCHULTZ-BIP. — In silvis, dumetis et lapid. reg. mont., subalp., rarius infer. — Sub monte Durmitor; supra coenob. Morača (Pč), in monte Balj et Jerinja glava pr. Andrijevica (Ba, Ro), in monte Garać et Čevski Lisac distr. Katunska nahijsa; circa Njeguši, Šavniki, Viliša; supra coenob. Piva; in monte Vojnik; Javorje et Sjekirica planina; ad latera montis Lovćen; insula Vranina in lacu Skadarsko blato (Ro).

— var. *cinerereum* (GRIS.) HAY. — Folia supra dense pilosa, subtus incano-sericea. — Rarius cum typo.

4815. *T. macrophyllum* (WILLD.) SCHULTZ-BIP. — In silvis umbrosis, in dumetis et ad ripas reg. subalpinae. — In monte Vjetrnik distr. Bratonožići; Viruša dol sub Crna planina (Pt), Perućica sub monte Kom (Pt, Ro), Kolašin (Pč), Vratlo in Sinjavina planina; Kurlaj et Lisa sub monte Kom (Ba), Trešnjevik; Han Garančić et Matoševo in valle fl. Tara (Ja), circa Andrijevica, in monte Jerinja glava et Balj; supra coenob. Piva; Borkovići et Ravno distr. Piva; Bukovica sub monte Durmitor (Ro), etiam in monte Lovćen (Pej, Ro), Pivska planina (De, Si).

4816. *T. vulgare* L. — In salicetis, glareosis et ad ripas reg. infer., mont. et subalpinae. — Ad ripas fl. Morača et Tara (Pč), in cacumine montis Jerinja glava supra Andrijevica cca 1400 mm (Ro), Boljevići pr. Vir (Do).

### *Tripleurospermum* SCHULTZ-BIP.

4824. *T. inodorum* (L.) SCHULTZ-BIP. (= *Matricaria inodora* L.). — In cultis ad Cetinje (Pč), ad Bar (Do).

4825. *T. tenuifolium* (KIT.) FREYN (= *Matricaria t. SIMK.*). — In cultis, ruder. et in silvis reg. mont. et subalpinae. — Circa Čeklići, Cuci et Grahovo distr. Katunska (Pč), Konjuhe sub monte Kom; Velika distr. Vasojevići (Ba), in monte Balj et Jerinja glava et circa Andrijevica; Trešnja et Bukovica sub monte Lovćen; Njeguši; Varda supra coenob. Piva; Pašina Voda sub monte Durmitor; Bijela pr. Šavnik; in valle Jelovica sub Bjelastica planina (Ro), in valle fl. Tara ad Han Garančić et Matoševo (Ja).

*Matricaria* L.

4828. *M. chamomilla* L. — In agris, incultis et ad vias reg. infer. et montanae. — Bioče in valle fl. Morača (Pt), Andrijevica (Ho, Ro), Kolašin; Bar, Ulcinj, Podgorica (Ro).

*Artemisia* L.

4832. *A. vulgaris* L. — In ruderatis, dumetis, sax. et ad sepes reg. infer., mont. et subalp. in toto territorio.

4835. *A. absinthium* L. — In rupestr., ruder. et dumet. reg. infer., subalp., rarius alpinae. — Vratlo supra Kolašin (Pt), Njeguši (Pč, Ro), Danilovgrad (Pč), in monte Lovćen (Ba, Pej, Ro), Bukovica et Žabljak sub monte Durmitor; Cetinje, Medun; Jablan vrh in Sinjavina planina (Ba, Ro), Zakamen et Ledenica planina distr. Piva; sub monte Vojnik; Lukavica planina (Ro), Andrijevica (Ja, Ro), Krivi do distr. Piva (De, Si).

4838. *A. Lobeliae* ALL. var. *canescens* (DC.) BRIQU. — In rupestr. reg. infer., mont. calid., rarius subalpinae. — Ad monastir Duga; Bioče pr. Podgorica, Šavnik, Šlivje (Pt), Njeguši (Kn, Pej, Ro), Grahovo (Pč), sub monte Lovćen; in monte Vojnik; Borkovići, Zakamen et coenob. Piva; Mratinje sub monte Maglić; Viljuša; in monte Garać supra Danilovgrad (Ro), Drušići pr. Rijeka (Ba), Kamenjak (Ho), in monte Kosa supra Bar (Do), in valle Vrbnica distr. Piva (De, Si). — var. *Biasolettiana* (VIS.) K. MALÝ. — Folia et involucra dense albo-tomentosa. — In lapid. ad Simunj distr. Katunska nađija cca 800 m (Ro).

4841. *A. annua* L. — In aren. et lapid. reg. infer. mediterr. — Ad Podgorica et Plavnica (Ro).

4842. *A. scoparia* W. K. — In campo ad Cetinje (Pč).

4848. *A. petrosa* (BAUMG.) FRITSCH. — Planta alpina sericeo-tomentosa; caulis humilis (5—15 cm altus); folia inferiora longe petiolata oblongo-cuneata palmato-multifida, caulinis media digitato-partita breviter pedicellata segmentis linearibus, superiora et fulcrantia indivisa; capitula subglobosa infima breviter (rarius longiuscule) pedunculata, reliqua fere sessilia in racemum simplicem disposita; involucri phylla margine spadiceo-scariosa; receptaculum glabrum (vel subglabrum), achene glabra, flores flavi. — In rupestribus summi montis Durmitor (Pč, Ba, Ro, De, Si, No).

*Tussilago* L.

4849. *T. farfara* L. — In humidis, argilos et ad ripas in toto territorio (usque ad 1900 m) frequens.

*Petasites* GAERTN.

4850. *P. Dörfleri* HAY. — „Scapus usque ad 20 cm altus squamatus; folia coetanea parva late ovata vel cordato-dentata utrimque albo-cinereo-tomentosa; capitula 12 mm longa in racemum (1—)3—10-cepahalum disposita; involucri phylla late lanceolata arachnoideo-lanata viridia + purpureo-suffusa; flores ochroleuci vel rubelli, marginales lingulati, ligulae involucro non vel vix longiores. — In glareosis ad nives liquefiantes sub cacumine montis Prokletija ad fines Albaniæ (Df).

4851. *P. hybridus* (L.) G. M. SCH. — In humidis et irriguis reg. subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), ad rivum Tušina supra Šavnik (Pč), Kurlaj sub monte Kom (Ba).

— var. *adriaticus* ROHL. V. Beitr. 64. — Squamae scapi et involucri viridulae; thyrso (in planta hermaphroditica) ovato-vel ovato-oblongo composito, pedunculis capitularum ramosis 3—5 capitula gerentibus, superioribus tantum simplicibus unifloris, floribus pallide ochroleucis. — In locis humidis reg. infer. mediterr. et subalp. — Ad Bar (Ro), Vučji potok sub Vermoš planina ad fines Albaniæ (Df).

4853. *P. albus* (L.) GAERTN. — In irriguis, humidis et ad ripas reg. subalp. — Sub monte Durmitor versus jugum Štulac et ad Crno jezero (Pč, Ba), Rogam sub monte Kom (Ba).

*Homogynne* CASS.

4855. *H. silvestris* (SCOP.) CASS. — In pratis et silvestr. reg. alpinae. — Kukuraj Brdo sub monte Kom (Pč). (An ne ad spec. sequentem pertinet?)

4856. *H. alpina* (L.) CASS. — In pascuis, silvis reg. alp. in omnibus mont. dic. septentr. frequens. — E montibus dic. meridionalis Lovćen et Rumija adhuc non vidi.

*Adenostyles* CASS.

4859. *A. alliariae* (GOU.) A. KERN. — In silvis et herbidis reg. subalp. et alp. in toto territorio. (E monte Rumija adhuc non vidi.)

— var. *Kernerii* (SIMK.) K. MALÝ. — Cum typo in monte Lovćen (Pej, Ro).

*Doronicum* L.

\*4864. *D. Columnae* TEN. — In lapidosis et glareosis reg. alp. et subalp. in toto territorio frequens.

— var. *orientale* HAY. — Involucri phylla pilis eglandulosis ciliata, pilis glanduliferis sparsis vel nullis. — In rupestr. rivi Vučji potok in Vermoš planina ad fines Albaniae (Df), in monte Durmitor (No). Verosimiliter etiam alibi.

\*— var. *occidentale* HAY. — Involucri phylla pilis glanduliferis ciliata, pilis eglandulosis paucis vel nullis. — Frequens.

\*4865. *D. austriacum* JACQ. — In glareosis, silvis umbrosis et ad rivulos reg. subalp. et alp. adhuc e montibus dic. septentr. nota. — Montes Maglić Pivski, Durmitor, Gradiště in Sinjavina planina, Žijovo, Kom (Pt, Pč, Ba, Ro).

\*4868. *D. grandiflorum* LAM. — In rupestr. et glareosis reg. alp. et subalpinae. — Volujačko jezero sub monte Maglić (Ma), Urdeni dolovi distr. Piva (Havelka teste MALÝ), ad viam inter Cetinje et Budua in montibus ad fines Dalmatiae (Biasoletto sec. cl. EBEL).

\*— var. *polyadenum* CAVILL. — Folia in margine  $\pm$  dense glandulosopilosa, pili eglandulosi sparsi. — In alpinis mont. Maglić Pivski, Durmitor et Vojnik (Ro).

\*— f. *calvescens* ROHL. — Achenia marginalia fere omnia epapposa. — Cum praeced. in monte Maglić (Ro).

A d n o t a t i o : Nescio, quid sit „*Doronicum lucidum*“ (= *D. scorpioides* var. *lucidum* C. KOCH) a cl. PANTOCSEK Adnot. 42 e monte Jastrebica in Bjelagora, in monte Crna planina, in valle Perućica infra Kom et in Sinjavina planina (Vratlo) lectum. Specifice distinctum a *D. scorpioides* (W.) BOISS. occidentali (ubi collum rhizomatis breviter villosum est) rhizomate omnino glabro: a *D. Columnae* foliis imis leviter cordatis crenatis. Caulis apice glandulifer, ceterum perfecte glaber“ (Pant. l. c.).

*Senecio* L.

\*4875. *S. procerus* GRIS. — Caulis et folia tomento arachnoideo detersili tecta saepissime mox decalvantia vel folia adulta subtus  $\pm$  arachnoidea; folia basalia ovata vel ovato-lanceolata in petiolum breviorem alato-decurrentia, caulina oblonga

rarius linearia; capitula radiantia 3—5 cm lata in corymbum laxum simplicem vel compositum disposita, pedunculis quam capitula 2—10-plo longioribus; involucrum fusco-viride dein glabrescens, basi squamulis exterioribus non cinctum; flores lutei, achenia glabra. — In rupestr. et in pratis reg. subalpinae. — Zakamen supra coenob. Piva; ad latera montis Balj supra Andrijevica (Ro).

\* — f. *pubicarpus* ROHL. — Achenia ad angulos breviter puberula. — In alp. montis Javorje planina (Ro).

\*4876. *S. bosniacus* BECK. — A praeced. dignoscitur (an specific?) foliis basalibus oblongo-linearibus vel linearibus in petiolum longe sensim attenuatis, caulinis quam internodia longioribus. — In rupestr. reg. subalp. et alpinae. — Ječmeni do in Sinjavina planina; in monte Dibala supra Kostića distr. Kući (Ba sub *Cineraria crassifolia*).

— f. *discoideus* (GRIS.) HAY. — Capitula discoidea, ligulae nullae. — In gramin. montis Sinjavina planina (Pt).

4881. *S. thapsoides* DC. subsp. *Visianianus* (PA=PAF.) VANDAS. — Caulis crassus albo-tomentosus; folia supra subglabra subtus niveo-tomentosa indivisa, inferiora oblongo-spathulata in petiolum contracta crenata; caulina lanceolata, basi late auriculata amplexicaulia; panicula composita; capitula cylindrica 15 mm longa discoidea breviter pedunculata; flores flavi, involucrum glabrum, achenia glabra. — In rupestr. reg. mont., subalp. et alpinae. — Circa Njeguši et in monte Lovćen (locus classicus) (Papafa, Pč, Ba, Ho, Pej, Kš, Ro), Bjela Gora (Pč), Cetinje (Kn), Hum Orahovski (Sz, Ba), Bukovica sub monte Lovćen (Gi), sub monte Žijovo (Ba), Valoviti do et Vališnica in monte Durmitor, Ranisava sub monte Durmitor; in monte Vojnik (Ro), Fuša Rudnices sub monte Prokletija (Df), supra lacum Crno jezero in monte Durmitor (De, Si).

4885. *S. doronicum* L. — In rupestr. et glareosis excelsioribus reg. alpinae. — In monte Kom supra Rogam (Pč), in monte Durmitor (Ht), Lebršnik (Ho), (e cacumine montis Kom Kučki cca 2200 m publicavit BALDACCI in Altre Notizie pag. 110 *S. transsilvanicum* BOISS., quod hucce spectare videtur).

4886. *S. lanatus* SCOP. — In herbidis et lapidosis reg. alpinae. — Sinjavina planina (Pt, Ro), in monte Planinica

distr. Kuči (Ba), Javorje et Ledenica planina (Ro). Potius varietas speciei praecedentis.

4893. *S. fluviaialis* WALLR. — In silvis et ad ripas. — A cl. HAYEK e Montenegro indicatus; locus mihi ignotus.

4894. *S. nemorensis* L. — In silvis reg. subalpinae. — Ad Kovčice sub monte Durmitor (Pt ut var. *subdecurrens* GRIS.), in valle fl. Tara (Pč), in monte Lisa distr. Vasojevići (Ba), Balj supra Andrijevica (Ba, Ro), in monte Vojnik; Bukovica et Žabljak sub monte Durmitor, Jerinja glava supra Andrijevica; Jelovica sub Bjelastica planina (Ro), Skrobotuša sub monte Vila distr. Kuči (Sz).

\*4896. *S. Fuchsii* GMEL. (= *S. nemorensis* var. *dalmaticus* GRIS. apud PANT. Adnot. 43). — In silvis et ad ripas reg. subalpinae. — Perućica sub monte Kom (Pt), Murino han distr. Vasojevići (Ba), Zakamen supra coenob. Piva; in monte Vojnik (Ro).

4899. *S. Othonnae* M. B. — Caulis erectus elatus glaber; folia supra glabra subtus parce puberula, omnia pinnatisecta, segmentis inciso-dentatis, in foliis inferioribus oblongo-lanceolatis saepe subtripartitis, in super. anguste lanceolatis; capitulo parva 5—7-flora in corymbum densum compositum disposita; involucrum glabrum, flores aurei, ligulae 1—2, achenia pilosa. — In dumetis et silvis reg. subalp. et alpinae. — In monte Vojnik; Korita rovačka; mons Balj supra Andrijevica (Ro).

4900. *S. abrotanifolius* L. subsp. *carpathicus* (HERB.) HAY. — A typo differt caule humiliore (usque 15 cm alto) monocephalo, foliis superioribus valde diminutis. — In pascuis et glareosis reg. alpinae. — Sub monte Kom; Crvena Ploča in Sinjavina planina (Ba).

\*4902. *S. erucifolius* L. — In pascuis et sax. reg. mont. et subalpinae. — Sub monte Velika Jastrebica (Pč).

\*— var. *latisectus* WILLK. — In fruticetis ad coenob. Piva (Ro).

4903. *S. alpinus* (L.) SCOP. subsp. *subalpinus* (KOCH) HAY. — In silvis, ad ripas et in pratis reg. subalp. et alpinae. — Perućica sub monte Kom (Pt), Kom Kučki (Ho), Kom Vasojevići (Ja), in monte Balj supra Andrijevica; Bjelastica planina; Maglić Pivski (Ro).

\*— var. *glandulosus* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938.  
— Pedunculi capitulum glandulosi; squamae involucri etiam,  
sed hinc inde. — In alp. montis Prokletija (Boš).

4904. *S. Jacobaea* L. — In gramin. et pratis reg. mont.  
et subalpinae. — Pašina Voda sub monte Durmitor (Pt),  
in monte Rumija (Ba), Borkovići et supra coenob. Piva; circa  
Šavnik et Andrijevica (Ro), supra coenob. Morača; ad Košlašin et Kralje (Ja).

— f. *brachyglossus* (OPIZ) DOM. — Ligulae valde ab-  
breviatae involucrum non superantes. — Ad Mratinje sub monte  
Maglić (Ro).

— var. *hydrophilus* BECK. — „Folia inferiora indivisa ob-  
longo-ovata vel ovalia longe petiolata, media indivisa vel lyrata,  
superiora lyrata vel pinnatifida segmentis utrimque 1—3-dens-  
tatis; pedunculi apice parum incrassati; achaenia disci subglabra  
vel glabra.“ — In pascuis pinguibus ad Plavnica (Sz).

4905. *S. erraticus* BERTOL. — In pratis humidis et  
ad fossas reg. infer. et montanae. — Ad Rijeka et Danilovgrad  
(Pt), Vir (Pč), Ceklin (Ho), Plavnica (Ro).

4906. *S. nebrodensis* L. subsp. *rupester* (W. K.)  
FIORI et PAOL. — In rupestr. et lapid. reg. mont., subalp. et  
alpinae in toto territorio vulgatus; in reg. infer. rarius.

— f. *pallidus* ROHL. MBL. VI: 157. — Ligulae albidae.  
— Cum typo in alp. montis Durmitor loco Valoviti do (Ro).

— f. *adustus* BECK. — Involucri phylla apice nigra. —  
Cum typo in monte Durmitor (Ro).

4910. *S. vernalis* W. K. — In cultis et ruder. reg. infer.,  
mont., rarius subalpinae. — Ad Cetinje, Grahovo et Danilovgrad  
(Pč), Rijeka (Ho), Crvena Ploča in Sinjavina planina (Ba).

4911. *S. silvaticus* L. — In silvis reg. subalpinae. —  
In monte Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

4913. *S. viscosus* L. — In silvis et dumetis reg. sub-  
alpinae. — In montibus Jerinja glava, Balj et Piševu supra  
Andrijevica (Ro).

4914. *S. vulgaris* L. — In ruder., incultis, arvis et ad  
vias reg. infer., mont., rarius subalp. in toto territorio frequens.

### *Calendula* L.

4916. *C. officinalis* L. — In hortis culta et non raro subspontanea.

4918. *C. arvensis* L. — Ad muros et in lapid. reg. infer. mediterraneae. — Prope Ulcinj (Ba, Ro).

### *Echinops* L.

4926. *E. ritro* L. — In rupestr. et gramin. reg. mont. calidioris. — Ad Njeguši (Ho, Ro), inter Bukovica et Cetinje (Ro), in monte Rasovatac pr. Vir (Eb).

— f. *elegans* BERTOL. — Folia tripinnati-partita segmentis linearibus. — In sax. montis Lovćen et ad Grahovo (Pč), ad Njeguši (Kn, Ba, Ro), in monte Rumija (Ba, Do).

— var. *ruthenicus* (M. B.) HAY. — In monte Jastrebica (Ad), Starac čekliński, Njeguši (Ro).

4930. *E. banaticus* ROCH. — In herbidis et lapid. reg. infer. et montanae. — Limljani pr. Vir (Pč), Cetinje (Kn), Planinica (Ho), Lješanska nahija, Ostrog (Ro).

### *Xeranthemum* L.

4937. *X. foetidum* (CASS.) MCH. — In aridis, ruderatis et saxosis reg. mont. et subalpinae. — Seoce sub monte Balj (Ba), Goraňsko et Ščepangrad in valle flum. Piva (Ro).

### *Amphoricarpus* VIS.

4938. *A. Neumayeri* VIS. — In rupestribus reg. mont., subalp. et alpinae. — In monte Orjen (Neumayer), sub monte Kom loco Cuk Džonev et Carine (Pt, Ba), ad Grahovo et in monte Velka Jastrebica (Pč), Durmitor (Pč, Ro), Lovćen (Pč, Ad, Kš, Pej, Ro), in monte Gradište supra Košlašin (Ba, Ro), Krstac pr. Njeguši (Ba, Ro, Pej), Tursko ždrijelo (Ho), inter Bukovica et Cetinje (Pej, Ro), Vrojca, Kostića distr. Kući (Ba), in valle fl. Piva sub Goraňsko et Mratinje; mons Zeletin supra Andrijevica; Korita rovačka pr. Lukavica planina (Ro).

\*— var. *velezensis* MURB. — Folia inferiora latiora, 10—20 mm lata, apice rotundato-obtusa vel subito acuminata, flores albi. — Dobri do in monte Durmitor; Pošćensko jezero supra

Šavnik; supra coenob. Piva (Ro), in valle flum. Tara pr. Lever Tara (De, Si).

### Carlina L.

4939. *C. acanthifolia* ALL. — In gramin. et collibus reg. mont. et subalpinae. — Ad Cetinje (Pč, Ro), Čevo et Grahovo (Pč), Njeguši, Mali Šanik et Bogojeva glava sub monte Lovćen; in monte Vojnik; montes Jerinja glava, Žoljevica et Balj supra Andrijevica; vallis Perućica sub monte Kom; Borkovići, coenob. Piva et Goraňsko distr. Piva (Ro), in monte Pej (Ja).

4940. *C. acaulis* L. — In gramin. et pascuis reg. mont. et subalpinae. — Ivica planina supra Šavnik; Javorje planina et sub monte Bjela Gora (Pč), Rikavac distr. Kuči; supra Vratlo in Sinjavina planina; Tušina pr. Šavnik (Ba); in monte Žoljevica pr. Andrijevica (Ro). Loca hic enumerata verosimiliter partim ad var. *alpinam* JACQ. pertinent.

— var. *alpina* JACQ. (= *C. acaulis* f. *caulescens* aut. mont., non KOCH). — In pratis subalp. et alpinis. — In monte Orjen (Ad), Durmitor, Štulac pr. Žabljak; Borkovlji distr. Piva; Žakamen supra coenob. Piva; in monte Vojnik; mons Zebalac pr. Javorje planina; Šavnik (Ro), Ivica planina (Ba).

4942. *C. vulgaris* L. subsp. *euvulgaris* HAY. — In dumetis, lapid. et pascuis reg. mont. et subalpinae. — Inter Podgorica et Medun, Tušina pr. Šavnik (Ba), supra Šavnik; Bajce pr. Cetinje; Starac čekliński; Njeguši; Andrijevica; in monte Vojnik (Ro), circa Kolašin (Ja).

— subsp. *longifolia* (RCHB.) HAY. — In valle fl. Tara sub monte Kom (Pt), Mratinje sub monte Maglić, Borkovići et coenob. Piva; in montibus Balj, Sjekirica et Piševo supra Andrijevica (Ro).

4944. *C. corymbosa* L. — In lapid. et apricis reg. infer. mediterr. et mont. calidioris. — Cetinje, Vir, Grahovo (Pč), Rijeka (Ho), Drušići (Ba), Bioče pr. Podgorica (Ja).

### Arctium L.

4953. *A. lappa* L. — In dumetis, ruder. et ad sepes reg. infer., mont. et subalpinae. — Vallis Perućica sub monte Kom (Pt), Njeguši, Čevo, Zagarać, Danilovgrad, Bogetići, Nikšić,

Viljuša, Andrijevica, coenob. Piva; Barno jezero et Žabljak sub monte Durmitor (Ro), in monte Lovćen (To).

4954. *A. nemorosum* LEJ. et COURT. — In dumetis ad Han Garančić in valle fl. Tara (Ro).

4955. *A. minus* (HILL) BERNH. — In dumetis et ruder. reg. infer. et montanae. — Medun pr. Podgorica (Sz), Nikšićko polje (Ro), Novi Bar (Do).

### *Jurinea* CASS.

4966. *J. mollis* (L.) RCHB. subsp. *eumollis* HAY. — In rupestr. et gramin. siccis reg. mont., subalp. et alpinae. — Orlova Skala sub monte Kom (Pt), Varda sub monte Kom Vašojevićki (Ba), Njeguši, Lovćen, Ranisava, Durmitor; Goraňsko distr. Piva (Ro), Pivska planina (De, Si).

— — f. *integrifolia* SCHUR. — Folia oblonga integerrima.

— — f. *tenuisecta* ROHL. VIII. Beitr. 17. — Foliorum laciniae angustiores et longiores. — Cum typo.

### *Carduus* L.

4974. *C. nutans* L. — In sax. reg. subalpinae ad Rupa Konjska sub monte Vila (Sz). (An ne ad subsp. sequentem pertinet?)

— — subsp. *micropterus* (BORB.) HAY. — In lapid. et gramin. reg. infer. et mont. calidioris. — Košarica pr. Njeguši; ad Podgorica, Kokoti et Zagarać (Ro), ad Cetinje et Danilovgrad (Pč, Ro), Sutorman supra Bar (Do), Podgora pr. Vir; insulae Lesandra et Vranina (Eb).

4978. *C. carduellis* (L.) KERN. — In pascuis, lapid. et rupestr. reg. subalp. et alpinae. — Perućica, Kom; Kovčice sub monte Durmitor (Pt), Blaca distr. Drobnjaci (Pč sub *C. carlinaefolio*), Carine sub monte Kom; Cetinje (?) (Ba). Verosimiliter loca hic enumerata partim ad var. sequentem vel ad *C. illyricum* MALÝ pertinent.

— — var. *alpestris* (WILLD.) ROSSI. — Kamenjak (Ho), Perućica, Sjekirica planina, Štirni do, Bjelastica planina, Jelovica; Srablje jezero sub monte Durmitor (Ro).

4980. *C. candicans* W. K. subsp. *eucandicans* HAY. — In lapidosis, rupestr. et herbidis in tota dizione frequens.

— — f. *suhensis* (BECK) ROHL. — Foliorum laciniae lanceolatae longius spinosae. — Lastva čevska; Farmaki et Lješko polje pr. Podgorica (Ro), Kolašin, Kralje; in monte Pivljan (Ja).

\* — — subsp. *cylindricus* (BORB.) HAY. — In calcar. ad Peljev brije inter Podgorica et Kolašin (Ja).

4982. *C. personata* (L.) JACQ. — In humidis et ad rivulos reg. subalp. et alp. in dic. septentrionali. E montibus dic. merid. (Lovćen et Rumija) adhuc non vidi. — In monte Crna planina et Kom (Pt), Kurlaj sub monte Kom (Ba), sub monte Durmitor (Pč, Ba, Ro), Zakamen supra coenob. Piva; in monte Maglić Pivski; Sjekirica et Balj supra Andrijevica; in valle Jelovica; Bjelastica planina (Ro).

\*4983. *C. crispus* L. — In dumetis reg. mont. ad coenob. Piva (Ro).

4987. *C. ramosissimus* PANČ. Elench. 51. — Caulis subglaber saepe iam a basi copiose spinoso=alatus; folia subglabra pinnatifida segmentis lobatis laciniis in spinam validam stramineam exeuntibus et spinoso=ciliatis; capitula mediocria breviter pedunculata in apice ramorum cymoso=congesta; involucrum phylla glabra omnia fere aequilonga, exteriora et media arcuato=recurva e basi subdilatata in apicem linearisubulatum usque ad 15 mm longum in spinam 5—7 mm longam exeuntem attenuata, intima apice scariosa lanceolato=subulata. — In saxosis sub monte Durmitor loco Crvena Stijena (Pč, Ba), in monte Jastrebica (Ad).

4989. *C. acanthoides* L. — In ruderatis, incultis et ad vias reg. infer., mont. et subalpinae. — Ad Njeguši, Vir et Cetinje (Pč, Kn, Ld, Ba, Ro), Viljuša; Drežnica pr. Nikšić (Ro).

— — f. *coloratus* ROHL. V. Beitr. 77. — Capitula basi pulchre violacea. — Sub monte Maglić Pivski (Ro).

— — f. *polyacanthus* (SCHREB.) RCHB. — Alae caulis et folia longissime et densissime spinosa. — Cum typo ad Podgorica et Njeguši (Ro).

4991. *C. pycnocephalus* L. — In lapid. et ruderatis reg. infer. et montanae. — In sax. sub monte Lovćen (Pč), circa Bar, Ulcinj et Podgorica (Ro).

(Adnotatio: Quid sit „*C. multiflorus* GAUD.“ a cl. PANČIĆ in rupestr. supra coenob. Ostrog lectus et in Elenchus 51 publicatus, nescio).

*Cirsium ADANS.*

4999. *C. ligulare* BOISS. subsp. *euligulare* HAY. — A *C. eriophoro* SCOP. ex Europa media dignoscitur involucri phyllis infra apicem in ligulam usque ad 5 mm latam oblongam vel ovato-oblongam margine scariosam valde fimbriata-laceram in spinulam terminalem subito contractam dilatata recurva. — Ad margines silvarum reg. mont. et inferioris. — Ad Cetinje, Rijeka et Podgorica (Sa).

— subsp. *albanum* WETTST. (= *C. odontolepis* var. *montenegrinum* BECK et SZYSZ. 154). — A praecedente differt spinis foliorum multo validioribus, foliis supremis involucrantibus capitulo longioribus, involuci phyllis in squamulam lanceolatam minus fimbriatam in spinulam terminalem attenuatam (non subito contractam) dilatata. — In dumetis ad Orahovo (Sz), in pratis ad Trijepši distr. Kuči (Ba), sub monte Kom Vašojevički (Ho), ad Čevo, Andrijevica et ad Han Drndarski sub monte Kom (Ro), ad Kralje et Kolašin (Ja, Ro), Mrčenovo sub monte Kom (Pč sub *C. eriophoro*).

Saepe occurunt formae ad subsp. *armatum* (VELEN.) PETR. vergentes et ad Andrijevica legi plantam, quae *C. albido* VELLEN. habitu valde similis est.

5001. *C. eriophorum* (L.) SCOP. subsp. *Velenovskýi* (VAND.) PETRAK. — A typo dignoscitur involucri phyllis exterioribus spinuloso-ciliatis foliaceis erectis infra capitulum coronulam formantibus. — In lapid. reg. mont. et subalpinae. — In monte Orjen (Ad), sub monte Ivica planina (Pč sub *C. eriophoro*), Nikšić (Ro), Njeguši, Starac cekliński, Lijeva Rijeka, Andrijevica (Ro). Saepe in forma involucri phyllis ad apicem ± dilatatis (var. *bosniacum* VANDAS). Ad Njeguši etiam in forma ad subsp. *dinaricum* (VANDAS) PETR. verg.

5003. *C. Rohlena e* PETRAK l. c. 78 (Forsan *C. Boujartii* × *ligulare* subsp. *albanum*). — A praecedentibus dignoscitur involucri phyllis tota longitudine spinuloso-ciliatis. A *C. Boujartii* dignoscitur involucri phyllis sub apice ± dilatatis. — In pascuis subalp. sub monte Kom loco Štavna (Ro).

5012. *C. Boujartii* (PILL. et MITTERP.) SCHULTZ-BIP. subsp. *Wettsteini* PETRAK OeBZ. LX: 351 (= *C. ferox*, *C. decussatum*, *C. ciliatum* aut. monten.). — Caule erecto superne ramoso polycephalo; foliis amplexicaulis non decurrentibus supra strigoso-hirtis subtus incano-stos mentosis pinnatifidis, laciinis in spinam validam excurrentibus; capitulis globosis folia involucrantia subaequantibus; involucri phyllis recurvis vel patentibus margine spinoso-ciliatis linear-lanceolatis apice non dilatatis in spinam 3—4 mm longam excurrentibus, intimis inermibus. — In pascuis et pratis reg. subalp. et alp. in dictione septentrionali. — Perućica (Pt, Ro) et Šavna sub m. Kom; sub m. Vojnik (Pč, Ba, Ro), Šavnići (Ro).

\* — — var. *brevispinum* ROHL. X. Beitr. 5. — Involucri phylla ad apicem in squamulam ovatam vel rotundatam dilatata et in spinulam brevem abrupte attenuata. — Sub m. Durmitor (Ro).

5013. *C. lanceolatum* (L.) SCOP. — In lapid., ruderatis et ad vias reg. infer., mont. et subalp. in toto territorio.

\* — — f. *seminudum* SCHULTZ-BIP. — Folia breviter decurrentia. — Njeguško polje (Ro).

— — f. *hypoleucum* DC. — Folia subtus cano- vel albo-tomentosa. — Njeguši; Starac cekliński (Pej, Ro).

5015. *C. arvense* (L.) SCOP. — In agris et ruderatis in toto territorio frequens.

— — var. *horridum* W. GR. — In m. Vjetnik (Ja).

— — var. *vestitum* W. GR. — Cum typo frequens.

— — var. *subviride* BECK. — Ad Njeguši (Ro).

5016. *C. acaule* (L.) ALL. — In herbidis et pascuis reg. subalpinae. — Ivica planina (Pč), sub m. Durmitor (Ba), in montibus Maglić Pivski et Lovćen; supra coenob. Piva; Mali Šanik et Golo brdo supra Njeguši (Ro).

— — f. *caulescens* LAM. — Popratni do pr. Njeguši (Pej, Ro).

5019. *C. appendiculatum* GRIS. — A *C. rivulari* dignoscitur spinis foliorum elongatis, 5—10 mm longis, flavi-cantibus, involucri phyllis ovato-lanceolatis in spinulam erecto-patulam attenuatis, capitulis saepe conglomeratis.

— — var. *Pantocsekii* ROHL. IV. Beitr. 62. — Spinae foliorum breviores et tenuiores. — In pratis humidis et ad rivulos reg. subalp. et alpinae. — In valle Viruša et Tara sub monte Kom

(Pt), Bjelastica planina; vallis Jelovica; Carine sub m. Kom (Ro).

5020. *C. tricephalodes* (LAM.) DC. — A cl. HAYEK e Montenegro indicatum; locus mihi ignotus.

5021. *C. rivulare* (JACQ.) LK. — In pratis humidis, irriguis et ad rivulos reg. subalp. dic. septentrionalis. — Sub monte Durmitor (Pč, Ba, Ro), Bukovica et Barno jezero sub monte Durmitor, inter Žabljak et Nedajno in Pivska planina; Treblješ luka pr. Lukavica planina (Ro).

— f. *glabratum* ROHL. III. Beitr. 41. — Folia supra glabra, solum subtus ad nervos pilis brevissimis scabra, caulis  $\pm$  glabra; tus sub capitulis vix tomentosus. — Cum typo inter Žabljak et Nedajno, cca 1500 m (Ro).

$\times$  *C. palustre* L.  $\times$  *rivilare* (JACQ.) LAM. f. *superrivulare*. — Inter parentes ad lacum Barno jezero sub m. Durmitor (Ro).

5022. *C. pauciflorum* (W. K.) SPRENG. — In valle flum. Tara pr. Han Garančić (Ja).

5024. *C. heterophyllum* (L.) ALL. — In pratis humidis reg. subalp. dic. septentrionalis. — Žabljak et Bukovica sub m. Durmitor (Ro).

— f. *indivisum* DC. — Folia indivisa. — Cum typo ad Bukovica sub m. Durmitor (Ro).

5025. *C. oleraceum* (L.) SCOP. — In irriguis et ad rivulos reg. subalp. sub m. Durmitor (Pč, Ba).

5027. *C. erisithales* (JACQ.) SCOP. — In gramin., pratis et silvis reg. subalp. et alpinae, usque ad 2000 m. — Sinjavinia planina (Pt), sub m. Durmitor (Pč, Ro), in silva Skroboštuša sub monte Vila distr. Kuči (Sz), Zakamen supra coenob. Piva; Velki Štulac et Dobri do in m. Durmitor; ad latera m. Vojnik (Ro).

5028. *C. candelabrum* GRIS. — Caulis giganteus usque ad 2 m altus longe paniculato=ramosus; folia viridia lanceolata vel ovato=lanceolata, sinuato=lobata vel profunde pinnatipartita, tenuiter spinoso=marginata, infima in petiolum attenuata, superiora basi cordata sessilia; capitula parva nutantia numerosissima ad racemi ramos subsessilia glomerata paniculam amplam formantia; involucrum ovatum glabrum, phyllis lanceolatis in spinam brevem erectam attenuatis; flores albidi vel

ochroleuci. — In silvis, lapid., glareosis et fruticosis reg. infer., mont., rarius subalp. frequens. — In m. Vjetnik (Pt, Ja), Gračanička rijeka in Nikšića župa; Bijela sub m. Vojnik (Pč), Cetinje (Kn), Bogetići et Nikšić (Ba, Ro), Velje brdo pr. Podgorica (Ba), Čevo (Ho), Bar; supra Vratlo in Sinjavina planina (Ba), inter Podgorica et Kolašin locis pluribus: Jablan vrh, Nožica, Lijeva Rijeka, Han Garančić, Matoševo (Ja, Ro); ad coenob. Morača; vallis Bistrica pr. Kolašin (Ja), circa Kralje et Andrijevica (Ja, Ro), Šavniki (Ro).

\*— f. *horridum* ROHL. VIII. Beitr. 10. — Foliorum spinis multo longioribus et validioribus. — Žanjev do pr. Njeguši (Ro).

\*5029. *C. pannonicum* (L.) GAUD. — In pratis alp. Štirni do pr. Lukavica planina (Ho).

5034. *C. creticum* (LAM.) URV. (= *C. siculum* DC.). — In salicetis ad Vir et Danilovgrad (Pč), ad Rijeka (Ho), sub m. Bijela Gora(?) (Pč).

5035. *C. palustre* (L.) SCOP. — In pratis turfosis reg. subalpinae. — Ad lacum Barno jezero sub m. Durmitor, cca 1550 m (Ro).

\*5036. *C. afrum* (JACQ.) DC. — In lapid. calcar. in decliv. merid. m. Rumija supra Bar cca 900 m (Do).

5037. *C. strictum* (TEN.) SPRENG. — Ab omnibus spec. praeced. dignoscitur acheniis non compressis, sed globosis vel ovatis; folia supra obscure viridia venis albis ornata. — In lapid. et dumetis reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Cetinje (Pč, Kn, Ja), Čeklići et Cuci in nahija Katunska; sub coenob. Ostrog; vallis fl. Morača super. (Pč), Medun (Sz, Ba), Rijeka (Kš), circa Njeguši et Mali Šanik sub m. Lovćen; Rudine nikšićke; m. Garač supra Danilovgrad (Ro), in m. Vjetnik (Ja), Ceklin (Ba).

### *Silybum* ADANS.

5044. *S. Marianum* (L.) GAERTN. — In sax. et ruder. reg. infer. et mont. calid. — Supra coenob. Ostrog (Pč), Podgorica; Klopot inter Bioče et Lijeva Rijeka cca 450 m (Ro).

### *Tyrimnus* CASS.

5045. *T. leucographus* (L.) CASS. — In dumet., lapid. et sterilibus reg. infer. mediterraneae. — Circa Bar, Podgorica, Farmaki et Kokoti (Ro).

### *Onopordum* L.

5047. *O. acanthium* L. — In ruder., lapid. et ad vias reg. infer. et montanae. — Ad Kopilje (Ho), Viljuša, Rudine nikšićke, Zagarać, Danilovgrad, Bogetići, Nikšić; Bukovica pr. Cetinje; Šanik sub monte Lovćen (Ro).

5056. *O. illyricum* L. — In sterilibus, ruder. et dumet. reg. infer., mont., rarius subalpinae. — Cetinje, Grahovo (Pč), Njeguši (Kn), collis Gorica pr. Podgorica; Berislavići pr. Plavnica; Kokoti distr. Lješanska nahija; Kolašin; Berane; sub monte Žoljevica pr. Andrijevica (Ro).

### *Crupina* CASS.

\*5057. *C. vulgaris* CASS. — In gramin. siccis, collibus sterilibus et in rupestribus reg. infer., mont. et subalpinae. — In valle flum. Lim; in montibus Balj, Žoljevica et Jerinja glava supra Andrijevica; circa Bar et Podgorica; Borkovići distr. Piva usque ad 1400 m (Ro), Kralje pr. Andrijevica (Ja), in valle rivi Vrbnica pr. Orak distr. Piva (De, Si).

### *Serratula* L.

5059. *S. tinctoria* L. — In silvis et pratis reg. subalpinae. — Bukovica et Barno jezero sub m. Durmitor (Pč, Ro).

5060. *S. radiata* (W. K.) M. B. subsp. *cetinjensis* ROHL. IV. Beitr. 63; Acta bot. Boh. II: 397. — Caulis simplex superne aphyllus, vel in ramos 2—3 fere aphyllos divisus; folia in margine et ad nervos scabra, praeterea glabra segmentis linearis-lanceolatis plerumque integerrimis terminali vix maiore. — In gramin., rupestr. reg. mont. calidioris. — Circa monast. Duga (Pt), Lastva čevska (Pt, Ro), in m. Rumija supra Bar; Trije pši distr. Kući (Ba), Viljuša, Bogojeva glava, Torine et Košarica supra Njeguši; Čeklići pr. Cetinje; Nikšić (Ro), in m. Kosa supra Bar (Do).

### *Centaurea* L.

? 5063. *C. alpina* L. — A cl. BLAU e Borkovići distr. Piva indicata.

5067. *C. Triumphetti* ALL.\* — In rupestr. et herbidis reg. mont., subalp. et alp. in toto territorio frequens.

\* Confer: JOS. DOSTÁL, Étude ... du genre *Centaurea* in Preslia X:57. 1931.

— — subsp. *variegata* (LAM.) DOST. ± ad var. *matthioli-foliam* (BOISS.) DOST. verg. — In pascuis m. Lovčen (Pej, Ro). — — subsp. *stricta* (W. K.) DOSTÁL l. c. 65. f. *Jablonovskýi* (VELEN.) DOSTÁL. — Caulis adscendens paucifolius, folia anguste oblonga, remota, anguste decurrentia, erecta, utrimque cano-tomentosa; ciliae squamarum involucri albae. — Cum typo rarius.

— — subsp. *axillaris* (WILLD.) DOSTÁL f. *nana* BAUMG. — In pascuis Margarita sub m. Kom cca 1750 m (Ja), in m. Lovčen (Pej, Ro).

\* — — — f. *Rohlena* DOST. — Caulis adscendens strictus humilis vel mediocris; folia ovato-oblonga subtomentosa integra vel lyrato-lobata, superiora sessilia decurrentia oblonga acuminate; capitulum solitarium magnum, squamae involucri late atrofusco-marginatae ciliis pallidis, partes virides squamarum involucri obtectae; radii coerulei. — In alpinis. — Jablan vrh, Jerinja glava (Ro).

— — — f. *spinescens* ROHL. Acta Botan. Boh. II:7. — Caulis humilis simplex, squamae involucri atrofusce marginatae ciliis spinosiusculis. — In alp. montis Zeletin (Ro).

— — — f. *sinuata* (VIS.) HAY. — Folia omnia sinuato-lobata. — Sub m. Kom et Durmitor (Pt), in m. Bijela Skala supra Bar (Ba).

5073. *C. tuberosa* VIS. — A praeced. dignoscitur praecipue radice tuberoso-fasciculata. — A cl. HAYEK e Monten. indicata; locus mihi ignotus.

5075. *C. cyanus* L. — Inter segetes in toto territorio.

5082. *C. scabiosa* L. — In pratis et dumetis reg. subalp. et alpinae in toto territorio septentrionali.

— — subsp. *Fritschii* HAY. — In rupestr. et herbid. reg. mont. calidioris in formis appropinquatis.

— — — f. *integrifolia* VUKOT. et f. *spinigera* HAY. rarius cum typo.

5086. *C. atropurpurea* W. K. — In rupestr. reg. mont. et subalp. — A *C. scabiosa* differt foliis + arachnoideis, capitulis maioribus, involuci phyllis appendicibus fere omnino obtectis, floribus atropurpureis, marginalibus non vel vix radianibus. — Sub m. Durmitor loco Crvena Stijena (Pč), Ječmeni do in Sinjavina planina; mons Lisa pr. Andrijevica (Ba).

— f. *gracilior* ROHL. in FEDDE Repert. XVII: 34. — *Gra-*  
*ciliōr*, *caulis* plerumque *simplex*; *capitulum* minus, *involucrum*  
18 mm longum. — In lapid. reg. montanae calidioris. — Lastva  
čevska in nahija Katunska (Ro).

5087. *C. Kotschyana* HEUFF. — A praeced. dig-  
noscitur caule simplici monocephalo, capitulis maioribus, in-  
volucro 25—30 mm longo, appendicibus late triangularibus,  
ciliis numerosis irregulariter arcuatis diametro transversali in-  
volucri phylli longioribus, foliis imprimis subtus valde scabris.  
— In pratis, rupestr. et lapid. reg. subalp. dicionis septentr. —  
In valle fl. Tara sub monte Kom (Pt), ad pedem m. Durmitor  
(Pt, Pč, Ro), Riblje jezero et Bukovica sub m. Durmitor;  
Varda et Štavna sub m. Kom (Ba, Ro), Sinjavina planina (Ba,  
Ro), in m. Lisa pr. Andrijevica (Ba), Pavlova livada (Ho),  
Štirni do pr. Lukavica planina, vallis Jelovica; Perućica sub  
m. Kom (Ro).

— f. *subspinosa* (VIS.) HAY. — Cilia terminalis appendi-  
cum phyllorum involucri rigida spinescens. — Jablan vrh in  
Sinjavina planina; Javorje planina (Ro).

5098. *C. chrysolepis* VIS. subsp. *crnogorica* ROHL.  
in FEDDE Repert. XVII: 33. — Radice perenni fibrillosa; caule  
simplice monocephalo vel pauce ramoso (ramis 1—2 brevibus  
monocephalis) 20—40 cm alto erecto folioso, supra nudo vel  
foliis parvis bracteiformibus obsito; tota planta (capitulis ex-  
ceptis) juvenilis albo-tomentosa, dein glabrescens; foliis rosul-  
arum hornotinarum indivisis oblongis vel oblongo-lanceolatis  
in petiolum longum sensim attenuatis integerrimis vel dentibus  
perpaucis minutis obsitis elevatim nervosis, nervis albis lucidis;  
foliis infer. pinnatisectis vel pinnatipartitis, segmentis oblongis  
obtusiusculis mucronatis integris vel parce minutissime dentatis,  
superioribus fere integris oblongis, summis bracteiformibus;  
capitulis mediocribus, involucri phyllis glabris late ovatis, appen-  
dicibus appressis late triangulari-lanceolatis phylla tegentibus  
in dorso pallide brunneis, margine albis splendentibus longe  
fimbriatis, fimbriis albis splendentibus diametrum transversale  
phylli aequantibus vel subaequantibus, terminalibus in spinam  
productis; flosculis luteis, acheniis juvenilibus tenuiter albo-  
sericeis, maturis —?, pappo sordide albo. — In gramin. reg.  
alpinae in monte Maglić Pivski cca 1800—2200 m (Ro).

\*5098b. *C. Gjurašini* BOŠNJAK in Glasnik Zagreb  
1938. — Planta superba, biennis—perennis; rhizoma obliquum.

comosum regulariter unicaule vel rarius multicaule; caulis elatus ad 80 cm altus aliquantum flexuosus, in inferiore parte angustatus, tota longitudine striato-sulcatus, copiose araneosus, ex maiore parte simplex vel circa medium unis et longe ramosus et rarius uno ad tres ramos valde reductos et remote inter se distantes praeditus; rami omnes unicephali; folia omnia scabra non decurrentia, basalia et superiora longe petiolata imparipinnata 6—8-juga cum petiolo ad 20 cm longa, suprema sessilia imparipinnata vel pinnatipartita, cca 1—3, in pedicellis capitulorum multo minora vel bracteiformia pinnatipartita vel pinnatifissa vel integra; folia hornotina etiam imparipinnata; petiola foliorum et rhachides eorum copiose aranei; folia ipsa etiam aranea, sed indumento plus minus detersili; foliola ad 6,5 cm longa et ad 11 mm lata, inter se ± inaequalia, oblongo-lanceolata vel lanceolata vel linearilanceolata, integra, excepto supremo saepe reliquis maiore et uno aut duobus lobis pinnatis vel dentibus ad basin praedito, omnia acuta cum apice cartilagineo; ea in pedicellis capitulorum spinosa, spina ad 6 mm longa; capitula in apice ramorum singularia, ovato-globosa magna, nonnulla plusquam 30 mm longa et lata; pedicelli elongati, hinc inde etiam ultra 45 cm longi; squamae anthodii virides, praesertim interiores nervoso-striatae, appendicibus paulum decurrentibus omnino obtectae; appendices serierum exteriorum et medianarum pectinato-fimbriatae, triangulares et haec posteriores plus minus abrupte in apicem cum spinula brevi et debole contractae, dum exteriores spinam validiorem ad 2 mm longam portant; appendices interiores sensim obrotundatae subconcavae fimbriatae, intimae multo minores fimbriato-laceratae; appendices mediae cum fimbria vel spinula apicali, omissis fimbriis decurrentibus ad summum 11 mm longae et ad 5 mm latae; color appendiculum cum fimbriis in vivo pulchre stramineo-aureus splendens, in sicco appendiculum fulvescens, fimbriarum albido-flavescens, in utroque casu basis obscura; corollae flavae; achene papposa, sine pappo ad 5,5 mm longa fuscescentia plus minus pilosa, umbelico barbulata; pappus griseorufescens multi-serialis; series exteriorum breviores sensim in penintimam 6—7 mm longam transeuntes, series intima minima (BOŠNJAK l. c.). — In alp. montis Prokletija loco Volušnica pr. caraulam Grbaj, solo calcareo (Boš).

5107. *C. rupestris* L. subsp. *eurupestris* GUGL. — In sax. et lapid. reg. mont. et subalpinae. — Circa pagum

Lukovo (Pt), Konjsk planina et coenob. Ostrog (Ho), Cetinje (Kn), supra pagum Klopot in m. Vjetrnik (Ja).

5108. *C. Nicolai* BALD. — Ab affini *C. Salonitana* dignoscitur floribus et appendicibus phyllorum involucri pulchre aurantiacis, foliis obscure viridibus in sicco saepe indigotis tantibus, pappo acheniis duplo longiore. — In rupestr., asperis et apricis reg. infer. et mont. calidioris dic. merid. — Lukovo (Pt), Čevo, Nikšićka župa (Pč, Ba), Orahovo et Trijepši, Medun distr. Kuči (Sz, Ba), Bar (Ba, Do), Nikšić, Ostrog (Ba), Njeguši, Viljuša, Rudine nikšićke, Peljev brijev; Bogosjeva glava et Kraćevo glavica sub monte Lovćen (Ro).

5121. *C. glaberrima* TSCH. — In rupestr. et herbidis reg. montanae calid. dic. meridionalis. — Circa Njeguši, Cetinje, Čevo, Viljuša et in Nikšićka župa (Pč, Ro, Ho), Lastva čevska pr. Vojnići (Pt).

5137. *C. incompta* VIS. — „Scabra aut floccosa subsimplex, foliis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus, omnibus parce lobato-pinnatifidis, lobis oblongis terminali maiore, folio supremo indiviso bracteante, capituli ovati squamis late ovatis obtusis quinquestriatis utrimque ala scariosa fissa decurrente auctis, superne nigre late marginatis ciliatisque, apice inermibus intimis oblongo-linearibus apice scariosis fissis, flosculis dilute violaceis, pappi setis fructu obovato duplo intimis triplo brevioribus“ (VIS. Fl. dalm. II: 38). — In rupestr. reg. montanae et subalpinae. — In m. Sutorman et Mali Lonac supra Bar, in m. Bijela Gora inter Vučji Zub et Velka Jastrebica (Pč), in pascuis sub m. Hum Orahovski (Sz), Gradište et Ječmeni do supra Kolašin, in m. Durmitor jugo Štulac (Ba), in m. Lovćen et Vojnik; ad Njeguši (Ro).

5179. *C. deusta* TEN. subsp. *eudeusta* HAY. — In lapid., dumosis et pratis siccis reg. infer., mont. et subalpinae frequens.

— subsp. *concolor* (DC.) HAY. — Ut praecedens.  
— f. *pseudodeusta* HAY. — Appendices phyllorum involucri centro fuscae. — Cum typo.  
— f. *colorata* ROHL. — Appendices totae fuscae. — Ad Šavniki (Ro).

5186. *C. jacea* L. subsp. *angustifolia* (SCHRK.) GUGL. var. *pannonica* (HEUFF.) GUGL. — In gramin. et

asperis reg. infer. et montanae. — Nikšićka župa, Vir (Pč), Dugevo (Ho), coenob. Morača, Kolašin (Ja).

— var. *Weldeniana* (RCHB.) BRIQU. — Cetinje (Kn), Njeguši (Pej, Ba, Ro), Konjuhe pr. Andrijevica (Ba), Goraško distr. Piva, Čevski Lisac, Bukovica pr. Cetinje (Ro), in monte Vjetrnik (Ja).

— f. *denudata* ROHL. — Caulis et folia fere glabra viridia. — Rudine nikšićke, Njeguši (Ro).

— f. *ustulata* ROHL. VIII. Beitr. 8. — Appendices fusco-ferrugineae. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

— subsp. *eujacea* GUGL. — In pratis subalpinis. — Ad latera m. Lovćen, Žabljak et Bukovica sub m. Durmitor (Ro).

— f. *pygmaea* ASCH. (= *C. humilis* SCHRK.). — In pratis humidis ad Crno jezero sub m. Durmitor (Ro).

5187. *C. macroptilon* BORB. — In pratis reg. subalp. in m. Balj supra Andrijevica cca 1200 m in forma appendicibus longioribus et magis recurvis (Ro).

? 5189. *C. dubia* SUT. subsp. *nigrescens* (WILLD.) HAY. — A cl. BALDACCI in pratis ad Cetinje (Contrib. alla fl. dalm. mont. 97) indicata. Potius ad aliam speciem pertinere videtur.

× *C. Michaelii* BECK = *C. jacea* subsp. *eujacea* × *stenocephala*. — In pratis subalp. ad Bukovica sub m. Durmitor, Mratinje sub m. Maglić, Pošćensko jezero pr. Šavniki, Lopatin do pr. Njeguši (Ro).

\*5192. *C. phrygia* L. subsp. *stenocephala* (A. KERN.) GUGL. — In pratis reg. mont., subalp., rarius infer. — Supra coenob. Morača, in m. Ključ et Lisa supra Kolašin, Ječmeni do in Sinjavina planina, Konjuhe sub monte Kom (Ba), Rijeka (Ho), Mratinje sub monte Maglić, Goraško et Borkovići distr. Piva, Šavniki, in valle fl. Perućica, in monte Balj et Jerinja glava supra Andrijevica, in monte Lovćen, Lopatin do pr. Njeguši (Ro).

\*5193. *C. nervosa* WILLD. subsp. *eunervosa* HAY. — In pratis et pascuis reg. alp. dicionis septentrionalis. — In monte Lisa pr. Andrijevica (Ba), in monte Sjekirica et Štit supra Andrijevica (Ro), inter Vunsaj et Dečani (Df).

— var. *sinuata* GRIS. — Foliis mediis sinuato-pinnatifidis, segmentis distantibus 3—4 jugis, inferioribus lyratis, segmentis

lateralibus subunjugis. — In pascuis Carine et Margarita sub monte Kom (Pt, Ja).

5199. *C. solstitialis* L. — In sterilibus, ruderatis et ad vias reg. infer. et montanae. — Bogetići pr. Nikšić (Pt), Cetinje, Njeguši (Pč, Ro), in calcar. ad Medun (Sz), Konjuhe pr. Andrijevica (Ba), Bioče pr. Podgorica (Ja), Lipovik pr. Rijeka (Ro), Bar (Do).

— f. *Adamii* (WILLD.) HEUFF. — Spina terminalis involucri phyllorum fusca, lateralibus parum longior. — Zalazi pr. Njeguši (Pej, Ro).

5202. *C. calcitrapa* L. — In ruder., pascuis et rupestr. reg. infer. mediterr. et mont. calidioris. — Ad Cetinje (Pč, Kn), Danilovgrad (Pč), Rijeka (Ho), Bioče pr. Podgorica (Ja), inter Njeguši et Kotor (Pej, Ro), in marit. ad Bar (Do).

5203. *C. iberica* TREV. — In ruderatis et lapid. reg. infer. mediterr. ad Ulcinj (Ro).

(*Adnotatio*: Quid sit „*C. paniculata*“ a cl. PANČIĆ ad Grahovo lecta et in Elench. 53 indicata, nescio; an *C. cristata* BARTL.?)

### *Carthamus* L.

5215. *C. lanatus* L. — In asperis, collibus apricis, ad margin. agrorum reg. infer. medit. et mont. calidioris. — Ad Rijeka (Pt, Kš), Bogetići pr. Nikšić (Pt), ad Njeguši et Grahovo (Pč), Rudine nikšićke (Ro), Bioče pr. Podgorica (Ja), Bar (Do).

### *Scolymus* L.

5224. *S. hispanicus* L. — In apricis, ruderatis et ad vias reg. infer. mediterr. et mont. calidioris. — Ad Rijeka (Pt, Kn, Ho), Sindžon (Pt), Cetinje, Šavica, Danilovgrad (Pč), Medun (Sz), Njeguši et Bukovica (Pej, Ro), Bar (Do).

### *Cichorium* L.

5229. *C. intybus* L. — In lapid. et ad vias reg. infer., mont. et subalpinae in toto territorio frequens.

5230. *C. pumilum* JACQ. — In incultis circa Bar (Do).

5231. *C. endiviva* L. — In sax. ad Ostrog; in vineis ad Klopot distr. Bratonožići (Pč).

### *Lapsana* L.

5233. *L. communis* L. subsp. *eucommunis* HAY.  
— In dumetis, ad margin. silvarum et in ruder. reg. infer.,  
mont. et subalp. in toto territorio.

— — f. *glandulosa* FREYN. — Pedunculi glandulosopilosii.  
— Ad Bar, Boljevići et Vir (Ro).

— — subsp. *intermedia* (M. B.) HAY. — Involucrum 8—  
10 mm longum; flores involucro duplo longiores. — In valle  
Viruša dol infra Crna planina (Pt).

— — f. *adenoclados* (BORB.) HAY. — Ad sepes circa  
Danilovgrad (Pt).

### *Hyoseris* L.

5239. *H. scabra* L. — In aren. maritimis ad Ulcinj (Ro).

### *Zazintha* L.

5243. *Z. verrucosa* GAERTN. — In locis apricis et  
ad vias reg. infer. mediterraneae. — Ad Vir (Pč, Ro), Bar (Ba,  
Ro), Ulcinj, Podgorica, Kokoti, Rijeka (Ro).

### *Rhagadiolus* SCOP.

\*5244. *R. stellatus* (L.) WILLD. — In cultis, lapid. et  
ad vias reg. infer. mediterr. et mont. calid. in dic. meridionali.  
— Circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Kokoti, Danilovgrad et  
Njeguši (Ro), insula Vranina (Eb).

— — f. *leiocarpus* DC. subf. *intermedius* (TEN.) DC. —  
Folia inferiora lyrata. — Cum typo.

— — f. *edulis* (GAERTN.) DC. — Achenia interiora puberula,  
folia inferiora lyrata. — Cum typo ad Njeguši (Ro, Pej).

### *Hedypnois* SCOP.

5245. *H. rhagadiolooides* (L.) WILLD. subsp. *mon-*  
*speliensis* (WILLD.) HAY. — In lapid. reg. infer. mediterr.  
— Ad Podgorica (Ro).

— — subsp. *cretica* (L.) HAY. — In arenosis marit. ad  
Ulcinj (Ro).

— — f. *crepidiformis* (RCHB.) HAY. — In asperis ad  
Vir (Pč).

\*— — subsp. *tubaeformis* (TEN.) HAY. — In incultis ad Bar; forma minus setosa, involucrum glabrum (= f. *laevigata* ROHL. II. Beitr. 3).

*Hypochoeris* L.

5246. *H. glabra* L. — In ruder. et lapid. reg. infer. ad Podgorica (Ro).

5247. *H. radicata* L. — In pratis reg. infer., mont. et subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt), Vir (Pč), Rijeka (Ho), Štavna sub monte Kom (Ba), Podgorica, in monte Balj et Sjekirica pr. Andrijevica (Ro), circa Kolašin et Kralje (Ja).

5248. *H. maculata* L. subsp. *eumaculata* HAY. — In pascuis et pratis reg. mont., subalp. et alpinae in toto territorio; e dizione merid. in monte Lastva čevska nota; e monte Lovćen et Rumija adhuc non vidi.

\*— — subsp. *Pelivanovićii* PETROV. — Caule simplici 10—20(—40) cm alto, versus apicem sensim incrassato monocephalo, apice hirsuto excepto glabro aphylo vel ad basin folio-parvo obsito, foliis radicalibus oblongis breviter acutatis remote repando-paucidentatis glabris ad marginem nervumque medium dense ciliatis, involuci phyllis dense et longe albo-hirsutis. — In pratis subalp. et alp. in monte Kom, Durmitor, etiam in monte Balj supra Andrijevica (Ro), supra rivum Piva ad Pišće (De, Si).

— — — var. *illyrica* (K. MALÝ) HAY. — Folia basalia minus profunde dentata, saepe tantum denticulata; involucrum 20—25 mm longum setis albis vel obscuris modice obsitum. — Cum typo.

\*5250. *H. cretensis* (L.) CH. et B. — A praecedentibus dignoscitur praesertim achaeniis marginalibus epappositi. — Ad litora pr. Novi Bar (O. Fiedler fide K. MALÝ).

*Leontodon* L.

5252. *L. autumnalis* L. — In pascuis reg. subalpinae. — Ivica et Kruševići pr. Šavniki (Pč, Ro).

— — f. *pratensis* (LK.) KOCH. — In alp. montis Javorje planina cca 1700 m (Ro).

5254. *L. illyricus* K. MALÝ. — A *L. montano* (ex Alpibus) dignoscitur: caule sub capitulo vix incrassato, capitulis

ante florendum nutantibus. — In herbidis et pascuis reg. alp.  
— In monte Kom (Ro).

? 5255. *L. montanus* LAM. — A cl. PANČIĆ e monte  
Kom supra Rogam et a cl. BALDACCI e monte Gradište et  
Somnia planina supra Kolašin indicatus; potius ad spec. praeced.  
pertinet.

5257. *L. hispidus* L. var. *vulgaris* (KOCH) HAY. —  
In pratis et pascuis in toto territorio frequens.

— — — subvar. *pseudincanus* HAY. — Folia pilis stellatis  
parvis breviter stipitatis densis canescens. — Inter Plav et  
Dečani in pratis alp. (Df), in pascuis Varda sub monte Kom  
(Ba).

— — — subvar. *opimus* (KOCH) WEISS. — Folia basalia  
obovata; caulis foliis vix longior apice valde incrassatus. —  
In pratis alp. inter Plav et Dečani (Df).

— — var. *glabratus* (KOCH) HAY. — Cum typo rarius in  
reg. subalpina.

5258. *L. crispus* VILL. subsp. *eucrispus* HAY. —  
In gramin. et pascuis e reg. infer. usque in alpinam in toto ter-  
ritorio frequens.

\* — — — f. *leviusculus* ROHL. — Involuci phylla glabra vel sub-  
glabra; folia ut in typo. — In monte Velji vrh pr. Njeguši  
(Pej, Ro).

— — subsp. *asper* (W. K.) ROHL. V. Beitr. 67. — Indu-  
mentum foliorum e pilis 3—4-furcatis longioribus et brevioribus  
radiis erecto-patentibus compositum; involuci phylla omnia  
vel saltem exteriora eleganter ciliata, dorso glabra, in var.  
*setuloso* HAL. etiam dorso pilis albis flexuosis aspera. — In  
saxosis reg. infer., mont. et subalp. typo multo rario. —  
In valle Viruša dol sub Crna planina et Perućica dol infra  
Kom (Pt); in calc. pagi Orahovo et in saxosis sub monte  
Hum Orahovski (Sz), Velki Maglić (Ba); Strenj vrh et Velki  
Mikulić sub monte Rumija (Ba ut *L. crispus*), circa Bar et  
Podgorica, Velji vrh pr. Njeguši, ad latera montis Lovćen (Ro).

— — — f. *setulosus* (HAL.) HAY. — Cum typo in monte Lov-  
ćen et ad Njeguši (Pej, Ro), in monte Rumija (Do), Pivska  
planina (De, Si).

— — subsp. *Rossianus* (DEG. et LENGY.) HAY. — Ko-  
pilje (Ho), Andrijevica, Velji vrh pr. Njeguši (Ro).

? 5263. *L. taraxacoides* (VILL.) MÉR. (= *Thrinacia hirta* ROTH). — In monte Lovčen (To). (Mihi dubius vis detur!)

5264. *L. tuberosus* L. — In pratis reg. infer. mediterr. ad Bar (Ba, Ro, Do).

### *Picris* L.

5265. *P. hispidissima* (BARTL) KOCH. — In apricis, ruder. et fruticetis reg. infer., mont. calidioris, rarius subalpinae. — Bogetiči pr. Nikšić (Pt), Ostrog (Pč), Njeguši, Medun (Sz, Ro), Borkovići distr. Piva (cca 1200 m!); Kokoti in Lješanska nahija; Bar, Boljevići (Ro), Ceklin pr. Cetinje (Kš), Bioče pr. Podgorica; in monte Vjetrnik pr. pagum Klopot (Ja).

\*5266. *P. hieracioides* L. subsp. *eu hieracioides* HAY. var. *umbellata* VIS. — In lapid., ruder. et gramin. reg. infer., mont., subalpinae. — Ceklin (Ho), Bar, Njeguši, Višljuša, mons Vojnik, Šavniki, Borkovići; Mratinje sub monte Maglić; coenob. Piva; Andrijevica; Čevski Lisac; Žabljak et Barno jezero sub monte Durmitor (Ro), supra coenob. Morača; Kolašin et Matoševo in valle fl. Tara (Ja), Cetinje (Kn).

### *Urospetrum* JUSS.

5271. *U. picroides* (L.) DESF. — In cultis, lapid. et ruder. reg. infer. mediterraneae. — Sindžon (Pt), circa Ulcinj, Vir, Boljevići, Rijeka et Podgorica (Ro), Bar (Ro, Do).

### *Tragopogon* L.

5272. *T. balcanicus* VELEN. — Caulis ramosus, rarius simplex glaber vel ad basin foliorum floccosus; folia e basi dilatata tenuissime linearia valde elongata; pedunculi apice parum dilatati; involucri phylla 4—5 floccosa demum nuda flores violaceo-purpureos subaequantia; achenia fuscescensia e basi fere ad apicem grosse muricata-squamulosa, in rostrum iis subaequilongum sursum clavato-incrassatum et sub pappo constricta; pappus sordidus fructu parum brevior etiam in acheniis marginalibus multiradiatus plumosus. — In rupestr. reg. infer., mont. et subalpinae. — Medjurečka planina pr. Bar (Ba), Belveder pr. Cetinje (Ld), Njeguši, Milušina pećina in Kastunska nahija, Bar, Boljevići; in monte Balj et Jerinja glava supra Andrijevica (Ro), in monte Rumija supra Bar (Lo).

\*5274. *T. porrifolius* L. — In herbidis et gramin. reg. infer. dic. mediterraneae. — Ad Ulcinj, Podgorica et Kokoti in Lješanska nahija (Ro).

5279. *T. pratensis* L. subsp. *eupratensis* THELL. — In pratis reg. infer., mont. et subalpinae. — Ad Danilovgrad; in valle flum. Tara (Pt), Lovćen (Pej, Ho, Ro), Bar (Ba), ad Podgorica, Andrijevica et in monte Balj (Ro); Krivi do distr. Piva f. ad var. *fallacem* verg. (De, Si).

\*——— f. *antheroflavus* ROHL. IX. Beitr. 18. — Antherae tota longitudine flavae ad apicem non nigricantes. — Ad Njeguši (Ro).

\*——— var. *fallax* ROHL. — Rostrum achenio subduplo longius, pedunculi sub fructu magis incrassati. — Krstačko polje pr. Njeguši (Pej, Ro).

——— subsp. *orientalis* (L.) VELEN. — In pratis reg. mont. et subalpinae. — Lukavica planina (Ho), Njeguši (Pej, Ba, Ro), Bukovica pr. Cetinje (Ro).

5282. *T. Tommasinii* SCHULZ-BIP. — In saxosis reg. montanae ad Cetinje (Pč), in monte Kosa supra Bar (Do). (Hucce spectare videtur *Tragopon pratensis* L. var. *longirostris* EBEL Zwölf Tage in Monten. p. 26. „Acheniis imprimis marginalibus spinuloso-tuberculatis, rostro filiformi subtriplo brevioribus.“ — Sutorman supra Bar.)

——— f. *glaber* K. MALÝ. — Planta glabra. — Cum typo.

### *Scorzonera* L.

5290. *S. rosea* W. K. — In pratis et gramin. reg. subalp. et alpinae in omnibus montibus dic. septentr.; e montibus dic. merid. (Lovćen, Lastva et Rumija) adhuc non vidi.

5291. *S. hispanica* L. var. *glastifolia* (WILLD.) WALLR. — In pratis subalp. et alp. in dic. septentrionali. — Javorje planina (Pč, Ro), Čarne sub monte Kom, Balj, Želatin, Sjekirica, Jelovica, Štirni do pr. Lukavica planina, Ivica planina, Ranisava, Vojnik; Božur et Zakamen distr. Piva (Ro), Žurim (Ho).

——— f. *asphodeloides* WALLR. — Cum typo rarius.

5294. *S. austriaca* WILLD. f. *stenophylla* BECK. — In saxosis ad Rapša, loco „Skala Rapš“ ad fines Albaniae (Df).

5300. *S. Doriae* DEG. et BALD. — „Caulis adscendens monocephalus iuvenilis dense, serius parce lanatus basi foliatus; folia linearia, initio lanato-villoso-ciliata dein calvescentia; involucri phylla brevissime lanato-puberula vel subglabra breviter pilosa longeque lanata; pappus intense rufo-violaceus achenio dimidio longior.“ — In rupestr. reg. infer. mediterraneae. — Ad Podgorica, Vir, Farmaki, Dukla (Ro).

*Podospermum* DC.

5303. *P. laciniatum* (L.) DC. — In pratis siccis et in lapid. reg. infer. et mont. calidioris. — Podgorica; mons Čevski Lisac et Tvrđjak in Katunska nahija (Ro).

*Gelasia* CASS.

5304. *G. villosa* (SCOP.) CASS. — In herbidis, pascuis et lapid. montanae. — Ivica planina supra Šavnik (Pč), Krstac pr. Njeguši (Ld, Ro), Jasenovo polje sub monte Vođnik, Ivica glavica sub monte Lovćen (Ro), in valle Vrbnica distr. Piva (De, Si).

*Lagoseris* M. B.

5307. *L. sancta* (L.) K. MALÝ subsp. *bifida* (VIS.) THELL. — In lapid. et gramin. reg. infer. et montanae. — Ad Limljani pr. Rijeka (Ho), Medun (Ba), circa Ulcinj, Bar, Vir, Podgorica et Rijeka frequens; ad Andrijevica rarius (Ro).

*Chondrilla* L.

5312. *Ch. juncea* L. — In lapid., sterilibus et in fruticetis reg. infer., mont. et subalpinae. — Danilovgrad (Pt), Podgorica, Nikšić, Andrijevica, Konjuhe, Njeguši, Lovćen et ad coenob. Piva (Ro), ad coenob. Morača et pr. Bioće (Ja).

*Willemetia* NECK.

5313. *W. stipitata* (JACQ.) CASS. — In pratis paludosis et turfosis reg. subalp. et alp. in dic. septentrionali. — Perućica sub monte Kom; Sinjavina planina (Pt), in monte Durmitor jugo Šljeme (Pč, Ba), Carine sub monte Kom (Ba), Krivi do supra Kolašin (Ro). Specimina a me lecta pedunculis

tantum in parte superiore glandulosovilloso ad var. *albanicam*  
KUEMM. et JAV. spectant.

*Taraxacum* HALL.

5315. *T. Hoppeanum* GRIS. — In rupestribus reg. subalp. et alpinae. — In monte Durmitor, Kom et Javorje planina (Pč), Kom Vasojevićki, Crna planina (Ba). Loca hic enumerata potius ad *T. officinale* subsp. *rectum* spectant. Ad Andrijevica (Ro teste HANDEL-MAZZETTI).

5316. *T. laevigatum* (WILLD.) DC. subsp. *pindicum* (BALD.) HAY. — „Folia profunde pinnatifida segmentis triangularibus vel lanceolatis linearibusve; scapi graciles usque ad 6 cm alti; involucri phylla apice ecorniculata vel callo indistincto praedita, externa appressa margine pallido plerumque latiusculo viridem transeunte; capitula 15—21 mm alta.“ — In pratis et pascuis reg. alpinae. — In monte Zeletin et Sjekirica planina pr. Andrijevica (Ro).

— subsp. *glaucescens* (M. B.) HAY. — In gramin. reg. infer. et mont. calidioris. — Inter Cetinje et Njeguši (Bo), Njeguši (Ro), Cetinjsko polje (Gi), inter Bar et Ulcinj (Ro).

5323. *T. officinale* WEB. subsp. *palustre* (LYONS) BECHERER. — In pratis humidis reg. infer. et montanae. — Inter Cetinje et Njeguši (Bo), Njeguško polje (Ro), Krstačko polje (Ld), Podgorica, Ulcinj, Vir, Bar (Ro). In Njeguško polje etiam formae ± ad subsp. sequentem transeuntes.

— subsp. *officinale* (GAUD.) BECHERER. — In cultis ad Cetinje (Pč, Kn), Grahovo (Pč), Carine sub monte Kom (Pt), in monte Dibala distr. Kuči (Ba), Krstac et Njeguško polje (Ro), Ulcinj (Ba).

— subsp. *erectum* (SCHRK.) SCHINZ et KELL. — In pascuis reg. alpinae. — In monte Kom (Sz, Ro), Lola planina (Ho), Perućica, Korita rovačka, Durmitor, Maglić Pivski (Ro).

(*Annotatio*: Quid sit *T. silesiacum* DAHLST., a cl. LINDBERG fil. e Krstac pr. Njeguši indicatum, nescio.)

*Reichardia* ROTH.

5324. *R. pictoides* (L.) ROTH. — In rupestr. et ad muros reg. infer. mediterr. et mont. calidioris. — Bjeloshi (Ba), Bar (Ba, Ro, Do), Ulcinj (Ro), Cetinje (Kn).

5325. *R. macrophylla* VIS. et PČ. — A praeced. dignoscitur foliis glaucis runcinato-pinnatilobis, segmentis crispule spinuloso-dentatis, involucri phyllis margine late membranaceis, floribus sulphureis involucro fere duplo longioribus. — In rupestr. et glareosis reg. mont. et subalpinae. — In valle Tušina supra Buan et in monte Vučji Zub-Bijela Gora (Pč), in monte Jastrebica et Orjen (Ad), Borkovići distr. Piva (Ro), in valle flum. Piva et rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

### *Cicerbita* WALLR.

5330. *C. alpina* (L.) WALLR. — In pratis silvat. et ad rivulos reg. subalp. et alp. dic. septentrionalis. — In monte Durmitor (Ro), Bukovica et Žabljak sub monte Durmitor (Ro, Ba), in valle Jelovica sub Bjelastica planina (Ro), sub monte Kom Kučki (Ja), Krivi do distr. Piva (De, Si).

? 5332. *C. Plumieri* (L.) KIRSCHL. — „In pratis silvat. sub monte Durmitor versus jugum Štulac ac in declivibus montis Kukuraj Brdo sub monte Kom“ a cl. PANČIC in Elench. 56 indicata; secundum cl. HAYEK dubia, nam haec species in Europa occident. crescit. A sequente dignoscitur foliorum segmento terminali rhombo-ovato, capitulis in corymbum laxum dispositis, achaeniis ellipticis.

5333. *C. Pančićii* (VIS.) BEAUV. — Caulis erectus glaber apice racemoso-ramosus; folia glabra subtus glauca lyrate-pinnatipartita segmento terminali cordato-triangulari acute dentato quam lateralia 1—2 ovata acute dentata conspicue maiore; capitula in racemum compositum disposita; involucrum glabrum, flores coerulei; achaenia prismatica vix compressa apice non attenuata. — In silvis humidis et umbrosis, irriguis et ad ripas reg. subalp. et alp. dic. septentrionalis. — Perućica sub monte Kom (Pč), in valle fl. Tara (Pč, Ja), in monte Lisa pr. Andrijevica (Ba), in monte Maglić Pivski; Ranisava et Bukovica sub monte Durmitor, vallis Jelovica sub Bjelastica planina (Ro).

### *Sonchus* L.

5335. *S. arvensis* L. — In cultis et agris reg. infer. et montanae. — Ad Danilovgrad (Pč), Viljuša (Ro).

— var. *laevipes* KOCH. — Ad ripas, in fossis et palud. reg. mont. et subalpinae. — Kopilje (Ho), Njeguši, Lastva čevska, Poščensko jezero supra Šavnik; Ranisava sub monte

Durmitor; ad coenob. Piva; Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro).

5337. *S. asper* (L.) HILL. subsp. *e u a s p e r* HAY. — In cultis, ruder. et asperis reg. infer. et montanae. — Rijeka et Vir (Pč), Čevo (Ho), Ulcinj (Ba), Njeguši; coenob. Piva; inter Cetinje et Rijeka (Ro).

— subsp. *glaucescens* (JORD.) HAY. (= *S. pallescens* PANČ. Elench. 55). — In cultis et ad sepes reg. infer. et mont. calidioris. — Cetinje (Pč), Bar (Ba, Do), Ulcinj, Danilovgrad; Kokoti in Lješanska nahija (Ro).

5338. *S. oleraceus* (L.) GOU. — In cultis et ruder. reg. infer. et montanae. — Ad Njeguši et Cetinje (Pč), Danilovgrad, Andrijevica et Ulcinj (Ro), Crmnica (Eb).

— f. *triangularis* WALLR. — Folia runcinato-pinnatifida segmentis triangularibus. — Cum typo ad Njeguši (Pej, Ro).

### *Mycelis* CASS.

5340. *M. sonchifolia* (PANČ.) HAY. — Caulis robustus usque ad 1—2 m altus glaber; folia ad nervos breviter setosa praeterea glabra lyrato-pinnatifida segmentis lateralibus oblongis dentatis, terminali magno sagittato-triangulari, superiora basi cordata sessilia; capitula breviter pedunculata in racemum simplicem vel ramosum disposita; involucrum 13—16 mm longum glabrum, phyllis pluriseriatis imbricatis; flores lutei; achenia compressa 6 mm longa in rostrum 1 mm longum subito contracta, longitudinaliter 10-costata. — In fruticetis humidis, in irriguis reg. subalpinae. — In monte Piševu supra Andrijevica cca 1600 m (Ro).

5343. *M. muralis* (L.) RCHB. — In silvis, fruticetis et rupestr. reg. mont. et subalp., rarius inferioris in toto territorio frequens.

### *Lactuca* L.

5345. *L. perennis* L. — In rupestr. reg. mont. et subalpinae. — Javorje planina (Pč), Borkovići distr. Piva; sub monte Balj pr. Andrijevica (Ro).

5348. *L. sativa* L. — Culta.

5349. *L. serriola* L. — In lapid., apricis et ruder. reg. infer. et mont. calidioris. — Cetinje (Kn), Plavnica (Sz),

Godinje pr. Vir; Podgorica, Andrijevica, Šavnik; Sinjac pr. coenob. Piva; Viljuša et Njeguši (Ro).

\*— f. *angustisecta* KNEUCKER. — Folia et foliorum segmenta angusta. — Rijeka (Kn).

5351. *L. saligna* L. — In rupestr. et ruder. reg. mont. calidioris. — Ceklin (Kš), Rudine nikšiće; Stubica pr. Nikšić (Ro).

5352. *L. quercina* L. var. *rostrata* VELEN. — Achenia nigricantia rostro aequilongo terminata. — In dumetis reg. montanae. — Rudine nikšiće et Mirkov do pr. Njeguši (Ro), Jasenovo polje sub. monte Vojnik; Pošćensko jezero supra Šavniki (Ro).

5356. *L. viminea* (L.) PRESL. — In rupestr. et dumetis reg. infer. et montanae. — Boljevči supra Vir; Medun (Sz), Podgorica, Viljuša; Mratinje sub monte Maglić Pivski; coenob. Piva; sub monte Žoljevica pr. Andrijevica (Ro), in monte Rumija (Do).

#### *Prenanthes* L.

5358. *P. purpurea* L. — In silvis reg. subalp. et alp. in toto territorio.

\*— f. *albonervosa* ROHL. IX. Beitr. 12. — Nervi foliorum subtus valde prominentes et cretaceo-albi. — In silva ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

#### *Crepis* L.

5359. *C. bulbosa* L. — In lapid. et arenosis reg. infer. mediterraneae. — In litore maris ad Bar et Ulcinj; ad ripam lacus Scodrani pr. Vir (Ro).

5360. *C. viscidula* FROEL. — Rhizoma obscurum cylindricum; caulis erectus laxe glandulosopubescens, remote foliosus, simplex vel superne in ramos paucos monocephalos distans; folia parce longe crispule glandulosopilosa, grosse dentata, longe cuspidata, infima obovato-lanceolata, in petiolum brevem sensim attenuata, reliqua basi lata cordata amplexicaulia; involucrum 12—15 mm longum, nigrescentiviride fere efflossum, pilis nigris eglandulosis et glanduliferis modice dense obsitum; flores flavi; pappus sordide albus. — In pratis reg. subalp. et alp. in omnibus mont. dic. septentrionalis. — Perućica

sub monte Kom (Pt), Sinjavina planina (Pt, Ro), in monte Durmitor versus jugum Štulac (Pč), Treblješ luka, Pavlova lava (Ho), Sjekirica planina; Carine sub monte Kom; Javorje planina; Štirni do; Bukovica, Žabljak, Ranisava et Crvena Stjena sub monte Durmitor, in monte Vojnik et Maglić Pivski; Ljut supra coenob. Piva (Ro).

\*5361. *C. conyzifolia* (GOU.) D. T. — In pratis reg. subalp. et alp. in dic. septentr. frequens. — E montibus dic. merid. (Lovćen, Lastva čevska et Rumija) adhuc non vidi.

— subf. *subruncinata* FROEL. — Folia infima runcinato-pinnatifida. — Cum typo.

— var. *montenegrina* (ROHL.) HAY. — Parce glandulosa; capitulis multo minoribus (1—1,5 cm latis), pedunculis tenuioribus vix incrassatis. — Ad Pašina Voda et Bukovica sub monte Durmitor; Štirni do pr. Lukavica planina; in monte Vojnik et Durmitor (Ro).

5365. *C. montana* (L.) TSCH. — In pratis reg. alp. dic. septentrionalis. — Javorje planina (Pč), Ranisava et Sjekirica planina (Ro), Durmitor (Ro, Ht, De, Si).

5367. *C. paludosa* (L.) MCH. — In silvis humidis, ad ripas et in irriguis reg. subalpinæ. — In valle fl. Perućica sub monte Kom et sub Hasanac planina; Berane (Ro).

\*— var. *eglandulosa* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Involucrum eglandulosum et fere omnino glabrum. — In alp. montis Prokletija loco Ahmica (Boš).

5373. *C. Pantocsekii* (VIS.) LATZEL.\* — Perennis; radice cylindrico, collo squamoso; caulis subglabris vel parum puberulis tenuibus gracilibus monocephalis vel in 2—3 ramos tenues monocephalos divisis, basi sicut foliorum petioli rubescentibus; foliis subglabris vel ad nervos puberulis, radicalibus in petiolum sensim attenuatis, primis obovato-oblongis, margine irregulariter dentatis, ceteris runcinatis, segmentis lanceolatis acutis integris vel acute dentatis, caulinis paucis (2—3), infimo radicalibus conformi, sequenti angustissime lanceolato indiviso integerrimo (rarius dentato), supremo minuto anguste lanceolato; capitulis mediocribus, involucro pilis eglandulosis et flavis glanduliferis obsito, involuci phyllis anguste lanceolatis, exterioribus quam interiora 2—3 plo brevioribus; ligulis flavis

\* non LATREL. Confer HAYEK Prodr. fl. balc. II:851.

involucro duplo longioribus; pappo niveo involucrum parum superante, acheniis apice attenuatis (nec rostratis) multistriatis pappo sublongioribus. — In rupestribus montis Lovćen (Pi).

\*— f. *Vandasii* ROHL. X. Beitr. 6 (= *C. Vandasii* ROHL. IV. Beitr. 66). — Caulibus et foliis pilis albis simplicibus crispulis parce obtectis, pilis glanduliferis nullis vel rarissimis, caulis in parte inferiore subglaber. (Forma typica: „Caulis inferne parce, superne densius glandulosopilosus pilis simplicibus intermixtis, folia omnia subtus densius, supra parce pilosa pilis glanduliferis intermixtis.“ ASCHERSON OeBZ. 1869: 67.) — Supra Njeguši et in monte Lovćen loco „Goli rti“, Bukovica pr. Cetinje (Ro, Pej).

\*— var. *subdurmitorea* ROHLENA X. Beitr. 6. — Viridis (non glaucescens); folia minus profunde runcinato-pinnatifida (nec fere ad rachim runcinato-pinnatipartita) densius glandulosopilosa pilis eglandulosis paucioribus, laciniis latioribus brevioribusque aut horizontaliter patentibus aut sursum vergentibus lobo terminali ceteris subaequali (nec longissime attenuato); folia speciminum humiliorum saepe integra solum margine sinuato-dentata; involuci phylla densissime glandulosopilosa, pilis eglandulosis paucis intermixtis; achenia interna apicem versus magis attenuata, + evidenter subrostrata. — In pratis subalpinis ad Borkovići sub monte Durmitor cca 1400 m (Ro).

5377. *C. Blavii* (ASCH.) STADLM. — In rupestr. et lapid. reg. subalp. et montanae. — Ad Borkovići distr. Piva (Ro).

— var. *viscosissima* ROHL. V. Beitr. 68 (= *C. rigida* var. *viscosissima* ROHL. IV. Beitr. 66). — Involucrum cum pedunculis dense glandulosopilosum. — In apricis ad Viljuša (Ro).

\*5383. *C. chondrilloides* JACQ. — In gramin. et rupestr. reg. mont., rarius subalpinae. — In monte Šarišnik pr. Goraňsko; Zagarač supra Danilovgrad; Velestovo et Lastva čevska in Katunska nahija (Ro).

5386. *C. Columnae* (TEN.) FROEL. — A *C. aurea* ex Alpibus dignoscitur capitulis saepissime minoribus (involucro 7–10 mm longo, solum basin versus parce floccoso), floribus extus non purpureis, foliis lanceolatis (nec cuneato-oblongo-ovovatis). — In pascuis et pratis reg. subalp. et alp. in omnibus mont. dic. septentr. frequens; etiam e monte Orjen

et Bijela Gora ad fines Dalmatiae nota; e monte Lovćen, Lastva čevska et Rumija adhuc non vidi.

— f. *pilifera* GRIS. ap. PANT. Adnot. 49. — „Palmaris foliis runcinato-dentatis vel inciso-pinnatisectis, involucro infra apicem dense piloso, pilis nigricantibus, ligulis aurantiacis sub-tus rubellis.“ — Viruša dol sub Crna planina (Pt), Lukavica planina (Ro), Čirova pečina in monte Durmitor (De, Si).

— f. *elatior* GRIS. l. c. — Caulis usque ad 30 cm altus apice nigro-pilosus; flores aurei, subtus rubelli. — Carine sub monte Kom (Pt), in monte Balj; Piperska Lukavica (Ro).

— f. *Kitaibelii* (FROEL.) HAY. — Caulis monocephalus, involucrum glabriuscum; flores flavi. — In monte Orjen (Ad), in monte Pivljan cca 1950 m (Ja).

— f. *limonifolia* GRIS. l. c. — Folia oblongo-spathulata; caulis humilis; involucrum subglabrum; flores aurei. — Ad lacus Riblje et Crno jezero sub monte Durmitor (Pt).

? 5387. *C. aurea* (L.) CASS. — In graminosis summi montis Velki Maglić ad fines Albaniæ (Sz, Ba). Potius ad spec. praeced. pertinet.

5389. *C. incarnata* (WULF.) TSCH. subsp. *dinarica* (BECK) HAY. — A typo differt inflorescentia tantum 1—4-cephala, involucro 10—12 mm longo phyllis cca 1,5 mm latis nigrescentibus, capitulis multifloris. — In pratis et pascuis reg. alp. dic. septentrionalis. — In monte Kom (Pt, Ro), Maglić Pivski, Božur et Ledenica planina supra coenob. Piva, Vojnik, Jablan vrh supra Kolašin; Sjekirica supra Andrijevica (Ro), Durmitor (No).

\*— f. *scabrifolia* ROHL. in FEDDE Repert. 1937:202. — Folia etiam adulta pilis brevibus (praesertim in pagina inferiore) dense tecta. — Non raro cum typo (Ro).

5391. *C. biennis* L. — In herbidis et lapid. reg. mont. et subalpinae. — Ad Šavniki et Andrijevica (Ro), Crmnica (Eb).

— subf. *runcinata* WIMM. et GRAB. — Folia runcinata segmentis lanceolatis antice saepe dentatis. — Ad Šavniki; Baro jezero sub monte Durmitor (Ro), in silva Perućica sub monte Kom et ad Kovčice sub monte Durmitor (Pt); „stigmatibus brunneis a *C. bienni* differt“? PANT. Adn. 48.

5393. *C. nicaeensis* BALB. — In pratis, aggeribus et in asperis reg. infer. et montanae. — Ad Cetinje et in Župa nik-

šićka (Pč), Drušći pr. Rijeka; Kokoti in Lješanska nahija, Njeguši; Drežnica pr. Nikšić (Ro).

— var. *adenantha* (VIS.) ROHL. V. Beitr. 68. — Involucrum cum pedunculis apice glandulosos-setosum; achaenia testuinter glandulosa. — In monte Bijela Gora (Pt), ad Delaj pr. Trijepši distr. Kuči (Ba), Viljuša, Njeguši; Bukovica pr. Četinje (Ro), in monte Lovćen (To, Ro).

5394. *C. capillaris* (L.) WALLR. — In pratis, cultis et ruder. reg. montanae. — Cetinje (Pč, Kn), Grahovo (Pč), ad Medun et Orahovo distr. Kuči (Sz).

— subf. *pectinata* BISCH. — Boljevići pr. Vir (Eb).

5398. *C. neglecta* L. subsp. *eunelecta* HAY. var. *stricta* (SCOP.) VIERH. — In gramin., cultis et ruder. reg. infer. mediterr. et mont. calidioris. — Cetinje (Kn), Dobrsko selo supra Rijeka (Kš), circa Bar, Ulcinj; Vir, Rijeka, Podgorica, Danilovgrad et Kokoti frequens (Ro), ad latera montis Rumija (Do).

— f. *parvuliceps* LINDB. subf. *exaltata* ROHL. III. Beitr. 43. — Caulis usque ad 60 cm altus polycephalus. — Dragovljici pr. Nikšić cca 900 m (Ro).

\*5399. *C. foetida* L. subsp. *rhoeadifolia* (M. B.) FIORI et PAOL. — In cultis et ruder. reg. montanae. — Ad Cetinje, Njeguši, Goraško, coenob. Piva et Andrijevica (Ro).

\*— subsp. *eufoetida* (L.) HAY. — In pratis, incult. et ruder. reg. infer. et montanae. — Danilovgrad (Pt), Cetinje (Pč), Vir (Pč, Ho), Rijeka et Andrijevica (Ho), Bar, Podgorica, Viljuša et Šavnik (Ro), Ilina glavica supra Njeguši et in monte Lovćen (Pej, Ro), ad latera montis Rumija (Do). Loca hic enumerata verosimiliter plurima ad var. *glandulosam* (GUSS.). BISCH. spectant.

5403. *C. setosa* HALL. f. — In gramin., cultis et lapid. reg. infer., mont., rarius subalpinae. — Cetinje (Pt, Pč, Kn), Rijeka (Pt), Kamenjak (Ho), circa Bar, Ulcinj, Vir, Kokoti, Podgorica, Danilovgrad, Andrijevica, Berane, Njeguši, Šavnik, Goraško, coenob. Piva; Njeguška planina sub monte Lovćen; Bukovica sub monte Durmitor (Ro), Kolašin (Ja), Krivi do et in valle Vrbnica distr. Piva (De, Si).

\*— f. *gracilis* ROHL. VIII. Beitr. 10. — A typo differt foliis indivisis solum parum dentatis, caule abbreviato 6–7 cm

alto, saepissime monocephalo, capitulis multo minoribus. — Inter Bukovica et Njeguši (Ro, Pej).

\*5405. *C. taraxacifolia* THUILL. — In aren., lapid. reg. infer. et montanae. — Berislavići pr. Plavnica, Podgorica, Bar; Andrijevica (Ro).

5406. *C. vesicaria* L. — In arenosis regionis mediterraneae. — Ad Bar et Ulcinj (Ro).

5408. *C. rubra* L. — In gramin., olivetis et dumetis reg. infer. mediterraneae. — Ad Bar et Ulcinj (Ro).

### *Hieracium* L.

5413. *H. Naegelianum* PANČ. Elench. 57 var. *Naegelianum* (PANČ.) ZAHN. — In rupestr. et gramin. reg. alpinæ. — Mrčenov do sub monte Kom (Pč), in monte Maglić Pivski (Ro).

— var. *maglićense* BECK et ZAHN MBL. V:92. — In rupes et glareosis montis Maglić Pivski (B, Ro).

5415. *H. bupleuroides* GMEL. subsp. *bupleuroides* N. P. var. *phyllobracteatum* N. P. — Sub monte Dziesbeze ad fines Albaniae (Sz). (Secundum cl. HAYEK dubium).

— var. *Schenkii* GRIS. — In monte Maglić Pivski (Ro). Hucce pertinent verosimiliter plantae a cl. PANČIĆ in alp. montis Javorje et ad Šavnik sub monte Ivica lectae (Elench. 59).

— f. *genuinum* N. P. subf. *stylosum* ROHL. V. Beitr. 71.

— Cum typo.

— subsp. *crinifolium* N. P. var. *pseudo-Schenkii* ROHL. et ZAHN in FEDDE Rep. VI:227. — In alp. montis Ranisava (Ro), in monte Durmitor (Pč).

5420. *H. oxyodon* FR. subsp. *oxyodon* ZAHN var. *pseudo-rupstre* (N. P.) HAY. f. *latifolium* ZAHN ap. ROHL. V. Beitr. 72. — In rupestr. reg. alp. montis Durmitor loco Vališnica (Ro).

5421. *H. pallens* W. K. var. *Trachselianum* (CHRISTEN.) ZAHN. — In alpinis montis Maglić Pivski, Durmitor loco Valoviti do et in monte Ranisava (Ro).

5422. *H. stuppeum* GRIS. var. *stupposum* (RCHB.) N. P. — In saxosis, lapid. et herbidis reg. infer., mont. et sub-

alpinæ. — Lastva čevska (Pt), Cetinje, Čevo, Čeklići, Cuci et Grahovo (Pč), Njeguši, Lovćen (Ba, Pej, Ro), Rijeka (Ho), Bogetići, Nikšić, Viljuša, Mratinje sub monte Maglić Pivski; Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

— f. *genuinum* N. P. subf. *calvifolium* N. P. — Cum typo.

— f. *multifolium* ZAHN. — Ad Njeguši (Ro).

— var. *pachychaetum* N. P. — In monte Vjetnik (Ja).

— var. *substupposum* ROHL. et ZAHN l. c. 235. — Vući do in monte Lovćen (Ro).

\*5423. *H. sparsum* FRIV. subsp. *Schuetianum* ZAHN in FEDDE Repert. 1932: 237. — In alp. Cav Borit pr. Gušinje sub monte Prokletija cca 2000 m (Schütt).

5424. *H. macrodontoides* ZAHN. — In rupestribus et lapid. reg. mont. et subalpinae.

— var. *macrodontoides* Z. — Lovćen, Rudine nikšićke, Njeguši loco Gojanova greda (Ro).

— var. *adenothrysum* (SAG. et Z.) HAY. — Krstac pr. Njeguši (Sa, Pej, Ro), in monte Balj supra Andrijevica (Ro).

— f. *pilosiceps* (ROHL. et Z. l. c. 236) HAY. — In rupestr. ad coenob. Piva (Ro), in valle fl. Tara pr. Lever Tara (De, Si).

— var. *baljense* (ROHL. et Z.) HAY. (= *H. adenothrysum* ssp. *baljense* ROHL. et Z.). — In monte Balj supra Andrijevica; Perućica sub monte Kom (Ro).

5428. *H. murorum* L. — In silvat. reg. subalp. et alpinae. — In monte Jastrebica, Durmitor et Kom (Pč), in monte Dziebeze (Sz).

— subsp. *pellucidum* (LAEST.) Z. var. *Ebelii* Z. Comp. Hier. 289. — In monte Sutorman supra Bar (Eb).

— subsp. *serratifrons* (ALMQ.) Z. var. *subbifidiforme* Z. f. *pseudatratum* (TOUT.) Z. — In sax. ad ripam rivi Vući potok ad fines Albaniae (Df).

— subsp. *grandidens* Z. var. *gentile* (JORD.) Z. f. *genuinum* (Z.) HAY. subf. *pilifolium* (Z.) HAY. — Supra Andrijevica (Ro).

— subf. *macrocephalum* Z. et subf. *oligocephalum* Z. — In sax. ad ripam rivi Vući potok ad fines Albaniae (Df).

\*— var. *gypsophilum* (GRIS.) Z. — In monte Kom Vasojevički; mons Vojnik; Črtov do et Zakamen supra coenob. Piva (Ro).

\*— var. *pleiophyllogenes* Z. — Zakamen supra coenob. Piva; Andrijevica (Ro).

— subsp. *proximum* (NORRL.) Z. var. *semisilvaticum* Z. — In valle Perućica sub monte Kom (Pt).

\*5433. *H. praecurrents* VUK. subsp. *praecurrents* Z. — In alp. montis Durmitor loco Valoviti do (Ro).

— var. *subserratifolium* Z. f. *crepidifrons* Z. — Cum typō (Ro).

5434. *H. rotundatum* KIT. (= *H. transsilvanicum* HEUFF.) var. *pleiophyllum* (SCHUR) Z. — In silvis reg. subalp. et alpinæ.

— f. *normale* Z. subf. *verum* Z. — Perućica sub monte Kom (Pt), Han Drndarski pr. Kolašin (Ro), Vuči potok ad fines Albaniæ (Df).

— subf. *leptocephalum* (VUK.) Z. — In silvis sub monte Durmitor (Pč).

— f. *brevipilum* Z. — In alp. montis Durmitor, Kom et Sjekirica (Ro).

5435. *H. trebevianum* K. MALÝ subsp. *subpleiophyllogenes* Z. var. *subpleiophyllum* ZAHN f. *minutidens* ROHL. et ZAHN l. c. 228. — Folia ovata vel ovato-lanceolata minute glandulosodentata. — In rupestr. reg. subalp. ad Poščensko jezero supra Šavnički (Ro).

— var. *glaucinoides* ZAHN subf. *subpilosum* Z. — Andrijevica, mons Žoljevica, Han Drndarski sub monte Kom (Ro).

— var. *obliquifidum* ROHL. et ZAHN l. c. 228. — In sax. reg. subalpinae. — Mali Šanik sub monte Lovćen (Kš, Ro), Orjen (Zahn).

— f. *pleiophyllotropum* MALÝ et Z. Glasn. 1926 p. 107. — In subalp. ad Volujačko jezero (Ma).

— f. *amauradenophorum* MALÝ et ZAHN l. c. — Cum praeced. (Ma).

— var. *paucifidum* ROHL. et ZAHN l. c. 229. — In pascuis alp. in monte Kom Vasojevički (Ro).

5436. *H. macrodon* N. P. (= *H. bifidum-stuppeum*)  
subsp. *macrodon* Z. var. *macrodon* Z. — In reg. mont. et  
subalpina. — Ad Cetinje (Kn).

— subf. *mratinjense* ROHL. et ZAHN l. c. 236. —  
In rupestr. ad Mratinje sub monte Maglić Pivski (Ro), Goli  
rti in monte Lovčen (forma foliis subtus efloccosis) (Ro).

— subf. *epilosiceps* ROHL. et Z. l. c. 236. — In monte  
Lovčen (Ro).

— subf. *pilosiceps* Z. — In monte Lovčen (Ro, Pej).

— subsp. *pseudomacrodon* Z. var. *pseudomacrodon*  
ROHL. et ZAHN l. c. 236. — In rupestr. reg. subalpinae.  
Ljut supra coenob. Piva; Valač rupe in monte Lovčen (Ro).

5437. *H. bifidum* KIT. subsp. *bifidum* Z. var. *steno-*  
*lepis* (LBG.) ZAHN. — In reg. subalp. montis Balj pr.  
Andrijevica; in monte Vojnik (Ro).

— var. *caesiiflorum* (ALMQU.) Z. — Vuči do in monte  
Lovčen, Vališnica do in monte Durmitor; Velki Krš pr. Andrijevica (Ro).

— subf. *alpigenum* Z. — In alp. montis Vojnik et Dur-

mitor (Ro).

— f. *pseudopraecox* ZAHN subf. *biceps* ZAHN (= f.  
*alpestre* Z. apud ROHL. V. Beitr. 71). — In alp. montis  
Kom Kučki et Durmitor (Ro).

— var. *sinuosifrons* (ALMQU.) Z. — In alp. montis  
Durmitor loco Vališnica do in f. *subeglandulosum* Z. (Ro).

— subsp. *subcaesium* (FRIES) Z. — In subalp. sub

monte Kom loco Mrčenov do (Pč).

— var. *cardiobasis* Z. — Žabljak sub monte Durmitor

(Ro).

— var. *basicuneatum* Z. — In monte Lovčen, Vuči do,  
Goli rti, Rupe zvěrinačke (Ro), cum forma *oligantho* ZAHN.

— subsp. *psammogenes* ZAHN var. *oreites* (A. T.)  
Z. f. *subsenile* Z. — In alp. montis Vojnik (Ro).

— subf. *submaculatum* Z. — In alp. Korita ro-

vačka; in monte Kom (Ro).

— var. *senile* (A. KERN.) Z. — In subalp. sub monte  
Ledenica planina loco Črtov do (Ro).

— f. *glabrescens* Z. — In subalp. Ledenica planina

(Ro).

— var. *monobrachion* (DEG. et ZAHN) ZAHN. — In alp. montis Maglić Pivski (Ro).

5438. *H. Neilreichii* BECK var. *Ranisavae* ROHL. et ZAHN l. c. 227. — In subalp. montis Ranisava pr. Durmitor (Ro).

5439. *H. incisiceps* ROHL. et ZAHN l. c. 229 (= *H. bifidum-rotundatum* > *villosum*). — In gramin. et sax. alp. montis Vojnik (Ro).

5450. *H. austroslavicum* MALÝ Glasn. 1926: 108. — In silvis reg. subalp. ad lacum Volučko jezero cca 1500 m (Ma).

5452. *H. juranum* (GAUD.) FR. var. *cichoriaceum* (A. T.) Z. (= *H. juranum* var. *mollissimum* ROHL. et Z. l. c. 234). — In silvis ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

5453. *H. pocuticum* WOŁ. subsp. *klopotivae* (PAX) Z. (= *H. Bukovicæ* ROHL. et ZAHN l. c. 234). — In silvis reg. subalp. ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

5457. *H. piliferum* HOPPE subsp. *piliferum* (HOPPE) HAY. var. *piliferum* (HOPPE) HAY. — In pascuis reg. alpinæ. — In monte Durmitor (Ro).

— var. *multiglandulum* (N. P.) HAY. — In monte Lovćen (Pč teste ZAHN).

5459. *H. villosum* L. subsp. *villosum* (L.) N. P. — In pascuis et lapid. reg. subalp. et alp. in omnibus montibus dic. septentrionalis. — Javorje planina, Mrčenov do sub monte Kom; in monte Durmitor (Pč), ad latera montis Dziebeze et in summo monte Velki Maglić distr. Kuči (Sz).

— var. *vilosissimum* (NAEG.) N. P. — In monte Božur planina distr. Piva; in monte Durmitor (Ro).

— f. *stenobasis* N. P. — In alp. montis Javorje planina, Vojnik, Ranisava et Korita rovačka (Ro).

— var. *villosum* (L.) N. P. — Bjelastica planina (Ro), Sinjavina planina (Pt), Maganik, Lukavica planina (Ho), Kačuni Kostića distr. Kuči (Ba).

— f. *genuinum* N. P. subf. *involutum* ROCH. — In sax. ad Fuša Rudnices sub Prokletija planina (Df).

— subf. *obscurum* SCHULTZ-BIP. — In rupestr. montis Sinjavina planina (Pt).

5460. *H. glabratum* HOPPE var. *nudum* A. KERN. — In saxosis reg. alpinae. — Orlova Skala sub monte Kom (Pt, Pč, Ro), in monte Maglić Pivski, Durmitor et Kom Vasojevićki (Ro).

— var. *glabratum* (HOPPE) N. P. — In alp. montis Ranisava et Durmitor (Ro), supra lacum Volujačko jezero (Ma).

5461. *H. Morisianum* RCHB. subsp. *villosiceps* (N. P.) Z. — In subalp. montis Ranisava pr. Durmitor (Ro), in monte Pivljan supra Kolašin (Ja), Struga (Havelka teste MALÝ).

— subsp. *comatum* (N. P.) HAY. var. *sericotrichum* (N. P.) f. *decrescens* (N. P.) Z. — In monte Ranisava (Ro).

\*5463. *H. scorzonetifolium* VILL. var. *flexuosum* (W. K.) N. P. — In rupestr. reg. subalp. et alpinae. — In monte Kom (Pt), in pascuis pinguibus Mokre ad pedem montis Dziebeze distr. Kuči (Sz), in sax. montis Kom et supra Ljubanji (Ba).

5466. *H. humile* JACQ. var. *sarajevense* BECK. — In rupestr. reg. subalp. et alpinae. — In monte Gradište supra Kolašin (Ba), in rup. ad Crno jezero sub monte Durmitor (Pt), Maglić Pivski; Vališnica do et Valoviti do in monte Durmitor; Vojnik, Ranisava, Pošćensko jezero (Ro), in sax. ad lac. Volujačko jezero (Ma).

5472. *H. prenanthoides* VILL. subsp. *prenanthoides* Z. var. *bupleurifolium* (TSCH.) Z. — In sax. supra Crno jezero in monte Durmitor (Pč), in monte Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

— f. *spicatum* (ALL.) Z. — In subalp. ad Zakamen supra coenob. Piva (Ro).

— subf. *subpetiolatum* Z. — In silvis ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

— var. *bupleurifolioides* Z. — Ad Bukovica sub monte Durmitor cum f. *subviolascente* ROHL. et Z. l. c. 233; Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

— var. *valdefoliatum* Z. — In pratis silvat. ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

— subsp. *lanceolatum* (VILL.) Z. var. *strictissimum* (FROEL.) Z. f. *strictum* (FR.) Z. — In alp. Štirni do pr. Lukavica planina (Ro).

— var. *violascens* Z. — In subalp. Ljut supra coenob. Piva (Ro).

— var. *auriflorens* Z. — In alp. montis Durmitor (Ro).

\*5473. *H. cydoniifolium* VILL. — In silvat. montis Durmitor sub Crvena Stijena (Pč).

5479. *H. pseudo-Tommasinii* ROHL. et Z. l. c. 237 (= *H. stuppeum* > *racemosum*) var. *pseudo-Tommasinii* ROHL. et Z. l. c. — Gornje polje pr. Njeguši; Mali Šanik in monte Lovćen (Pej, Ro).

— f. *calvescens* ROHL. et Z. — Ad Šavniki sub Ivica planina; Mali Šanik sub monte Lovćen (Ro).

— var. *vardense* ROHL. et Z. l. c. — In subalp. Varda supra coenob. Piva (Ro).

— var. *stupposiceps* ROHL. et Z. — Supra Šavniki (Ro).

— f. *glaucifolium* ROHL. et Z. — In rupestr. ad Martinje sub monte Maglić Pivski (Ro).

— var. *crnagorae* Z. — In rup. ad coenob. Piva (Ro), ad Cetinje (Gross).

— var. *krstacense* MALÝ et Z. Glasn. 1925: 57. — In sax. ad Krstac pr. Njeguši (Ma).

\*5480. *H. Tommasinii* RCHB. f. var. *Tommasinii* (RCHB.) Z. — In rupestr. ad coenob. Piva (Ro), Kolašin (fide ZAHN), Cetinje (Kn), Njeguši (Gelmi, Sa), Trijepši distr. Kuči (Ba).

— var. *setosissimum* N. P. — In rupestr. ad coenob. Moraca (Ja).

5485. *H. racemosum* W. K. subsp. *crinitum* (S. S.) Z. — In rupestr. reg. mont. et subalpinae. — Sutorman supra Bar; mons Velka Jastrebica; Kolašin (Pč), in monte Lovćen (Ro), supra Cetinje (Kn), Velje osoje supra Njeguši (Pej, Ro).

— subsp. *italicum* Z. — Vuči do et Goli rti in monte Lovćen (Ro).

— subsp. *barbatum* (TSCH.) Z. — In dumetis et rup. ad coenob. Piva et Goraňsko (Ro).

— f. *genuinum* Z. subf. *Aschersonianum* (UECHTR.) Z. — In rupestr. clivi Mali Lonac montis Sutorman (Pč).

\*——— var. *syringifolium* DOMIN Magy. Bot. Lap. 1915: 69.  
— Hypophyllopodium; folia ad rhizomatis apicem pauca subrosulata, sub anthesi partim emortua; caulis strictus, totus patens tim hirsutus et pilis stellatis inspersus asperulus distantim regulariter usque ad apicem foliosus; folia caulina late ovata chartacea subintegra breviter subacuminata, omnia sessilia, i. e. infima basi breviter contracta, cetera basi rotundata vel subcordata; caulis apice floccosus et in corymbum brevem expansus, pedunculis lateralibus capitulum terminale plerumque superantibus; involucrum glabrescens; achaenia atro-fusca. — Ad coenob. Piva (Ro).

\*——— f. *sparsifolium* DOMIN l. c. — Caulis glabrescens, i. e. parte media pilis longis destitutus; folia caulina pauca valde distantia; involuci phylla pilis longioribus nigrescentibus glanduligeris hirsuta. — Inter Gorańsko et coenob. Piva (Ro).

\*——— var. *Rohlenae* DOMIN l. c. — Rhizoma repens, elongatum; folia ad rhizomatis apicem subrosulata, ovata, acuminata, in petiolum alatum longiusculum cuneato-contracta; caulis, foliorum margines necnon paginae inferioris costa pilis albis longissimis mollibus patentibus hirsuti, raro denique glabrescentes, juventute saepe hirsutissimi; caulis totus distantim foliatus; folia ovata, in apicem acuminatum protracta, basi cuneata, margine subintegro plus minusve undulata; inflorescentia (tantum juvenilis visa) racemosa, tota villosa-hirsutissima; pedunculi capituligeri bracteis foliaceis magnis suffulti; involucrum pilis longis albis eglandulosis laxe hirsutum. — Ad Njeguši loco Žarbinje (Ro).

5490. *H. sabaudum* L. subsp. *boreale* (FR.) Z. var. *nemorivagum* (JORD.) Z. — In silv. reg. subalpinae. — Sub monte Kom (Ho), ad Andrijevica (Ro).

——— var. *praticolum* (SUDRE) Z. — In valle fl. Tara ad Kolašin (Ja).

5491. *H. brevifolium* TSCH. var. *congestifolium* (VUK.) Z. — In dumetis reg. mont. ad coenob. Piva (Ro).

——— var. *Helwegeri* (MURR et Z.) Z. — In sax. et silv. ad coenob. Piva (Ro).

5494. *H. laevigatum* WILLD. subsp. *laevigatum* (W.) Z. var. *grandidens* Z. — In dumetis ad Pošćensko jezero supra Šavniki (Ro).

5495. *H. umbellatum* L. var. *umbellatum* (L.) Z. — In silva ad Kovčice sub monte Durmitor (Pt).

— — — f. *monticola* (JORD.) Z. — In pratis silvat. ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

5497. *H. gymnocephalum* GRIS. var. *gymnocephalum* (GRIS.) Z. — In rupestr. reg. subalp. et alpinae. — Orlova skala sub monte Kom (Pt), in valle Tušina supra Buan et in monte Velka Jastrebica (Pč), in monte Hum Orahovski (Sz), in schistaceis ultra Mrčenov do secus viam ad Kukuraj brdo sub monte Kom; in rupestr. Širokar distr. Kuči; Varda sub monte Kom (Ba), Štirni do et Piperska Lukavica (Ro), in monte Lovćen (Ad), in monte Jerinja glava pr. Andrijevica (Sk).

— — — f. *genuinum* Z. subf. *subglandulosum* Z. — In sax. ad Vunsaj pr. Gusinje (Df).

— — — f. *oriensi* (A. KERN.) Z. — In reg. subalp. et alpina. — In monte Maglić Pivski, Vojnik, Kom, Durmitor (Ro), in monte Orijen (Ad).

— — var. *laxipellitum* Z. — In monte Orijen (Ad).

5498. *H. Scheppigianum* FREYN var. *Scheppigianum* (FR.) Z. — In rupestr. reg. alpinae. — Dobri do in m. Durmitor (Ro), in m. Lovćen (Ad).

— — — f. *achyrophoroides* ROHL. et Z. l. c. 232. — In rupestr. montis Durmitor loco Crvena Greda (Ro).

5499. *H. coloriscapum* ROHL. et Z. l. c. 240. — In rupestr. summi montis Durmitor (Ro).

\* — — var. *Schuettianum* ZAHN in FEDDE Repert. 1932 p. 237. — Cav Borit pr. Gusinje Prokletiae, cca 2000 m (Schütt).

5501. *H. Pichleri* A. KERN. subsp. *Pichleri* Z. var. *Pichleri* (KERN.) Z. — In rupestr. montis Lovćen (Ro).

— — — subf. *parcipilum* Z. — Cum typo.

— — — var. *Černýi* ROHL. et Z. l. c. 331. — In rup. reg. alpinae. — Javorje planina, Korita rovačka (Ro).

— — — f. *vališnicae* ROHL. et Z. — In monte Durmitor loco Valoviti do et Vališnica (Ro).

— — subsp. *Adamovićii* ZAHN var. *Adamovićii* SAG. et Z. — In rupestr. alp. montis Orijen et Lovćen (Ad, Sk, Pej).

— — — var. *pseudo-Adamovićii* Z. — In monte Orijen (Ad).

— var. *chloripedunculatum* ROHL. et Z. — In monte Lovćen loco Štirovnik (Kš, Ro, Pej), Duge pr. Njeguši (Ro, Pej).

5502. *H. flexicaule* FREYN et VANDAS (= *H. miticifissum* ROHL. et Z. in FEDDE Rep. VI: 240) var. *durmitorium* ROHL. et Z. l. c. — In rupestr. alp. m. Durmitor (Ro).

\*— var. *flexicaule* (FREYN et VAND.) Z. (= *H. miricifissum* ROHL. et Z.). — In rupestr. alp. et subalp. montis Maglić Pivski (Ro).

5503. *H. Guentheri-Beckii* Z. var. *Guentheri-Beckii* Z. — In pascuis reg. subalp. et alpinae. — In m. Durmitor (Ro), Margarita sub m. Kom (Ja).

5504. *H. Waldsteinii* TSCH. subsp. *plumulosum* (A. KERN.) Z. — In rupestr. reg. mont. et subalpinae. — Krs-tac pr. Njeguši; ad coenob. Piva (Ro), in m. Pej cca 1500 m (Ja), supra coenob. Morača (Ja), in m. Lonac et Kosa supra Bar (Do).

— f. *Brandisii* (FREYN) Z. subf. *subpilosum* ZAHN. — In m. Lovćen loco Šavnik (Sk).

— var. *nipholeucum* Z. — Ad Kolašin et coenob. Morača (Ba), in m. Rumija supra Bar, loco Dolinka (Do).

— var. *thapsiforme* (UECHTR.) N. P. — In valle Peručica sub monte Kom (Sk).

— subsp. *suborieni* Z. var. *suborieni* Z. — In rupestr. reg. alp. — Štirni do pr. Lukavica; Sinjavina supra Kolašin (Ro).

— f. *oligocephalum* ROHL. et Z. — In rupestr. m. Durmitor (Ro), in valle fl. Lim ad Andrijevica (Ja).

\*— subvar. *glandulosum* BOŠNJAK in Glasnik, Zagreb 1938. — Caulis supra plus, infra minus glandulosus. — In alp. m. Prokletija, loco Zastan supra Vojuše (Boš).

— f. *lovćenicum* ROHL. et Z. l. c. 231. — Rupe zvéri-načke in m. Lovćen; Matošovo in valle fl. Tara (Ro).

— subf. *pilosipedunculum* ROHL. et Z. — In m. Balj supra Andrijevica (Ro), in m. Pej supra Kolašin (Ja).

— subsp. *lanifolium* (N. P.) Z. var. *Delpinoi* (BALD.) Z. — In rupestr. ad coenob. Morača; Lipovo pr. Kolašin (Ba), Goraško distr. Piva (Ro).

— — — var. *Baldaccianum* (FREYN) Z. — In rupestr. m. Lovćen (Ba), Peručica sub m. Kom (Sk).

— — — f. *sublanifolium* Z. (= *H. thapsoides* PANČ. Elench. 59). — In rupestr. ad Krstac pr. Njeguši; in m. Lastva čevska distr. Katunska (Ro), in rupestr. travertinaceis ad cas taractam rivuli sub coenob. S. Stephani Moračae super. (Pč) (locus classicus!); in monte Kosa supra Bar (Do).

\*— — — var. *Waldsteinii* (TAUSCH) Z. f. *Schlosseri* (RCHB.) Z. — In monte Lovćen (Pč), Mali Šanik et Goli rti supra Nje guši (Ro), Krstac (Ba).

5505. *H. albanicum* FREYN var. *albanicum* Z. — In rupestr. reg. mont. et subalpinae. — Ad Borkovići distr. Piva (Ro).

— — var. *Pivae* ROHL. et Z. l. c. 239. — In sax. supra coenob. Piva (Ro).

\*5507b. *H. brevilanosum* DEG. et Z. Magy. Bot. Lap. 1907: 222 (= *H. sublanosum* ROHL. V. Beitr. 74). — In rupestr. reg. subalp. supra coenob. Piva (Ro).

5508. *H. calophyllum* UECHTR. var. *calophyllum* (UECHTR.) Z. — In rupestr. subalp. et alp. montis Vojnik (Ro).

— — var. *calophylloides* (ROHL. et Z. l. c. 234) Z. — In sax. reg. alp. Štirni do sub Lola planina (Ro).

5521. *H. Guglerianum* Z. var. *Guglerianum* Z. — In rupestr. reg. mont. — Ad Belvedere pr. Cetinje (Gugler); ad Nožica inter Podgorica et Kolašin (Ja).

5525. *H. montenegrinum* FREYN non PANČ. — In rupestr. reg. mont. ad coenob. Morača (Ba).

5534. *H. pannosum* BOISS. subsp. *pannosum* (BOISS.) Z. var. *pannosum* Z. — In rup. reg. subalp. et alpinae. — In m. Balj, Jerinja glava et Sjekirica pr. Andrijevica; in monte Lovćen (Ro).

\*— — — subvar. *taygeteum* (BOISS. et HELDR.) BOISS. — In rup. supra Andrijevica (Ro).

\*— — — var. *mokragorae* N. P. — In rupestr. ad Poščensko jezero supra Šavniki (Ro).

\*— — — var. *parnasidis* Z. — In subalp. m. Balj pr. Andrijevica (Ro).

?5538. *H. pilosissimum* FRIV. (= *H. athoum* GRIS. ap. PANTOCSEK Adnot. 52) var. *pilosissimum* Z. — In rupestr. circa Šavniki (Pt, Pč). (Sec. cl. ZAHN dubium.)

\*?5539. *H. marmoreum* VIS. et PANČ. var. *marmoreum* Z. — In rupestr. m. Kom? (Pt, Pč).

5542. *H. plumulosiforme* G. SCHNEID. var. *plumulosiforme* Z. — In rupestr. m. Lovćen et ad Njeguši (fide ZAHN), ad Lopate inter Podgorica et Kolašin, cca 1050 m (Ja).

5545. *H. Hoppeanum* SCHULT. subsp. *Hoppeanum* Z. — In pascuis et pratis reg. mont., subalp. et alp. — Ad latera m. Dziebeze, Hum Orahovski et Velki Maglić distr. Kuči (Sz).

— subsp. *macranthum* (TEN.) N. P. — In pascuis alp. Carine et in valle Perućica sub m. Kom; in m. Mali Durmitor (Pt).

\*— var. *leucocephalum* (VUK.) N. P. — Triepši et Širokar distr. Kuči (Ba), sub m. Balj pr. Andrijevica (Ro).

— var. *polyadenioides* Z. — Supra coenob. Piva (Ro), Struga (Havelka fide MALÝ).

\*— var. *multisetum* N. P. — In alp. montis Maglić Pivski (B, Ro), Buni Jezerce (Df).

— var. *osmanicum* N. P. — In subalp. ad lacum Volujačko jezero distr. Piva (Ma), Kolašin (Ja).

— var. *macrolepioides* Z. — Perućica sub m. Kom (Pt), inter Plav et Dečani; Buni Jezerce sub m. Prokletija (Df).

\*— var. *macranthopsis* Z. — In m. Lastva čevska (Ro), Buni Jezerce sub monte Prokletija in forma *submultisetum* Z. (Df).

— var. *pseudosmanicum* Z. — In alp. m. Durmitor jugo Velki Štulac (Führer), Volujačko jezero (Ma).

5546. *H. hypeuryum* N. P. var. *hypeuryum* N. P. — In gramin. et pascuis reg. subalpinae.

— f. *breviglandulum* ROHL. et Z. l. c. 225. — In monte Balj pr. Andrijevica (Ro), Trijepši distr. Kuči (Ba).

— var. *lamprocomum* N. P. — In pratis ad Berane (Ro).

— subvar. *stenophylloides* ROHL. et Z. l. c. 225. — In pascuis alp. m. Maglić Pivski (Ro).

5548. *H. pilosella* L. — In pascuis et gramin. reg. mont. et subalpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt); sub monte Durmitor (Pč).

— var. *trichosoma* N. P. subf. *longipilum* N. P. — Ad Andrijevica (Ro).

— var. *trichadenium* N. P. — Circa Andrijevica, ad latera montis Lovćen supra Njeguši (Ro).

— var. *fulviflorum* N. P. — Vuči potok pr. Vermoš planina (Df).

— var. *acuminatissimum* Z. subvar. *coniosphaera* Z. — Ad ripas fl. Lim pr. Andrijevica (Df).

\*— var. *euronotum* N. P. f. *multifloccum* N. P. — In subalp. ad lacum Volujačko jezero distr. Piva (Ma).

5563. *H. brachiatum* BERTOL. var. *brachiatiforme* N. P. — In pascuis reg. mont. et subalpinae. — Gornja Krivača in m. Lovćen (Kš), ad Andrijevica (Ro).

— f. *glandulosissimum* Z. — In subalp. Vermoš planina ad fines Albaniae (Df).

5569. *H. alpicola* SCHLEICH. — In pascuis montis Kom (Pt). (Verosimiliter ad var. sequentem pertinet.)

— var. *glandulaefolium* N. P. — Inter Plav et Dečani (Df).

5575. *H. multiflorum* SCHLEICH. — In pascuis et gramin. reg. subalp. et alpinae. — Crna planina, Kom, Sinjava, Durmitor (Pt, Pč).

— var. *erythrodes* (N. P.) HAY. — In pascuis alp. montis Durmitor, Vélki Štulac et Kom Kučki (Ro).

— f. *holosericeum* (N. P.) Z. — In alp. m. Durmitor (Ro).

— f. *Mannagettianum* (K. MALÝ) HAY. — In alp. m. Maglić Pivski (Ro), Buni jezerce sub m. Prokletija (Df), in silva sub m. Kom Kučki (Ja).

— var. *rubrisabinum* (NAEG.) HAY. — In alp. m. Maglić Pivski (Ro).

— var. *xanthophyllogenoides* (Z.) HAY. — In subalp. et alp. m. Balj et Sjekirica pr. Andrijevica (Ro).

5579. *H. pratense* TAUSCH. — In pratis subalp. loco Viruša dol sub Crna planina (Pt). (Verosimiliter ad var. *brevipilum* N. P. pertinet.)

5581. *H. cymosum* L. — In graminosis et pratis reg-  
subalp. et alp. frequens. — Viruša dol sub Crna planina;  
Peručica sub m. Kom; Sinjavina, Mali Durmitor (Pt), Hum  
Orahovski, Rupa Konjska sub m. Vila et in m. Dziebeze distr.  
Kuči (Sz), in m. Dibala et Planinica distr. Kuči (Ba). Loca  
hic enumerata forsitan ad subspecies sequentes pertinent.

— subsp. *sabinum* (SEB. et M.) N. P. var. *sabinum* N. P.  
— Črtov do, Ledenica et Varda supra coenob. Piva, in alp.  
m. Maglić Pivski, Njeguši (Ro).

— subf. *laxisabinum* N. P. — Njeguši, Lovćen, Štirni  
do sub Lola planina, Valoviti do in m. Durmitor (Ro).

— f. *pseudo-sabinum* N. P. — In alp. m. Durmitor  
(Ro).

— var. *gnaphalophorum* N. P. — In alp. m. Kom Kučki  
(Ba), in m. Lovćen (Ad).

— subsp. *cymosum* (L.) N. P. var. *meizocephaloides* HAY.  
et Z. — In subalp. ad lacum Volujačko jezero distr. Piva (Ma).

— var. *vitudans* N. P. — In subalp. Peručica sub monte  
Kom; in m. Balj pr. Andrijevica; Crno jezero sub m. Durmitor;  
Šavnik sub Ivica planina; Božur planina distr. Piva (Ro), Buni  
Jezerce sub m. Prokletija (Df).

— var. *xanthophyllum* VUK. — In subalp. m. Velki Štu-  
lac pr. Durmitor (Ro).

5587. *H. Bauhinii* BESS. subsp. *magyaricum* (N. P.)  
Z. var. *Besserianum* (N. P.) K. MALÝ. — In herbidis et lapid.  
montis Vojnik (Ro).

— var. *podgoricae* ROHL. et Z. l. c. 225. — In lapid. et  
arenosis reg. infer. ad Podgorica (Ro).

— var. *holpsilon* (N. P.) Z. — In rupestr. ad coenob.  
Ostrog (fide ZAHN).

\*— var. *filiferum* (TSCH.) Z. — Trijepši distr. Kuči (Ba).

— var. *submagyaricum* (N. P.) Z. — E Monten. a cl.  
ZAHN indicatum sine loco speciali.

— var. *substoloniferum* (N. P.) Z. — In herbid. reg.  
mont. et subalpinae. — Bogojev do pr. Njeguši, Lovćen loco  
Štirovnik, Mokro distr. Kuči (Ro), Cetinje (Kn), supra la-  
cum Volujačko jezero distr. Piva (Ma), in m. Rumija loco  
Dolinka (Do).

- var. *magyaricum* (N. P.) MALÝ. — In reg. infer., mont. et subalpinae. — Ad Njeguši (Sz, Ro), Boljevići pr. Vir (Ro), Mokro sub m. Dziebeze distr. Kuči (Sz).
- \*— var. *heothinum* (N. P.) MALÝ. — In pratis reg. infer. ad Danilovgrad (Ro).
- var. *cattarensse* (N. P.) Z. — In subalp. montis Ledenica et in m. Lovćen (Ro).
- subf. *montanum* ROHL. et Z. — Mali Šanik in m. Lovćen (Ro).
- var. *adenocymum* (N. P.) K. MALÝ f. *normale* ROHL. et Z. — Ad Danilovgrad; Boljevići pr. Vir; in m. Balj pr. Andrijevica (Ro), Kolašin (Ja), Gusinje (fide ZAHN).
- subf. *pilosiceps* ROHL. et Z. — In herbidis ad Andrijevica (Ro).
- var. *Kernerii* (N. P.) HAY. — Ad Volovica pr. Bar (fide ZAHN).
- subsp. *Bauhinii* (N. P.) Z. — In pratis ad Velki Miškulić sub m. Rumija; in aridis ad Tudjemile et Bijela Skala supra Bar (Ba).
- \*— var. *fastigiatum* (TSCH.) Z. — In subalp. Božur planina distr. Piva (Ro).
- var. *adenocymoides* ROHL. et Z. l. c. 226. — In lapid. ad Njeguši (Ro, Pej).
- var. *florentinifolium* (N. P.) Z. — A cl. ZAHN e Monten. indicatum.
5588. *H. densiflorum* TSCH. (= *H. Tauschii* ZAHN Comp. Hier. 1500) var. *filistolonum* (ROHL. et Z.) HAY, (= *H. umbelliferum* subsp. *filistolonum* ROHL. et Z.). — In pratis subalp. montis Balj supra Andrijevica (Ro).
- var. *njuguschense* (ROHL. et Z.) HAY. (= *H. umbelliferum* subsp. *njuguschense* R. et Z.). — In subalp. ad Gornja Krivača supra Njeguši (Pej, Ro).
- var. *umbelliferum* (N. P.) HAY. — „Romanova livada“ (an ne in Bosnia?). A cl. ZAHN indicatum.

#### Species dubiae.

1. *H. piloselloides* VILL. var. *stoloniferum* GRIS. apud PANTOCSEK Adnot. 50. — „Pedicellis pube stellata carentibus foliisque angustis ab *H. praealto* stolonifero recedit.“

— Circa Cetinje et Danilovgrad (Pt). Meo sensu ad *H. Bauhinii* pertinet.

2. *H. jurassicum* GRIS. Hier. — In pratis circa Kovčice infra Mali Durmitor (Pt).

3. *H. murorum* L. var. *plumbeum* FR. — „Forma foliis basi inciso-dentatis.“ — In silvaticis montis Kom (Pt).

4. *H. incissum* (HOPPE) KOCH. — „Forma foliis plerisque rotundato-ovatis.“ — In silvaticis circa Crno jezero infra Mali Durmitor. — B) Forma *angustifolia*. — Foliis plerisque oblongo-lanceolatis. — In silvat. m. Kom et circa pagum Kovčice infra Mali Durmitor (Pt).

5. *H. vulgatum* FR. var. *rosulatum* GRIS. — Forma foliis oblongo-lanceolatis in var. *irrigatum* FR. transiens. — In silvat. m. Mali Durmitor circa Crno jezero et circa pagum Kovčice (Pt).

6. *H. Boccone i* GRIS. — „Forma foliis repando-denticulatis dentatisque, villis in basi caulis et petiolorum eximie crinita, ceterum plantae tyrolensi helveticaeque conformis. Species ob ligulas glabras ab *Alpinis* ad *Vulgata* transponenda est“ (PANTOCS. Adn. 51). — In silvat. vallis Perućica dol infra Kom (Pt).

## Alismataceae

### *Alisma* L.

5590. *A. plantago-aquatica* L. — In paludosis, fossis et ad ripas reg. infer., mont. et subalp. — Ad ripas lacus Scodrani (Pč, Eb, Ro); in lacu Rikavac distr. Kuči (Sz); circa Rijeka (Pt, Ho, Ro); insula Vranina in lacu Scodrano; ad Bar, Ulcinj, Plavnica, Danilovgrad, Šavnik; Ledenica planina; in lacu montis Lovćen (Ro).

\* — var. *stenophyllum* A. GR. — Folia lanceolata vel elliptico-lanceolata in petiolum ± attenuata. — In lacu sub monte Lovćen; insula Vranina in lacu Scodrano (Ro, Pej).

\*5591. *A. gramineum* GMEL. — Ad ripam lacus Scodrani prope Vir (Ho).

— f. *arcuatum* (MICHALET) HOLMBERG. — In pratis ad Novi Bar (Do).

### *Sagittaria* L.

\*5596. *S. sagittifolia* L. — Ad ripas lacus Scodrani loco Gornje Blato et in insula Vranina (Ro).

\*— — f. *diversifolia* MICHELI. — Ad ripam lacus Scodrani pr. Plavnica (Sz).

### **B u t o m a c e a e**

#### *B u t o m u s* L.

5597. *B. umbellatus* L. — In aquis stagnantibus et ad ripas reg. infer. — Ad ripam lacus Scodrani (Pt, Eb, Sz, Ro); ad Rijeka et Danilovgrad (Pt, Ro); Vir (Pč); Berislavići pr. Podgorica (Ro).

\*— — var. (vel subsp.?) *scutariensis* ROHL. VIII. Beitr. 6 (= *B. scutariensis* ROHL. in sch.). — Tota planta glauca; scapus profunde 3—4-sulcatus; stamina ovariis breviora; perigonii phylla omnia fere aequilonga oblonga 2,5—3-plo longiora ac lata. — Ad ripam fluvii rijeka Crnojevićka (Pej, Ro).

### **S c h e u c h z e r i a c e a e**

#### *T r i g l o c h i n* L.

5603. *T. palustre* L. — In pratis paludosis et ad ripas reg. subalp. et alp. — Ad Murino sub Velika distr. Vasovići (Ba); ad Andrijevica; Štirni do sub Lola planina (Ro).

### **P o t a m o g e t o n a c e a e**

#### *P o t a m o g e t o n* L.

5606. *P. natans* L. — In aquis stagnantibus reg. infer., subalp. et alp. (—1680 m). — In lacu Riblje jezero sub m. Durmitor (Pč); in stagnis lacus Scodrani pr. Plavnica (Sz, Ro); in lacu sub monte Lovćen (Pej, Ro); ad Stubica sub m. Maglić Pivski; sub monte Vojnik; in lacu Semolj jezero sub monte Javorje planina (Ro).

5607. *P. polygonifolius* POURR. — A cl. HAYEK e Montenegro indicatus; locus mihi ignotus.

5609. *P. fluitans* ROTH. — In lacu Scodrano ad ostium rivi Crnojevićka rijeka (Pč); in aqua stagnante lacus Scodrani pr. Plavnica (Sz); ad Rijeka (Ba); inter Spuž et Danilovgrad (Ro).

\* — var. *elongatus* (KUEHN.) ASCH. GR. — Etiam folia natantia lanceolata in petiolum usque 10 cm longum sensim attenuata. — In rivulo ad Bar (Ro).

5610. *P. alpinus* BALB. — In lacu Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt).

— f. *obscurus* (DC.) ASCH. — Folia natantia nulla. — In lacu Volučko jezero distr. Piva (Ma).

5612. *P. perfoliatus* L. — In lacu Scodrano (Pč, Ro, Ja); in lacu Rikavac sub monte Vila (Sz); in lacu Valoviti jezero sub monte Durmitor (Ro).

5613. *P. gramineus* L. f. *heterophyllus* FR. — Folia suprema natantia longe petiolata, ± coriacea. — In aquosis circa pagum Ceklin et in lacu Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); in palustr. sub m. Durmitor versus jugum Štulac (Pč); in lacu Trnovičko jezero sub monte Maglić Pivski (Ro).

5614. *P. lucens* L. — In lacu Scodrano ad Plavnica et in Gornje blato (Ro, Ja); in lacu Riblje jezero sub m. Durmitor (Pč).

— var. *longipes* ROHL. II. Beitr. 15. — Pedunculis eximie incrassatis et valde elongatis (usque ad 35 cm!), spicis folia 2—3-plo superantibus; foliis ut in var. *acuminato* FRIES longe acutatis apice convolutis. — In recessibus lacus Scodrani ad Karugj copiosissime (Ro).

5615. *P. Zizii* M. K. — In lacu Riblje jezero sub monte Durmitor (Pt).

5616. *P. crispus* L. — In lacu Scodrano frequens (Pč, Sz, Ro, Ja); in lacu Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); in lacu Rikavac jezero distr. Kuči (Sz); ad Rijeka (Ho); in rivo Ribnica pr. Podgorica (Ro); ad Vir et in lacu Poščensko jezero supra Šavniki (Ro).

— var. *serratus* (SCHR.) RCHB. f. *longifolius* FIEB. — Folia anguste linearia (2—4 mm lata) remote denticulata. — Cum typo ad Plavnica et in lacu Poščensko jezero (Ro).

? 5617. *P. densus* L. — In lacu Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt).

? 5618. *P. compressus* L. — In palustribus sub monte Durmitor versus jugum Štulac (Pč).

5621. *P. mucronatus* SCHRAD. — In lacu Riblje jezero (Pt) et Crno jezero sub monte Durmitor (Ro).

5622. *P. pusillus* L. — In lacu Scodrano frequens (Pč, Sz, Ro); in lacu sub monte Lovćen (Ho); in palud. sub monte Durmitor versus jugum Štulac; ad Ulcinj et Vir; Konjsk et Lukavica planina (Ro); ad Rijeka (Ba, Ro).

5625. *P. pectinatus* L. — In lacu Crno jezero sub monte Durmitor; in aquosis Mokro dictis pr. Bijela (Pt); in lacu Rikavac ad pedem montis Vila distr. Kuči (Sz).

— f. *interruptus* ASCH. — In aquis stagnantibus ad Ulcinj (Ro).

5626. *P. filiformis* PERS. — In lacu Crno jezero sub m. Durmitor (Pt).

#### *Zannichellia* L.

5629. *Z. palustris* L. — In paludosis ad Bar et Plavnica (Ro).

#### *Najadaceae*

##### *Naia* L.

\*5634. *N. marina* L. — In palustribus sub monte Durmitor versus jugum Štulac (Pč); in lacu Scodrano (Mrázek); ad Plavnica (Ro, Ja).

\*5635. *N. minor* ALL. — Ad ripam lac. Scodrani pr. Plavnica (Ja).

#### *Liliaceae*

##### *Tofieldia* Huds.

5637. *T. calyculata* (L.) WAHLENB. — In pascuis et pratis reg. subalp. et alp. — In m. Maglić et Bioće distr. Piva (Ro).

##### *Narthecium* Huds.

\*5339. *N. scardicum* KOŠAN. OeBZ. LXIII: 141. — Rhizome repente; caulis usque 20 cm altis, firmis, basi foliolatis; foliis basalibus (3—)4 distichis equitantibus, linearis ensiformibus, 5—7 cm longis, 2—2,5 cm latis, compresso-vaginatis, firmulis; foliis caulinis decrescentibus, infimis foliis basilaribus conformibus, supremis saepe lamina brevissima acumi-

natis  $\pm$  squamiformibus; bracteis pedunculis plerumque longioribus, apice attenuatis, non complicatis, cymbiformibus, margine late scarioso-nitidis; bracteolis angustis pallide scariosis; racemo-densifloro (5—12-floro), 1—2,5 cm longo; floribus semper brevioribus basi et ad medium bracteolatis; perigonii laciniis obtusis 4—7 mm longis, 1,3—2 mm latis trinerviis, intus luteis extus stria mediana viridi ornatis; filamentis dense villosis; antheris filamentis aequilongis; ovario subconico, stylo crassiusculo indiviso quam ovarium breviore, stigmate trilobo. — In pratis humidis reg. alp. inter Plav et Dečani cca 1600—1800 m (Df).

### *Veratrum* L.

5640. *V. nigrum* L. — In pratis reg. mont. et subalp. — In m. Lastva čevska supra Vojnići (Pt); in herbidis et sax. in Nikšićka župa (Pč); Lukavica planina (Ho, Ro); Konjsk plan.; Jasenovo polje sub monte Vojnik; Viljuša et Šavnik (Ro).

5641. *V. album* L. — In pascuis et pratis humidis reg. subalp. et alp. frequens. — In m. Jastrebica et Bijela Gora; Viruša dol sub Crna planina; Lastva čevska supra Vojnići (Pt); in m. Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ho, Ro, Ja); Sinjavina planina (Pt, Ba, Ro); Mokra planina; Sjekirica, Bjelastica, Javorje planina (Ro); Štavna sub m. Kom (Ro, Ja).

— var. *bosniacum* BECK. — Perigonii phylla intus alba vel virescentia, basi in nectarium viride contracta; capsula apicem versus vix attenuata. — In incultis pagi Orahovo et in pratis silvae Skrobotuša ad fines Albaniae (Sz); in m. Maglič Pivski; Javorje et Sinjavina planina, Štirni do sub Lola planina; Konjsk planina (Ro).

— var. *viride* LAP. (= *V. Lobelianum* BERNH.). — Perigonii phylla intus viridia. — Štirni do sub Lola planina; Konjsk planina (Ro); Vermoš planina (Df).

### *Colchicum* L.

5648. *C. hungaricum* JKA. — E Monten. a cl. HAYEK indicatum; locus mihi ignotus; verosimiliter ad Bar et Ulcinj.

5655. *C. autumnale* L. — In pascuis et pratis subalp. et alp. — Bukovica sub m. Durimtor (Ba); Lovćen (Stud=

nicka); in monte Durmitor (Pč, Ro); Lukavica planina (Ho); Njeguši (Ro). Verosimiliter etiam alibi.

5657. *C. Visianii* PARL. — In silvis montis Sutorman supra Bar (Eb).

### *Asphodelus* L.

5666. *A. alb us* (L.) MILL. — In pratis, gramin. reg. mont., subalp. et alpinae frequens; in regione infer. rarissime. — Viruša dol sub Crna planina (Pt); ad Gvozd sub monte Vojnik (Pč); Cetinje (Ba, Eb); Lukavica planina (Ho, Ro); supra Njeguši (Ro); in m. Kom, Mokra, Šjekirica, Bjelastica, Štirni do sub Lola planina, Konjsk (Ro); sub m. Durmitor (Pč, Ro); in dumetis collis Gorica pr. Podgorica (Ro); in m. Vjetnik et in valle fl. Tara (Ja); Vermoš planina (Df); Timar pr. Šavnik (Ba); Pivska planina supra Nedajno et Pišće (De, Si).

5667. *A. microcarpus* SALZM. et VIV. — In gram. reg. infer., mont., rarius subalp. — Jasenovo polje sub monte Vojnik; circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica et in distr. Lješanska nahija; Gornje blato (Ro).

— f. *simplex* ROHL. V. Beitr. 113. — Racemus simplex. — In lapid. pr. Gornje blato (Ro).

### *Asphodeline* RCHB.

5671. *A. lutea* (L.) RCHB. — In rupestribus et lapid. reg. infer. et mont. calidioris. — „Pišine Strane“ distr. Katunska nahija (Pč); ad latera montis Rumija supra Bar (Jovović); circa Bar, Ulcinj, Rijeka et Vir (Ro); insula Lesandra (Eb).

5672. *A. liburnica* (SCOP.) RCHB. — In frutic., dumetis et rupestribus reg. infer. et montanae. — Lastva čevska supra Vojnići (Pt); ad Bar et coenob. Ostrog (Pč, Ba); ad Rijeka (Ba); Žolbinje pr. Cetinje (Ro); ad Medun distr. Kući (Ho); sub Goraško distr. Piva (Ro); in m. Rumija et Kosa supra Bar — 1100 m (Do).

### *Anthericum* L.

\*5675. *A. liliago* L. — In rupestr. reg. mont. — Ad Njeguši loco Žanjev do et Čiste Strane; ad latera m. Lovćen (Pej, Ro).

— f. *fallax* ZABEL. — Inflorescentia ± ramosa. — Cum typo ad Njeguši (Ro).

5676. *A. ramosum* L. — In rupestr., herbidis et dumetis reg. mont. et subalp. — Vučie Gornje prope Gvožđe Han (Pt); Konjsk planina (Ho); Perućica sub monte Kom; Višljuša, Goraňsko, Borkovići, coenob. Piva; ad latera m. Maglić Pivski versus Mratinje; ad latera m. Lovćen; circa Njeguši; Velestovo et Lastva čevska distr. Katunska (Ro).

— f. *simplex* KLINGGR. — Racemus simplex. — Non raro cum typo.

### *Gagea* SALIB.

5682. *G. lutea* (L.) KER. — In silvestr. reg. subalp. vallis Perućica sub m. Kom (Pt).

\*5683. *G. pusilla* (SCHM.) R. S. — In gramin. et agris reg. mont. — Ad Njeguši loco Gornje polje (Pej, Ro).

\*5688. *G. arvensis* (PERS.) R. S. — In herbidis reg. mont. et subalp. — Ad latera m. Jezerski vrh (Ho); ad Njeguši (Pej, Ro).

\*5690. *G. pratensis* (PERS.) R. S. — In gramin. reg. mont. ad Njeguši (Pej, Ro).

### *Allium* L.

5691. *A. ampeloprasum* L. subsp. *eu-ampeloprasum* HAY. — In lapid. et herbid. reg. infer. — Ad Rijeka et Vir (Ro); insula Vranina (Eb).

— subsp. *porrum* (L.) HAY. — In hortis cultum.

5694. *A. margaritaceum* S. S. — Bulbus simplex ovatus tunicis scariosis demum fibroso-laciniatis; scapus teres ad medium foliatus; folia semicylindrica, supra canaliculata, 1–2 mm lata, spatha brevis, ovata, cito decidua; umbella multiflora globosa densa non bulbillifera; pedicelli inaequales: externi breves, interiores elongati flores pluries superantes; perigonium campanulatum 3–4 mm longum, phyllis oblongo-lis nearibus obtusis albis levibus carina virentibus; stamina interiora dilatata tricuspidata, cuspide media lateralibus multo breviore. — In rupestr. et collibus apricis reg. infer. et mont. — Ad Bar (Ho, Do); Ulcinj (Ho).

5695. *A. dalmaticum* A. KERN. ap. JANCHEN OeBZ. LXXIX: 242. — A praeced. dignoscitur: bulbo saepissime bulbillos numerosos edente, perigonii phyllis pulchre roseis vel

purpureis carina obscuriore, sed non viridi. — In rupestr. reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Vir (Pč teste JANCHEN); Orlov Krš (Bierbach teste MALÝ); Podgorica; Čulice distr. Katunska, Nikšić, in m. Lovćen (Ro).

— f. *laxiflorum* (ROHL.) JÁV. — Pedicelli flore 5—8-plo longiores. — Cum typo.

5697. *A. sphaerocephalum* L. — In rupestr., dumosis et gramin. reg. infer., mont., rarius subalp. — Cerovo, Rogami, Bioče, Kruševići, Lukovo, Slivje (Pt); Cetinje (Kn); Ulcinj, Radovče polje, Kopilje et Brotnik (Ho); inter Bogetići et Nikšić, Lastva čevska, Njeguši, Jasenovo polje sub m. Vojnik, Višljuša, Pošćensko jezero supra Šavnik; Borkovići et Varda distr. Piva; Jerinja glava supra Andrijevica (Ro); Bar (Do).

5706. *A. vineale* L. — Inter segetes et in lapid. reg. infer. et mont. — In campis ad Pristan Bar (Ba); sub monte Lovćen (Ho).

5708. *A. schoenoprasum* L. subsp. *riparium* (ČEL.) HAY. — In hortis cultum.

— subsp. *sibiricum* (L.) HAY. — In pascuis et pratis alp. — In monte Maganik; Treblješ luka (Ho); in monte Maglić Pivski (Ro, B); in monte Durmitor loco Vališnica do (Ro).

5709. *A. ascalonicum* L. — In hortis cultum.

*A. cepa* L. — In hortis cultum.

\*5720. *A. ursinum* L. — In fagetis sub monte Kom Vasovjevići in valle Perućica (Ro).

\*5721. *A. victorialis* L. — In rupestr. et glareosis montis Kom Vasovjevići versus Štavna (Ro).

\*5723. *A. chamaemoly* L. — In gramin. reg. infer. mediter. — Ad Ulcinj (Ba).

5724. *A. montanum* SCHM. f. *glaucum* (SCHRAD.) A. et G. Syn. III:126. — In rupestr. et glareosis reg. alp. — In monte Maglić Pivski (Ro).

5730. *A. subhirsutum* L. — In rupestr. reg. infer. dic. mediterr. — Supra Pristan Bar (Ro).

5735. *A. roseum* L. — In vineis, graminosis et collibus siccis reg. infer. — Donja Zeta pr. Podgorica; circa Bar (Ro).

— var. *javorjense* ROHL. MBL. 1904: 320. — Umbella bulbifera; perigonii phylla 8—10 mm longa oblonga albo-hyalina; antherae oblongae. — In pratis et pascuis reg. alp. cca 1800—2000 m. — In monte Javorje planina (Ro).

5736. *A. nigrum* L. — In sax. et vineis reg. mont. calid. — Ad pagum Klopot distr. Bratonožići (Pč).

*A. sativum* L. — In hortis cultum.

5740. *A. saxatile* M. B. — In rupestr. et alp. — In m. Lovćen (Pč, Ad, Pej, Ro); Orjen (Ad); in m. Velka Jastrebica-Bijela Gora (Pč); Mrčenov do sub monte Kom (Pč, Ba); supra Njeguši; Dobri do in m. Durmitor, m. Maglić Pivski; Han Garančić in valle fl. Tara (Ro); Rogam sub m. Kom; Ostrog; Lonac supra Bar; Rumija planina (Ba).

5741. *A. pulchellum* DON. — In lapid. et sax. reg. subalp. et alp. — In m. Javorje (Pč); Orjen (Ad); sub monte Vojnik; Ljut supra coenob. Piva (Ro).

5744. *A. flavum* L. — In sax. et lapid. reg. infer., mont. et subalp. — Ad Ceklin (Pt); Šavnik (Pt, Ro); circa castrum Medun (Sz); inter Dobrsko selo et Rijeka; in m. Rumija (Ba); circa Bar, Vir et Podgorica, Viljuša, Njeguši et Borkovići (Ro); in m. Vjetnik (Ja).

— var. *minus* BOISS. — Humile, caule ad 15 cm alto gracili; umbella pauciflora, pedicellis flore 1—3-plo longioribus; spatha umbellae saepe parum longior. — In pascuis alpinis et subalp. cum typo (Ro).

\*— f. *pseudo-Guicciardii* ROHL. — Perigonii phylla albida vel pallide straminea subdiaphana; caulis gracilis ultra medium foliatus. Perigonii colore *A. Guicciardi* BOISS. revocat, sed haec species (an potius *A. flavi* varietas?) perigonii phyllis apice truncatis (nec rotundatis) differt. — Mali Šavnik sub monte Lovćen (ROHLENA V. Beitr. 114 ut *A. flavum* f. *Guicciardii*).

5745. *A. carinatum* L. — In pratis, gramin. et rupestr. reg. mont., subalp. et alpinae. — Ad pedem montis Mojan ad fines Albaniae (Sz); ad Medun distr. Kuči; Konjuhe pr. Andrijevica; in monte Lisinj et Lonac supra Bar (Ba); Kom Kučki (Ho); in monte Vojnik et in Sjekirica planina; supra Njeguši; Bukovica et Srabljе jezero sub monte Durmitor (Ro);

ad Murino pr. Andrijevica (Ba); in m. Vjetnik (Ja); in m. Lovčen (To, Ro).

— f. *parviflorum* BECK. — Perigonii phylla cca 3—5 mm longa rosea. — In alp. m. Vojnik, Maglić Pivski et Jerinja glava (Ro).

— f. *montenegrinum* BECK et SZ. Pl. Crnag. 47. — „Floribus dimidio brevioribus, cca 2—3 mm longis, segmentis perianthii post anthesim pellucidis albis, in alabastro apice roseo-violaceis, staminibus perianthium duplo vel triplo superantibus.“ — Ad latera m. Dziebeze distr. Kuči (Sz); Carine sub monte Kom; m. Vojnik (Ro).

5751. *A. fuscum* W. K. — In rupestr. et gramin. reg. subalp. et alp. — In m. Sutorman (Pč); in monte Maglić Pivski (Ro).

5752. *A. paniculatum* L. — In gramin. et rupestr. reg. infer. et mont. calidioris. — Circa Sindžon (Pt); Rijeka (Ho); Bar (Do).

— var. *pallens* GREN. et GODR. — Floribus pallide luteis vel ± albidis. — In sax. secus viam inter Cetinje et Rijeka (Ba).

5754. *A. oleraceum* L. — Ad latera m. Maglić distr. Kuči (Sz).

— var. *complanatum* FR. — Ad lacum Riblje jezero et pr. pagum Kovčice sub m. Mali Durmitor (Pt).

### *Lilium* L.

5760. *L. carniolicum* L. — In pratis sub m. Durmitor versus jugum Štulac (Pč). Verosimiliter pertinet ad subsp. *bosniacum* BECK.

— subsp. *bosniacum* BECK. — „Caulis robustus saepe pluriflorus; bulbus magnus; folia margine papilloso-ciliolata, ceterum glabra vel tantum ad nervos 3 validiores parum ciliolata; flores minores lutei intus basin versus verrucis purpureis vel atroviolaceis signati.“ — In pratis reg. alp. frequens. — Pavlova livada (Ho); Štirni do sub Lola planina; Sjekirica, Zeletin et Mokra planina supra Andrijevica; Bjelastica planina supra Košlašin; Štavna sub m. Kom (Ro); in alp. m. Prokletija (Df); in monte Lovčen et Maglić Pivski (Ro); Pivska planina pr. Pišće; Krivi do supra Aftovac ad confines Hercegovinae (De, Si).

\* — subsp. *albanicum* (GRIS.) HAY. — „Bulbus me-  
diocris carneus; caulis gracilis, uniflorus rarius biflorus; folia  
marginē tantum ciliolata, subtus glabra; superiora saepe tantum  
2—3 mm lata; flores aurei, aurantiaci vel miniati; perigonii  
phylla intus basin versus verrucis et lineis obscuris signata.“ —  
In pascuis et pratis subalp. et alpinis. — Bijele Carine sub m.  
Kom; Sinjavina planina; Mali Durmitor (Pt); Javorje planina  
(Pč); in m. Kunj Kostiča, Dibala et Planinica distr. Kuči (Ba);  
in m. Rudo brdo, Peh, Glave et Kom Kučki (Ja); in monte  
Vila distr. Kuči (Df). Vero similiter loca hic enumerata par-  
tim ad subsp. *bosniacum* pertinent.

5763. *L. martagon* L. — In silvis et dumetis reg. mont.  
et subalp. in toto territorio.

— f. *albiflorum* VUK. — Cum typo ad Njeguši (Pej).

\* — f. *lanigerum* ROHL. IX. Beitr. 10. — Perigonii phylla  
dorso et apice pilis perlóngis albis hyalinis dense tecta. —  
In m. Lovćen (Ro).

— f. *pubescens* BORB. — Caulis et folia subtus breviter  
pilosa. — In monte Lovćen locis pluribus (Kš, Pej, Ro).

— f. *polyphyllum* ROHL. IV. Beitr. 91. — Folia in vertic-  
cillos usque 16-foliosos disposita. — Cum typo in valle fl.  
Jelovica sub Bjelastica planina et ad latera montis Lovćen (Ro).

— var. *cattaniae* VIS. — In valle Perućica sub monte Kom  
(Pt). Vero similiter etiam alibi, praecipue in regione infer.

— f. *sanguineo-purpureum* BECK. — Flores sanguinei,  
purpureo-maculati. — In monte Lovćen (Ro).

### *Fritillaria* L.

? 5766. *F. tenella* M. B. — In sax. clivi Granica pr.  
Cetinje et sub Crvena Stijena m. Durmitor (Pč); in m. Vojnik,  
Durmitor et in Sinjavina planina (Ba). Potius ad speciem  
sequentem pertinet.

5767. *F. gracilis* (EBEL) A. GR. — In pratis et colli-  
bus herbid. reg. mont., subalp. et alp. — Sutorman supra Bar  
(Eb); in silvis ad Velki Mikulić sub m. Rumija; in sax. m.  
Dibala et Planinica distr. Kuči (Ba); in m. Vila, Vermoš pla-  
nina et Širokar distr. Kuči (Df); Krstac pr. Njeguši (Ld,  
Ki, Pej); Mali Šanik et Krivača supra Njeguši; ad latera m.  
Lovćen; Dobrsko selo inter Cetinje et Rijeka; in m. Durmitor

(Ro); ad Rijeka; in m. Kom et in valle Perućica sub m. Kom (Pt ut *Fr. messanensis*); Žabljak sub m. Durmitor (De, Si).

*Tulipa* L.

\*5796. *T. silvestris* L. subsp. *Grisebachiana* (PANT.) HAY. — A typo recedit foliis linearibus planis vel margine revolutis, flore minore citrino numquam virescente; perigonii phyllis basi et apice barbulatis" (PANT. Adnot. 23). — In sax. elatioribus. — Medjurečka planina pr. Bar (Ba); in fagetis montis Sutorman pr. Bar (Ro); ad Bukovica pr. Cetinje (Ho); in monte Golo brdo supra Njeguši (Pej, Ro); in m. Lovćen (To).

*Erythronium* L.

\*5798. *E. dens-canis* L. — In silvis et dumetis reg. infer., mont., subalp. usque in alpinam. — Ad Njeguši et Cetinje (Ld, Ro); circa Bar, Vir, Podgorica et Viljuša; etiam in montibus Kom, Zeletin, Sjekirica etc. (Ro); ad Ulcinj (Ba, Ro).

*Scilla* L.

5804. *S. pratensis* W. K. — In herbidis et saxosis reg. infer., mont., subalp. — In m. Jastrebica-Bijela Gora (Pt); in distr. Cuci et in campis circa Grahovo (Pč); Lastva čevska, Ostrog, Čeklići (Pč); circa Njeguši (Ld, Gi, Ki, Pej, Ro); ad latera m. Lovćen (Pej, Ro, Eb); in m. Čevski Lisac; ad Vir (Ro); supra Vratlo pr. Kolašin(?) (Ba).

5809. *S. bifolia* L. — In pratis, sax. et dumetis reg. infer., mont., rarius subalp. — Ad Cetinje (Pč, Ba); Bukovica et Dubovik pr. Cetinje (Gi, Ro); Njeguši et ad latera m. Lovćen (Pej, Ro); circa Ulcinj (Ba); Grebeni Selces pr. Vermoš (Df).

— f. *bracteata* TOMASCH. — Pedicelli bractea minuta ad 1 mm longa suffulti. — Ad Njeguši (Pej, Ro). Saepe occurunt formae ± ad subvar. *nivale* (BOISS.) BAKER vergentes.

5810. *S. autumnalis* L. — In incultis, dumetis et gramin. reg. infer. et mont. calidioris. — Ad pagum Orahovo (Sz); in sax. distr. Cuci (Pč); in dumetis inter Lukovo et Nikšić (Ba); circa Njeguši et ad latera montis Lovćen (Ro, Pej); Zagarać supra Danilovgrad (Ro).

*Ornithogalum* L.

5821. *O. tenuifolium* GUSS. — In gramin. reg. mont., subalp. et alpinae. — Inter Njeguši et Cetinje (Ld, Ki); in pratis silvat. in monte Rumija (Jovović); in pascuis alp. Pišperska Lukavica; Mokro distr. Kuči; Carine sub m. Kom; Ledenica distr. Piva (Ro); in m. Durmitor (Pč); Sinjavina planina (Ba).

— var. *bosniacum* BECK. — In alp. m. Kom et Ledenica planina (Ro).

\*— var. *Kochii* (PARL.) BECK. — Ad Viljuša et ad latera montis Lovćen (Kš, Ro); Golo brdo et Bukovica pr. Njeguši (Pej, Ro).

\*5822. *O. umbellatum* L. — In gramin. reg. infer., mont. et subalp. — Ad Cetinje et supra Boljevići (Pč); Lukavica planina et Crveno ždrijelo (Ho); Sutorman supra Bar (Eb).

— var. *divergens* (BOR.) BECK. — In monte Jastrebica; Crna planina, in m. Kom et Mali Durmitor (Pt).

5823. *O. refractum* KIT. — In lapid. inter Kotor et Njeguši (Ro).

5824. *O. exscapum* TEN. — A praeced. dignoscitur scapo brevissimo (vix 2 cm alto), florum pedicellis valde inaequalibus, demum valde elongatis bractea multo longioribus, perigonii phyllis oblongo-lanceolatis (nec late ellipticis) cca 10–15 mm longis. — In gramin. reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Njeguši (Ro), circa Ulcinj (Ba, Ro).

5826. *O. pyramidale* L. subsp. *narbonense* (L.) A. GR. — In gramin. reg. infer. et montanae calidioris. — In m. Kosa supra Bar (Do).

6827. *O. sphaerocarpum* A. KERN. — In gramin. et dumetis reg. mont. et subalp. — Circa Kolašin (Ja); in pratis m. Vermoš planina ad fines Albaniae (Df); Golo brdo supra Njeguši; Bar, Danilovgrad, Njeguši; Andrijevica, Lovćen (Ro); in valle rivi Vrbnica distr. Piva (De, Si).

5828. *O. flavescentia* LAM. — In herbidis et dumetis reg. mont. et subalp. — Sub m. Sutorman (Pč); ad Cetinje (Pt, Ba); sub monte Hum Orahovski distr. Kuči (Sz). Verosiš

militer loca hic enumerata partim (vel omnia?) ad spec. praeced. pertinent.

*Hyacinthus* L.

\*5834. *H. orientalis* L. — „In campis per reg. montis Rumija“ (Jovović fide Ba); ad Ulcinj (Ba). Verosimiliter tantum subsppontaneus.

*Bellevalia* LAP.

5840. *B. romana* (L.) RCHB. — In agris reg. inferioris dic. mediterr. — Circa Bar et Ulcinj frequens (Ro).

*Muscari* MILL.

5842. *M. tubiflorum* STEV. — A cl. HAYEK e Montenegro indicatum; locus mihi ignotus.

5845. *M. comosum* (L.) MILL. — In agris, herbidis et inter segetes reg. infer., mont. et subalp. — Ad Cetinje (Pt); ad latera montis Lovćen (Pč, Ro, Pej); circa Njeguši (Gi, Pej, Ro, Ho); sub monte Hum Orahovski et in pago Orahovo distr. Kuči (Sz); in monte Rumija (Jovović fide Ba); circa Ulcinj, Vir et Podgorica (Ro); Sutorman supra Bar (Eb); Bar (Ro, Do); ad Kralje pr. Andrijevica (Ja).

5854. *M. racemosum* (L.) MILL. — In campis reg. mont. — Ad Cetinje (Ba).

— var. *neglectum* (GUSS.) BRAND. — In agris et pratis reg. infer. et mont. calidioris. — Circa Bar, Ulcinj et Njeguši (Ro).

5857. *M. botryoides* (L.) MILL. — In sax., gramin. et silvestr. reg. mont. et subalp. — In m. Jastrebica-Bijela Gora; in m. Kom (Pt); in monte Sutorman (Pč); in m. Lovćen (Ho, Pej, Ro); circa Njeguši (Ro); Čekanje pr. Cetinje (Ki).

\*— f. *Kernerii* (MARCH.) A. GR. — Ad Bukovica inter Cetinje et Njeguši (Pej, Ro).

— f. *latifolium* BECK. — Folia usque 9 mm lata. — In alp. Crna Gora pr. Vermoš planina ad fines Albaniae cca 1800 m (Df); in monte Durmitor supra lacum Crno jezero (De, Si).

*Asparagus* L.

5861. *A. tenuifolius* LAM. — In sax. et dumetis reg. infer. mediterr. et montanae calidioris. — Nikšićka župa (Pč);

inter Nikšić et Jasenovo polje sub monte Vojnik; circa Podgorica et Danilovgrad (Ro).

5863. *A. officinalis* L. — In hortis cultus.

5866. *A. acutifolius* L. — In frutic. et sax. reg. infer. mediterr. et mont. calidioris frequens. — Ad Rijeka (Pt, Ro); Cetinje, Danilovgrad, Ostrog et Vir (Pč, Ro); Bar, Ulcinj, Podgorica, Spuž et Bogetiči (Ro); Bioće pr. Podgorica (Ja); Brčeli supra Vir; insula Vranina (Eb).

? 5867. *A. aphyllus* L. — A cl. HORÁK e Rijeka indiscatus; an ne ad spec. praeced. pertinet?

### *Ruscus* L.

5869. *R. aculeatus* L. — In dumetis, silvis et sax. reg. infer. mediterr. et montanae calidioris frequens. — Ad Ostrog et supra Grahovo (Pč); Orahovo distr. Kuči (Sz); circa Rijeka, Podgorica et Medun (Ho, Ba); circa Bar, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Spuž et Bogetiči (Ro); ad coenob. Morača; Bioće et Peljev brije (Ja); ad Ulcinj (Ba, Ro).

### *Maianthemum* WEB.

\*5873. *M. bifolium* (L.) SCHM. — In silvis reg. subalp. — Ad latera montis Maglić versus Mratinje (Ro).

### *Streptopus* MICHX.

5874. *S. amplexifolius* D. C. — In silvis reg. subalp. cca 1400—1500 m. — Ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

### *Polygonatum* ADANS.

5875. *P. officinale* ALL. — In silvis reg. mont. et subalp. — Viruša dol sub m. Crna planina (Pt); in silvis montis Lovćen (Pč, Pej, Ro); Viljuša; Žakamen supra coenob. Piva; in m. Tvrđjak et Čevski Lisac (Ro). (Verosimiliter loca hic enumerata partim ad *P. Velenovskýi* pertinent.)

\* — subsp. *Velenovskýi* ROHL. in SBGW. 1920 (= *P. Velenovskýi* ROHL. in sch.). — Differt floribus maioribus, perigonii laciniis stellatim patentibus subreflexis, exterioribus late ovato-ellipticis, internis e basi angustata fere orbiculatis utrimque obtusissimis; foliis latissime ellipticis pro more latoriis ac in typo; bacca fere duplo maiore, cca 1 cm dia-

metro. (Fortasse species propria!) — In silva ad latera montis Vojnik et in monte Lovćen (Ro).

5877. *P. multiflorum* (L.) ALL. — In silvis et dumetis reg. mont. et subalp. — Ad Cetinje (Ba); Zakamen supra coenob. Piva; Andrijevica; Sjekirica planina; Perućica sub monte Kom; circa Njeguši et ad latera montis Lovćen; Lastva čevska, Čevski Lisac; Malošin do et Milušina pećina distr. Kačunska nahija (Ro); ad Kolašin et in monte Trešnjevik (Ja); Sutorman supra Bar (Eb).

\*5878. *P. latifolium* (JACQ.) DESF. — In silvis reg. subalp. et alp. — In m. Jerinja glava pr. Andrijevica; in alp. Korita rovačka (Ro); in m. Lovćen (To).

5879. *P. verticillatum* (L.) ALL. — In silvis et pratis reg. mont., subalp. et alpinae. — Vallis Perućica sub m. Kom; Sinjavina planina (Pč); sub m. Durmitor (Pč, Ro); in m. Lovćen (Ho); in m. Balj et Jerinja glava pr. Andrijevica; in valle fl. Jelovica sub Bjelastica planina; Bukovica et Ranisava pr. m. Durmitor; Štirni do sub Lola planina; ad lat. m. Vojnik, Zakamen supra coenob. Piva (Ro); in valle fl. Tara (Ro, Ja); ad lac. Volujačko jezero distr. Piva (Ma).

#### *Convallaria* L.

5880. *C. maialis* L. — In silvis et dumetis reg. mont. et subalp. — Vallis Perućica sub monte Kom (Pt, Ro); sub monte Durmitor versus jugum Štulac (Pč); sub monte Kom Kučki (Ho); Bukovica sub m. Durmitor; ad Andrijevica; ad latera m. Maglić Pivski; in decliv. montis Lovćen (Ro); supra Vratlo in Sinjavina planina (Ba).

#### *Paris* L.

5881. *P. quadrifolia* L. — In silvis humidis reg. mont., subalp. et alpinae. — Viruša dol sub Crna planina (Pt); in silva Skroboča ad fines Albaniae (Sz); sub monte Kom Kučki (Ho); ad latera montis Lovćen (To, Ro); Trešnja supra Njeguši; Bukovica sub m. Durmitor; circa Šavnik; in m. Maglić Pivski; supra coenob. Piva; in valle fl. Tara; Štirni do sub Lola planina; circa Andrijevica et in m. Sjekirica planina (Ro); Ljuban sub m. Kom; Rikavac distr. Kuči (Ba); Volujačko jezero distr. Piva (Ma); Savin Kuk et Medjed in m. Durmitor (Ht).

*Smilax* L.

5882. *S. aspera* L. — In sax. et dumet. reg. infer. dic. mediterr. frequens. — Circa Vir (Pč); Gornje blato (Ho); Drušići pr. Rijeka (Ba, Ro); circa Bar (Ba, Ro); Ulcinj et Podgorica (Ro).

**Amaryllidaceae**

*Leucoium* L.

5886. *L. aestivum* L. — In pratis humidis, paludosis reg. infer. dic. mediterr. — Ad Ulcinj frequentissime (Ro); Plavnica (Ro, Ja).

*Galanthus* L.

- \*5888. *G. nivalis* L. — In pratis humidis et in dumetis reg. infer. et montanae. — Ad Cetinje (Pč); Ulcinj (Ba, Ro); circa Bar, Vir, Podgorica et Njeguši (Ro).

*Sternbergia* W. K.

5891. *S. lutea* (L.) KER. — Ad margines agrorum pr. Bar (Jovović fide BALDACCI).

*Narcissus* L.

5894. *N. pseudonarcissus* L. — In campis per reg. m. Rumija supra Bar (Jovović fide BALDACCI). Verosimiliter subsppontaneus.

5895. *N. jonquilla* L. — In pratis humidis reg. infer. — „In campis per reg. m. Rumija“ (Jovović fide BALDACCI).

5899. *N. tazetta* L. — In pratis humidis reg. infer. mediterr. ad Ulcinj (Ro).

5904. *N. radiiflorus* SALISB. — In pratis reg. subalp. et alp. — In m. Sutorman (Pč); Ječmeni do in Sinjavina planina (Ba); Korita rovačka pr. Lukavica planina (Ro); in m. Troica supra Vir (Eb); in m. Lovćen (To).

*Agave* L.

5906. *A. americana* L. — In rupestr. et ad muros reg. infer. mediterr. ad Ulcinj subsppontanea (Ro).

# Iridaceae

## Crocus L.

\*5916. *C. Tommasinianus* HERB. — Affinis *C. variegato* HOPPE et HORNSCH., a quo differt tuberis tunicis tenuiter (nec crasse) reticulatim fibrosis, perigonii segmentis dilute coeruleis apice obscurioribus, dorso non tristriatis, basi intus albis, stigmatibus apice dilatato-pectinato-dentatis quam stamina multo longioribus. — In herbidis et dumetis reg. infer. et mont. — Lovćen (fide ASCHERSON et GRAEBN.); ad Ulcinj (Ba); Njeguši (Pej, Ro, Gi); Dubovik et Žolbinje pr. Cetinje (Pej, Ro); Nikšić (Ma). Huc pertinet verosimiliter planta a cl. PANČIĆ „in dumetis ad Cetinje“ lecta et ut *C. Banaticus* HEUFF. publicata.

\*5916b. *C. montenegrinus* KERN. — A praeced. dignoscitur perigonii phyllis lutescenti-albidis basi intus intensius luteis, stigmatibus indivisis apicem versus valde dilatatis quam stamina brevioribus. — In monte Orjen supra Kotor (conf. ASCH. GRAEBN. Syn. III: 448).

5919. *C. neapolitanus* (KER) ASCHERS. — In pratis et pascuis reg. subalp. et alp. — In m. Maglić (B, Ro); in m. Durmitor (Ro, De, Si). Forsan etiam alibi.

5920. *C. albiflorus* KIT. — In pratis, in reg. alpinam adscendens. — In m. Durmitor (Pč, Ro); in pascuis Carine sub m. Kom (Pt); in m. Maglić Pivski (B, Ro). Verosimiliter etiam alibi.

5925. *C. dalmaticus* VIS. Fl. dalm. I: 119. — Tuberis tunicis crasse reticulatim fibrosis *C. variegatum* HOPPE et HORNSCH. revocat, sed differt segmentis perigonii oblongis obtusiusculis (nec ellipticis acutis) intus fauce aureis (nec violaceis), omnibus extus concoloribus (nec externis striis 3-pinnato-ramosis saturationibus variegatis) et stigmatibus profundius multisectis. — In gramin. montis Lovćen (Pej, Ro); in lapid. ad Podgorica (Ro). Etiam a Ludw. v. Führer lectus (teste DEGEN).

\*5934. *C. biflorus* MILL. — In saxosis ad Cetinje (Novaković fide BALDACCI).

*Romulea* MARATTI.

5938. *R. bulbocodium* (L.) SEB. et MAURI. — In pratis siccis reg. infer. mediterr. — Ad Ulcinj (Ba, Ro); circa Bar (Ro).

*Hermodactylus* MILL.

\*5944. *H. tuberosus* (L.) SALISB. — In dumetis et pratis humidis reg. infer. mediterr. — In m. Rumija (Jovović fide BALDACCI); circa Bar, Ulcinj et Vir (Ro).

*Iris* L.

? 5945. *I. pumila* L. — In sax. Orlova Skala sub monte Kom (Pt). Potius ad *I. bosniaca* pertinet.

5951. *I. bosniaca* BECK (= *I. lutescens* ROHL. III. Beitr. 56 non LAM.). — Caulis pumilus (usque ad 35 cm altus) 1—(2)-florus, solum in parte infer. foliosus; folia parum falcata 4—15 mm (in cultura usque 30 mm) lata; spathae subaequales ovatae inflatae dorso acute carinatae virides marginē ± late membranaceae; flores pallide citrini (confer f. *Dörfleri*) breviter pedicellati, perigonii tubus limbo brevior, sed quam ovarium duplo longior; segmenta late obovata basi purpureo-striolata, exteriora ad lineam medianam luteo-barbata, interna in unguem cito attenuata; filamenta antheris subdupo longiora. — In gramin. et rupestr. reg. mont., subalp. et alp. — In monte Hum Orahovski (Sz); Jablan vrh in Sinjavina planina; in m. Jerinja glava et Žoljevica pr. Andrijevica; Čevski Lisac distr. Katunska nahija (Ro); in monte Durmitor loco Ledena pećina et supra lacum Crno jezero (De, Si).

— f. *Dörfleri* HAY. — Flores pulchre violacei. — In monte Jerinja glava (Ro).

5954. *I. florentina* L. — In vineis reg. infer. mediterr. ad Ulcinj (Ro).

5956. *I. pallida* LAM. — In rupestr. reg. infer. mediterr. et mont. calidioris. — Ad Ostrog (Pč, Ba); ad coenob. Morača (Pč); circa Rijeka (Ba); Bar et Ulcinj (Ro); Sutorman supra Bar (Eb).

5959. *I. variegata* L. — In saxosis reg. mont. supra Grahovo (Pč).

5960. *I. pseudacorus* L. — In fossis et pratis palud.  
reg. infer. — Ad ripam lacus Scodrani (Pč, Sz, Ro); ad Bar  
(Ro); Vir (Eb).

5964. *I. graminea* L. — In gramin. silvat. et in fruti-  
cetis reg. infer. et subalp. — In m. Durmitor (Pč); Jerinja  
glava supra Andrijevica; Plavnica ad ripam lacus Scodrani (Ro).

### *Gladiolus* L.

5969. *G. segatum* KER. — In herbidis, olivetis et in  
agris. reg. infer. et mont. calid. — „In campis per m. Rumija“  
(Jovović fide BALDACCI); Tudjemile pr. Bar; Boljevići supra  
Vir (Ro).

5971. *G. communis* L. — In vineis reg. infer. ad Bolje-  
vići supra Vir (Ro).

\*5974. *G. illyricus* KOCH. — In pratis, agris et fruti-  
cetis reg. infer. et mont. calidioris. — Circa Bar (Ba, Ro);  
ad Podgorica et Spuž (Ro).

5975. *G. paluster* GAUD. — In pratis, fossis et sa-  
xosis(!) reg. infer. et montanae. — In m. Rasovatac pr. Vir  
(Eb); ad Spuž (Pt, Ro); in clivo Granica pr. Cetinje (Pč);  
Njeguši et Bukovica sub m. Lovćen (Ho, Ro, Pej); Grubojev  
vrh et Duge distr. Čeklići (Pej, Ro); Podgorica et Danilovgrad  
(Ro); ad Cetinje loco Krive Grede (Bierbach fide MALÝ);  
Triepši (Ba ut *G. illyricus* fide MALÝ).

### *Dioscoreaceae*

#### *Dioscorea* L.

5976. *D. balcanica* KOŠANIN OeBZ. 1914: 37. — A  
*Tamo communis* L., cui caule volubili similis, dignoscitur  
foliis leviter cordatis latitudine vix longioribus, floribus in spi-  
cas tenuissimas dispositis, perigonio vix 2 mm longo, stigma-  
tibus bifidis, capsula (nec bacca coccinea) orbiculari-tri-  
alata, loculis dispermis, seminibus alatis. — In dumetis reg.  
montanae ad Nikšić; collis Glavica, circa Treblješka Glava;  
Straševina et Ozrinići (Marie Zafirović fide KOŠANIN).

#### *Tamus* L.

5977. *T. communis* L. — In dumetis et sax. reg. infer.,  
mont., rarius in subalpinam adscendens (usque ad 1500 m!). —

Ad coenob. Ostrog (Pč); monastir Morača (Pč, Ja); Carine sub monte Kom (Ba); circa Ulcinj, Bar, Vir, Rijeka, Podgorica, Spuž, Danilovgrad, Nikšić; Jasenovo polje sub m. Vojnik; Borkovići distr. Piva; in m. Žoljevica et Jerinja glava pr. Andrijevica; Njeguši (Ro); in valle fl. Lim (Ja, Ro); Laćica krš sub monte Lovćen (Ro, Pej).

## Juncaceae

### *Juncus* L.

5978. *J. bufonius* L. — In arenosis humidis, ad ripas et ad fossas e regione infer. in subalp. adscendens in toto territorio frequens.

— f. *rostratus* HAUSM. — Perigonii phylla valde elongata.  
— Cum typo ad Bar (Ro).

\*5979. *J. tenagelia* EHRH. — In arenosis humidis reg. infer. — Ad Plavnica et Danilovgrad (Ro).

5981. *J. capitatus* WEIG. — In fossis et locis humidis reg. infer. mediterr. circa Bar (Ro).

5983. *J. bulbosus* L. — In humidis reg. infer. ad rivulum Sušica pr. Danilovgrad (Pt).

5985. *J. alpinus* VILL. — In aquosis, turfosis et paludosis reg. subalp. — Circa lacus Crno et Barno jezero sub monte Durmitor (Pt, Ro).

— subf. *uni-biceps* LAEST. — Nanus, cca 10 cm altus, capitula 1—2, pauciflora. — In spongiosis inter Plav et Dečani ad fines Albaniæ (Df).

5986. *J. anceps* DE LAHARPE var. *hercegovinus* (SAG.) HAY. — Caulis et rami anthelae graciliores; capitula 4—7-flora, minus numerosa. — In fossis et paludosis reg. infer. et subalp. — Circa Bar, Ulcinj et Vir (Ro, Do); ad lac. Volujačko jezero distr. Piva (Ma).

\*5991. *J. alpigenus* C. KOCH. — In pratis et pascuis reg. alp., cca 1600—2100 m. — Sjekirica, Mokra, Bjelastica planina (Ro).

5993. *J. articulatus* L. — In palud., pratis humidis et ad ripas reg. mont. et subalp. — Circa lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); Mokra sub m. Dziebeze (Sz); Sutorman supra Bar (Ho); ad Nikšić; Mratinje sub m. Maglić Pivski;

Šavnik et Andrijevica; Bukovica sub monte Durmitor (Ro); Krstac pr. Njeguši (Pej, Ro); Volujačko jezero distr. Piva (Ma).

— f. *nigritellus* (D. DON) HAY. — Humilior; inflorescentia oligocephala ramis suberectis; perigonum rubrofussum, capsula nigricans. — Cum typo in lacu sub monte Lovćen (Pej, Ro).

5994. *J. compressus* JACQ. — Ad fossas et in pratis humidis reg. infer., mont. et subalp. — Ad Rijeka (Pt); ad ripam lac. Scodrani (Pč, Ro); Danilovgrad (Pč, Ro); circa Bar, Vir, Šavnik et Andrijevica; Mratinje sub m. Maglić; Njeguška planina (Ro).

\* — f. *viridiflorus* ASCH. GR. — Cum typo ad Plavnica (Ro).

5995. *J. Gerardii* LOIS. — In pratis humidis et in maritimis ad Ulcinj (Ro); etiam forma perigonii phyllis intense coloratis usque fere atris ± ad var. *atrofuscum* TRAUTV. vergens.

5999. *J. monanthos* JACQ. (= *J. trifidus* L. subsp. *monanthos* A. GR.). — In saxosis reg. alp. — In monte Kom (Pč); Bjelastica planina (Ro).

6002. *J. glaucus* EHRH. — In paludosis et fossis reg. infer. et subalp. — Viruša dol sub Crna planina; ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); circa Bar, Spuž et Danilovgrad; sub monte Maglić Pivski, Krstac pr. Njeguši (Ro); Velki Mikulići sub m. Rumija (Do).

6004. *J. effusus* L. — In humidis, palud. et fossis reg. infer. et subalp. — Ad rivulum Sušica pr. Danilovgrad (Pt), Konjuhe et Štavna sub m. Kom (Ba).

— f. *compactus* LEJ. et COURT. — Inflorescentia ± gloomerata. — Ad Bukovica sub monte Durmitor (Ro).

6005. *J. conglomeratus* L. — In fossis reg. infer. ad Danilovgrad (Ro).

\*6006. *J. maritimus* LAM. — In aren. maritimis ad Bar (Do).

6007. *J. acutus* L. — In maritimis ad Bar (Ro).

— f. *longebracteatus* BUCHEN. — Inflorescentia magis gloomerata bractea perlonga multoties superata. — Cum typo ad Bar (Ro).

*Luzula* LAM. et DC.

6008. *L. Forsteri* (SM.) DC. — In silvis et dumetis reg. infer. et mont. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Rijeka (Ro).

\*6009. *L. pilosa* (L.) WILLD. — In silvis et circa ovilia reg. subalp. — Crna planina loco Javorce et in m. Kom (Pt); Vuči potok in Vermoš planina ad fines Albanaiae (Df); sub m. Durmitor (Ba); Brčeli supra Vir (Eb).

\*6010. *L. luzulina* (VILL.) D. T. et SARNTH. — In silvis reg. subalp. — Ad pedem m. Durmitor (Ht); inter Kotor et Krstac; Njeguši, Andrijevica; Matoševo in valle fl. Tara (Ro sub *L. Forsteri*).

\*6011. *L. silvatica* (HUDS.) GAUD. — In silvis et gramin. reg. subalp. et alp. — In m. Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ba, Ro, De, Si); in m. Jastrebica-Bijela Gora (Pt); Kukuraj Brdo sub m. Kom (Pč); Perućica et Varda sub m. Kom (Sz, Ba, Ro); Maglić Pivski, Ljut supra coenob. Piva; in m. Balj et Sjekirica planina; supra Andrijevica; in valle fl. Jelovica sub Bjelastica planina; ad lac. Crno jezero sub m. Durmitor (Ro); ad lac. Volujačko jezero distr. Piva (Ma).

\*6015. *L. nemorosa* (PALL.) E. MEY. — In silvis et graminosis reg. subalp. et alp. — Crna planina loco Javorce (Pt); in valle fl. Tara (Pč); Zmijnica in Sinjavina planina (Ba); ad Andrijevica (Ro).

\* — subvar. *erythranthema* (WALLR.) HAY. — Flores rubelli vel cuprini. — In sax. m. Dziebeze distr. Kuči (Sz); Bujkovica sub m. Durmitor (Ro); Vermoš planina ad fines Albanaiae (Df).

— — f. *fuliginosa* ASCHERS. — Flores obscure fusci. — In alp. Sjekirica et Mokra planina supra Andrijevica (Ro).

6017. *L. spicata* (L.) LAM. et DC. — In pascuis reg. alp. — In m. Kom (Pt, Ro); Štavna sub monte Kom (Ro, Ja); Krivi do et Bjelastica planina supra Kolašin; Jablan vrh et Gradište in Sinjavina planina; Javorje planina (Ro); Širokar distr. Kuči; Vermoš planina ad confines Albanaiae (Df).

\*6018. *L. sudetica* (WILLD.) DC. — In silvaticis reg. subalp. — Ad Kovčice sub m. Durmitor (Pt).

6019. *L. campestris* (L.) LAM. et DC. subsp. *vulgaris* GAUD. — In gramin. et silvis reg. subalp. et alp.

frequens. — Crna planina loco Javorce; Carine sub monte Kom (Pt); Rupa Konjska sub monte Vila et Mali Maglić distr. Kuči (Sz, Ba); Treblješ luka pr. Lukavica planina (Ho); Sinjavina planina loco Zmijnica (Ba); in valle Tara pr. Matošević; in valle fl. Lim et Žlorječica; in monte Zeletin, Balj et Sjekirica planina supra Andrijevica; Ledenica planina et Maglić Pivski (Ro); Sutorman supra Bar (Eb); in monte Durmitor loco Savin Kuk (De, Si).

— subsp. *multiflora* (EHRH.) A. GR.\* — In pratis et dumetis reg. infer., mont. et subalp. frequens. — In m. Jastrebica-Bijela Gora (Pt); Javorje planina (Pč); insula Vranina (Eb); Njeguši, Podgorica, Vir, Bar, Ulcinj, Danilovgrad, Matošević et Andrijevica (Ro); Vuči potok pr. Vermoš planina (Df).

\*— f. *alpestris* R. BEYER. — Vermoš planina et Širokar distr. Kuči (Df).

## Cyperaceae

### *Pycnus* PAL.

6020. *P. flavescens* (L.) RCHB. — In pratis udis et locis humidis reg. infer. — Ad Rijeka et Danilovgrad (Pt, Ro); in fossis ad Sinjac et Vir (Pč); ad Štoj distr. Primorje (Ba); circa Bar (Ro).

6022. *P. serotinus* (ROTTB.) HAY. — In fossis reg. infer. ad Vir (Pč).

6026. *P. longus* (L.) HAY. — Ad ripas et fossas reg. infer. — A ripam lacus Scodrani pr. Sinjac, Vir et Plavnica (Eb, Pč, Sz, Ro, Ja); Rijeka (Pt, Ro, Ho); Bar (Ro, Do).

\*6028. *P. badius* (DESF.) HAY. — A praeced. discernitur anthelae ramis paucioribus (2—4), brevioribus (ad summum 8 cm longis) minus ramosis, caule acutius trigono, glumis obscure ferrugineis. — In fossis et palud. reg. infer. ad Bar et Vir (Ro).

6029. *P. rotundus* (L.) HAY. — Ad ripas aren. lacus Scodrani non procul a vico Dodoš (Pč).

### *Galilea* PARL.

6032. *G. mucronata* (L.) PARL. — In aridis arenosis maritimis ad Bar et Ulcinj (Ba, Ro).

\* Conf. ROHLENA V. Beitr. 120.

*Dichostylis* PAL.

6034. *D. Micheliana* (L.) NEES. — In arenosis humidis et in palud. reg. infer. — Ad Rijeka (Pt); insula Vranina (Pej, Ro).

*Fimbristylis* VAHL.

6036. *F. dichotoma* (L.) VAHL. — In ripa arenosa lacus Scodrani non procul a vico Dodoš et in fossis ad Vir (Pč).

*Cyperus* L.

\*6038. *C. fuscus* L. — In arenosis udis, in irriguis et ad fossas reg. infer. — Ad rivulum Sušica pr. Danilovgrad (Pt); in valle Zeta, Morača et ad Vir (Pč); Plavnica et insula Vranina (Pej, Ro); coenob. Morača (Ja).

— subf. *virescens* (HOFFM.) KOCH. — Spiculae virescentes. — Ad Rijeka (Kn).

*Eriophorum* L.

6043. *E. angustifolium* ROTH. — In pratis palud. et in spongiosis reg. subalp. — Sub m. Durmitor (Pč); Građište in Sinjavina planina (Ba).

6045. *E. latifolium* HOPPE. — In turfosis et pratis palud. reg. mont. et subalp. — Viruša dol sub Crna planina; Pašina Voda sub m. Durmitor (Pt); ad Andrijevica et Berane; Sjekirica planina (Ro).

*Schoenoplectus* (RCHB.) PALLA.

6046. *Sch. setaceus* (L.) PALLA. — In aren. humidis et ad fossas reg. infer. — Ad ripam lac. Scodrani pr. Plavnica (Pej, Ro); Bar, Ulcinj et Danilovgrad (Ro).

— f. *clathratus* (RCHB.) HAY. — Fructus intense transverse rugosi. — Ad ripam fluv. Zlorječica pr. Andrijevica (Ro).

6047. *Sch. cernuus* (VAHL) HAY. — Ad rivulum Sušica pr. Danilovgrad (Pt); Kolašin (Ba).

6049. *Sch. lacuster* (L.) PALLA. — In palud. et ad ripas reg. infer. et subalp. — Viruša dol sub Crna planina (Pt); in lacu Scodrano (Pč).

\*— f. *capitatus* HAUSSKN. — Anthelae rami valde abbreviati, inflorescentia densa. — Cum typo ad Lipovik pr. Rijeka (Ro).

6050. *Sch. Tabernaemontanii* (GMEL.) PALLA. — In arenosis et humidis ad Bar (Do).

— var. *longespiculosus* ROHL. V. Beitr. 121. — Spiculis multo maioribus oblongis (15—20 mm longis), longius pedicellatis. — Ad ripam lacus Scodrani pr. Plavnica (Ro).

### *Holoschoenus* LK.

\*6054. *H. vulgaris* LK. subsp. *euvulgaris* HAY. — In palud. et pratis humidis reg. infer. — Sub Danilovgrad (Pč); Mosori pr. Podgorica (Ro).

\*— var. *australis* (L.) HAY. — In saxosis ad Rijeka (Ro); in fossa inter Bukovica et Cetinje; Lopatina strana et Vranja Glavica pr. Njeguši (Pej, Ro); Bar (Do).

— subsp. *romanus* (L.) HAY. In aren. marit. ad Ulcinj (Ro).

### *Blysmus* PANZ.

6055. *B. compressus* (L.) PANZ. — In pratis et pascuis pinguibus reg. subalp. et alp. frequens. — Viruša dol sub Crna planina; Pašina Voda sub m. Durmitor (Pt); ad lac. Riblje, Barno et Srablje jezero sub m. Durmitor (Pt, Pč, Ro); Mokre sub m. Dziebeze (Sz); Črtov do supra coenob. Piva; Andrijevica; Sjekirica et Bjelastica planina; Krivi do et Štavna sub m. Kom; Jevik supra Njeguši (Ro).

### *Scirpus* L.

6056. *S. silvaticus* L. — In palud., ad ripas et in pratis humidis reg. subalp. — Sub m. Durmitor (Pč); ad Han Mušrino pr. Velika distr. Vasojevići; Konjuhe sub m. Kom (Ba); Andrijevica (Ro).

### *Bolboschoenus* (ASCHERS.) PALLA.

6058. *B. maritimus* (L.) PALLA. — In palud. et ad fossas reg. infer. — Ad rip. lac. Scodrani ad Sinjac et Vir (Pč, Ro); Rijeka (Ho); Bar et Danilovgrad (Ro); Crmnica (Eb).

*Eleocharis* R. BR.

6059. *E. palustris* (L.) R. BR. — In fossis et palud. reg. infer., mont. et subalp. frequens. — Danilovgrad (Pt, Ro); ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); ad ripas lac. Scodrani (Pč, Sz, Ro); Podgorica, Spuž, Nikšić et Andrijevica; Črtov do supra coenob. Piva; in lacu sub monte Lovćen (Ro); Bar (Do); Crmnica (Eb).

\* — f. *glaucescens* (WILLD.) ASCH. GR. — Gracilior, glaucescens. — Cum typo in lacu sub m. Lovćen (Pej, Ro).

— f. *pumila* LGE. — Planta nana. — In inundatis fl. Crmnica prope Rijeka (Ro).

6060. *E. uniglumis* (LK.) SCHULT. — In palud. reg. mont. et subalp. — Mokro pr. Bijela (Pt); Blatište in m. Lovćen (Pej, Ro).

\*6066. *E. acicularis* (L.) R. BR. — In inundatis ad Plavnica (Ro); in decliv. montis Rumija, cca 900 m (Do).

*Schoenus* L.

6067. *Sch. nigricans* L. — In pratis turfosis et in maritimis ad Bar et Ulcinj (Ro).

*Cladium* BOEHM.

6070. *Cl. mariscus* (L.) R. BR. — In lacu Scodrano ad ostium rivi Crnojevićka Rijeka (Pč).

*Elyna* SCHRAD.

6071. *E. myosuroides* (VILL.) FRITSCH. — In pasuis et gramin. reg. alpinæ in m. Durmitor (Pč, Ro, Ht); Kom supra Carine (Ba).

*Carex* L.

6072. *C. Davalliana* SM. — In pratis turfosis reg. subalp. — Ad lac. Riblje jezero et ad Pašina Voda sub monte Durmitor (Pt).

\*6073. *C. rupestris* ALL. f. *orbicularis* (VELEN.) STOJ. et STEF. — Inflorescentia pauciflora, spiculis inferioribus fere totis femineis. — In rupestr. summi montis Durmitor cca 2200 m (Ro).

6076. *C. distachya* DESF. — In rupestr. et dumetis reg. infer. dit. mediterr. — Circa Bar, Ulcinj, Vir et Podgorica (Ro).

6079. *C. divisa* HUDES. — In gramin. et aren. reg. infer. — Ad Ulcinj (Ro).

— var. *longiculmis* WILLK. (= *C. divisa* var. *ammophila* KUEKENTH.). — Culmi elongati compresso-triquetri; spica saepe bractea perlonga suffulta; utriculi oblongo-ovati longius rostrati. — Cum typo ad Bar et Ulcinj (Ro).

— var. *chaetophylla* (STEUD.) DAVEAU. — Folia convoluta filiformia; spica brevis densa; utriculi ellipsoidei. — In pratis siccis ad Ulcinj (Ro).

6080. *C. contigua* HOPPE. — Sub m. Javorje et in valle flum. Tara (Pč); Mokra distr. Kuči (Sz); Cetinje (Kn); Andrijevica et Podgorica (Ro).

6082. *C. divulsa* GOOD. — In gram. et dumetis reg. infer. — Circa Bar, Ulcinj et Podgorica (Ro).

— f. *Chabertii* (F. SCHULTZ) KNEUCKER. — Culmi pauciores firmi; folia brevia stricta rigidula; spica minus interrupta. — In herbidis reg. subalp. — Gornja Krivača et Nješićka planina in m. Lovćen; Varda supra coenob. Piva (Ro).

6085. *C. paniculata* L. — In pratis turfosis et palud. reg. mont. et subalp. — Ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); Bukovica et Ranisava sub m. Durmitor (Ro); Bešane; in valle Jelovica; Sjekirica planina (Ro); Vermoš planina et Širokar distr. Kuči; inter Plav et Gusinje (Df); Barno jezero sub m. Durmitor (Ko).

\*6086. *C. diandra* SCHRK. — In pratis humidis reg. subalpinae. — Ad ripas lacus Pošćensko jezero supra Šavnik (Ko).

6087. *C. brizoides* L. — In silvis reg. infer. ad Rijeka (Ro).

6088. *C. praecox* SCHREB. — In gramin. siccis et ad marg. silvarum reg. mont. et subalp. — Sub m. Lovćen et ad Grahovo (Pč); Vratlo supra Kolašin (Ba).

6090. *C. stellulata* GOOD. — In pratis humidis reg. subalp. — Viruša dol sub Crna planina et ad lac. Crno jezero

sub m. Durmitor (Pt); Sjekirica planina (Ro); Barno jezero  
sub m. Durmitor (Ko).

— var. *grypos* (SCHK.) KOCH. — Culmus humilior sub-  
curvatus; spiculae approximatae pauciflorae obscurius coloratae.  
— In pascuis alp. Bijele Carine sub m. Kom (Pt).

6091. *C. elongata* L. — In spongiosis reg. subalp. —  
Sub m. Durmitor (Pč).

6092. *C. leporina* L. — In spongiosis reg. subalp. —  
Sub m. Durmitor (Pč); Andrijevica (Ro); ad lac. Volujačko  
jezero distr. Piva (Ma).

? 6093. *C. Lachenalii* SCHK. — In humidis Viruša  
dol sub Crna planina et in m. Kom (Pt).

6096. *C. remota* L. — Ad ripas, fossas et in silvestr.  
irriguis reg. infer. et subalp. — In valle fl. Tara (Pč); circa  
Bar, Ulcinj et Andrijevica (Ro).

6100. *C. caespitosa* L. — In uligin. ad lac. Riblje je-  
zero sub m. Durmitor (Pt).

6101. *C. elata* ALL. f. *nigricans* (BECK) HAY. — Glu-  
mae nigrae concolores. — In pratis subalp. Treblješ luka pr.  
Lukavica planina (Ro).

6102. *C. gracilis* CURT. — In palustr. reg. subalp. et  
alp. — Ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pč); Korita  
rovačka; Maglić Pivski (Ro).

6103. *C. fuscă* ALL. (= *C. Goodenowii* GAY.). — In  
humidis reg. subalp. — Sub m. Durmitor versus jugum Štulac  
(Pč); ad lac. Volujačko jezero (Ma); Barno jezero sub m.  
Durmitor (Ko).

— f. *oxylepis* (SANIO) KUEKENT. — In alp. Korita ro-  
vačka (Ro).

6105. *C. polygama* SCHK. — In pratis uligin. reg.  
subalp. — Ad lac. Riblje et Barno jezero et sub jugo Štulac  
sub m. Durmitor (Pt, Pč, Ba, Ro).

6106. *C. nigra* ALL. — In pratis alpinis montis Durmitor  
(Ro).

6107. *C. atrata* L. — In pratis et pascuis reg. alpinae.  
— In m. Durmitor loco Vališnica et jugo Šljeme (Pč, Ba, Ro);  
in m. Ranisava et Maglić Pivski (Ro); Gradište et Somina in

Sinjavina planina (Ba); in alp. Bjelastica planina etiam forma  
ad var. *aterrimam* (HOPPE) HARTM. vergens (Ro); in  
m. Durmitor supra Škrka (Ko).

6110. *C. umbrosa* HOST. — In gramin. subalp. in Sin-  
javina planina (Pt).

6111. *C. verna* CHAIX. — In gramin. et silvis reg.  
infer., mont. et subalp. — In valle Viruša dol sub Crna pla-  
nina (Pt); ad Cetinje, Grahovo et Vir (Pč ut *C. praecox* L.);  
in monte Hum Orahovski, Mali et Velki Maglić distr. Kući  
(Sz, Ba); circa Bar, Ulcinj et Andrijevica (Ro); Djinova Brda  
(Bierbach).

\*6112. *C. ericetorum* POLL. var. *approximata* (ALL.).  
RICHT. — In sax. alp. montis Kom (Pt ut *C. membranacea*  
HOPPE); Bobotov Kuk in monte Durmitor (Ht); Savin Kuk  
in monte Durmitor (De, Si).

6113. *C. pilulifera* L. — In pratis silvat. reg. subalp.  
ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt).

6114. *C. tomentosa* L. — In pratis palud. reg. infer.  
et subalp. — Circa Ulcinj et Podgorica (Ro); ad lac. Volu-  
jačko jezero distr. Piva (Ma).

6115. *C. Halleriana* ASSO. — In collibus siccis et in  
rupestr. reg. infer. et mont. Non raro cum f. *pedunculata*  
KUEKENTH. — Circa Ulcinj et Podgorica (Ro); Cetinje  
(Če); Djinova Brda et Orlov Krš (Bierbach).

6117. *C. humilis* LEYSS. — In gramin. siccis in m.  
Žoljevica pr. Andrijevica cca 1380 m (Ro).

6118. *C. digitata* L. — In sax. reg. mont., subalp. et  
alp. usque ad 2200 m. — In valle fl. Morača super. (Pč);  
Gradiste supra Kolašin (Ba); circa Andrijevica; Velki Krš  
sub m. Kom; Sjekirica et Mokra planina distr. Vasojevići; in  
m. Kom Vasojevički (Ro).

6119. *C. ornithopoda* WILLD. var. *elongata* LEYB.  
(= var. *castanea* MURB.). — Glumae femin. fuscae, viridi-  
carinatae, hyalino-marginatae, utriculi atrofusci. — In sax., du-  
met. et pratis reg. subalp. et alp. — In valle Perućica sub m.  
Kom (Pt, Ro), Sjekirica planina, Jerinja glava, Štit et Mokra  
planina distr. Vasojevići (Ro); in monte Durmitor loco Savin  
Kuk et Mali Durmitor (Pt, De, Si).

6124. *C. panicea* L. — In humidis reg. subalp. ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt).

\*6126. *C. pendula* HUDES. — In palud. et dumetis reg. infer. ad Bar et Ulcinj (Ro).

6128. *C. glauca* MURR. — In pratis, dumetis et silvis reg. infer., mont. et subalp. — Viruša dol sub Crna planina; ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); supra Vir (Pč); Cetinje (Kn); ad Bar et Podgorica (Ro).

— f. *leptostachys* SCHUR. — Spiculae mascul. 2—4, fere lineares. — In campo Ulcinjsko polje (Ro).

— f. *pubicarpa* ROHL. MBL. III: 320. — Utriculi (etiam adulti!) dense puberulo-hirti. — Cum typo ad Bar et Ulcinj (Ro).

6129. *C. capillaris* L. — In pratis alpinis et subalp. — Ad lacus Crno<sup>z</sup> et Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); in alp. m. Maglić Pivski (Ro).

6130. *C. limosa* L. f. *pauciflora* ASCHERS. — Spiculae femin. pauciflorae; glumae atrofuscae. — In pratis turfosis reg. subalp. ad lacum Barno jezero sub m. Durmitor (Ro, Ko).

6133. *C. pallens* L. — In silvis et pratis humidis reg. infer., mont. et subalp. — Viruša dol; Bijele Carine sub m. Kom; in valle fl. Tara; ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); circa Andrijevica et Danilovgrad (Ro); ad lac. Volužačko jezero distr. Piva (Ma).

6136. *C. ferruginea* SCOP. — In rupestr. m. Maglić distr. Kuči (Ba).

— f. *spadicea* (HOST) KOCH. — Utriculi margine valde ciliati, superne sat dense hispidi. — In pascuis montis Kom (Pt).

6138. *C. sempervirens* VILL. — In rupestr. alp. mons. Maglić Pivski cca 2200 m (Ro); supra lacum Volužačko jezero distr. Piva (Ma).

6139. *C. laevis* KIT. — In rupestr. reg. mont., subalp. et alpinae in toto territorio frequens! (Conf. ROHLENA IV. Beitr. 96.)

6143. *C. lasiocarpa* EHRH. — In palud. et turfos. reg. subalp. ad Riblje et Barno jezero sub monte Durmitor (Pč, Ro, Ko).

6144. *C. hirta* L. — In pratis, ad fossas et vias reg. infer., mont. et subalp. — Circa Plavnica et Andrijevica (Ro). — *f. hirtaeformis* PERS. — Culmus et folia glabriuscula. — In valle fl. Tara (Pč); Viruša dol; ad lacum Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt).

6146. *C. distans* L. — In pratis humidis et ad fossas reg. infer. et subalp. — Circa Bar, Ulcinj, Podgorica et Andrijevica (Ro).

6147. *C. Hostiana* DC. — In humidis ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt).

6148. *C. depauperata* GOOD. — In dumetis reg. subalp. ad lat. m. Balj pr. Andrijevica (Ro).

6149. *C. flava* L. — In palud., humidis et rivularibus reg. subalp. — Viruša dol, Bijele Carine sub m. Kom; Riblje jezero et Pašina Voda sub m. Durmitor (Pt); sub jugo Štulac (Pč); Mokro distr. Kuči (Sz); ad Andrijevica et Berane (Ro); inter Plav et Gusinje (Df).

\*6150. *C. lepidocarpa* TSCH. — In humidis reg. subalp. ad lac. Volučko jezero (Ma).

6152. *C. extensa* GOOD. — A cl. HAYEK e Monten. indicata; verosim. ad litora maris pr. Bar et Ulcinj.

6155. *C. silvatica* HUDS. — In silvis et dumet. reg. infer., mont. et subalp. — Perućica sub m. Kom (Pt); supra Kolašin (Pč); Bar, Danilovgrad et Andrijevica (Ro); Vuči potok pr. Vermoš planina (Df).

6160. *C. riparia* CURT. — In humidis ad Ulcinj (Ro). — subvar. *gracilescens* (HARTM.) A. GR. — Cum typo ad Ulcinj (Ro).

6161. *C. vesicaria* L. — In palud. ad ripam lacus Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt, Pč).

6162. *C. rostrata* STOKES. — In palud., spongiosis et ad fossas reg. subalp. et alp. — Sub monte Durmitor locis pluribus: Pašina Voda, Riblje jezero, Bukovica, Barno jezero, Mlinski potok et Valoviti do (Pt, Pč, Ro); Treblješ luka pr. Korita rovačka (Ro); in m. Velki Maglić distr. Kuči (Ba); inter Plav et Gusinje legit Dörfler formam, quae var. *utriculatae* (BOOT) BAILEY maxime similis est. (Conf. HAYEK in DAWW 1917: 79.)

## Gramineae

### Bromus L.

6165. *B. ramosus* Huds. subsp. *Benekenii* (SYME) HAY. — In silvis et dumetis reg. mont. et subalp. — Sub m. Vojnik (Pč); ad Šavniki, Mratinje sub m. Maglić et circa Andrijevica (Ro).

— subsp. *euramosus* (A. G.) HAY. — Supra coenob. Piva, ad Andrijevica et circa Rijeka (Ro).

6171-73. *B. erectus* Huds. subsp. *eurectus* A. GR. — In herbidis et pratis reg. mont., subalp. et alp. — In m. Durmitor et Javorje planina (Pč); Hum Orahovski et Velki Maglić distr. Kuči (Sz); ad Andrijevica (Ba); Viljuša, Njeguši (Ro).

— subvar. *pubiflorus* BORB. — Panicula laxa, vaginae inferiores pilosae, spiculis patule pilosis. — Ad Velestovo distr. Katunska nahija (Ro).

— var. *transsilvanicus* (STEUD.) BECK. — In m. Hum Orahovski (Sz); Kom Kučki (Ho).

— f. *montenegrinus* (SAG.) HAY. — Robustior, folia latiora, spiculae permagnae. — Ad Njeguši (Sa); Korita rovačka (Ro).

— subsp. *pannonicus* (KUEMM. et SENDT.) A. GR. — Ad Bar et Njeguši (Ro).

— f. *hercegovinus* (BECK) A. GR. — Lovćen, Sinjavina planina, Šarišnik pr. Goraško, Borkovići distr. Piva, Žoljevica pr. Andrijevica, ad coenob. Piva; Rijeka (Ro); in m. Rumija supra Bar (Do).

— var. *dissolutus* BECK (= f. *reptans* BORB.). — Lovćen, Njeguši, Žabljak et Bukovica sub monte Durmitor, Maglić Pivski, Ledenica planina, Bar, Ulcinj, Vir et Podgorica (Ro); Sutorman; Volovica pr. Bar (B, Do).

— subsp. *condensatus* (HACKEL) A. GR. var. *australis* (GRIS.) BECK. — Vučije Gornje prope Gvožd Han et circa Lukovo sub monte Vojnik (Pt); Bogojeva glava pr. Njeguši (Ro).

— var. *cilifer* BECK. — In monte Jerinja glava pr. Andrijevica (Sk).

6177. *B. villosus* FORSK. var. *maximus* (DESF.) A. G.  
 — In arenosis, incultis et ad sepes reg. infer. mediterr. — Circa Bar, Ulcinj et Podgorica (Ro).  
 — — f. *ambigens* (JORD.) A. GR. — Panicula erecta, subcontracta, ramis brevibus. — Cum typo ad Ulcinj (Ro).
6178. *B. madritensis* L. — In aren., lapid. et incultis reg. infer. et mont. frequēns. — Circa Ulcinj et Rijeka (Ro); Bar (Ro, Do); in m. Rasovatac pr. Vir (Eb).  
 — — f. *ciliatus* GUSS. — Glumella margine longe ciliata. — Cum typo (Ro); etiam in m. Kosa supra Bar (Do).
6181. *B. tectorum* L. — In agris, incultis et ad vias reg. montanae. — Andrijevica, in valle flum. Piva sub Gorańsko (Ro).
6182. *B. sterilis* L. — In cultis, sterilibus, ad vias et sepes reg. infer., mont., rarius subalp. — Cetinje (Pč); Orahovo distr. Kući (Sz); Kamenjak (Ho); Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Spuž, Danilovgrad, Viljuša, Njeguši, Šavniki, coenob. Piva, Gorańsko et ad Andrijevica (Ro); in m. Lovćen (To).  
 — — f. *intermedius* RCHB. (= var. *pilosus* ROHL. II. Beitr. 31). — Glumis margine et ad nervos longe ciliatis. — Boljevići supra Vir (Ro).
6183. *B. secalinus* L. — Inter segetes reg. infer. et mont. — Njeguši (Pč); Andrijevica, Viljuša et alibi (Ro); in m. Lovćen (Eb).  
 — — f. *submuticus* RCHB. — Gluma mucronata non aristata. — Ad Rijeka frequens (Ro).  
 — — f. *elongatus* (GAUD.) ASCH. GR. — Arista elongata glumae aequilonga. — Ad Spuž et Njeguši (Ro).
6184. *B. arvensis* L. — In agris, vineis et gramin. reg. infer. et mont. calid. frequens. — Ad coenob. Morača (Pč); Medun (Sz, Ro); Cetinje (Ba, Ro); Rijeka (Ba, Ro); Bar (Ba, Ro); Ulcinj, Vir, Podgorica, Danilovgrad, Andrijevica, coenob. Piva, Njeguši; inter Bukovica et Cetinje (Ro).  
 — — f. *compactus* A. GR. — Panicula densa ramis erectis saepissime unispiculatis. — Ad lac. Pošćensko jezero supra Šavniki (Ro).  
 — — var. *hyalinus* (SCHUR) A. GR. f. *puberulus* ROHL. II. Beitr. 31. — Vaginae dense puberulae; panicula ampla laxissima ramis plurispiculatis post anthesin valde patulis; spiculae

maiores 5—8-florae; glumella 8—10 mm longa glabra arista  
subaequilonga. — Ad Podgorica, Spuž et Danilovgrad (Ro).  
\*— f. *subsimplex* ROHL. IX. Beitr. 2. — Paniculae  
ramis post anthesin erectis (nec patulis) saepissime unispiculatis.  
— Ad Belveder pr. Cetinje (Kš).

6185. *B. racemosus* L. — In pratis humidis reg. infer.  
et montanae. — Mali Bostur sub m. Lovćen (Kš); Plavnica,  
Donja Zeta et Andrijevica (Ro).

6186. *B. mollis* L. — In pratis, ad vias region. infer.,  
mont., rarius subalp. — Cetinje, Danilovgrad (Pt, Ro); Nje-  
guši, Ulcinj, Bar, Rijeka, Podgorica, Šavnik, Goraňsko et  
Andrijevica (Ro).

— f. *leiostachys* HARTM. — Spiculae glabrae. — Cum  
typo non raro.

6187. *B. commutatus* SCHRAD. — In herbidis, ad  
vias et in incultis reg. infer., mont., rarius subalp. — Ulcinj,  
Rijeka, Podgorica, Andrijevica, Šavnik, Perućica sub m. Kom;  
nahija Katunska (Ro); Bar (Ro, Do).

— f. *apricorum* SIMK. — Spiculae dense breviterque velu-  
tino-pubescentes. — Ad Rijeka (Ro).

6190. *B. squarrosum* L. — In collibus siccis, in saxosis  
et lapid. reg. infer., montanae calid., rarius subalp. — Medun  
(Sz); Bar, Ulcinj, Rijeka, Vir, Podgorica, nahija Katunska, Nje-  
guši, Šavnik, coenob. Piva (Ro).

— f. *megastachyus* BORB. — Spiculae maxima, 16—24-  
florae. — Cum typo ad Rijeka (Ro).

— f. *puberulus* BECK. — Spiculae breviter pubescentes. —  
Borkovići distr. Piva cca 1400 m; in valle fl. Piva sub Goraň-  
sko; Njeguši et Andrijevica (Ro); in m. Kosa supra Bar, cca  
1000 m (Do).

— f. *villosus* (GMEL.) KOCH. — Spiculae ± villosae. —  
Ad Boljevići pr. Vir (Ro).

6192. *B. intermedius* GUSS. — In ruder., ad vias et  
in vineis reg. infer. mediterr. — Ad Bar, Rijeka et Drušići (Ro).  
— f. *polystachyus* VIS. — Rami paniculae elongati multi-  
spiculati. — Cum typo.

6194. *B. molliformis* LLOYD. — In incultis et aren.  
reg. infer. ad Bar (Ro).

*Brachypodium BEAUV.*

6197. *B. pinnatum* (L.) BEAUV. — In rupestr., gramin. siccis et dumet. reg. infer., mont. et subalp. — Sub clivo Mali Lonac supra Bar (Pč); sub m. Kom Kučki (Ho); Rijeka, Viljuša, Šavnik, coen. Piva, Danilovgrad, Andrijevica, Perućica sub m. Kom et ad latera montis Lovćen (Ro).

— f. *megastachyum* UECHTR. — Spiculae multo maiores multiflorae. — In vineis reg. infer. ad Godinje pr. Vir (Ro).

— var. *rupestre* (HOST) RCHB. — Folia glabra vaginis glabris vel parum ciliatis; glumella glabra, paleae aequilonga. — In sax. supra Bar (Ro).

— var. *caespitosum* (R. S.) KOCH. — Caespitosum; folia rigida glabra margine scabra; glumella glabra quam palea longior. — In dumetis ad Grahovo (Pč); Podgorica, Bogojeva glava supra Njeguši (Ro).

\*6198. *B. glaucovirens* (MURB.) FRITSCH. — In gramin. et dumet. reg. infer. et montanae. — Ad Bar et in m. Kosa supra angust. Sutorman (Do).

6199. *B. silvaticum* (HUDS.) R. S. — In silvis et dumetis reg. infer. et subalp. — Ad Andrijevica (Ho).

— f. *villosum* LEJ. et COURT. — Spicae, folia et caules dense pubescentes. — Ad latera m. Lovćen; Perućica sub m. Kom; Viljuša, coen. Piva, Danilovgrad, Vir, Boljevići, Rijeka (Ro).

6200. *B. ramosum* (L.) R. S. — In sax., gramin., vineis et dumetis reg. infer. mediterr. — Danilovgrad et Boljevići (Pč); supra Bar (Ro); Podgora pr. Vir (Eb).

6201. *B. distachyum* (TORN.) BEAUV. — In rupestr., herbid., ad vias reg. infer. mediterr. — Limljani distr. Crmnica (Pč); Nikšić (Ba); Ulcinj, Bar, Rijeka et Drušići (Ro).

— f. *monostachyum* (POIR.) GUSS. — In lapid. in campo Zeta pr. Podgorica (Ro).

— f. *multiflorum* WILLK. — Spiculae 12—24-florae, plerumque 4—5. — In gramin. ad Bar (Ro).

— f. *pubens* BECK. — Glumella pilis brevissimis aspera. — Ad Drušići et Bar (Ro).

*Agropyron* GAERTN.

6203. *A. caninum* (L.) BEAUV. — In silvis umbrosis et in fruticetis reg. mont. et subalp. — In valle flum. Tara et in Kukuraj brdo sub m. Kom (Pč); ad lac. Volujačko jezero distr. Piva (Ma); Bukovica sub m. Durmitor; Šavniki, Mražtinje in valle fl. Piva; Perućica sub m. Kom, Andrijevica (Ro). — var. *breviaristatum* BECK (conf. ROHLENA V. Beitr. 132). — Spiculae 2—3-florae, arista quam glumella brevior. — In alp. m. Durmitor locis Valovitiš et Dobri do (Ro).

— f. *flexuosum* (HARZ) K. MALÝ. — Vaginae pilis retrorsis hirtae. — Andrijevica; Zakamen supra coenob. Piva (Ro).

6205. *A. repens* (L.) BEAUV. — In agris, cultis, ruderatis et ad vias reg. infer., mont. et subalp. — Gvozd sub m. Vojnik (Pč), Bar (Ba), Viljuša, Njeguši, Andrijevica, Rijeka, Drušići; Žabljak sub m. Durmitor (Ro).

— f. *aristatum* (NEILR.) HAY. subf. *pubescens* (DOELL.) HAY. — Axis inflorescentiae ± pubescens. — Andrijevica; Drušići pr. Rijeka (Ro).

— f. *glaucum* (HOST) HAY. — Ad Bar (Ba).

× *A. intermedium* var. *virescens* × *repens*. — Inter parentes ad Njeguši et ad latera m. Lovćen (Pej, Ro).

\*× *A. junceum* × *repens* = *A. pungens* R. S. — In litora ad Novi Bar (Do).

\*6207. *A. intermedium* (HOST) BEAUV. — In gramin. siccis et in lapid. reg. infer. et mont. calidioris frequens.

— f. *hispidum* (A. G.) HAY. — Vaginae infer. setosopilosae. — Cum typo ad Njeguši frequens (Ro).

— f. *dubium* (GREMLI) HAY. — Glumae breviter acuminatae glabrae. — In vineis ad Godinje pr. Vir et ad Drušići pr. Rijeka (Ro).

— f. *aristatum* (SADL.) HAY. et subf. *longearistatum* (POSP.) HAY. — Cum typo non raro.

— f. *virescens* (PANČ.) HAY. — Planta tota viridis. — Frequens! Non raro etiam in forma glumellis breviter vel longiuscule aristatis = f. *aristatum* BECK (= f. *armatum* ROHL. VIII. Beitr. 28).

— var. *villosum* (SADL.) HAY. — Spiculae dense villosae; planta caesia. — Ad Podgorica (Ro).

\*6209. *A. junceum* (L.) BEAUV. — In aren. marit. ad Bar (Do).

\*— var. *Dostálíi* ROHL. — Foliorum vaginae densissime retrorsum velutinae, glumae 5—7—(9) nerviae. — Cum typo ad Novi Bar (Do).

### *Triticum* L.

6214. *T. ovatum* (L.) GR. G. — In vineis, aridis et ad vias reg. infer. mediterr. et mont. calid. — Ad Klopot distr. Bratonožići (Pč); Vir (Pč, Ro); Nikšić (Ba); Bar, Boljevići, Rijeka, Podgorica et Danilovgrad (Ro).

— var. *triaristatum* (WILLD.) A. GR. — Cum praeced. frequens. — Bar, Ulcinj, Vir, Boljevići, Rijeka et Podgorica (Ro, Do).

6215. *T. triunciale* (L.) GR. G. — In gramin. et ruder. reg. infer. medit. ad Bar (Ho, Ro).

\*6217. *T. uniaristatum* (VIS.) RICHT. — In gramin., lapidos. et incultis reg. infer. dic. medit. — Ad Bar et Podgorica (Ro).

*T. aestivum* L. et *T. turgidum* L. var. *durum* DESF. cultum.

6224. *T. villosum* (L.) M. B. — In gramin. siccis, lapid., in ruder. et ad vias reg. infer. et mont. calidioris frequens. — Cetinje (Pt, Ro); Medun (Sz); Rijeka (Ho, Ro); Bar (Ba, Ro); Ulcinj, Vir, Podgorica, Njeguši, Danilovgrad (Ro); Bioče et Lopate (Ja).

— f. *coloratum* ROHL. V. Beitr. 133. — Spiculae intense violaceo-coloratae. — In aren. et lapid. ad Podgorica versus confines Albaniae frequentissime! (Ro); Volovica pr. Bar (Do).

— f. *glabratum* (BORB.) A. G. — Spiculae minores, glumella tantum apice ad nervos pilosa, ceterum glabra. — Cum typo.

### *Secale* L.

6226. *S. montanum* GUSS. — A sequente dignoscitur radice perenni, spicae rachide fragili, glumis in apicem aristis formem cito (nec sensim) attenuatis, glumella indistincte trinervia, arista breviore (cca 10—15 mm longa). — In m. Lisa pr. Andrijevica (Ba); in m. Lovćen (To).

6227. *S. cereale* L. — Ubique cultum et saepe subsponsaneum.

*Hordeum* L.

6229. *H. europaeum* (L.) ALL. — In silvis humidis et umbr. reg. subalp. — Sub m. Kom Kučki (Ho); Ranisava et Pašina Voda sub m. Durmitor; supra coen. Piva; Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro); ad lac. Volujačko jezero distr. Piva (Ma).

6232. *H. vulgare* L. et *H. distichon* L. in agris cultum.

6234. *H. bulbosum* L. — In gramin. siccis reg. infer. dic. mediterr. — Ad Bar, Podgorica et Kokoti (Ro).

6237. *H. maritimum* WITH. subsp. *eumaritimum* HAY. — In aren. maritimis pr. Ulcinj (Ro).

\*— — — f. *pubiglumis* ROHL. Věstn. Kl. Přír. Praha 1921. — Spiculis pubescentibus. — Cum typo ad Ulcinj (Ro).

— — — subsp. *Gussoneanum* PARL. — Glumae spicarum lateralia inter se aequales aristiformes. — In gramin. ad Bar (Ro, Do).

— — — f. *hirtellum* DEG. — Glumella breviter pilosa. — Ad Bar (Ro, Do).

6238. *H. murinum* L. — In ruder., incultis et lapid. reg. infer. et mont. — Cetinje (Pt, Pč); Danilovgrad (Pč); Ceklin (Ho).

— — — subsp. *leporinum* (LK.) A. GR. — In rupestr., lapid., incultis et ad sepes reg. infer. et mont. calidioris frequens. — Medun (Sz); Cetinje (Ba); Podgorica, Njeguši, Bogetići, Nikšić, Dragovoljići, Ulcinj et alibi (Ro).

*Sesleria* SCOP.

6240. *S. auctumnalis* (SCOP.) FR. SCHULTZ. — In gramin., dumetis, silvis et rupestr. reg. infer., mont., subalp. in toto territorio.

6241. *S. nitida* TEN. — A praeced. differt: estolonosa; folia in mucronem levem cito (nec scabridum sensim) acuminate; panicula brevior (2—5 cm longa), sed crassior (cca 7—12 mm lata). — In rupestr. reg. infer., mont., subalp. et alp. — In valle fl. Morača et Tara (Pč); Njeguši, Krivačko ždrilo sub m. Lovćen, Spuž, Sutorman et in m. Javorje planina

(Ro); in m. Maglić Pivski (B); Fuša Rudnices sub Prokletija planina (Df).

— f. *montenegrina* BECK. — Humilior 20—25 cm alta; folia 2—3 mm lata, panicula 1,5—2 cm longa. — In alp. m. Hum Orahovski (Sz); in m. Kosa et Rumija supra Bar (Do).

— f. *stenophylla* BECK. — Folia angusta complicata 1—1,5 mm lata. — Sutorman supra Bar (B).

— f. *fallax* BECK. — Spica 2,5—5 cm longa, 1—1,5 cm lata; glumellae arista media 2—3 mm longa, laterales distinctae. — In m. Velki Maglić (Sz).

6247. *S. coeruleans* FRIV. (conf. ROHLENA VII. Beitr. 49). — A sequente dignoscitur glumella longius aristata (arista media quam glumella fere aequilonga vel parum brevior), aristae laterales distinctae cca 1—2 mm longae. — In rupestr. reg. subalp. et alpinæ. — Crna planina, Mali Durmitor, Kom (Pt, Ro); in m. Lovćen, Velka Jastrebica et ad Mrčenov do sub m. Kom (Pč); in m. Velki Maglić et Hum Orahovski (Sz); Građište supra Kolašin (Ba); Mokra planina distr. Kući; Sjekirica et Zeletin pr. Andrijevica; Bjelastica planina supra Kolašin; Korita rovačka (Ro).

6250. *S. coerulea* (L.) ARD. subsp. *varia* (JACQ.) HAY. — In rupestr. reg. subalp. et alp. — Ledenica planina et m. Maglić distr. Piva (Ro).

— f. *scabridula* ROHL. in FEDDE Rep. XVII: 33. — Culmi ancipites compressi scabriduli. — In alp. montis Maglić Pivski, cca 2200 m (Ro).

— subsp. *uliginosa* (OP.) HAY. — In turfos. ad lac. Barno jezero sub m. Durmitor cca 1550 m (Ro).

6254. *S. tenuifolia* SCHRAD. — In rupestr. reg. subalp. et alpinæ in toto territorio frequens.

— f. *interrupta* (VIS.) ASCH. et KAN. — Panicula elongata ad 5 cm longa ± interrupta. — Non raro cum typo.

— f. *pubiglumis* ROHL. SBGW. 1920. — Glumellis parte superiore breviter denseque puberulis. — In alp. m. Vojnik, Kom et Durmitor (Ro).

— f. *iuncifolia* (SUFFREN) MARCHES. — Culmi rigidiiores et elatiiores, folia crassiora 1—1,5 mm crassa. — Cum typo in alp. m. Maglić Pivski (Ro).

— — f. *longearistata* ROHL. l. c. — Arista terminalis glumellae elongata glumellam subaequans, dentes laterales aristati. — In subalp. Velki Krš supra Andrijevica cca 1200 m (Ro).

*Arundo* L.

6257. *A. Plinii* TURRA. — In lapid. et aren. marit. ad Bar et Ulcinj (Ba, Ro).

*Phragmites* ADANS.

6258. *P. communis* TRIN. — In palud. et ad ripas reg. infer. et subalp. — Ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); ad ripas lac. Scodrani et in valle fl. Zeta et Morača (Pč, Pt, Ro).

*Diplachne* BEAUV.

\*6260. *D. serotina* (L.) LK. — In lapid. reg. infer. mediterr. ad Bar (Ba).

*Molinia* SCHRK.

6261. *M. coerulea* (L.) MCH. — In pratis pinguibus reg. subalp. — Sub m. Durmitor (Pt, Pč, Ro); Pošćensko jezero supra Šavnik; Mratinje sub m. Maglić (Ro).

6262. *M. altissima* LK. — In fossis, frutic. et silvis reg. infer. et mont. — Ad Vir, Spuž, Danilovgrad et in m. Lastva čevska (Ro).

*Eragrostis* HOST.

6263. *E. megastachya* (KOEL.) LK. — In ruderatis reg. mont. calid. — Pračište distr. Katunska nahija (Ro); ad latera m. Lovćen (To).

6265. *E. minor* HOST. — In arenosis, lapidos. et ad vias reg. infer. — Rijeka (Pt); Vir (Pč); Danilovgrad (Pt, Ro); Spuž (Ro); Bar (Do).

6267. *E. pilosa* (L.) BEAUV. — In ruder., lapid. et ad vias reg. infer. et mont. — Rijeka (Kn); in valle fl. Tara (Pč); circa Podgorica et Spuž (Ro).

*Melica* L.

6272.-6273. *M. ciliata* L. subsp. *transsilvanica* (SCHUR) HACKEL var. *subaristata* ROHL. II. Beitr. 27. —

Gluma superior sensim in aristulam fere 2 mm longam acuminate. — In sax. ad Bar et Godinje pr. Vir (Ro).  
— subsp. *nebrodensis* (PARL.) COSS. — In sax. et lapid. e reg. infer. usque in alp. in toto territorio frequens.  
— f. *trebinjensis* (STROBL) A. GR. — Glumella ad ad nervos medianos pilosa. — Trešnja pr. Njeguši (Pej, Ro).  
— var. *Magnoli* (GR. G.) PANT. — In sax. reg. subalp.  
— Perućica sub m. Kom loco „Orlova Skala“ (Pt).

6277. *M. nutans* L. — In silvis et frutic. reg. subalp.  
— In valle Perućica sub m. Kom (Pt); Šavnik; Bukovica sub m. Durmitor; in m. Vojnik et Maglić Pivski (Ro).

6280. *M. uniflora* RETZ. — In silvis humidis et in dumet. reg. infer., mont. et subalp. — In valle fl. Tušina (Pč); Cetinje (Kn); Andrijevica, Ulcinj, Seljani pr. Vir, Drušići pr. Rijeka, Viljuša; ad lat. m. Lovćen, Ljut supra coen. Piva (Ro); in m. Kosa supra Bar (Do).

### *Briza* L.

6281. *B. maxima* L. — In gramin. et asperis reg. infer. et mont. calid. — Boljevići pr. Vir (Pč); Medun (Sz); Bar, Ulcinj, Podgorica, Rijeka, Drušići et in nahija Lješanska (Ro, Do); insula Lesandra et Vranina (Eb).

— f. *glabriflora* ROHL. V. Beitr. 130. — Glumellae omnes glaberrimae. — Cum typo frequens (Ro).

— f. *depauperata* ROHL. l. c. — Panicula depauperata 1–2 spiculata, spiculis glabris suberectis. — Cum typo in nahija Lješanska (Ro).

6282. *B. media* L. — In pratis reg. infer., mont., subalp. et alp. — Danilovgrad, Viruša dol; Kovčice sub m. Durmitor (Pt); Javorje planina et in m. Kom (Pč); Perućica, Hum Oraš hovski (Sz); Ceklin (Ho); in m. Lisa pr. Andrijevica (Ba); circa Andrijevica et in m. Vojnik (Ro).

— f. *albida* LEJ. — Spiculae virescenti-albidae. — Velestovo distr. Katunska nahija (Ro).

— var. *Horákii* ROHL. II. Beitr. 27. — Elatior, panicula paucis ramosa et paucispiculata, ramo in nodo infer. unico, spiculis typo multo maioribus (8–9 mm longis) 12–14 floris dense imbricatis. — In pratis alpinis. — In m. Kom (Ho, Ro); Sjeki-

rica et Balj supra Andrijevica; Konjsk planina (Ro). [Vix cum var. *elatior* (S. S.) HAL. identica.]

6283. *B. minor* L. — In pascuis et pratis reg. infer. dic. mediterr. — Ad Bar et Ulcinj (Ba, Ro).

### *Dactylis* L.

\*6287. *D. glomerata* L. subsp. *euglomerata* HAY. — In pratis, fruticosis et in silvis in tota dicione vulgaris.

— — — f. *scabra* (OP.) BECK subf. *abbreviata* DREJ. — Panicula densa ramis abbreviatis. — Non raro.

— — — f. *ciliata* PETERM. — Cum typo.

\*— — — f. *striata* O. KUNTZE. — Foliis albo-striatis. — Lukavica planina; Mratinje sub m. Maglić (Ro).

\*— — — f. *puberula* ROHL. SBGW. 1899. — Vaginae foliorum puberulae. — Cum typo ad Andrijevica (Ro).

— — — var. *montenegrina* ROHL. II. Beitr. 60. — Rhizoma longe repens, vaginae pilosae. — In humidis reg. subalp. ad Bukovica sub m. Durmitor (Ro).

— — subsp. *hispanica* (ROTH) ROHL. — In pratis et herbidis reg. inferioris et mont. calidioris frequens.

### *Cynosurus* L.

6288. *C. cristatus* L. — In pratis et gramin. reg. subalp. — Viruša sub Crna planina (Pt); in m. Ivica et sub m. Durmitor (Pč, Ro); Mokra sub m. Dziebeze (Sz); Rikavac distr. Kući; Carine sub m. Kom (Ba, Ro); ad coenob. Piva; in m. Balj et circa Andrijevica (Ro). Etiam alibi!

6289. *C. echinatus* L. — In gramin. siccis reg. infer., mont. et subalp., usque ad 1600 m. — Ad Cetinje (Pt, Kn); Boljevići (Pč, Ro); Njegusi (Sz, Kn, Ro); sub m. Kom (Ho, Ro); Šavnik, Pošćensko jezero, Borkovići distr. Piva; Gorańsko; Balj supra Andrijevica; Perućica et Štavna sub m. Kom Vasojevićki; Bar, Ulcinj, Vir, Podgorica (Ro); Bioče; supra coenob. Morača; in m. Pivljan; Kralje pr. Andrijevica; in m. Peh et Glave distr. Vasojevići (Ja).

— — f. *coloratus* ROHL. II. Beitr. 28. — Spiculae steriles cum aristis violaceae. — In m. Čevski Lisac cca 1000 m (Ro).

*Sclerochloa* BEAUV.

\*6293. *S. dura* (L.) BEAUV. — In aridis, arenosis et ad vias reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Podgorica et Golubovići; ad Resna distr. Katunska nahija cca 800 m (Ro).

*Poa* L.

6296. *P. annua* L. — In cultis, ruderatis et ad vias e reg. infer. in alp. ascendens (—1900 m!). — Danilovgrad, Crna planina (Pt); Javorje planina, vallis Tara (Pč); Ulcinj (Ba, Ro); Bar, Rijeka, Cetinje; Sjekirica planina (Ro). Verosimiliter etiam alibi.

6297. *P. iubata* A. KERN. OeBZ. XXIII: 6 (conf. ROHLENA V. Beitr. 134). — A *P. annua*, quam radice annua revocat, discedit culmis saepissime solitariis vel paucis, foliis angustioribus (cca 1 mm), spiculis violaceo-variegatis, glumis subaequalibus trinerviis, glumellis ovatis obtusis ad carinam et marginem dense et longe niveo-pectinato-ciliatis. — In aren. et humidis maritimis ad Bar et Ulcinj (Ro).

6298. *P. bulbosa* L. subsp. *eubulbosa* HAY. — In aren., lapid. et gramin. reg. infer., mont. et subalp. ubique frequens, rarius in f. *vivipara* KOEL.

— subvar. *pseudoconcinna* (SCHUR) A. GR. f. *colorata* HACK. — Spiculae multiflorae intense rubellae. — Ad Cetinje et Njeguši (Ro).

— subsp. *concinna* (GAUD.) HAY. — In sax. reg. mont. et subalp. — Grahovo (Pč); Treblješ luka pr. Lukavica planina (Ho).

6300. *P. minor* GAUD. — In glareosis et ad nivem liquefacentem reg. alp. — In m. Kom Kučki (Sz); Maglić Pivski usque ad 2300 m (Ro).

6302. *P. pumila* HOST. — In rupestr. et gramin. reg. mont., subalp. et alp. — In m. Lovćen (Huter); in m. Hum Orahovski et Velki Maglić (Sz); Cetinje (Kn); Lastva čevska, Čevski Lisac; Piperska Lukavica; Sutorman (Ro); in m. Rumija supra Bar (Do); in valle Vrbnica pr. Orak; ad Lever Tara et Krivi do distr. Piva; Savin Kuk in m. Durmitor (De, Si).

— f. *pallidiflora* (BECK) HAY. — Glumae pallidae. — In monte Balj et Sjekirica planina (Ro).

6305. *P. alpina* L. subsp. *badensis* (HAENKE) BECK  
var. *glaucescens* BECK. — Folia glauca, angustiora ad summum  
2 mm lata anguste cartilagineo-marginata. — In rupestr. et  
gramin. reg. subalp. et alp. — Lovćen, Maglić Pivski, Ledenica,  
Božur, coenob. Piva, Durmitor et Žoljevica pr. Andrijevica  
(Ro); Vermoš planina (Df).

— — — f. *brevifolia* (DC.) GAUD. — Folia non glauca, ba-  
salia valde abbreviata. — In alp. m. Kom (Pč).

— — subsp. *euaalpina* HAY. — In rupestr. et pascuis reg.  
subalp. et alp. in omnibus montibus frequens, saepe in f.  
*vivipara* L.

— — — subvar. *Rohlenae* HAY. Prodr. III: 263 (= f. *viridi-*  
*flora* HACK. ap. ROHLENA II. Beitr. 28 non BECK). —  
Culmus gracilis, ad 50 cm altus; folia tenuissima pilosa; pan-  
icula laxa spiculis viridibus; glumellae obtusiusculae. — In m.  
Čevski Lisac; inter Kotor et Njeguši (Ro).

— — — f. *acuminata* HACKEL. — Glumellae acuminatae  
apice saepe recurvae. — Ad Godinje pr. Vir (Ro).

— — — var. *pseudiubata* ROHL. III. Beitr. 63. — Panicula  
brevis ramis infimis binis; glumellae latiores apice obtusae. —  
In rupestr. m. Durmitor (Ro).

— — — var. *arnautica* ROHL. V. Beitr. 137. — Humilis, solum  
6 cm alta; foliis viridibus angustis (cca 1—1½ mm) plicatis, culmo  
saepissime usque ad paniculam foliato, ligula foliorum omnium  
(etiam inferiorum) elongata 2—3 mm longa, saepissime acuta;  
panicula densa brevi ovata, ramis 1(—2) spiculas gerentibus,  
spiculis infer. longiuscule, superioribus breviter pedicellatis, glu-  
mellis obtusis margine, dorso et in nervis pubescentibus. — In  
rupestr. summi montis Kom ultra 2300 m (Ro).

6307. *P. ursina* VELEN. (conf. ROHLENA V. Beitr. 136). — Ab affini *P. alpina* L. dignoscitur: culmis graciliорibus tenuis-  
simis, foliis angustioribus (basilibus cca 1 mm, caulinis cca 1,5  
mm latis), panicula oblonga angusta, densiore contracta apice  
± nutanti, ramis abbreviatis filiformibus, flosculis basi lana fere  
destitutis, glumellis ad margines sericeo-pilosis et late flavescentiis  
(vel fuscresentiis) scariosis. — In pratis et pascuis reg. alp. in  
Sjekirica planina supra Andrijevica (Ro).

6308. *P. cenisia* ALL. — In glareosis et rupestr. reg.  
subalp. et alp. — Mrčenov do sub m. Kom (Pč); in m. Lisa

pr. Andrijevica; m. Gradište supra Kolašin (Ba); Lovćen (Ad); Maglić Pivski (Ro, B); Kom, Durmitor (Ro).

6309. *P. compressa* L. — In ruder., incultis, fossis, ad vias et muros reg. infer., mont. et subalp. — Viruša dol sub Crna planina; Perućica sub m. Kom (Pt); Grahovo (Pč); Cetinje (Kn); Njeguši, Šavnik; Borkovići et Mratinje distr. Piva (Ro).

— subvar. *polynoda* A. GR. Syn. II/1: 421. — Boljevići, Godinje pr. Vir; Drušići pr. Rijeka (Ro).

6311. *P. nemoralis* L. — In silvis, dumetis et sax. reg. subalp. et alp., rarius infer. — Sub m. Durmitor (Pč, Ro); Hum Orahovski, Skrobotuša ad ped. m. Kukura et in valle Perućica sub m. Kom (Sz); in m. Kom Kučki (Ho); Božur planina et supra coenob. Piva; in m. Vojnik; Jerinja glava supra Andrijevica; Podgorica; Velestovo distr. Katunska nahija (Ro).

— f. *tenella* RCHB. — Flaccida; panicula flaccida laxissima, ramis capillaribus. — In umbr. sub m. Durmitor (Ro); Lovćen (Kš).

\* — var. *montana* KOCH. — In m. Durmitor (Pč).

— var. *glaucum* GAUD. (= var. *glaucescens* KERN.). — In sax. circa lacum Crno jezero sub m. Durmitor (Pt).

\* — var. *agrostoides* A. GR. Syn. II/1: 408. — Korita rovačka, Andrijevica (Ro).

\*6312. *P. palustris* L. — A cl. EBEL e Monten. indiscata, sed sine loci specialis notitia.

6314. *P. trivialis* L. — In pratis pinguibus reg. subalp, sub m. Durmitor (Pč).

\* — var. *multiflora* RCHB. subvar. *glabriflora* ROHL. — Glumellae glabrae basi sine pilis arachnoideis. — In humidis vallis Jelovica pr. Andrijevica (Ro).

6315. *P. silvicola* GUSS. — In lapid., ruder. et in frutic. reg. infer., mont. (rar. subalp.) frequens. — Circa Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Danilovgrad, Njeguši, Šavnik; Mratinje sub m. Maglić Pivski, coenob. Piva, m. Vojnik; Andrijevica; in valle fl. Tara (Ro); in valle Vrbnica pr. Orak distr. Piva (De, Si).

— f. *versicolor* (HAUSSKN.) HAY. — Spiculae et saepe culmi et vaginae violascentes. — Cum typo (Ro).

6316. *P. pratensis* L. subsp. *eupratensis* HAY. — In gramin. reg. infer. et mont. ad Velestovo distr. Katunska nahija et ad Plavnica (Ro).

— f. *anceps* GAUD. — In humidis ad Andrijevica (Ro).

— subsp. *angustifolia* (L.) HAY. — In pratis reg. infer. et subalp. — Velestovo, Bar, Andrijevica; sub m. Durmitor (Ro); ad lac. Volučko jezero (Ma).

\*— f. *puberula* BECK. — Vaginae dense breviter pubesrulae. — Cum typo sub m. Durmitor (Ro).

6317. *P. stiriaca* FRITSCH et HAY. — Supra lacum Crno jezero sub m. Durmitor; Pivska planina: Pišće, Lever Tara et Nedajno (De, Si).

— f. *Rohlenae* HAY. — Folia inferiora cum vaginis dense breviter puberula. — In silvis reg. subalp. 800—1200 m. — Ad lat. montis Balj pr. Andrijevica et supra coenob. Piva (Ro).

6319. *P. Chaixii* VILL. — In sax. silvat. reg. subalp. — Sub m. Durmitor (Pč, Ro); in m. Balj pr. Andrijevica (Ro). — f. *tubens* (MCH.) A. GR. — In alp. Štirni do pr. Lukavica planina (Ro).

6320. *P. hybrida* GAUD. — In silvis reg. subalp. dic. septentr. — Sub m. Durmitor (Pt, Ro); ad lat. m. Maglić Pivski versus Mratinje; in m. Vojnik (Ro); Piva planina: ad Nedajno (De, Si).

6322. *P. violacea* BELL. — In pratis et rupestr. reg. subalp. et alp. in dic. septentr. — Pavlova livada (Ho); in m. Durmitor: Velki Štulac et Srablje jezero; Konjsk planina; Lukavica (Ro); inter Plav et Dečani (Df); supra vallem Sušica distr. Piva (De, Si).

### *Glyceria* R. BR.

6323. *G. maxima* (HARTM.) HOLLMBG. — In palud. ad flum. Morača et ad rip. lac. Scodrani (Pč).

6325. *G. plicata* FR. — In palud., ad ripas et fontes reg. subalp. — Sub m. Žoljevica pr. Andrijevica; Berane; Črtov do sub Ledenica planina; Bukovica sub m. Durmitor (Ro).

\*— var. *depauperata* CRÉP. — Panicula subsimplex, fere raseemiformis. — Črtov do sub Ledenica planina (Ro).

6326. *G. fluitans* (L.) R. BR. — In fossis et palud. reg. infer. et subalp. — Danilovgrad (Pt); Vir (Pč); Konjuhe pr. Andrijevica (Ba).

— var. *spicata* (BIV.) FORM. — Panicula spiciformis, spiculae laterales subsessiles; glumella obtusiuscula, nervis parum prominentibus. — In humidis vallis Viruša sub Crna planina (Pt).

*Festuca* L.

6336. *F. vulgaris* (KOCH) HAY. (= *F. ovina* L. var. *vulgaris* KOCH). — In gram. et rup. reg. infer., mont. et subalp. — Viruša dol sub Crna planina (Pt); Cetinje (Pč).

— f. *laevifolia* (HACK.) HAY. — Folia levia. — In rupestr. ad Vir (Ro).

6339. *F. stricta* HOST var. *polita* HACK. — Folia levia. — In rupestr. et pascuis reg. subalp. et alp. dic. septentr. frequens; etiam in reg. infer. ad Bar! — Ledenica planina, Sinjavina, Žoljevica, Sjekirica, Mokro distr. Kući, Maglić Pivski, Štirni do sub Lola planina, Durmitor, Velki Štulac (Ro).

? 6340. *F. glauca* LAM. — In monte Kom (Pč). Certissime ad aliam speciem pertinet.

? 6341. *F. vaginata* W. K. — In sax. m. Javorje (Pč). Potius ad aliam spec. spectat.

6344. *F. Pančićiana* (HACK.) RICHT. — In lapid. reg. subalp. m. Vermoš planina ad fines Albaniae (Df). (Forma ± ad *F. sulcata* verg.)

6345. *F. dalmatica* (HACK.) RICHT. — In rupestr. reg. infer. et mont. calidioris. — Rijeka, Drušići; Velestovo; Bogojeva glava pr. Njeguši (Ro); in m. Lovćen (Kš).

6346. *F. sulcata* (HACK.) NYM. — In rupestr. et gramin. siccis reg. infer., mont. et subalp. in toto territorio frequens.

— f. *prorepens* ROHL. VI. Beitr. 2. — Rhizoma subrepens. — In aren. et lapid. ad Vir (Ro).

— f. *barbulata* (HACK.) RICHT. — Glumella dorso hispidula, margine longius ciliata. — Cum typo non raro.

— f. *saxatilis* (SCHUR) RICHT. — Caulis cum foliis levissimus. — Ad Bar et Boljevići (Ro).

— — f. *glaucantha* (HACK.) RICHT. — Spiculae glauco-pruinosae. — Velestovo distr. Katunska nahija (Ro).

6347. *F. vallesiaca* SCHL. — In pratis et gramin. siccis reg. infer., mont. et subalp. — Črtov do, Ledenica planina et Varda distr. Piva; ad Goraňsko et coenob. Piva; in m. Balj supra Andrijevica (Ro).

— — var. *pseudovina* (HACK.) HAY. — In gramin. et rupestr. reg. infer. ad Boljevići et Vir (Ro).

? 6349. *F. alpina* SUT. — In rupestr. m. Lovćen loco Jezerski vrh (Ho). Non vidi.

\*6353. *F. violacea* GAUD. subsp. *euviolacea* HAY. — In pascuis reg. alp. — In m. Kom et Durmitor (Pt, Pč, Ho, Ro, Sk).

\*— — var. *minor* HACK. — In pascuis reg. subalp. et alp. dic. septentr. — Kom, Durmitor, Ledenica planina, Maglić Pivski usque ad 2300 m (Ro).

— — — f. *mutica* ROHL. SBGW. 1920. — Glumellae obtusiusculae muticae. — Cum typo in subalp. Ledenica planina (Ro).

6354. *F. heterophylla* LAM. — In silvis reg. infer., mont. et subalp. — Boljevići pr. Vir; Danilovgrad; Andrijevica; Varda supra coenob. Piva; in m. Vojnik et Lovćen (Ro).

— — f. *leiophylla* (HACK.) RICHT. — Folia basalia ± levia. — Cum typo ad Danilovgrad (Ro).

6355. *F. Porcii* HACKEL var. *angustifolia* (HACKEL) KRAJINA. — Folia angustiora (1—1,5 mm lata), ligulae minus ciliatae. — In pratis subalp. et alp. Štirni do sub Lola planina et in Korita rovačka (Ro). Forsan species propria.

\*6356. *F. rubra* L. — In pratis et gramin. reg. mont. et subalpinae. — Kukuraj Brdo sub m. Kom (Pč); Andrijevica, Sjekirica planina, Črtov do sub Ledenica planina; Njeguši (Ro).

\*— — subsp. *fallax* (THUILL.) HAY. — In pratis ad Andrijevica (Ro).

6358. *F. varia* HAENKE subsp. *pungens* (KIT.) HAY. — In rupestr. reg. subalp. et alp. frequens. — Ledenica, Ranisava, Durmitor, Javorje, Maglić Pivski, Sinjavina, Sjekirica planina; Piperska Lukavica, Lovćen (Ro).

\*— var. *pseudoxanthina* ROHL. SBGW. 1920. (Non cum var. *chlorantha* BECK identica.) — Spiculis pallide stramineis, brevius aristatis, culmis et foliis tenuioribus gracilioribusque. — In rupestr. montis Kom Vasojevički et montis Lovćen; Durmitor supra Crno jezero (Ro); in m. Lisinj supra Bar (Ba ut *F. xanthina*).

6359. *F. xanthina* R. S. — In monte Lovćen (Pichler); in monte Kom (Pč). Meo sensu loca hic enumerata potius ad *F. pungentem* var. *pseudoxanthinam* ROHL. pertinent. Fuša Rudnices sub m. Prokletija (Df).

6360. *F. paniculata* (L.) SCHINZ et THELL. (= *F. spadicea* L.). — In pratis reg. subalp. et alp. — Sinjavina planina (Pt); Durmitor (Pč, Ht).

— f. *fibrosa* (GRIS.) HACK. — Vaginae foliorum inferemarcidae demum in fibras dissolutae. — In pasc. alp. m. Bjelastica planina, cca 1800—2000 m (Ro).

6362. *F. affinis* BOISS. et HELDR. var. *croatica* (HACK.) RICHT. — In pascuis et rupestr. reg. alp. et subalp. — In m. Lovćen (Ad).

— var. *coarctata* (HACK.) BECK subvar. *montenegrina* BECK. — Folia latiora 2—3 mm lata, saepissime plana. — In alp. m. Vojnik, Ranisava, Maglić Pivski et in Korita rovačka; Žanjev do sub m. Lovćen (Ro).

6363. *F. silvatica* (POLL.) VILL. — In pratis silvestr. reg. subalp. in m. Durmitor (Pč).

6365. *F. arundinacea* SCHREB. var. *pauciflora* HARTM. — Folia angusta, 2—4 mm lata elongata plana vel siccando subconvoluta; panicula strictior erecto-patula, ramo primario cca 5, secundario 2-spicato; glumellae aristatae, arista 2 mm longa. — In humidis et fossis reg. infer., subalp. et alp. — Ulcinj; vallis Jelovica, Korita rovačka, Štirni do, Sjekirica planina, Vojnik; Balj supra Andrijevica; Barno jezero sub m. Durmitor (Ro).

6366. *F. elatior* L. subsp. *pratensis* (HUDS.) HACK. — In pratis reg. infer., mont. et subalp. — Bar, Ulcinj, Rijeka, Podgorica; supra coenob. Piva; Njeguška planina in m. Lovćen (Ro).

— f. *subspicata* G. MEY. — Non raro cum typo (Ro).

6367. *F. gigantea* (L.) VILL. — In dumetis et fruticetis reg. subalp. — Supra coenob. Piva; ad ripas rivi Zaždrijelje potok sub Lola planina usque ad 1300 m (Ro).

[Adnot.: *F. dimorpha* GUSS. a cl. PANČIĆ e m. Lovćen, Javorje et Durmitor et a cl. HORÁK e m. Lukavica planina indicata; meo sensu loca hic enumerata potius ad *F. variam* subsp. *pungentem* pertinent.]

### *Vulpia* GMEL.

6368. *V. myurus* (L.) GMEL. — In cultis, ruderatis, arenosis et ad vias reg. infer., mont., rarius subalp. frequens. — Danilovgrad, Komani (Pt, Ro); Dobrsko selo pr. Cetinje (Pč); circa Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica; Velestovo distr. Katunska nahija; Andrijevica (Ro).

6369. *V. dertonensis* (ALL.) VOLKART. — In aren. et ruder. reg. infer. dic. mediter. — Circa Bar, Ulcinj et Podgorica (Ro).

\*6371. *V. fasciculata* (FORSK.) FRITSCH (= *V. uniglumis* DUM.). — In aren. marit. ad Ulcinj (Ro).

6372. *V. ciliata* (DANTH.) LK. — In aren., lapid. et incultis reg. infer. dic. mediterr. frequens. — Circa Bar, Ulcinj (Ba, Ro); Rijeka, Vir, Podgorica, Donja Zeta, Njeguši (Ro).

\*— f. *glabrescens* ROHL. II. Beitr. 30. — Glumellis spicularum in parte infer. paniculae glabrescentibus, superioribus tantum ciliatis. — Cum typo ad Boljevići pr. Vir (Ro). (Est forma ad var. *imberbem* VIS. transiens.)

### *Catapodium* LK.

6377. *C. lolium* (HUDS.) LK. — In aren. maritimis et locis apricis ad Bar et Ulcinj (Ba, Ro, Do).

### *Scleropoa* GRIS.

6379. *S. rigida* (L.) GRIS. — In gramin. siccis, rupestr., ad vias et muros reg. infer. dic. mediterr. et mont. calidioris. — Ad Cetinje, Rijeka et Danilovgrad (Pč, Ro); Njeguši (Gi, Ro); Ulcinj, Bar, Podgorica et Vir (Ro, Do); ad coen. Mošrača (Ja).

*Lolium* L.

6381. *L. temulentum* L. — Inter segetes reg. infer., mont. et subalp. — Njeguši (Pč); Bar et Ulcinj (Ba, Ro); Rijeka, Podgorica, Viljuša, Mratinje (Ro).

— f. *leptochaeton* A. BR. — Glumae flores supremos spiculae non superantes, arista tenuis, flexuosa glumella brevior. — Non raro cum typo (Ro).

— subf. *robustum* (RCHB.) KOCH. — Culmi scabri. — Cum typo (Ro).

— f. monstr. *ramosum* SM. — Spica ± ramosa. — Ad Mratinje et Viljuša (Ro).

6382. *L. siculum* PARL. — In gramin. et aren. reg. infer. dic. mediterr. — Circa Ulcinj et Podgorica (Ro).

6384. *L. perenne* L. — In gramin. et pratis reg. infer. et mont. — Cetinje (Pč, Kn); Grahovo (Pč); Farmaki pr. Podgorica cum f. monstr. *ramoso* SM. (Ro).

\*— var. *tenue* (L.) SCHRAD. — Spica angusta, spiculis multo minoribus 3—4-floris. — Ad Njeguši (Ro).

6385. *L. multiflorum* LAM. subsp. *italicum* (A. BR.) SCHINZ et KELL. — Inter segetes reg. infer. — Ad Bar et Ulcinj (Ro).

— f. *submuticum* MUT. — Non raro (Ro).

6387. *L. loliaicum* (BORY et CHAUB.) HAND.-MAZZ. (= *L. subulatum* VIS.). — In lapid. et aren. reg. infer. dic. medit. — Circa Ulcinj et Podgorica (Ro).

— f. *aristatum* (LINDB. f.) HAY. — Glumellae ± longissimae aristatae. — Non raro cum typo (Ro).

*Lepturus* R. BR.

6388. *L. cylindricus* (WILLD.) TRIN. — In aren. et lapid. reg. infer. mediterr. — Ad Štoj distr. Primorje (Ba); Podgorica (Ro).

*Psilurus* TRIN.

6392. *P. aristatus* (L.) DUV. — In incult., rupestr., collibus siccis et aren. reg. infer., mont. calidioris frequens, rarius ad vias reg. subalp. frequens. — Ad Ostrog et Vir (Pč, Ro); circa Bar, Ulcinj, Boljevići, Rijeka, Kokoti, Podgorica et Danilovgrad (Ro); Bioče (Df).

*Nardus* L.

6393. *N. stricta* L. — In pascuis reg. subalp. et alp. dic. septentr. frequens. — In m. Kom, Durmitor (Pč, Pt, Ro); Sinjavina planina (Ba, Ro); Velki Maglić distr. Kuči (Sz, Ba); Sjekirica planina, Ledenica, Lukavica, Konjsk planina; Bukovica sub m. Durmitor; Maglić Pivski (Ro); e mont. dic. merid. (Lovćen et Rumija) adhuc non vidi.

*Sieglungia* BERNH.

6394. *S. decumbens* (L.) BERNH. — In silvis, dumetis et pasc. reg. infer., mont. et subalp. — Danilovgrad, Viruša dol sub Crna planina (Pt); Žabljak sub m. Durmitor (Pč); in m. Sjekirica et Žoljevica pr. Andrijevica; Berane (Ro).

*Danthonia* LAM. et DC.

6395. *D. calycina* (VILL.) RCHB. — In pascuis et gramin. reg. infer., mont. et subalp. — Nikšićka Župa (Pč); Vizljuša, Jasenovo polje sub m. Vojnik; sub m. Kom; m. Balj, Piševac et Žoljevica pr. Andrijevica; Velestovo distr. Katunska nahija; Boljevići, Bar (Ro).

*Koeleria* PERS.

6398. *K. subaristata* (PANČ.) DOM. Monogr. Koel. 165 (= *K. grandiflora* var. *subaristata* PANČ. Elench. 97). — „Paleis inferioribus apice in mucronem longiusculum productis, aut soluto infra apicem nervo mediano sub apice aristulatis, palea tum integra aut bidentata; spiculae e maximis cum aristula (cca 1 mm et ultra) 8,5 mm longae“ (PANČ. l. c.). — In herbidis montis Kom (Pč).

6400. *K. splendens* PRESL. — In rupestr. et gramin. e reg. infer. usque in alp. ascendens. — In m. Velka Jastrebica (Pč); Durmitor (Ko); Cetinje (Kn); Pivljan supra Kolašin (Ja); in m. Lovćen (Ad, Pč); ad Bar, Njeguši, Drušići pr. Rijeka, Velestovo distr. Katunska; Ranisava, Vojnik, Borkovići, Ledenica planina; Kom (Ro); Sustaš pr. Bar (B); in m. Rumija supra Bar (Do).

— f. *colorata* DOM. — Spiculae violaceo-variegatae. — In m. Ranisava et Maglić Pivski (Ro).

— f. *interrupta* DOM. — Panicula tota verticillato-interrupta. — Ad Bar (Ro).

- f. *pyramidata* DOM. — Robusta; folia latiora cum vaginis glabra; panicula valde lobata, spiculis maioribus 6—8 mm longis. — Borkovići et Ledenica planina distr. Piva (Ro).
- subf. *longiglumis* DOM. — Spiculae maxima 9 mm longae 3-florae, glumis et glumellis longe acuminatis. — In sax. marit. ad Bar loco Volovica (Ba).
- f. *fallacina* DOM. — Innovationes minus incrassatae; culmi glaberrimi. — In rup. reg. infer. — Ad Bar (Ro).
- f. *atherophora* DOM. — Glumellae mucronato-aristatae. — Čevski Lisac distr. Katunska, in m. Maglić Pivski (locis pluribus —2000 m), Črtov do sub Ledenica planina, cca 1900 m (f. *colorata* DOM.), in m. Durmitor locis pluribus (—2300 m); hic adsunt pluriores maxima ex parte grandispiculatae, paniculis minus densis excellentes, praeter alias f. *coloratae* quoque et formae parte vegetativa f. *pseudorigidulae* respondentes (DOMIN l. c. 95) (Ro). In m. Durmitor loco Lokvica 1800—1900 m (Ko fide MALÝ); supra lacum Crno jezero (De, Si).
- subf. *verticillata* ROHL. II. Beitr. 27. — Panicula verticillata-interrupta, spiculis subsessilibus. — In rupestr. ad Bar et Velestovo (Ro).
- subf. *pubiculmis* DOM. — Culmi superne molliter pubescentes. — In m. Ranisava cca 1700 m (Ro).
- f. *pseudorigidula* DOM. — Densissime caespitosa; folia basalia glauca glabra anguste convoluta. — In alp. m. Velki Maglić (Sz); Ledenica planina (± ad f. *atherophoram* verg.) (Ro); in m. Durmitor loco Čvorov Bogaz (Ko teste MALÝ).
- f. *pubescens* DOM. subf. *subpubescens* (ROHL.) DOM. — Vaginis foliorum infer. molliter dense breviter pilosis, foliis nonnullis pro more pubescentibus. — In reg. mont., subalp. et alpina. — Šavniki, coenob. Piva et m. Maglić Pivski (Ro).
- subf. *microstachya* DOM. — Vaginis infimis breviter pubescentibus, foliis innovationum nonnullis saepe pubescentibus, spiculis diminutis cca  $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$  mm longis. — Ad coenob. Piva (Ro).
- f. *canescens* (VIS.) G. BECK. — Folia glauca glabra, spiculae cca 5—6 mm longae, glumis glumellisque undique vel dorso hirsutis usque villosis. — In valle fl. Piva ad coenob. (subf. *exaltata* DOM. foliis longioribus plurimis planis) (Ro).
- var. *subcaudata* (ASCH. et GR.) DOM. — Humilior ad 55 cm alta; folia glauca, basalia brevia convoluta glabra;

panicula angusta densa, spiculae minores 3,5—4,5 mm longae. — In reg. infer., mont. et subalp. — Collis Volovica pr. Bar (B); insula Vranina in lacu Skadarsko jezero (Eb); Podgorica, Katunska nahija, Farmaki, Lješko polje; Mali Štulac sub m. Durmitor (cca 1600 m); supra coenob. Piva (Ro); ad Neđajno in Pivska planina (De, Si).

— var. *durmitorea* DOM. — Densissime caespitosa; culmi graciles humiliores (—30 cm alti) saepe violaceo-colorati; folia basalia abbreviata 1—4 cm longa, plerumque convoluta, vaginis glabris saepe violaceo-suffusis; panicula brevis, minus densa; spiculae intense violaceo-coloratae glabrae, glumellis sub-aristatis. — In monte Durmitor locis pluribus cca 1800—2000 m; Maglić Pivski forma spiculis minus intense coloratis glumellis aristulatis, aristulis fere 1 mm longis (Ro).

6404. *K. gracilis* PERS. — In gramin. reg. mont. et subalp. — In m. Lovćen (Pč); ad Njeguši (Pej, Ro); Jastreštica (Ad); Carine sub m. Kom (Pt); in m. Lisa pr. Andrijevica (Ba).

— f. *colorata* (HEUFF.) DOM. — Folia mollia parum glauca, basalia brevia; culmi superne longe nudi; spiculae violaceo-coloratae. — In pratis siccis ad Andrijevica cca 900 m (Ro).

— f. *Rohlenae* DOM. l. c. 193. — A praeced. dignoscitur culmis humilioribus fere usque ad apicem vel conspicue supra medium foliatis, vaginis tantum infimis breviter dense pubescens tibus, panicula minus colorata angustiore. — In pratis subalp. ad Andrijevica et in Sjekirica planina cca 1000—1600 m (Ro).

6406. *K. phleoides* (VILL.) PERS. — In arvis, incultis et inundatis reg. infer. mediterr. ad Bar, Ulcinj, Rijeka et Podgorica frequens (Ro).

— f. *robusta* BORB. — Elatior, panicula robusta semper lobata, lobis infer. elongatis. — Cum typo ad Ulcinj, Rijeka et Podgorica (Ro).

— f. *glabriflora* TRAUTV. — Spiculae glabrae vel glabrescentes. — Ad Rijeka et Bar (Ro).

— f. *multiaristata* ROHL. II. Beitr. 27. — Glumellae in spicula omnes aristatae. — Non raro cum typo (Ro).

6408. *K. pubescens* (LAM.) BEAUV. — In aren. dic. medit. ad Bar (B, Grimburg, Do).

*Trisetum* PERS.

6410. *T. flavesens* (L.) BEAUV. subsp. *pratense* (PERS.) A. GR. — In pratis et inter segetes reg. subalp. — Kovčice sub m. Durmitor (Pt); Bukovica et lac. Barno jezero sub m. Durmitor (Ro); Črtov do et Varda sub Ledenica planina distr. Piva (Ro).  
— — f. *variegatum* (M. K.) ASCH. — In alp. Lukavica planina (Ho).

— — f. *glabratum* ASCHERS. — Korita rovačka pr. Lukavica planina (Ro).

? — — subsp. *fuscum* (KIT.) HACK. — In gramin. reg. alp. in m. Javorje (Pč). (Sec. cl. HAYEK dubium.)

6411. *T. alpestre* (HOST) BEAUV. — In pratis reg. subalp. — Ad pagum Kovčice et ad lac. Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt). Non vidi.

\*6414. *T. distichophyllum* (VILL.) BEAUV. subsp. *albanicum* (JÁV.) HAY. — In rupestribus et glareosis montis Kom Kučki et Kom Vasojevićki, cca 1800—2200 m (Ro). — Specimina a me lecta foliis viridibus planis margine ciliato-scaberulis supra glabris, nervis minus prominulis cum descriptione (JÁVORKA Magy. Bot. Lap. 1919) bene congruant, sed in eodem loco legi plantas, quae foliis margine sublevibus et iis surculorum sterilium glaucis rigidis apice pungentibus a typo vix differunt. Sed etiam in Alpibus Europae mediae occurruunt plantae, quae folia viridia mollia supra ± glabra, margine scabra habent ut in *T. \*albanico*.

\*6415. *T. myrianthum* (BERTOL.) PARL. — Ab omnibus spec. praeced. dignoscitur radice annua, spiculis minutis saepissime 2-floris, glumellis 1—1,5 mm longis. — In aren., lapid. et cultis reg. infer. — Ad Šestani distr. Primorje (Ba); ad Rijeka, Drušići, Kokotí, Lješko polje, Farmaki, Podgorica, Spuž et Danilovgrad (Ro).

*Ventenata* KOEL.

6417. *V. dubia* (LEERS) F. SCHULTZ. — In pratis siccis reg. mont. et subalp. — Velestovo distr. Katunska; Anđrijevica (Ro).

*Avena* L.

6421. *A. compacta* B. H. — Dense caespitosa; folia setaceo-convoluta subpungentia cca 0,5 mm crassa, vaginis emortuis nitidis dilute fuscis; ligula lanceolata cca 1 mm longa; panicula racemiformis brevis, ramis brevibus, unispiculatis stricte erectis; glumae acuminatae subaequales (3)—5(—7) nerviae late scarioso-marginatae; axis longe pilosa; glumella dorso pilosa apice profunde bifida dentibus lanceolato-aristatis infra medium arista basi complanata demum torta provisa. — In rupestr. reg. subalp. et alp., rarius inferioris. — Sub m. Vučji Zub-Bijela Gora (Pč); Lisinj, Rumija et Medjurečka planina pr. Bar; in m. Velki Maglić distr. Kuči (Ba); in m. Kom, Ranisava, Durmitor (Valoviti et Dobri do); Ledena planina et Maglić Pivski (Ro). Rarius in reg. inferiore: in rupestr. riparum fl. Morača supra Podgorica (Ro); in m. Kosa supra Bar (Do).

\*6422. *A. Blavii* ASCH. et JKA. — A praeced., cui affinis, differt: laxe caespitosa; culmi rigidiores superne saepissime scabri; folia cca 2 mm lata, ligula elongata ad 4 mm longa; panicula longior (usque 20 cm), rami longiores (usque 1—1,5 cm), glumae inaequales 3-nerviae. — In sax. reg. alp. in m. Durmitor loco Vališnica do et supra lac. Srablje jezero; Ledena planina; Maglić Pivski (Ro); Savin Kuk in m. Durmitor (De, Si).

6425. *A. versicolor* VILL. — In rupestr. reg. alp. — In m. Durmitor jugo Šljeme (Pč); Mali Maglić distr. Kuči (Sz); Vratlo supra Kolašin (Ba); in summo monte Kom Vašojevićki et in Bjelastica planina (Ro).

6426. *A. pubescens* HUDS. — In pratis reg. subalp. et alp. — Sjekirica planina; Kom, Perućica (Ro). Occurrunt formae foliis ± glabrescentibus ad var. *alpinam* GAUD. vergentes.

— f. *flavescens* GAND. — In pratis montanis ad Krivi do distr. Piva (De, Si).

6427. *A. pratensis* L. — In sax. reg. subalp. — Sub monte Durmitor versus jugum Štulac (Pč).

? 6428. *A. alpina* SM. — In pratis sub m. Durmitor (Pč). An ne ad *A. pubescentem* var. *alpinam* pertinet?

6430. *A. sterilis* L. — In cultis, vineis et gramin. reg. infer. mediterr. — Dujevo (Ho); circa Bar, Ulcinj, Boljevići, Drušići et Rijeka (Ro).

\*— f. *hirsutior* ROHL. II. Beitr. 26. — Glumellae usque ad apicem, aristae in parte inferiore longe hispidae. — Rarius cum typo (Ro).

— var. *Ludoviciana* (DUR.) HUSNOT. — Spiculae multo minores, saepissime biflorae, glumae cca 20—25 mm longae. — In gramin. reg. infer. ad Mosori et Kokoti pr. Podgorica (Ro).

\*6431. *A. fatua* L. — In gramin. reg. infer. — Insula Vranina (Eb).

6432. *A. sativa* L. — Ubique culta.

— var. *diffusa* (NEILR.) A. G. — Culta ad Podgorica (Ro).

6434. *A. barbata* GOTTL. — In cultis, lapidos., sterilibus et ad sepes reg. infer. et mont. calidioris frequens. — Ad Cetinje et Grahovo (Pč); circa Bar, Ulcinj, Rijeka, Drušići et Podgorica (Ro). Confer ROHLENA II. Beitr. 25.

### *Arrhenatherum* BEAUV.

6438. *A. elatius* (L.) M. K. — In pratis et herbidis reg. mont. et subalp. — Lovćen (Ho); Ledenica planina, coen. Piva, Njeguši (Ro); inter Cetinje et Podgora (Eb).

— f. *piliferum* BECK. — Vaginae infer. hirtae; glumellae sparse pilosae. — Bogojeva glava pr. Njeguši (Pej, Ro).

— f. *biaristatum* PETERM. — Etiam glumella floris superiores in paniculae ramis ut in f. *biaristato*, ceterae ut in typo. — In alp. Štirni do sub Lola planina (Ro).

\*— f. *mutable* ROHL. VIII. Beitr. 3. — Solum spiculae superiores in paniculae ramis ut in f. *biaristato*, ceterae ut in typo. — Ad Žanjev do pr. Njeguši frequens (Ro).

### *Holcus* L.

6442. *H. lanatus* L. — In pratis humidis, in silvis reg. infer., mont. et subalp. — Piperi, Burone (Pt); in m. Javorje planina (Pč); Mratinje, Šavnik, Pošćensko jezero, Andrijevica, Berane, Njeguši, Cetinje, Godinje et Rijeka (Ro).

6443. *H. mollis* L. — Inter segetes reg. subalp. — Bukovica sub m. Durmitor; Perućica sub m. Kom; Mratinje sub m. Maglić (Ro).

*Deschampsia* BEAUV.

6445. *D. caespitosa* (L.) BEAUV. — In pratis humidis, in spongiosis, ad ripas et fruticetis reg. subalp. et alp. — Sub m. Durmitor (Pč, Ro); Perućica sub m. Kom (Pt, Sz, Ro); Mali et Velki Maglić; Mokro sub m. Dziebeze (Sz); Lovćen, Lukavica planina (Ho); Rikavac distr. Kući; Velika distr. Vasojevići (Ba); ad lac. Volujačko jezero et Poljana distr. Piva (Ma); Sjekirica planina; Andrijevica (Ro).

— var. *montana* (RCHB.) HAY. — Humilior; panicula magis contracta; spiculae maiores violaceo-coloratae. — In pratis et pascuis montis Maglić Pivski (Ro).

— var. *montenegrina* ROHL. III. Beitr. 60. — Spiculis majoribus (6—7 mm longis) saepissime 3-floris fusco-violaceis arista glumellam superante panicula subcontracta. — In alp. Štirni do sub Lola planina et in Konjsk planina (Ro).

6446. *D. media* (GOU.) R. S. — Ab *D. flexuosa* distinguuntur: densius caespitosa; folia rigida glauco-pruinosa; ligula acuta elongata (usque 8 mm longa), arista quam glumella brevior indistincte geniculata. — In gramin. et lapid. reg. infer. et mont. calid. — Cetinje (Kn); Danilovgrad; Bogetići, Nikšić, coen. Piva (Ro).

6447. *D. flexuosa* (L.) TRIN. — In muscosis et pratis silvaticis reg. subalp. et alp. — Supra Kolašin (Pč); Mali Maglić (Sz); Kom (Ho, Ro); Suhi vrh pr. Kom (Ba); Sjekirica planina, Ranisava, Maglić Pivski (Ro).

\*— f. *Legei* RICHTER. — Spiculis pallidis albescensibus; glumis pellucidis. — Cum typo in monte Maglić Pivski (Ro).

\*— f. *brachyphylla* GAY. — Folia multo breviora, panicula laxior. — In formis approximatis ad Andrijevica et in m. Kom (Ro).

*Aira* L.

6450. *A. capillaris* HOST. — In incult., pascuis, lapid. et aren. reg. infer., mont., rarius subalp. — Danilovgrad (Pt); circa Ulcinj, Bar, Podgorica et Viljuša; etiam in m. Balj supra Andrijevica (Ro); Kralje sub m. Kom (Ja).

— f. *ambigua* (DE NOT.) ASCHERS. — Glumellae florum amborum aristatae. — Ad Podgorica, Andrijevica, Bar et Njegusi (Ro); Bioče (Df).

*Calamagrostis* ADANS.

6460. *C. pseudophragmites* (HALL. f.) BAUMG. — In fruticetis ad ripas fl. Zlorječica, Lim et Peručica pr. Andrijevica (Ro).

6462. *C. epigeios* (L.) ROTH. — In silvis, ad ripas reg. infer. et subalpinæ. — Cetinje, Danilovgrad (Pč); sub m. Kom Kučki (Ho); ad lat. m. Vojnik (Ro).

6464. *C. varia* HOST. — In gramin., frutic. et silvat. reg. subalp. et alp. — Lovćen (Ad); Maglić Pivski, Durmitor loco Dobri do et ad lac. Barno jezero; Pošćensko jezero supra Šavniki; Pivska planina; m. Vojnik, Bukovica sub m. Durmitor (Ro); Bijela Gora (Pč); Crvena Stijena sub m. Durmitor (Pč); in m. Kom (Ho).

\*— f. *inclusa* TORGES. — Aristae breviores e glumis non exsertae. — Frequentior ac typus (Ro).

\*— f. *argentea* TORG. — Spiculae pallidae, albescentes. — In silvis sub m. Durmitor ad lac. Crno jezero (Ro).

6465. *C. arundinacea* (L.) ROTH. — In silvis et dumetis reg. subalp. et alp. — Sub m. Durmitor (Pč); in sax. silvae Skrobotuša ad pedem m. Kukura distr. Kuči (Sz). An ne ad spec. praeced. pertinet?

*Ammophila* HOST.

6466. *A. arenaria* (L.) LK. var. *australis* (MABILLE) HAY. — In arenosis maritimis ad Štoj et Ulcinj distr. Primorje (Ba, Ro).

*Apera* ADANS.

6467. *A. spica-venti* L. — In agris, gramin. et ad vias reg. mont. et subalp. — Piperi (Pt); Andrijevica; inter coen. Piva et Goraňsko; Borkovići distr. Piva; Jasenovo polje sub m. Vojnik (Ro).

*Agrostis* L.

6469. *A. verticillata* VILL. — Habitu *A. albae* similis, sed dignoscitur: folia saepissime glaucescentia: ligulae breviores (2–4 mm) obtusae ad apicem denticulatae; panicula densiuscula saepe lobata ramis subverticillatis fere ad basin spiculis obsitis; glumae dense breviter appresse pubescentes (rarius so-

lum scabrae). — In incultis et humidis reg. infer. — Circa Bar (Ro).

6471. *A. alba* L. — In fossis, pascuis, ad ripas et in silvis humidis e reg. infer. usque in subalp. ascendens. — Sub m. Durmitor (Pč, Ro); Andrijevica (Ho).

— f. *flavida* (SCHUR) A. GR. — Spiculae pallidae. — In ulig. ad Spuž et Danilovgrad (Ro); Bar (Do).

— f. *gigantea* GAUD. — Elatior, ultra 1 m alta, folia latiora 4–11 mm lata; panicula ampla, laxa. — Njeguši, coenob. Piva; in m. Maglić Pivski et Ranisava (Ro).

— f. *stolonifera* SM. — Caules prostrati. — Sub m. Durmitor (Pč).

— f. *coarctata* (HOFFM.) RCHB. — Panicula contracta; folia convoluta. — In reg. infer. et mont. calid. — Ad Grahovo et Vir (Pč); Cetinje (Kn).

6472. *A. capillaris* L. — In pratis, silvis reg. infer., subalp. et alp. — Danilovgrad; Viruša dol sub Crna planina; Kovčice sub m. Durmitor (Pt); in monte Maglić Pivski (Ro).

? — f. *humilis* A. GR. — An *A. vulgaris* var. *pumila* PARLAT. in PANTOCSEK Adnot. 17 „in pratis vallis Viruša dol et in pasc. montis Mali Durmitor“ indicata? (Verosim. loca Pantocsekiana hic enumerata partim ad *A. \*byzantinam* pertinent.)

6473. *A. castellana* BOISS. et REUT. subsp. *eucastellana* HAY. (= *A. vulgaris* var. *aristata* GRIS. ap. PANT. Adn. 17). — In gramin. et frutic. ad Danilovgrad (Pt, Ro); Podgorica, Spuž (Ro).

— subsp. *byzantinā* (BOISS.) HACKEL. — Habitu *A. capillari* similis, sed dignoscitur foliis anguste linearibus (cca 1–1,5 mm latis), ligula longiore (cca 1 mm longa), panicula oblonga semper contracta; glumella glumis tertia parte\*) brevior. — In herbidis et pratis siccis e reg. infer. usque in alp. ascendens. — In m. Kom (Ho, Ro); Podgorica, Spuž, Danilovgrad, Farmaki, Lješko polje, Drušići; Simunj et Lastva čevska distr. Katunska; Kapa supra Njeguši, Lovćen; Črtov do sub Ledenica planina; Piševo et Sjekirica planina supra Andrijevica (Ro).

\*) Non „ter“. Confer. HAYEK Prodr. Fl. Balk. III: 333 et ASCH. GRAEB. Synopsis II. 1: 188.

\*6474. *A. canina* L. f. *nobilis* (DE NOT.) PARL. — Spiculae parvae truncatae; glumella cum arista brevi glumis non longior. — In m. Jastrebica (Ad fide HALÁCSY).

6476. *A. rupestris* ALL. — In rupestr. reg. alp. dic. septentr. — Bijele Carine sub m. Kom (Pt); Mali et Velki Maglić distr. Kuči (Sz); Crna planina et Planinica distr. Kuči; Crvena Ploča in Sinjavina planina (Ba); in m. Kom et Durmitor (Ro).

### *Gastridium* BEAUV.

\*6477. *G. ventricosum* (GOU.) SCHINZ et THELL. — In gramin., collibus apricis et in aren. reg. infer. — Ad Rijeka (Ho, Ro); circa Bar, Ulcinj, Podgorica et Drušići (Ro; conf. ROHLENA II. Beitr. 23); Podgora pr. Vir (Eb).

### *Polygongon* DESF.

\*6481. *P. maritimus* WILLD. — In aren. marit. ad Novi Bar (Do).

\* — — f. *lobatus* ROHL. et DOSTÁL. — Panicula usque ad 1,5 cm lata et evidenter lobata ut in *P. monspeliensi*. — Cum typo (Do).

### *Lagurus* L.

6484. *L. ovatus* L. — In arenos. marit. et lapid. reg. infer. — Ad Boljevići (Pč); circa Bar, Ulcinj et Štoj distr. Primorje (Ba, Ho, Ro, Do).

### *Alopecurus* L.

6487. *A. Gerardii* VILL. — Ab *A. pratensi* differt rhizomate crasso vaginis demum in fibras solutis vestito, foliorum vaginis magis inflatis, panicula breviore globosa vel ovata cca 1 cm longa, glumis liberis sericeo-villosis breviter aristatis, glumella quam gluma parum breviore albo-membranacea oblique truncata infra medium arista brevi (cca 1 mm) obsita. — In gramin. et pascuis reg. alp. — In m. Kom et Durmitor (Pt, Ro); in sax. Mrčenov do sub m. Kom (Pč); Zeletin supra Andrijevica; Jablan vrh supra Kolašin; Maglić Pivski (Ro). — — var. *Pantocsekii* ROHL. III. Beitr. 60. — Folia valde glaucescentia rigida, inferiora falcato-recurva; glumae sine arista 5 mm longae in aristam sensim attenuatae, arista longior quam in typo

(cca 3 mm), arista glumellae 3—5 mm longa glumellas superans. — In pasc. alp. m. Durmitor loco Vališnica do (Ro).

6489. *A. pratensis* L. — In pratis reg. subalp. — Sub m. Durmitor (Pt, Pč); Borkovići distr. Piva; Piperska Lukavica (Ro).

6491. *A. geniculatus* L. — In palud. et fossis reg. subalp. — Sub m. Durmitor (Pč).

6492. *A. aequalis* SOBOL. — In aquis stagnantibus reg. mont. ad coenob. Piva (Ro).

\*6493. *A. creticus* TRIN. var. *submuticus* ROHL. II. Beitr. 22. — A sequente dignoscitur vaginis ± dilatatis, glumis ad  $\frac{4}{5}$  connatis ad carinam superne multo latius alatis, glumellis truncatis; in var. *submutico* ROHL. II. Beitr. 22 muticis vel superioribus breviter (1—2 mm) aristatis. — In palud. reg. infer. ad Ulcinj (Ro).

6494. *A. myosuroides* HUDS. — In incultis reg. infer. ad Bar (Ro).

6496. *A. utriculatus* PERS. — In incultis, pratis humidis, in fossis et ad rivulos reg. infer. et mont. calidioris frequens. — Danilovgrad (Pt, Ro); Cetinje (Pč, Ro); Njeguši (Ld, Ho, Ro); Bar, Ulcinj, Vir, Rijeka, Podgorica, Spuž et Danilovgrad (Ro).

### *Heleochnloa* HOST.

6497. *H. alopecuroides* (PILL. et MITTERP.) HOST. — In inund., fossis et ad ripas reg. infer. et mont. — Cetinje (Pč); Rijeka (Kn); Vir (Ho).

6498. *H. schoenoides* (L.) HOST. — In aren. humidis et ad ripas lacus Scodrani pr. Vir et Rijeka (Pč, Kn).

### *Phleum* L.

6500. *Ph. echinatum* L. — In lapid. et arenosis reg. infer. et mont. calid. — Grahovo (Pč); Vrojca pr. Medun (Ba); inter Kotor et Njeguši (Ro).

6501. *Ph. alpinum* L. — In pratis et pasc. reg. subalp. et alp. dic. septentr. — Crna planina et in m. Kom (Pt); Durmitor (Pč); Velki Maglić, Mokra sub m. Dziebeze, m. Vila;

vallis Perućica (Sz); Maganik, Treblješ luka (Ho); in m. Lisa pr. Andrijevica (Ba); Sjekirica planina, Zeletin (Ro).

\* — f. *flavescens* SCHUR OeBZ. 1859: 16. — Spiculae virides. — In monte Zeletin supra Andrijevica (Ro) (confer ROHLENA V. Beitr. 124).

— — f. *subhirsutum* ROHL. III. Beitr. 59. — Rhizoma repens, culmi elati, vaginae superiores appresse hirsutae. — In pratis alp. Piperska Lukavica (Ro).

— — f. *subalpinum* HACK. — Culmi elati; panicula 4—8 cm longa; arista quam glumae dimidio brevior. — Carine sub m. Kom (Ba).

\* — var. *commutatum* (GAUD.) RICHT. — Panicula ovata vel breviter cylindrica; aristae tantum brevissime denticulatae. — In pasc. subalp. et alp. — Ledenica et Božur planina distr. Piva; Vališnica in m. Durmitor (Ro).

6502. *Ph. pratense* L. — In pratis et gramin. reg. infer., mont. et subalp. — Viruša dol; Kovčice et Riblje jezero sub m. Durmitor (Pt); Danilovgrad (Pč); Kom Kučki (Ho); Crvena Ploča in Sinjavina planina (Ba); Njeguši; Jerinja glava pr. Andrijevica (Ro).

— — var. *nodosum* (L.) SCHREB. — Frequentius ac typus. — Cetinje (Pt); Barno jezero sub m. Durmitor; Šavniki, Mračtinje, Vojnik, Lovćen (Ro).

— — var. *debile* VELEN. — Culmi humiles, graciles; panicula gracilis 1—4 cm longa, 4—5 mm lata; spiculae minores 2—3 mm longae, carina minus ciliata, in mucronem brevem cca 0,5 mm longum abeunte. — Rijeka, Šavniki, Jerinja glava, Čevski Lisac (Ro); Bostur in m. Lovćen (Kš).

6503. *Ph. phleoides* (L.) SIMK. — In gramin. siccis, in vineis et rupestr. reg. mont. et subalp. — Ad Klopot distr. Bratonožići (Pč); Sutorman supra Bar (Ba); Balj supra Andrijevica; coenob. Piva; Varda distr. Piva (Ro).

— — f. *ciliatum* (ČEL.) HAY. (Conf. ROHLENA II. Beitr. 22). — Glumae carina distincte ciliata. — In collibus siccis ad Podgorica (Ro).

6504. *Ph. paniculatum* HUDS. — In aren. et lapid. ad rip. fl. Lim pr. Andrijevica cca 800 m (Ro).

6505. *Ph. montanum* C. KOCH. — A *Ph. pratensi* et *phleoides* dignoscitur glumis apice sensim attenuatis (nec trun-

catis), a posteriore praeterea etiam glumis ad carinam longe ciliatis discedit. — In rupestr. et lapid. reg. infer., mont. et subalp. — Podgorica, Šavnik; ad ped. m. Balj pr. Andrijevica (Ro).

— f. *epilosum* ROHL. V. Beitr. 124. — Glumae carina epilosa vel parcissime pilosa. — Cum typo ad Šavniki (Ro).

6506. *Ph. Michellii* ALL. — In pratis et pasc. reg. subalp. et alp. in dic. septentr. — Sub m. Durmitor versus jugum Štulac (Pč); in summo montis Hum Orahovski et in monte Kom Kučki (Sz); Korita rovačka (Ro).

— var. *subincrassatum* GRIS. ap. PANTOCS. Adnot. 17. — Panicula fere ovato-oblonga 3—4 cm longa et usque ad 1,5 cm lata; spiculae maiores; glumae abruptius acuminatae.

— In pasc. alp. frequentius ac typus. — Durmitor (Pt, Ro, De, Si); Maglić, Ledenica, Kom, Bijela Voda distr. Kuči, Sjekirica, Zeletin, Sinjavina planina (Ro).

— f. *triaristatum* ROHL. V. Beitr. 124. — Glumella in aristam  $\frac{1}{2}$ —1 mm longam abiens. — Non raro cum typo (Ro).

\*6507. *Ph. graecum* BOISS. et HELDR. — A sequente dignoscitur glumis in aristam brevem cito acuminatis apice sub-divergentibus, glumellis 5-nerviis. Habitu etiam *Ph. montano* similis, sed ab hac specie discedit radice annua et glumellis obtusis. — Typum non legi.

\*— f. *lobatum* ROHL. V. Beitr. 125. — Elatius usque ad 80 cm altum, panicula maiore (usque ad 20 cm longa) lobata. — In incultis et lapid. reg. mont. — Ad Njeguši (Pej, Ro).

\*6508. *Ph. arenarium* L. — In aren. et lapid. reg. infer. — Circa Bar, Ulcinj et Vir (Ro).

6509. *Ph. subulatum* (SAVI) A. GR. — In pascuis sub m. Velka Jastrebica (Pč).

### *Lasiagrostis* LK.

\*6511. *L. calamagrostis* (L.) LK. — In rupestribus et reg. infer. usque in alp. ascendens! — Rijeka (Pt, Kn); Cetinje (Kn); „In sax. per aprica dicionis vulg.“ (Pč); Medun (Ba); Hum Orahovski (Sz); Andrijevica, Ostrog (Ho); Konjuhe (Ba); Viljuša, Borkovići; Maglić Pivski et Durmitor (Ro); Bioče et in m. Vjetrnik; in valle fl. Mala Rijeka pr. Nožica (Ja); Crkvica in m. Lovćen (Kš); in m. Rumija (Do).

### *Stipa* L.

6512. *S. bromoides* (L.) BRAND. — In sax. et frutic. reg. infer. et mont. calid. — Burone (Pt); Čevo, Grahovo (Pč); Rijeka (Ho, Ro); Boljevići, Kokoti, Podgorica, Spuž; in valle flum. Žlorječica pr. Andrijevica, cca 800 m (Ro).

6517. *St. pennata* L. subsp. *eupennata* A. GR. — In rupestr. et gramin. e reg. infer. usque in alpinam. — Crna planina (Pt); Cetinje; Čevo, Durmitor, Javorje planina (Pč); Hum Orahovski (Sz); Rumija (Ba). [Verosimiliter loca hic enumerata (saltem partim) ad subspeciem sequentem pertinent.] — subsp. *mediterranea* (TRIN. et RUPR.) A. GR. — Bar; Čevski Lisac distr. Katunska; Konjsk<sup>a</sup> et Lukavica planina; Štirni do sub Lola planina (Ro); in m. Lovćen loco Velki Bostur (Kš).

— subvar. *gallica* (ČELAK.) HAY. — In vineis ad Boljevići supra Vir, cca 100 m (Ro); in m. Rumija, cca 1400 m (Do); Krivi do distr. Piva (De, Si).

— f. *asperrima* (ŠIRJAEV) HAY. — Culmi brevissime hirtuli. — In m. Rumija (Do).

### *Oryzopsis* MICHX.

6519. *O. milacea* (L.) ASCH. et SCHWEINF. f. *Thomasi* (DUBY) RICHT. — In lapid. et incult. — Ad Ulcinj, Bar, Drušići pr. Rijeka; Podgorica (Ro).

### *Milium* L.

6523. *M. effusum* L. — In silvis reg. subalp. — Crna planina ad ovilia Javorce dicta (Pt); Varda planina distr. Piva; Maglić Pivski; Žabljak sub m. Durmitor; sub m. Kom; in m. Balj pr. Andrijevica (Ro).

— f. *elatius* KOCH. — Robustum; panicula post florendum contracta, ramis erectis. — Bukovica sub m. Durmitor; in valle fl. Jelovica sub Bjelastica planina (Ro).

### *Anthoxanthum* L.

6527. *A. odoratum* L. — In pratis et gramin. e reg. infer. in alp. ascendens. — Cetinje (Pt, Kn); Ivica planina, Durmitor (Pč).

— f. *montanum* A. GR. — In pascuis m. Maglić Pivski et in Sjekirica planina (Ro).

— var. *bulgaricum* VELEN. — Ad Šavniki, Bar, Rijeka, Podgorica, Njeguši, Cetinje et in m. Balj pr. Andrijevica (Ro).

6529. *A. aristatum* BOISS. — In inundatis ad Crnojevička Rijeka (Ro).

6530. *A. ovatum* LAG. — A praeced. dignoscitur glumis duabus superioribus 2 mm longis arista brevi glumam secundam non superante provisis. — In aren. et lapid. ad Farmaki et Podgorica cca 50 m (Ro).

— f. *laxiflorum* ROHL. VI. Beitr. 3. — Panicula elongata 4—5 cm longa laxa. — Cum typo (Ro).

— f. *leiostachys* (GANDGR.) ROHL. l. c. — Glumae inferiores glabrae. — Rarius cum typo (Ro).

### *Phalaris* L.

6533. *Ph. bulbosa* L. — Perennis; rhizoma obliquum; culmi basi in nodos 1—4 incrassati; panicula oblonga vel cylindrica; glumae lanceolatae acutae utrimque uninerviae ad carinam anguste alatae, alis integris ad apicem sensim attenuatis; gluma interior tantum una linearis villosa vix 1 mm longa; gummella et palea 4—5 mm longae pilosae. — In herbidis, humidis et ad sepes reg. infer. in valle fl. Zeta sub Danilovgrad (Pč).

\*6535. *Ph. brachystachys* LK. — Ad viam pr. Njeguši (Kš).

6536. *Ph. minor* RETZ. — In cultis, vineis et ad vias reg. infer. — Ad Ulcinj (Ro).

### *Typhoides* MNCH.

6539. *T. arundinacea* (L.) MCH. (= *Phalaris* a. L.). — In lacustr. ad ripam lac. Scodrani pr. Sinjac (Pč).

### *Leersia* SW.

6541. *L. oryzoides* (L.) SW. — In fossis ad Vir (Pč).

### *Cynodon* RICH.

6546. *C. dactylon* (L.) PERS. — In aren., lapid. et ad vias reg. infer. et mont. calid. — Cetinje (Pč, Kn); Podgorica (Ro); Bar (Do).

### *Digitaria* HEIST.

6547. *D. sanguinalis* (L.) SCOP. — In aren., incultis et agris reg. infer. et mont. calid. — Ad Vir, Cetinje et Grahovo (Pč); ad Bar, Njeguši et Plavnica (Ro).

### *Panicum* L.

6551. *P. crus-galli* L. — In incultis, ad vias et fossas reg. infer. et mont. calid. — Ad ripas lacus Scodrani (Pč); Danilovgrad (Pč, Ro); Nikšić (Ho); Cetinje (Kn); Njeguši (Ro).

— f. *brevisetum* DOELL. — Cum typo ad Njeguši et Mražtinje (Ro).

6553. *P. miliaceum* L. — In agris cultum et non raro subspontaneum.

### *Setaria* PALL.

6555. *S. glauca* (L.) BEAUV. — In cultis et ruderatis reg. infer. et mont. — Rijeka (Kn); Njeguši, Podgorica; Mražtinje sub m. Maglić (Ro).

6557. *S. viridis* (L.) P. BEAUV. — In cultis et ruder. reg. infer. et mont. — Cetinje (Pt, Kn); Danilovgrad (Pč); Andrijevica (Ho); Podgorica, Šavnik, coenob. Piva, Mratinje (Ro).

6559. *S. verticillata* (L.) BEAUV. — In cultis reg. infer. et mont. calidioris. — Ad Rijeka et Grahovo (Pč); Podgorica (Ro).

— f. *robusta* (A. BR.) HAY. — Robustior; spica ± lobata. — In dumetis ad Podgorica (Ro).

### *Imperata* CYR.

6560. *I. cylindrica* (L.) PAL. BEAUV. — In aren. marit. ad Ulcinj; ad ripas lacus Scodrani inter Godinje et Vir; in inund. rivi Crmnica sub Boljevići (Ro).

### *Erianthus* MICHX.

6561. *E. ravennae* (L.) PAL. BEAUV. — A cl. HAYEK e Monten. indicatus; verosimiliter ad Bar et Ulcinj.

6562. *E. Hostii* GRIS. — A praeced. discedit culmo sub panicula ± scabro, ligulis longioribus (2–3 mm) breviter pi-

losis, panicula breviore (cca 20 cm) stricta gracili, ramis apresis glabris; glumis inferioribus rufescentibus obtusis (rarius parum acutis) subbidentatis. — In fossis et fruticetis reg. infer. — Zagarač et Martinovići (Pt); sub Ostrog et Danilovgrad (Pč); Spuž (Ho, Ro); Podgorica (Ro).

### *Andropogon* L.

6565. *A. ischaemum* L. — In graminosis siccis, lapid. et scopolis sax. reg. infer., mont., rarius subalp. — Cetinje et Grahovo (Pč); Medun (Sz); Podgorica (Ho, Ro); coenob. Piva, Rudine nikšićke, Njeguši, Velestovo distr. Katunska; Spuž; etiam in m. Žoljevica pr. Andrijevica (Ro); ad coen. Močrača; Bioče (Ja); Bar (Do).

### *Chrysopogon* TRIN.

6567. *Ch. gryllus* TRIN. — In arenosis, pratis et colibus siccis reg. infer., rarius montanae calidioris. — Danilovgrad, coen. Duga (Pt, Ro); sub monte Lovćen; inter Nikšić et Gvozd Han (Pč); Spuž (Ho, Ro); Ulcinj, Bar, Podgorica, Boljevići, Drušići, Kokoti et Rijeka (Ro); insula Vranina (Eb).

### *Sorghum* PERS.

6568. *S. halepense* (L.) PERS. — In fruticetis, ad vias et in fossis reg. infer. — Danilovgrad (Pt, Pč); Podgorica (Ro); Topolica pr. Bar (Do).

— f. *muticum* (HACK.) HAY. — Spiculae muticae. — Cum typo (Ro).

— f. *leiostachyum* (HACK.) HAY. — Spiculae glabrae. — Ad Podgorica (Ro).

### *Cymbopogon* SPRENG.

6569. *C. hirtus* (L.) JANCH. — In sax. et lapid. reg. infer. — Ad Boljevići pr. Vir in forma ad var. sequentem verg. (Ro).

— f. *pubescens* (VIS.) HAY. — Folia angusta cca 1 mm lata; spicae breviter pilosae. — Ad Pristan Bar sub colle Voločica; Drušići pr. Rijeka (Ba).

*Tragus* HALL.

6571. *T. racemosus* (L.) DESF. — In aren., ruder. et ad vias reg. infer. et mont. calid. — Rijeka (Pt); Cetinje, Grahovo (Pč); Bar (Do).

*Zea* L.

- Z. mays* L. — Ubique culta.

**Orchidaceae**

*Cypripedium* L.

6572. *C. calceolus* L. — A cl. HAYEK e Monten. indicatum; locus mihi ignotus.

*Ophrys* L.

6573. *O. fusca* LK. — In pratis humidis reg. infer. — Ulcinjsko polje (Ro).

6583. *O. oestrifera* M. B. subsp. *balcanica* (SOÓ) HAY. var. *cornuta* (STEV.) HAY. — In gramin. et pratis reg. infer. — Ulcinj, Bar, Rijeka, Podgorica, Danilovgrad, Spuž (Ro).

6587. *O. aranifera* Huds. — In gramin. reg. infer. — Podgorica (Ro).

6588. *O. Bertolonii* MOR. — In pascuis et olivetis reg. infer. — Ulcinjsko polje; Bar; Vrh suta pr. Bar usque ad 800 m! (Ro).

6593. *O. fuciflora* (CR.) RCHB. — In silvaticis m. Rumija (Jovović fide Ba); in pratis ad Bar (Ro).

*Orchis* L.

6594. *O. papilionacea* L. var. *parviflora* WILLK. — In sax. clivi Granica pr. Cetinje reg. mont. (Pč).

6595. *O. morio* L. subsp. *eumorio* HAY. — In pratis et herbidis reg. infer., mont. et subalp. — Viruša dol (Pt); in pratis montis Rumija (Jovović); Donja Krivača supra Nješići et in monte Lovćen (Pej, Ro); ad Vir, Podgorica, Danilovgrad, Spuž, Bar et Andrijevica (Ro).

— — f. *nana* CHENEV. — Cum typo non raro, saepe ± ad subsp. *pictam* (LOIS.) A. G. vergens (conf. ROHLENA V. Beitr. 117).

— — subsp. *picta* (LOIS.) A. GR. — Inter Krstac et Cetinje (Ld).

— — f. *albiflora* BOISS. — Ad Andrijevica locis pluribus frequentior ac typus! (Ro).

6597. *O. corytophora* L. subsp. *eucorytophora* HAY. — In pratis humidis reg. subalp. — Kovčice sub m. Durmitor (Pt); in m. Lovćen (To).

— — subsp. *fragrans* (POLL.) HAY. — In gramin. humid. — Vermoš planina ad confines Albaniae (Df).

6599. *O. globosa* L. — In pratis reg. subalp. — Viruša dol; Perućica sub m. Kom (Pt, Ro); Crna planina (Ba); in valle Jelovica sub Bjelastica planina (Ro).

6600. *O. ustulata* L. — In pratis reg. mont., subalp. et alp. — Perućica sub m. Kom (Pt, Ro); Kom, Jerinja glava, Maglić Pivski, Vojnik, Varda distr. Piva; Andrijevica; Veles-tovo et Lastva čevska distr. Katunska (Ro).

6601. *O. tridentata* SCOP. subsp. *eutridentata* HAY. — In pratis, gramin. et dumet. reg. infer., mont., rarius subalp. — Njeguši; ad lat. m. Lovćen; Bukovica pr. Cetinje; inter Vir et Seljani (Ro).

— — var. *commutata* (TOD.) RCHB. — Ad Cetinje (Če); Krivača sub m. Lovćen, Njeguši, Bar, Vir, Danilovgrad (Ro).

6602. *O. italic a* POIR. — A cl. HAYEK e Monten. indicata; verosimiliter ad Bar et Ulcinj.

6603. *O. simia* LAM. — In collinis supra Bar (Ro).

6604. *O. militaris* L. — In gramin. ad latera montis Lovćen (Pej, Ro).

6607. *O. mascula* L. — In prat. silvat. reg. subalp. — In valle Perućica sub m. Kom (Pt); Vučji potok sub Vermoš planina (Df); Sutorman supra Bar (Eb).

6609. *O. provincialis* BALB. subsp. *euprovincialis* HAY. — In pratis montis Rumija (Jovović fide Ba); in m. Rasovatac pr. Vir (Eb).

— — subsp. *pauciflora* (TEN.) HAY. — In herbid. reg. infer. et mont. — Circa Njeguši (Ld, Pej, Ro); Cetinje (Če); Gornja Krivača sub m. Lovćen (Pej); Čevski Lisac distr. Kačunska; Bar, Vir (Ro).

6611. *O. quadripunctata* CYR. — In herbidis, fruticetis reg. infer. et mont. calidioris. — Circa Cetinje et Njeguši (Ld, Pej, Ro, Če); Podgorica (Ro); in m. Rasovatac pr. Vir (Eb).

× *O. pseudanatolica* FLEISCHM. = *O. pauciflora* × *quadripunctata* (= *O. Čelakovskýi* ROHL. Preslia II: 100). — Ad Cetinje (Če).

6612. *O. palustris* JACQ. — A cl. HAYEK e Monten. indicata. Locus spec. mihi ignotus.

6613. *O. laxiflora* LAM. — In humidis montis Rumija (Jovović fide Ba); Bar; Mosor pr. Podgorica (Ro); Konjuhe pr. Andrijevica (Ba).

6614. *O. romana* SEB. et

6616. *O. Spitzelii* SAUT. — A cl. HAYEK e Monten. indicatae. Verosimiliter ad Bar et Ulcinj.

6618. *O. sambucina* L. — In pratis reg. subalp. — In valle Perućica (Pt); Njeguši (Ho); Sinjavina planina (Ba); Zeletin supra Andrijevica (Ro).

\* — — f. *incarnata* WILLD. — In m. Kom et Mali Durmitor (Pt).

6619. *O. cordigera* FR. var. *Grisebachii* (PANT.) KLINGE. — Folia usque 6 fusco-maculata acuta, superiora lanceolata; labellum cuneato-orbiculare subintegrum; calcar conicum ovario fere dimidio brevius. — In pratis humid. reg. subalp. et alp. — Valles Viruša et Perućica (Pt); Crna planina (Ba); Kom Kučki usque ad 1800 m (Ja).

— — var. *bosniaca* (BECK) KLINGE. — Folia 3—5, fere semper fusco-maculata, inferiora late obovata obtusa, media late elliptica, suprema lanceolata; labellum rhombo-orbiculare, 12—15 mm latum obtusum vel subrepandum, concolor vel leviter signatum. — In pratis humidis subalp. ad Žabljak sub m. Durmitor (Ro).

? 6620. *O. latifolia* L. — In pratis humidis reg. subalp. — Vallis Perućica sub m. Kom; Sinjavina planina (Pt); sub

m. Durmitor (Pč); Lukavica planina (Ho). Sec. cl. HAYEK  
dubia.

\*6621. *O. maculata* L. subsp. *eumaculata* HAY. — In silvis et pratis reg. mont. et subalp. — Sub m. Durmitor (Pt, Ba); Andrijevica, Berane; Dragovoljići pr. Nikšić (Ro); circa Kolašin (Ja); ad lac. Volujačko jezero distr. Piva (Ma). — — var. *candidissima* KROKER. — Cum typo ad Berane (Ro).

— — subsp. *macrostachys* (TIN.) ROHL. V. Beitr. 117. — Folia immaculata; bracteae ovario longiores; labellum trilobum purpureo-maculatum lobo medio producto; calcar crasse cylindrica cum subsaccatum dimidio ovarii longius. — In pratis humidis reg. subalp. — Bukovica sub m. Durmitor; Varda supra coen. Piva; Maglić Pivski; Jerinja glava supra Andrijevica (Ro).

×*O. Boryi* SOÓ = *O. morio* subsp. *picta* × *O. quadriflora punctata*. — A cl. HAYEK e Monten. indicata. Locus mihi ignotus.

### *Serapias* L.

6622. *S. lingua* L. — In gramin. et olivetis reg. infer. ad Bar (Ro).

\*6623. *S. cordigera* L. — In pratis m. Rumija supra Bar (Jovović fide Ba).

6624. *S. vomeracea* (BURM.) BRIQU. var. *stenopetala* VIERH. — In pratis humidis reg. infer. ad Bar, Danilovgrad, Spuž et Podgorica (Ro).

### *Loroglossum* RICH.

6628. *L. hircinum* (L.) RICH. subsp. *euhircinum* HAY. (= *Himantoglossum h.* SPR.). — In herbidis et dumetis reg. infer. et mont. — Ad Ceklin (Ba); Vir, Boljevići (Ro).

— — subsp. *caprinum* (M. B.) HAY. var. *calcaratum* (BECK) HAY. — Inflorescentia laxa; galea acuminata; calcar conicum 7—12 mm longum; labelli 7—12 cm longi lobus medius lateralibus 3—5-plo longior. — In m. Jerinja glava pr. Andrijevica usque ad 1000 m (Ro); in valle fl. Lim (Ja).

*Anacamptis* RICH.

6629. *A. pyramidalis* (L.) RICH. subsp. *eupyramidalis* HAY. — In gramin., dumetis et lapid. reg. infer., mont., rarius subalp. — Cetinje et Njeguši (Ro, Kn); Rijeka (Pt, Ro); Kamenjak (Ho); Gornja Krivača et Krivačko osoje sub m. Lovćen (Pej, Ro); Bar, Ulcinj, Boljevići, Rijeka, Vir, Danilovgrad, Zagarać; in m. Tvrđak et Čevski Lisac distr. Katunska nahija (Ro); Boljevići supra Vir (Eb).  
— subsp. *brachystachys* (URV.) HAY. — A cl. HAYEK e Montenegro indicata.

*Ceolossum* HARTM.

6631. *C. viride* (L.) HARTM. — In pratis, gramin. et pascuis reg. subalp. et alp. in toto territorio. Non raro forma floribus sine calcare.  
— f. *bracteatum* RICHTER. — Bractae flores superantes.  
— Non raro (Ro).  
— f. *lancifolium* ROHL. V. Beitr. 118. — Foliis duobus infimis obovato-lanceolatis basin versus longe attenuatis cca 13 mm latis, usque ad 65 mm longis, duobus superioribus anguste linearie-lanceolatis, 5—7 cm longis; bracteis ut in f. *bracteatum* RICHTER flores superantibus. — Cum typo in subalp. Ledena planina distr. Piva (Ro).

*Gymnadenia* R. BR.

6632. *G. nigra* (L.) RCHB. — In pratis et pascuis reg. subalp. et alp. in dic. septentr. frequens. — Kom, Durmitor (Pt, Ba, Ht, Ro); Maganik, Lukavica, Crveno Ždrijelo (Ho); Maglić Pivski; Jerinja glava, Zeletin, Sjekirica, Bjelastica planina, Javorje, Sinjavina planina, Štirni do sub Lola planina (Ro); in m. Vila supra Rikavac (Df); Pivska planina (De, Si). E montibus dic. merid. Lovćen et Rumija adhuc non vidi.

6633. *G. albida* (L.) RICH. — In pratis et pascuis reg. alp. et subalp. — Carine sub monte Kom; sub Mali Durmitor (Pt); inter Plav et Dečani cca 1800 m (Df) [an ne (partim?) ad spec. sequent. pertinet?]; Savin Kuk in monte Durmitor (De, Si).

6634. *G. Friwaldii* HAMPE (confer. ROHLENA IV. Beitr. 88). — A praeced. discedit floribus candidis parum maiori-

bus, spica breviore et densiore, bracteis 1-nerviis flores subaequans tibus, perianthii phyllis externis oblongo-ovatis quam interna angustiora aequilongis; labello leviter trilobo, lobis lateralibus semiovatis obtusis quam medium obtuse-triangulare subaequius longis; calcari filiformi acuto. — In pratis et pascuis reg. subalp. et alp. dic. septentr.-orient. — Štavna sub m. Kom; Zeletin et Sjekirica planina supra Andrijevica; Bjelastica planina 1000—1800 m (Ro); in m. Kom Kučki (Ja).

6636. *G. conopsea* (L.) R. BR. — In pratis humidis reg. subalp. — Perućica sub m. Kom; Kovčice sub m. Durmitor (Pt); in m. Sutorman (Pč); in m. Hum Orahovski (Sz); sub m. Kom Kučki (Ho); ad latera montis Lovćen (Eb, Pej, Ro); Rudo brdo (Ja); Boljevići supra Vir (Eb).

#### *Platanthera* RICH.

6637. *P. bifolia* (L.) RCHB. — In silvis, dumetis et pratis reg. infer. et mont. — Krstac pr. Njeguši (Ki); Vir, Zagarač, Danilovgrad, Andrijevica, Berane; nahija Katunska: m. Garač, Tvrđjak et Čevski Lisac (Ro).

6638. *P. chlorantha* (CUSTER) RCHB. — In silvis, dumet. et gramin. reg. mont. et subalp. — Njeguši; in m. Čevski Lisac, Tvrđjak et Garač distr. Katunska; circa Andrijevica etiam forma sine calcare! (Ro).

— f. *lancifolia* ROHL. IV. Beitr. 88. — Folia angustiora (cca 12—20 mm) oblongo-lanceolata. — Cum typo ad Andrijevica (Ro).

#### *Helleborine* HILL.

6640. *H. latifolia* (L.) DRUCE (= *Epipactis l.* ALL.). — In silvis reg. mont. et subalp. — Šavniki, coenob. Piva; Jerinja glava pr. Andrijevica; Cetinje, Njeguši; ad lat. m. Lovćen (Ro); in valle rivuli Svinjača pr. Kolašin (Ja).

6641. *H. atropurpurea* (RAFIN.) SCHINZ et THELL. (= *Epipactis rubiginosa* CR.). — In silvis reg. subalp. — Sub m. Durmitor (Pč); in silva Trepetlika et ad lat. m. Mojan ad fines Albaniae (Sz).

— f. *viridiflora* SANIO. — Flores luteo-virides. — Ad lat. m. Maglić Pivski versus Mratinje (Ro).

6642. *H. micropylla* (EHRH.) SCHINZ et THELL. — In silvis, pratis silvat. et in frutic. reg. subalp. — In m.

Hum Orahovski (Sz); in valle fl. Lim ad Andrijevica (Ja); in m. Rumija loco Velki Mikulići (Do).

6643. *H. palustris* (L.) SCHRK. — In pratis palud. reg. subalp. — Crna planina; Pašina Voda sub m. Durmitor (Pt).

*Cephalanthera* RICH.

6644. *C. rubra* (L.) RICH. — In sax., dumetis et silvis reg. mont. et subalp. — Crvena Stijena sub m. Durmitor (Pč); sub m. Hum Orahovski (Sz); Brotnik (Ho); circa Njeguši et in m. Lovćen (Pej, Ro); Jerinja glava pr. Andrijevica; Zagarać supra Danilovgrad; Drežnica pr. Nikšić (Ro).

6645. *C. longifolia* (L.) FRITSCH. — In silvis reg. subalp. — Ad lat. m. Maglić Pivski versus Mratinje (Ro).

6646. *C. alba* (CR.) SIMK. — In silvis, dumet. et sax. reg. mont. et subalp. — Njeguši; Lovćen, Vojnik; Zagarać supra Danilovgrad; Sutorman supra Bar (Ro).

*Ionorchis* BECK.

6648. *I. abortiva* (L.) BECK. — In silvis m. Lovćen raro (Pej, Ro).

— f. *brevicornu* ROHL. V. Beitr. 119. — Perigonii phylla latiora et magis obtusa; calcar conicum rectum ovario dimidio brevius. — Cum typo in silva ad lat. m. Lovćen (Pej, Ro).

*Epiptogium* RICH.

\*6649. *E. aphyllum* SW. — In silvis ad latera m. Mojan ad confines Albaniæ (Sz).

*Spiranthes* (L.) RICH.

\*6650. *S. spiralis* (L.) K. KOCH. — In graminosis reg. mont. calid. — Inter Cetinje et Rijeka (Hadač).

*Listera* R. BR.

6652. *L. ovata* (L.) R. BR. — In silvis et pratis humidis reg. mont. et subalp. — Mali Šanik in m. Lovćen (Pej); Sutorman supra Bar (Eb); Varda supra coen. Piva; circa Andrijevica et in m. Balj; Gornja Bukovica sub m. Durmitor;

in distr. Katunska nahija: m. Tvrđjak, Pješevac et Čevski Lisac (Ro).

6653. *L. cordata* (L.) R. BR. — In silvis reg. subalp. ad pedem m. Durmitor (Ht).

### *Neottia* SW.

6654. *N. nidus-avis* (L.) RICH. — In silvis reg. mont. et subalp. — In valle fl. Tara (Pt); sub m. Hum Orahovski (Sz); in m. Strenj vrh supra Bar (Ba); Jerinja glava pr. Andrijevica; ad lac. Crno jezero sub m. Durmitor; sub Hasanac planina pr. m. Kom; in valle fl. Jelovica pr. Kolašin; Grašina sub m. Lovćen (Ro).

### *Corallorrhiza* CHATELAIN.

6657. *C. trifida* CHATELAIN. — In silvis ad latera montis Lovćen loco Grašina (Pej, Ro).

### *Araceae*

#### *Arum* L.

6660. *A. Petteri* SCHOTT. — In rupestr. et sax. reg. infer. et mont. — Circa Njeguši (Ld, Pej, Ro); in sax. clivi Granica pr. Cetinje (Pč); ad Bar et in m. Lovćen (Ba).

— f. *nigrum* (SCHOTT) HAY. — Njeguši (Ld, Ro); Cetinje (Ld, Če).

\*6661. *A. orientale* M. B. subsp. *longispathum* (RCHB.) ENGL. — A cl. BECK e Monten. indicatum.

6662. *A. italicum* MILL. — In dumetis ad Andrijevica (Ba, Ro).

6663. *A. maculatum* L. — In frutic. et silvis. — A cl. HAYEK e Monten. indicatum.

— var. *angustatum* ENGL. subvar. *Malyi* SCHOTT. — A cl. BECK e Monten. indicatum.

### *Dracunculus* ADANS.

\*6664. *D. vulgaris* SCHOTT. — In dumetis reg. mediterr. — Drušići pr. Rijeka; Kokoti distr. Lješanska (Ro). An subsppontaneus?

*Arisatum* TARG. TOZZ.

6668. *A. vulgare* TARG. TOZZ. — In frutic. et olivetis reg. infer. ad Bar (Ba, Ro).

**Lemnaceae**

*Lemna* L.

6671. *L. minor* L. — In aquis stagnant. reg. infer. et subalp. — Ad lac. Crno<sup>s</sup> et Riblje jezero sub m. Durmitor (Pč, Pt); ad pag. Ceklin et in Mokro prope Bijela (Pt); Danilovgrad; Pošćensko jezero pr. Šavnik (Ro); Sinjavina planina (Ba).

**Sparganiaceae**

*Sparganium* L.

6674. *S. erectum* L. subsp. *polyedrum* (A. GR.) HAY. — Ad ripas et in palud. reg. infer. et subalp. — Danilovgrad (Pt, Ro); circa Strajnići (Pt); Vir (Pč, Ro); Plavnica; Pošćensko jezero supra Šavnik (Ro).

— subsp. *neglectum* (BEEBY) HAY. var. *microcarpum* (NEUM.) HAY. — Ad ripas lacus Skadarsko jezero pr. Plavnica (Ro).

— var. *oocarpum* ČEL. — In palud. ad Plavnica (Ro).

6675. *S. simplex* HUDS. — Ad ripas lacus Scodrani in insula Vranina (Ro).

**Typhaceae**

*Typha* L.

\*6679. *T. angustata* B. et CH. — In palud. ad Novi Bar (Do).

6680. *T. angustifolia* L. — In palud. ad Spuž et Danilovgrad (Ro); ad Novi Bar (Do).

6681. *T. latifolia* L. — In stagnis et fossis reg. infer., mont. et subalp. — Inter coen. Ždrebanik et Martinići (Pt); in lacu Scodrano locis pluribus (Pč, Ro); Ulcinj (Ro); inter Matoševo et Kolašin (Ja).

— f. *bethulona* (COSTA) KRONF. (confer. ROHLENA IV. Beitr. 86). — Folia anguste linearia 5–10 mm lata, spica masculina usque duplo brevior quam feminea. — Ad Spuž et Danilovgrad (Ro).

# ABBREVIATIONES PERIODICARUM

ABZ. = Allgemeine Botanische Zeitschrift.

FEDDE Rep. = FEDDE Repertorium specierum novarum.

MBL. = Magyar botanikai lapok.

OeBZ. = Oesterreichische Botanische Zeitschrift.

SBGW. = Sitzungsberichte der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.

ROHL. I. Beitr. = I. Beitrag zur Flora von Montenegro in SBGW. 1902

ROHL. II. Beitr. ibidem 1902

ROHL. III. Beitr. „ 1903

ROHL. IV. Beitr. „ 1904

ROHL. V. Beitr. „ 1911

ROHL. VI. Beitr. = ROHLENA VI. Beitrag zur Flora von Montenegro in Acta Botanica Bohemica Vol. II. 1923.

ROHL. VII. Beitr. ibidem Volumen III. 1924.

ROHL. VIII. Beitr. SBGW. 1931

ROHL. IX. Beitr. ibidem 1933

ROHL. X. Beitr. „ 1935

ROHL. XI. Beitr. „ 1936

ROHL. XII. Beitr. „ 1939

## ADNOTATIO

Numerus plantarum e Montenegro adhuc cognitarum est:

species . . . . .	2623
subspecies . . . . .	194
In summa 2817	

Numerus plantarum asterisco \* designatarum, quae in HAYEK Prodr. Florae peninsulae Balcanicae e Montenegro non sunt indicatae, est:

species . . . . .	298
subspecies . . . . .	32
varietates et formae . . . . .	178
In summa 508	

Plantae ? designatae dubiae mihi videntur, ergo ulterius observandae sint.

## CORRIGENDA

pag. 136 linea 9. Loco S. opositifolia pone S. oppositifolia.

# INDEX GENERUM

## A

- Abies* 14  
*Abutilon* 107  
*Acanthus* 285  
*Acer* 121  
*Achillea* 365  
*Aconitum* 61  
*Actaea* 63  
*Adenostyles* 373  
*Adiantum* 8  
*Adonis* 72  
*Adoxa* 332  
*Aegilops* 459  
*Aegopodium* 218  
*Aethionema* 94  
*Aethusa* 221  
*Agave* 438  
*Agrimonia* 149  
*Agropyron* 458  
*Agrostemma* 57  
*Agrostis* 481  
*Aira* 480  
*Aiuga* 285  
*Alchimilla* 146  
*Alectorolophus* 277  
*Alisma* 422  
*Alkanna* 248  
*Alliaria* 83  
*Allium* 428  
*Alnus* 16  
*Alopecurus* 483  
*Alsine* 38  
*Althaea* 109  
*Alyssoides* 89  
*Alyssum* 87  
*Amarantus* 35  
*Amelanchier* 158  
*Ammannia* 204  
*Ammi* 214  
*Ammophila* 481  
*Amphoricarpus* 378  
*Anacampsis* 495  
*Anagallis* 243  
*Anchusa* 247  
*Andropogon* 490  
*Androsace* 242  
*Anemone* 63  
*Anethum* 227  
*Angelica* 223

- Antennaria* 358  
*Anthemis* 364  
*Anthericum* 427  
*Anthoxanthum* 487  
*Anthriscus* 233  
*Anthyllis* 191  
*Antirrhinum* 264  
*Apera* 481  
*Aquilegia* 60  
*Arabidopsis* 80  
*Arabis* 81  
*Arctium* 379  
*Arctostaphylos* 240  
*Aremonea* 149  
*Arenaria* 40  
*Arisarum* 499  
*Aristolochia* 58  
*Armeria* 237  
*Armoracia* 78  
*Arrhenatherum* 479  
*Artemisia* 372  
*Arum* 498  
*Aruncus* 137  
*Arundo* 462  
*Asarum* 58  
*Asparagus* 435  
*Asperugo* 247  
*Asperula* 324  
*Asphodeline* 427  
*Asphodelus* 427  
*Aspidium* 12  
*Asplenium* 9  
*Aster* 356  
*Asteriscus* 363  
*Asterolinum* 243  
*Astragalus* 164  
*Astrantia* 209  
*Asyneuma* 351  
*Athamanta* 221  
*Athyrium* 10  
*Atriplex* 34  
*Atropa* 255  
*Aubrieta* 83  
*Avena* 478

## B

- Ballota* 295  
*Barbaraea* 77

- Bartschia* 274  
*Bellevalia* 435  
*Bellis* 356  
*Berberis* 53  
*Berteroa* 86  
*Berula* 218  
*Betonica* 295  
*Betula* 15  
*Biasolettia* 216  
*Bidens* 364  
*Bifora* 236  
*Biscutella* 93  
*Blackstonia* 320  
*Blechnum* 8  
*Blysmus* 447  
*Bolboschoenus* 447  
*Botrychium* 7  
*Brachypodium* 457  
*Brassica* 91  
*Briza* 463  
*Bromus* 454  
*Bryonia* 105  
*Bunias* 84  
*Bunium* 215  
*Buphthalmum* 363  
*Bupleurum* 211  
*Butomus* 423

## C

- Cakile* 92  
*Calamagrostis* 481  
*Calamintha* 305  
*Calendula* 378  
*Calepina* 92  
*Callitricha* 208  
*Caltha* 60  
*Calystegia* 244  
*Camelina* 97  
*Campanula* 344  
*Cannabis* 22  
*Capparis* 75  
*Capsella* 97  
*Capsicum* 256  
*Cardamine* 79  
*Cardaminopsis* 80  
*Cardaria* 93  
*Carduus* 380  
*Carex* 448

- Carlina 379  
 Carpinus 16  
 Carthamus 392  
 Carum 214  
 Castalia 72  
 Castanea 17  
 Catapodium 472  
 Caucalis 230  
 Celtis 22  
 Centaurea 386  
 Centaurium 317  
 Centunculus 244  
 Cephalanthera 497  
 Cephalaria 308  
 Cerastium 42  
 Ceratonia 163  
 Ceratophyllum 72  
 Cerinthe 254  
 Ceterach 10  
 Chaenorrhinum 266  
 Chaerophyllum 231  
 Chamaenerion 206  
 Chamaeplium 76  
 Cheilanthes 8  
 Cheiranthus 84  
 Chelidonium 73  
 Chenopodium 33  
 Chondrilla 393  
 Chrozophora 28  
 Chrysanthemum 368  
 Chrysopogon 490  
 Chrysosplenium 136  
 Cicerbita 400  
 Cichorium 392  
 Ciræa 207  
 Cirsium 382  
 Cistus 98  
 Cladium 448  
 Clematis 64  
 Cnidium 222  
 Coeloglossum 495  
 Colchicum 426  
 Colocynthis 105  
 Colutea 163  
 Conium 235  
 Conringia 92  
 Consolida 62  
 Convallaria 437  
 Convolvulus 244  
 Corallorrhiza 498  
 Cornus 208  
 Coronilla 197  
 Coronopus 93  
 Corydalis 74  
**Corylus** 17  
 Cotinus 121  
 Cotoneaster 161  
 Cotyledon 131  
 Crataegus 161  
 Crepis 402  
 Crithmum 218  
 Crocus 439  
 Crozophora 28  
 Crupina 386  
 Cucumis 105  
 Cucurbita 105  
 Cupressus 14  
 Cuscuta 245  
 Cyclamen 242  
 Cydonia 158  
 Cymbopogon 490  
 Cynanchum 321  
 Cynodon 488  
 Cynoglossum 246  
 Cynosurus 464  
 Cyperus 446  
 Cypripedium 491  
 Cystopteris 12  
 Cytisus 193
- D**
- Dactylis 464  
 Danaa 235  
 Danthonia 474  
 Daphne 202  
 Datura 257  
 Daucus 229  
 Delphinium 62  
 Deschampsia 480  
 Dianthus 47  
 Diehostylis 446  
 Dictamnus 119  
 Digitalis 273  
 Digitaria 489  
 Dioscorea 441  
 Diplachne 462  
 Diplotaxis 91  
 Dipsacus 337  
 Donax 462  
 Doronicum 374  
 Doryenium 189  
 Draba 89
- E**
- Dracunculus 498  
 Dryas 149  
 Drypis 51
- Echinops 378  
 Echium 255  
 Edraianthus 353  
 Eleocharis 448  
 Elichrysum 360  
 Elyna 448  
 Empetrum 241  
 Ephedra 15  
 Epilobium 205  
 Epipactis 496  
 Epipogium 497  
 Equisetum 6  
 Eragrostis 462  
 Erianthus 489  
 Erica 240  
 Erigeron 357  
 Eriophorum 446  
 Erodium 117  
 Eruca 92  
 Ervum 172  
 Eryngium 210  
 Erysimum 76  
 Erythronium 433  
 Eupatorium 355  
 Euphorbia 29  
 Euphrasia 275  
 Evax 358  
 Evonymus 123
- F**
- Fagopyrum 28  
**Fagus** 17  
 Falcaria 214  
 Ferula 224  
 Ferulago 224  
 Festuca 469  
 Ficaria 66  
**Ficus** 21  
 Filago 358  
 Filipendula 137  
 Fimbristylis 446  
 Foeniculum 222  
 Fragaria 140

*Fraxinus* 322  
*Freyera* 216  
*Fritillaria* 432  
*Fumana* 100  
*Fumaria* 75

## G

*Gagea* 428  
*Galanthus* 438  
*Galatella* 356  
*Galega* 166  
*Galeopsis* 292  
*Galilea* 445  
*Galium* 327  
*Gastridium* 483  
*Gelasia* 398  
*Genista* 195  
*Gentiana* 318  
*Geranium* 113  
*Geum* 147  
*Gladiolus* 441  
*Glaucium* 72  
*Glecoma* 290  
*Glinus* 35  
*Globularia* 314  
*Glyceria* 468  
*Gnaphalium* 359  
*Goniolobium* 93  
*Gratiola* 263  
*Gymnadenia* 495

## H

*Haplophyllum* 119  
*Haynaldia* 459  
*Hedera* 209  
*Hedypnois* 393  
*Heleochocha* 484  
*Helianthemum* 98  
*Helianthus* 364  
*Heliosperma* 53  
*Heliotropium* 245  
*Helleborine* 496  
*Helleborus* 59  
*Heracleum* 227  
*Hermodactylus* 440  
*Herniaria* 36  
*Hesperis* 84  
*Hibiscus* 107

*Hieracium* 407  
*Himantoglossum* 494  
*Hippocratea* 199  
*Hippuris* 208  
*Hladnikia* 235  
*Holcus* 479  
*Holoschoenus* 447  
*Holosteum* 42  
*Homogyne* 373  
*Hordeum* 460  
*Hornungia* 96  
*Humulus* 22  
*Hutchinsia* 94  
*Hyacinthus* 435  
*Hyoscyamus* 256  
*Hyoseris* 393  
*Hypericum* 105  
*Hypochoeris* 394  
*Hyssopus* 307

**I**  
*Iberis* 94  
*Ilex* 123  
*Impatiens* 118  
*Imperata* 489  
*Inula* 360  
*Ionorchis* 497  
*Iris* 440  
*Isatis* 83  
*Isnardia* 204  
*Isolepis* 446  
*Isopyrum* 60

**J**  
*Jasione* 355  
*Juglans* 19  
*Juncus* 442  
*Juniperus* 13  
*Jurinea* 380

**K**  
*Kerneria* 95  
*Kickxia* 266  
*Knautia* 339  
*Kochia* 34  
*Koeleria* 474  
*Kohlrauschia* 46

**L**  
*Lactuca* 401  
*Lagenaria* 105  
*Lagoseris* 398  
*Lagurus* 483  
*Lamium* 292  
*Lappa* 379  
*Lappula* 247  
*Lapsana* 393  
*Larix* 14  
*Laser* 229  
*Laserpitium* 229  
*Lasiagrostis* 486  
*Lathraea* 283  
*Lathyrus* 172  
*Laurus* 58  
*Lavandula* 289  
*Lavatera* 108  
*Leersia* 488  
*Legouzia* 351  
*Lemna* 499  
*Leontodon* 394  
*Leontopodium* 359  
*Leonurus* 294  
*Lepidium* 93  
*Lepturus* 473  
*Leucanthemum* 368  
*Leucoium* 458  
*Libanotis* 220  
*Ligusticum* 223  
*Ligustrum* 323  
*Lilium* 431  
*Limosella* 268  
*Linaria* 264  
*Linum* 110  
*Listera* 497  
*Lithospermum* 253  
*Lolium* 473  
*Lonicera* 333  
*Loroglossum* 494  
*Lotus* 190  
*Ludwigia* 204  
*Lunaria* 86  
*Lupinus* 193  
*Luzula* 444  
*Lychnis* 57  
*Lycopodium* 6  
*Lycopsis* 248  
*Lycopus* 312

*Lygia* 202  
*Lysimachia* 243  
*Lythrum* 203

**M**

*Maianthemum* 436  
*Malabaila* 228  
*Malachia* 45  
*Maleholmia* 85  
*Malus* 161  
*Malva* 107  
*Marrubium* 289  
*Marsdenia* 322  
*Marsilea* 13  
*Matricaria* 372  
*Matthiola* 85  
*Medicago* 177  
*Melampyrum* 281  
*Melandrium* 57  
*Melica* 462  
*Melilotus* 179  
*Melissa* 302  
*Melittis* 291  
*Mentha* 312  
*Menyanthes* 321  
*Mercurialis* 28  
*Mespilus* 162  
*Meum* 222  
*Microcalia* 321  
*Micromeria* 303  
*Micropus* 358  
*Milium* 487  
*Minuartia* 38  
*Moehringia* 41  
*Moenchia* 42  
*Molinia* 462  
*Moltkea* 253  
*Monerma* 473  
*Moneses* 239  
*Monotropa* 239  
*Montia* 36  
*Morus* 21  
*Mulgedium* 400  
*Muscari* 435  
*Myagrum* 83  
*Mycelis* 401  
*Myosotis* 249  
*Myosoton* 45  
*Myriophyllum* 207  
*Myrrhis* 235  
*Myrtus* 204

**N**  
*Naias* 425  
*Narcissus* 438  
*Nardus* 474  
*Narthecium* 425  
*Nasturtium* 78  
*Neottia* 498  
*Nepeta* 290  
*Nephrodium* 10  
*Nicotiana* 257  
*Nigella* 61  
*Nigritella* 495  
*Nonnea* 248  
*Nuphar* 72  
*Nymphaea* 72  
*Nymphoides* 321

**O**

*Odontites* 274  
*Oenanthe* 220  
*Oldenlandia* 324  
*Olea* 323  
*Omphalodes* 246  
*Onobrychis* 200  
*Ononis* 175  
*Onopordum* 386  
*Onosma* 254  
*Ophioglossum* 7  
*Ophrys* 491  
*Opopanax* 224  
*Orchis* 491  
*Origanum* 307  
*Orlaya* 230  
*Ornithogalum* 434  
*Ornithopus* 197  
*Orobanche* 283  
*Oryzopsis* 487  
*Ostericum* 224  
*Ostrya* 16  
*Osyris* 23  
*Oxalis* 113  
*Oxyria* 27  
*Oxytropis* 166

**P**

*Paeonia* 59  
*Paliurus* 126

*Pallenis* 363  
*Pančičia* 217  
*Panicum* 489  
*Papaver* 73  
*Parentucellia* 274  
*Parietaria* 23  
*Paris* 437  
*Parnassia* 136  
*Paronychia* 37  
*Pastinaca* 227  
*Pedicularis* 279  
*Peltaria* 96  
*Peplis* 204  
*Periploca* 321  
*Petasites* 373  
*Petroselinum* 214  
*Petteria* 195  
*Peucedanum* 225  
*Phalaris* 488  
*Phaseolus* 175  
*Phillyrea* 323  
*Phleum* 484  
*Phlomis* 291  
*Phragmites* 462  
*Phyllitis* 9  
*Physalis* 256  
*Physocaulis* 231  
*Physospermum* 235  
*Phyteuma* 352  
*Phytolacca* 35  
*Picea* 14  
*Picridium* 399  
*Pieris* 396  
*Pimpinella* 216  
*Pinguicula* 283  
*Pinus* 14  
*Pirola* 239  
*Pirus* 160  
*Pistazia* 121  
*Pisum* 175  
*Plantago* 314  
*Platanthera* 496  
*Pleurospermum* 235  
*Plumbago* 236  
*Poa* 465  
*Podospermum* 398  
*Polycarpon* 37  
*Polykenemum* 33  
*Polygala* 119  
*Polygonatum* 436  
*Polygonum* 27  
*Polypodium* 7

Polypogon 483  
Polystichum 12  
Populus 19  
Portenschlagia 221  
Portulaca 36  
Potamogeton 423  
Potentilla 141  
Prangos 236  
Prasium 287  
Prenanthes 402  
Primula 241  
Prunella 290  
Prunus 162  
Psilurus 473  
Psoralea 167  
Pteridium 8  
Pteris 8  
Ptychotis 214  
Pulicaria 362  
Pulmonaria 249  
Pulsatilla 64  
Punica 204  
Putoria 324  
Pycreus 445  
Pyracantha 161

**Qu**

Quercus 18

**R**

Ramischia 239  
Ramondia 284  
Ranunculus 67  
Raphanus 92  
Rapistrum 92  
Reichardia 399  
Reseda 97  
Rhagadiolus 393  
Rhamnus 124  
Rhinanthus 278  
Rhus 121  
Ribes 136  
Robinia 163  
Romulea 440  
Roripa 77  
Rosa 150  
Rosmarinus 287  
Rubia 332  
Rubus 138

Ruscus 436  
Rumex 25  
Ruta 118

**S**

Sagina 41  
Sagittaria 423  
Salix 19  
Salsola 35  
Salvia 300  
Sambucus 332  
Samolus 244  
Sanguisorba 149  
Sanicula 209  
Saponaria 46  
Satirea 302  
Saxifraga 131  
Scabiosa 342  
Scandix 234  
Schoenoplectus 446  
Schoenus 448  
Scilla 433  
Scirpus 447  
Scleranthus 38  
Selerochloa 465  
Seleropoa 472  
Scolymus 392  
Scorpiurus 200  
Scorzonera 397  
Scrophularia 267  
Scutellaria 288  
Secale 459  
Securigera 191  
Sedum 127  
Selaginella 6  
Selinum 222  
Sempervivum 126  
Senecio 374  
Serapias 494  
Serratula 386  
Seseli 218  
Sesleria 460  
Setaria 489  
Sherardia 324  
Sideritis 289  
Sieglungia 474  
Silene 52  
Silybum 385  
Sinapis 91  
Sisymbrium 75

Sium 218  
Smilacina 436  
Smilax 438  
Smyrnium 236  
Solanum 256  
Soldanella 242  
Solidago 355  
Sonchus 400  
Sorbus 159  
Sorghum 490  
Sparganium 499  
Spartium 197  
Spergula 37  
Spergularia 37  
Spiraea 137  
Spiranthes 497  
Stachys 295  
Staphylea 124  
Statice 236  
Stellaria 45  
Sternbergia 438  
Stipa 487  
Streptopus 436  
Succisa 339  
Swertia 320  
Symphytum 247  
Syringa 323

**T**

Tamarix 105  
Tamus 441  
Tanacetum 370  
Taraxacum 399  
Taxus 13  
Telekia 363  
Teucrium 286  
Thalictrum 65  
Theligonum 35  
Thesium 24  
Thlaspi 95  
Thymus 308  
Tilia 110  
Tofieldia 425  
Tordylium 228  
Torilis 231  
Tozzia 283  
Tragopogon 396  
Tragus 491  
Trapa 207  
Tribulus 118

Trifolium	179	Urospermum	396	Vitis	126
Triglochin	423	Urtica	22	Vogelia	97
Trigonella	176			Vulpia	472
Trinia	213				
Tripleurospermum	371				
Trisetum	477	Vaccaria	46		
Triticum	459	Vaccinium	240	Willemetia	398
Trollius	60	Valantia	332	Wulfenia	273
Tuberaria	98	Valeriana	335		
Tulipa	433	Valerianella	384		
Tunica	46	Ventenata	477		
Turgenia	230	Veratrum	426		
Turritis	81	Verbascum	257	Xanthium	363
Tussilago	373	Verbena	285	Xeranthemum	378
Typha	499	Veronica	269		
Typhoides	488	Viburnum	332		
Tyrimnus	385	Vicia	167		
		Vinca	321	Zazintha	393
<b>U</b>		Vincetoxicum	322	Zannichellia	425
Ulmus	22	Viola	101	Zea	491
		Vitex	285	Zizyphus	126