

Zdeněk Dohnal:

Jatrovky Adršpaško-Teplických skal.

S podporou Čsl. Národní rady badatelské a Čsl. botanické společnosti.

Riccia glauca L.

Sbírána D ě d e ě k e m (1883) na polích u Adršpachu.

Fegatella conica C o r d a.

Na vlhkých skalních stěnách a balvanech při potůčcích, v celém území roztroušeně. Sterilní. **Adršpach:** Na zdi vestavěné do vchodu do Skalního města; na kamenech pod Velkým vodopádem Vlčí rokle, v dolní Teplické části na kamenech při potůčku. Rokle za Starým mlýnem. **Teplice:** Skalní město — Chrámové náměstí, Sklad sukna.

Marchantia polymorpha L.

Na suchých pohyblivých písčích a ohořelých pařezech. Bohatě plodná. **Adršpach:** Spáleniště jižně od Řeřichové rokle, u Svidnické věže a Vlčí rokle.

Aneura pinguis D u m.

Na vlhkém písku při potůčcích, do nichž někdy i sestupuje, na basích vlhkých skalních stěn, hlavně v hlubokých stinných roklích a chodbách. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — Martinská ulička. — Bludné rokle, Janovická rokle. **Teplice:** Skalní město — v okolí Chrámového náměstí a Sibiře.

Metzgeria furcata (L.) D u m.

Udávána D ě d e ě k e m z Teplických skal.

Metzgeria pubescens (S c h r.) R a d d i.

Sbírána D ě d e ě k e m a W i n k l e r e m v Teplických skalách.

Pellia epiphylla (L.) L i n d b.

Na vlhkém písku a vlhké zemi, odkud vystupuje na vlhké base skalních stěn. Po celém území hojná. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — v celé Staré partii. — Řeřichová rokle, Vlčí rokle, Bludné rokle, Janovická rokle, rokle za Starým mlýnem. **Teplice:** Skalní předměstí, Skalní město — při vchodu na Chrámové náměstí, Lví klec, Sibiř a přilehlé partie.

Pellia Neesiana (G o t t.) L i m p r.

Sbírána D ě d e ě k e m.

Fossombronía Wondraczeki D u m.

Sbírána D ě d e ě k e m na strništích u Adršpachu.

Alicularia scalaris (S c h r.) C o r d a.

Na vlhkém písku pouze na jediném místě. Ekomorfosa následkem nízké průměrné roční teploty a nedostatečného osvětlení. **Teplice:** Skalní město — Sibiř.

Alicularia geoscypha D e N o t.

Sbírána L i m p r i c h t e m v Adršpachu.

Haplozia crenulata (S m.) D u m.

Sbírána D ě d e ě k e m v Adršpachu.

Haplozia sphaerocarpa (H o o k.) D u m.

Na vlhkém písku a mokřavých stinných skalních stěnách po území roztroušeně. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — mokřavá stěna na Malém náměstí, na vlhkém písku pod Velkým vodopádem. Bludné rokle. **Teplice:** Skalní město — Sibiř, Chrámové náměstí.

Sphenolobus minutus (C r a n t z) S t e p h.

Na vlhkých ± stinných skalních stěnách, na humusu, často na lišejníku *Icmadophila ericetorum* v celém území rozšířen. **Adršpach:** Skalní předměstí, Skalní město, Aspenplan, Buchberg. Řeřichová rokle, Bludné rokle, Janovické rokle, rokle za Starým mlýnem, Vlčí rokle. **Teplice:** Skalní předměstí, Skalní město v otevřenějších partiích za Chrámem, Římské divadlo a jinde.

Sphenolobus Michauxii (W e b.) S t e p h.

Na trouchnivějších kmenech v pralesích, N e e s e m sbírána zde i na basích skalních stěn. Sterilní. **Adršpach:** Kotlík jižně od Řeřichové rokle na kmenech vyvrácených stromů. Bludné rokle.

Lophozia barbata (S c h m i d.) D u m.

Sbírána D ě d e ě k e m v Adršpachu.

Lophozia gracilis (S c h l e i c h.) S t e p h.

Na trouchnivějším dřevu, někdy na mrtvé rašelině a na skalách s vrstvou humusu. Pouze ve vlhkých stinných těžko přístupných roklinách, ne častá. Sterilní. **Adršpach:** Kotlík jižně od Řeřichové rokle. Bludné rokle.

Lophozia Floerkei (W. & M.) S c h i f f.

Sbírána D ě d e ě k e m v Adršpachu.

Lophozia ventricosa (D i c k s.) D u m.

Dostí hojná po celém území na nejrůznějším substrátu — organickém i anorganickém. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — ve Staré partii na skalách a písku. Bludné rokle, Vlčí rokle na humusu, písku a dřevu.

L. ventricosa (D i c k s.) D u m. var. *porphyroleuca* (N e e s) H a r t m a n

Na podobných stanovištích jako předchozí druh. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — stěna nad Stříbrným pramenem. — Řeřichová rokle, Bludné rokle. **Teplice:** Skalní město, — balvany při cestě před Chrámovým náměstím.

Lophozia incisa (S c h r a d.) D u m.

Na shnilém dřevu, písčité zemi, hlavně však na skalách a balvanech s vrstvou humusu. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí — na balvanech, Vlčí rokle. **Teplice:** Skalní předměstí.

Gymnocolea inflata (H u d s.) D u m.

Na mokvavých skalních stěnách, vlhkém humusu a pod. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí — na mokvavé stěně. Bludné rokle.

Anastrepta orcadensis (H o o k.) S c h i f f.

Na vlhkém humusu a mrtvé rašelině. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí — na vlhké stráni na humusu za restaurací „Lesní zátiší“. Vlčí rokle — na mrtvé rašelině na východním konci velkého vřehoviště.

Plagiocbala asplenoides (L.) D u m.

Po celém území velmi hojná, na vlhkém humusu, ve štěrbinách skal i na lesní půdě. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí, Skalní město, Aspenplan, Buchberg. Řeřichová rokle, rokle za Starým mlýnem, Vlčí rokle Bludné rokle, Janovické rokle. **Teplice:** Skalní předměstí, Skalní město — v otevřenějších partiích.

Leptoscyphus Taylori (H o o k.) M i t t.

Pokrývá v rozsáhlých načervenalých a zelených koberecích vlhké skalní stěny, po nichž vystupuje dosti vysoko; častý i na trouchnivějším dřevu. Nejhojnější jatrovka v celém území. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí, Skalní město, Řeřichová rokle, rokle za Starým mlýnem, Vlčí rokle, Bludné rokle, Janovické rokle. **Teplice:** Skalní předměstí, Skalní město.

Lophocolea heterophylla (S c h r a d.) D u m.

Sbírána D ě d e ě k e m v Adršpachu.

Lophocolea minor N e e s.

Tu a tam na trouchnivějším dřevu. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí. Kotlík jižně Řeřichové rokle, Bludné rokle.

Chiloscyphus polyanthus (L.) C o r d a.

Pouze v Adršpašském Skalním městě v Martinské uličce na dřevěném zábradlí, občas zaplavovaném. Sterilní.

Cephalozia bicuspadata (L.) D u m.

Vytváří povlaky na vlhkém písku ve Vlčí rokli.

Cephalozia connivens (D i c k s.) S p r.

Podle Dědečka sbírána Flotowem v Adršpachu.

Nowellia curvifolia (D i c k s.) M i t t.

Na trouchnivějším dřevu a pařezech, velmi vzácně. Sterilní. Kotlík jižně od Řeřichové rokle. Vlčí rokle — v blízkosti Teplického Stříbrného pramene.

Odontoschizma denudatum (M a r t.) D u m.

Časté na rašeliništích i na pískovci s vrstvou humusu. Porůznu. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — na stěně nad Stříbrným pramenem. Vlčí rokle — na okraji velkého vrchoviště mezi Sphagnem a Pohlí.

Calypogeia Neesiana (M a s s. & C a r e s t.) K. M ü l l.

Jedna z nejběžnějších jatrovek v celém území. Hojná na vlhkých skalních stěnách, ve skalních temnějších dutinách, na písčitém humusu při basích skalních stěn i na hniječím dřevu. Bohatě plodná. **Adršpach:** Skalní předměstí, Skalní město. Řeřichová rokle, kotlík jižně od Řeřichové rokle, rokle za Starým mlýnem, Bludné rokle, Janovické rokle, Vlčí rokle. **Tepliec:** Skalní předměstí, Skalní město.

Capylogeia Trichomanis (L.) C o r d a.

Sbírána Neesem v Adršpachu i v Teplících.

Pleuroschizma trilobatum (L.) D u m.

Velmi hojně na balvanech ve smrkových porostech, v roklinách na lesní půdě v celém území. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí, Skalní město. Řeřichová rokle, kotlík jižně od Řeřichové rokle, rokle za Starým mlýnem, Bludné rokle, Janovické rokle, Vlčí rokle. **Tepliec:** Hlavně ve Skalním předměstí, ve Skalním městě vzácněji.

Pleuroschizma tricrenatum (W a h l e n b.) D u m.

Na podobných stanovištích jako předchozí, avšak vzácněji. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí, Skalní město. Řeřichová rokle, Bludné rokle, Janovické rokle, Vlčí rokle. **Tepliec:** Skalní předměstí.

Lepidozia reptans (L.) D u m.

Na nejružnějším substrátu — hniječím dřevu, na skalách, humusu, písčité půdě a pod., hlavně ve stínu. Dostí hojná. Sterilní. Řeřichová rokle, rokle za Starým mlýnem, Bludné rokle, Janovické rokle.

Lepidozia setacea (W e b.) M i t t.

Sbírána Dědečkem v Adršpachu.

Lepidozia silvatica E v a n s.

V území velmi vzácná, pouze na dvou nalezištích na vlhkých stinných skalních stěnách. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — na stěnách mezi Velkým a Malým vodopádem. Bludné rokle.

Ptilidium ciliare. (L.) H a m p e.

Na hniječím dřevu a písčitém humusu. Sterilní. Řeřichová rokle.

Ptilidium pulcherrimum W e b.) H a m p e.

Pouze na hniječím dřevu a pařezech. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí. Kotlík jižně od Řeřichové rokle, Bludné rokle.

Trichocolea tomentella (E h r h.) D u m.

Sbírána Dědečkem v Adršpachu.

Diplophyllum albicans (L.) D u m.

Velmi běžná jatrovka na vlhkých stinných skalních stěnách a v puklinách v celém území. Sterilní. **Adršpach:** Skalní předměstí, Skalní město. Řeřichová rokle, Bludné rokle, Janovické rokle, Vlčí rokle. **Tepliec:** Skalní předměstí, Skalní město.

Diplophyllum obtusifolium (H o o k.) D u m.

Sbíráno Dědečkem v Teplických skalách.

Scapania umbrosa (S e h r.) D u m.

Na hnijícím dřevě v hlubokých stinných vlhkých roklích častá. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — mezi vodopády. Řeřichová rokle, Bludné rokle.

Scapania uliginosa (S w.) D u m.

Vzácný vysokohorský druh, rostoucí v tekoucích vodách, někdy též vystupuje na písčité břehy. Pouze na dvou nalezištích. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — v potoku pod Velkým vodopádem. Vlčí rokle — v potoku pod Teplickým Stříbrným pramenem.

Scapania nemorosa D u m.

Na vlhkých skalních stěnách v některých hlubokých roklinách. Sterilní. **Adršpach:** Skalní město — na stěnách nad Stříbrným pramenem, pod Velkým vodopádem a na stěnách ve Velkém vodopádu. Kotlík jižně od Řeřichové rokle, Bludné rokle. **Teplice:** Skalní město — Sibir a okolí, před Chrámovým náměstím.

Frullania Tamarisci (L.) D u m.

Podle D ě d ě č k a sbírána W i n k l e r e m v Teplických skalách.

Anthoceros levis L.

Sbíráán D ě d ě č k e m při vchodu do Teplických skal.