

† Richard Picbauer:

Addenda ad floram čechoslovakiae mycologicam.

X.

Quae in praefatione Addendorum priorum dixeram, etiam in his Addendis valet. De ea re mihi scribendum esse non arbitror. Solum puto dom. directori Ignatio Z a v ř e l i, qui fungos hos magno cum studio legit, gratias agere meum esse. Deinde abbreviaciones lectoris in memoriam reducere puto: Z = Zavřel, sine nota legit auctor, ceteri lectores nomine commemorati. Species stella signatae adhuc in terris nostris non observatae harum omnino XCV enominatae sunt.

Myxomycetes

Badhamia panicea Rost. Ad corticem *Abietis albae* in silva inter Adamov et Blansko (leg. Ing. C. Blahušek).

Arcyria ferruginea Sauter. Ad caudicem putrescentem in colle Kelčský Javorník.

Phycomycetes

Cladochytrium butomi Büsg. ad scapos foliaque *Butomi umbellati* in silva Pohansko ad Břeclav.

Cladochytrium sparganii ramosi Büsg. ad folia *Sparganii erecti* in ripa Moštěnka flum. ad Turovice (Z).

Synchytrium mercurialis Fuck. ad folia *Mercurialis perennis* in collibus Branisko Slovakiae.

**Synchytrium sanguineum* Schröt. ad folia *Cirsii palustris* in ripa Břestový potok ad Staré Hamry Moraviae orient. (Z).

Albugo candida Pers. ad herbam *Coronopi procumbentis* ad Vel. Němčice (Fr. Šmarda). *Sisymbrii sophiae* ad flum. Bystřička ad Lipová (Z).

Albugo lepigoni D. B. ad herbam *Spergulariae marginatae* ad Vel. Němčice (Fr. Šmarda). *Albugo portulacae* (DC.) Kuntze ad herbam *Portulacae oleraceae* ad Bagota pr. St. Ďala Slovakiae. (Baudyš).

Plasmopara epilobii (Rbh.) Schröt. ad folia *Epilobii hirsuti* in ripa flum. Moštěnka ad Turovice (Z).

Plasmopara densa Schröt. ad folia *Odontitis rubrae* in agro ad Dol. Lipová (Z).

Peronospora polygoni (Halsted) Alfr. Fisch. ad folia *Polygoni avicularis* ad Turovice (Z).

Peronospora minor (Gaspar.) Gäum. ad folia *Atriplicis nitentis* in ripa fluvil Moravae ad Kroměříž (Z).

Peronospora arenariae (Berk.) Tul. ad folia *Arenariae serpyllifoliae* loco Na bařinách ad Rychlov (Z).

Peronospora brassicae Gäum. ad folia *Sinapis albae* in agro ad Dřevohostice ad septentr. (Z).

Peronospora berteroeae Gäum. ad folia *Berteroeae incanae* in ripa fl. Radkova ad Lhota Radkova pr. Bystřice p. Host. (Z).

Peronospora erysimi Gäum. ad folia *Erysimi cheiranthoidis* in agro ad Dřevohostice (Z).

Peronospora dentariae Rbh. ad folia *Cardaminis impatientis* in silva ad Zlín ad merid. (Z).

Peronospora barbareae Gäum. ad folia *Barbareae vulgaris* ad pedes montis Smrk ad Čeladná (Z).

Peronospora nesleae Gäum. ad folia *Vogeliae paniculatae* in agro ad Dřevohostice (Z).

Peronospora potentillae D. B. ad folia *Potentillae aureae* in summo montis Král. Sněžník (Z).
Peronospora trifolii repentis S y d. ad folia *Trifolii montani* inter Šatov et Devět mlýnů.
Peronospora trifolii hybridi G ä u m. ad folia *Trifolii spadicei* in prato sphagnali ad Sulov et Bílý Kříž in mont. Beskydy (Z).

Peronospora pratensis S y d. ad folia *Trifolii medii* in prato in occid. declivitate montis Jehelník in mont. Hostýnské kopce (Z).

Peronospora meliloti S y d. ad folia *Meliloti albi* in ripa fl. Moštěnka ad Turovice (Z).

Peronospora Mayorii G ä u m. ad folia *Viciae cracca* in ripa fl. Moštěnka ad Turovice. (Z).

Viciae angustifoliae in agro ad Dřevohostice (Z).

Peronospora viciae (B e r k.) G ä u m. ad folia *Viciae hirsutae* G r a y in finibus agri ad Dřevohostice (Z).

Peronospora galii F u c k. ad folia *Galii molluginis* in ripa rivi Kozrál a Lišná ad merid.

Peronospora aparinis (D. B.) G ä u m. ad folia *Galii aparinis* in ripa rivi ad Blazice (Z).

Peronospora tanacetii G ä u m. ad folia *Tanacetii vulgaris* in ripa fluvii Moraviae ad Kroměříž (Z).

Ascomycetes

Protomyces macrosporus U n g. ad nervos foliorum *Heraclei sphondylii* ad Lhota Radkova (Z).

Protomyces kreuthensis K ü h n ad folia *Leontodontis danubialis* in margine silvae convallis rivi Břestovský potok ad Staré Hamry (Z).

Taphrina minor S a d. ad folia *Pruni fruticosae* loco olivum munito supra Předmostí ad Přerov (Z).

Otidea auricula (S c h ä f f.) R e h m. Humi in silva coniferina in convalli Babia dolina ad pedes mont. Bielské Tatry. Ascis 346×15.7 , sporis $23-27 \times 11.5 \mu$.

Lachnum nidulus (S c h m i d t et K u n z e) K a r s t. ad scapos siccos *Polygonati multiflori* in silvula Na Kamenici dicta a Turovice ad merid. (Z).

Coryne sarcoides (J a c q.) T u l. ad incisuram *Fagi silvaticae* in colle Kelčský Javorník.

Pseudopeziza bistortae (L i b.) F u c k. ad folia *Polygoni bistortae* summo monte Vozka in mont. Jeseníky (Z).

Fabraea astrantiae R e h m ad folia *Astrantiae maioris* in margine silvae in declivitate occidentali collis Hostýn (Z).

Pyrenopeziza nigrella F u c k. ad caules *Galeopsidis grandiflorae* in silva ad Dřevohostice (Z).

Scleroderma ribesia (P e r s.) K a r s t. ad ramos *Ribis rubri* in horto in Dřevohostice (Z).

**Cryptodiscus pallidus* (P e r s.) ad lignum fagale in colle Kelčský Javorník.

Lophodermium arundinaceum (S c h r a d.) C h e v. var. *actinothyrium* (F u c k.) R e h m ad culmos *Moliniae arundinaceae* S c h r k. loco exstirpationis in silva Ochozy ad occid. supra vicum Lipová ad Bystřice p. Host. (Z).

Hypomyces viridis (A l b. et S c h w.) B. et Br. ad fungos *Russulae* sp. ad Zad. Zhorec pr. Vel. Meziříčí.

Nectria ditissima T u l. ad corticem *Fagi silvaticae* in colle Kelčský Javorník.

Nectria cinnabarina (T o d e) F r. ad corticem *Aesculi hippocastani* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (Z).

Nectria ribis (T o d e) O u d. ad ramos *Ribis rubri* in horto in Dřevohostice (Z). Ascis $80 \times 12 \mu$, sporis $22 \times 7 \mu$.

**Pleonectria berolinensis* S a c c. ad ramos *Ribis aurei* in Dřevohostice (Z).

Polystigma ochraceum S a c c. ad folia *Pruni padi* a Dol. Lipová ad septentr. (Z).

Claviceps microcephala (W a l l r.) T u l. in ovariis *Calamagrostidis epigeios* ad viam na Pulčínách dictam a Vsetín ad merid. (Z).

Plowrightia ribesia (P e r s.) S a c c. ad ramos *Ribis rubri* in horto in Dřevohostice (Z).

Dothidea thoracella S a c c. ad folia *Sedi marimi* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).

Phyllachora bromi F u c k. ad folia culmosque *Bromi erecti* infra vivarium ad Dřevohostice (Z).

Chaetomium comatum (T o d e) F r. ad stramentum secalinum ad Radkov (Z).

Venturia geranii (F r.) W i n t. ad folia *Geranii silvatici* in montibus Bielské Tatry.

Mycosphaerella hederacola (D e s m.) L i n d a u as folia *Hederae helicis* in colle Sivec ad Margecany.

Mycosphaerella tirolensis (A u e r s w.) M a g n. ad folia *Polypodi vulgaris* in convalli ad Macocha locum praeruptum (Bílý). Sporibus adhuc immaturis, unicellularibus, 16μ longis ac 4μ latis, ascis 45μ longis ac $8-11 \mu$ latis.

Leptosphaeria derasa (B. et Br.) A u e r s w. ad caules *Senecionis nemorensis* in Kamenice pr. Turovice (Z).

Leptosphaeria eustoma (Fr.) S a c c. ad culmos *Deschampsiae caespitosae* ad Dřevohostice (Z). Ascis $60 \times 10 \mu$, sporis $23 \times 5 \mu$.

Leptosphaeria doliolum (Pers.) C e s. et D e N o t. ad scapos *Plantaginis lanceolatae* ad viam ad Dřevohostice (Z).

Leptosphaeria dolioloides (A u e r s w.) K a r s t. ad caules *Chrysanthemi vulgaris* in ripa Bečvae fl. ad Val. Meziříčí (Z). Ascis $100 \times 14 \mu$, sporis $48 \times 35 \mu$.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) C e s. et D e N o t. ad caules *Cimicifugae foetidae* in convalli Pustý žleb ad Macocha, locum praeuptum. In Slovenia adhuc ignota.

Pleospora media N i e s s l ad scapos *Plantaginis maioris* in confinio a Turovice ad merid. (Z); ad caules *Phyteumatis spicati* ad Mor. Knínice pr. Tišnov. Ascis $88 \times 23 \mu$, sporis $26.9 \times 11.5 \mu$.

**Pleospora meliloti* R b h. ad caules *Meliloti albi* in ripa fl. Moštěnka ad Turovice (Z).

Pleospora herbarum R b h. ad scapos *Allii cepae* in Dřevohostice (Z). Sporis $20 \times 13-14 \mu$; ad caules *Brassicae napi oleiferi* in agro ad Radkov (Z);

Cichorii intybi in silva Kamenice ad Turovice (Z).

Pleospora vulgaris N i e s s l ad caules *Dauci carotae* in Dřevohostice (Z).

Pleospora vagans N i e s s l ad culmos *Dactylis glomeratae* in silva in Břečtany a Dřevohostice ad merid. (Z).

Pyrenophora pellita (Fr.) S a c c. ad caules *Papaveris somniferi* in ripa fl. Moštěnka ad Turovice (Z).

Pleospora Spegazziniana S a c c. ad pedunculos *Catalpae* sp. in Praha (Paelt).

Ophiobolus tenellus (A u e r s w.) S a c c. ad caules *Cardui crispi* in silva ad Dřevohostice (Z).

Ophiobolus acuminatus (S o w.) D u b y ad caules *Cardui crispi* in fruticeto in ripa rivi a Žákovice ad septentr. (Z).

Ophiobolus compressus R e h m. ad caules *Cirsii arvensis* ad viam a Dřevohostice ad merid. (Z). Ascis $130 \times 10 \mu$, sporis $90 \times 4 \mu$.

Valsa ambiens (Pers.) F r. ad ramos *Rosae polyanthae* in horto in Dřevohostice (Z).

Valsa cincta F r. ad ramos *Pruni armeniaca* in horto in Dřevohostice (Z).

Valsa salicina (Pers.) F r. ad ramos *Salicis capreae* in silva Kamenice ad Turovice (Z).

Pseudovalsa irregularis (D. C.) S c h r ö t. ad ramos *Robiniae pseudacaciae* in Kruhy ad Tučapy (Z).

**Diaporthe dryophila* (N i e s s l) S a c c. ad ramos *Quercus sessilis* in silva Kamenice a Turovice ad merid. (Z).

**Metasphaeria Bellyneckii* S a c c. ad caules *Polygonati multiflori* in silva Kamenice a Turovice ad merid. (Z).

Basidiomycetes

Ustilagineae

Anthracoidea subinclusa (K ö r n.) B r e f. in ovariis *Caricis gracilis* in paludibus in silva Kančí obora ad Břeclav.

Ustilago utriculosa (N e e s) U n g e r in ovariis *Polygoni persicariae* ad Lanžhot.

**Ustilago spermophora* B e r k. et C u r t i s in ovariis *Eragrostidis minoris* in ripa Bečvae fl. ad Přerov (Z).

Ustilago striaeformis (W e s t.) N i e s s l in foliis *Holci lanati* in ripa graminosa Bystrčíckae fl. ad Lípová (Z).

Ustilago calamagrostidis (F u c k.) C l i n t. in foliis *Calamagrostidis epigeios* in declivitate Kruhy ad Tučapy (Z).

Ustilago panici glauci (W a l l r.) W i n t. in ovariis *Setariae glaucae* in agris circa collem Drevenik et ad vicum Dubrava pr. Spišské Podhradie.

Ustilago coronariae L i r o in antheris *Lychnidis flos cuculi* in silva Kozrál a Lišná pr. Přerov ad merid. (Z).

Ustilago scabiosae W i n t. in antheris *Kautiae silvaticae* in margine silvae Kozrál a Lišná ad merid. pr. Přerov (Z).

Tubercina anemones (Pers.) L i r o in foliis *Anemonis nemorosae* ad Lanžhot.

Tubercina colchici (S c h l e c h t.) L i r o in foliis *Colchici autumnalis* in summo collis Pouzdřanské kopce ad Hustopeče.

Tubercina agropyri (P r e u s s) L i r o in foliis *Agropyri repentis* in colle Zobor ad Nitra.

Ustilago violacea T u l. in antheris *Dianthi Carthusianorum* ad fodinam Kukla pr. Oslavany copiose.

Tolyposporium leptideum S y d. in ovariis *Chenopodii albi* in et ad Strážnice.

- Entyloma hieracii* S y d. in foliis *Hieracii inuloidis* in summo montis Králický Sněžník (Z).
Entyloma dahliae S y d. in foliis *Dahliae variabilis* in Val. Meziričí.
Entyloma crepidicola T r o t t e r in foliis *Crepidis tectorum* in agro a Dřevohostice ad septentr. (Z).
Entyloma bellidiastri M a i r e in foliis *Bellidiastri Michelii* in convalli rivi Reglany potok in montibus Bielské Tatry.

Uredinales

- Uredinopsis flicina* (N i e s s l) M a g n. ad folia *Phegopteridis polypodioidis* ad rivum Reglany potok in Bielské Tatry.
Pucciniastrum Goepertianum (K ü h n) K l e b. ad famulos *Vaccinii vitis idaeae* in silvis ad Žďár ad merid., ad Bílek pr. Chotěboř.
Melampsora larici-epitea K l e b. ad folia *Salicis retusae* in Široké pole infra montem Vidla in mont. Bielské Tatry.
Cronartium asclepiadeum (W i l d.) F r. ad ramos *Pini silvestris* in Josefské údolí pr. Adamov, in colle Květnice ad Tišnov.
Coleosporium doronici N a m y s l. ad folia *Doronici austriaci* ad rivum Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
Endophyllum euphorbiae silvaticae (D C.) W i n t. ad folia *Euphorbiae amygdaloidis* in mont. Bielské Tatry rare.
Thekopsora galii (L k.) D e T o n i ad folia *Galii silvatici* in montibus Bielské Tatry satis disseminata.
Thekopsora vacciniorum K a r s t. ad folia *Vaccinii vitis idaeae* in sphagneto Hutě in convalli Ostravice fl. a Staré Hamry ad septentr. (Z).
Uromyces Kabatianus B u b. ad folia *Geranii pyrenaici* ad Jaroslavice pr. Znojmo.
Uromyces behenii U n g. ad folia *Silenis vulgaris* in declivitate fruticosa supra Dol. Lipová (Z).
Uromyces ranunculi-festucaae J a a p. ad folia *Festucaae heterophyllae* L a m. in silva ad Dřevohostice (Z).
Uromyces genistae tinctoriae (P e r s.) W i n t. ad folia *Cytisi nigricantis* in deolivi collis Hostýn (Z).
Uromyces striatus S c h r ö t. ad folia *Trifolii campestris* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
Uromyces Fischeri Eduardi P. M a g n. ad folia *Viciae craccaae* in prato Na Bařinách dicto ad Rychlov (Z).
Uromyces veratri D. C. ad folia *Veratri Lobeliani* ad rivum Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
Uromyces cristatus S c h r ö t. ad folia *Viscariaae vulgaris* in margine silvae in colle Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
Uromyces thapsi (O p i z) B u b. ad folia *Verbasci phlomidis* ad fodinam Gabriela in Karvinná (Z), ad Král. Pole anno 1948 copiose.
Uromyces alchemillae (P e r s.) W i n t. ad folia *Alchemillae alpestris* in montibus Bielské Tatry disseminata.
Puccinia thesii (D e s v.) C h a i l l. ad folia caulesque *Thesii linophylli* in pratis Mandáty dictis ad Radějov prope Strážnice ad merid. (Pbr et Z).
Puccinia Zopfii W i n t. ad folia *Calthae palustris* in convalli Ostravice fl. ad Staré Hamry (Z), in ripa rivi Golias in mont. Bielské Tatry.
Puccinia soldaneliae (D C.) W i n t. ad folia *Soldaneliae carpathicaae* in convalli rivi Babin potok, in pratis Široké pole infra montem in mont. Bielské Tatry.
Puccinia prenanthes purpureae (P e r s.) L i r o ad folia *Prenanthis purpureae* in convalli rivi Reglany potok Žďiar mont. Bielské Tatry.
Puccinia mulgedii S y d. ad folia *Mulgedii alpini* in convalli Reglany potok ad Žďiar in mont. Bielské Tatry.
Puccinia asperulae cynanchicaae W u r t h. ad folia *Asperulae cynanchicaae* ad Dřevohostice ad septentr. (Z).
Puccinia gentianae S t r a u s s ad folia *Gentianae cruciataae* in collibus Branisko pr. Spišské Podhradie.
Puccinia bromina E r i k s. ad folia *Bromi inermis* ad Dřevohostice (Z). Accidia ad folia *Symphyti tuberosi et officinalis* in pratis ad Pavlov pr. Radějov ad Strážnice copiosissime (Pbr et Z).
Puccinia ariae (L g h.) C r u c h. et M a y o r ad folia *Deschampsiae caespitosae* in boreali declivitate collis Bukovina in collibus Hostýnské kopce (Z).
Puccinia perplexans P l o w r. ad folia *Alopecuri pratensis* a Turovice ad merid. (Z).

- Puccinia graminis* Pers. ad folia *Festucae giganteae* in silva ad Dřevohostice (Z).
Puccinia coronata Corda ad folia *Holci mollis* in silva ad Dřevohostice (Z).
Puccinia silvatica Schröt. ad folia *Caricis Schreberi* ad Oslavany.
Puccinia firma Diet. Aecidia ad folia *Bellidiiastri Michellii* in convalli rivi Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
Puccinia obscura Schröt. ad folia *Luzulae luzulinae* in silva colle Javorník a Vel. Karlovice ad merid. (Z).
Puccinia polygoni vivipari Karst. ad folia *Polygoni vivipari* in pratis ad Tatranská Kotlina, in pratis Široké pole infra montem Vidla in mont. Bielské Tatry.
Puccinia veratri Duby ad folia *Veratri nigri* in convalli fl. Ostravice a Staré Hamry ad septentr. (Z).
Puccinia Komarovii Tranzsch. ad folia *Impatientis parviflorae* in hortis collis Petřín in Praha (Z).
Puccinia acetosae Körn. ad folia *Rumicis acetosae* in declivitate boreali montis Kněhyně in mont. Beskydy (Z).
Puccinia pyrethri Rbh. ad folia *Chrysanthemi corymbosi* ad Tatranská Kotlina et in prato Široké pole infra montem Vidla in mont. Bielské Tatry.
Puccinia Schirajewskyi Tranzsch. ad folia *Serratulae lycopiifoliae* in pratis Mandáty dietis a Radějov pr. Strážnice ad merid.
Puccinia absinthii D. C. ad folia *Artemisiae absinthii* in Margecany.
Puccinia echinopis D. C. ad folia *Echinopis sphaerocephali* ad Medlánky pr. Brno.
Puccinia carlinae Jacky ad folia *Carlinae acaulis* in collibus Branisko ad Dubrava pr. Spiš. Podhradie.
**Puccinia Passerinii* Schröt. ad folia *Thesii linophylli* in pratis Mandáty dietis ad Radějov pr. Strážnice (Pbr. et Z).
Puccinia millefolii Fuek. ad folia *Achilleae millefolii* ad Brněnské Ivanovice et ad Soběšice pr. Brno.
Puccinia valantiae Pers. ad folia *Galii verni* in margine silvae ad Dřevohostice (Z), in colle Dreveník ad Spiš. Podhradie.
Puccinia arenariae (Schum.) Wint. ad folia *Melandryii silvestris* in margine silvae ad rivum Kozrál pr. Lišná ad Přerov (Z).
Puccinia Volkartiana E. Fisch. ad folia *Androsaces chamaejasmis* in convalli rivi Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart. aecidia ad folia *Sorbi ariae* in declivitatibus collis Branisko ad Spiš. Podhradie.
Phragmidium fusiforme Schröt. ad folia *Rosae pendulinae* in colle Branisko pr. Spiš. Podhradie.
Triphragmium ulmariae (Schum.) Wint. ad folia caulesque *Spireae ulmariae* ad rivum Chlébský potok pr. Nedvědice, in convalli rivi Golias potok in mont. Bielské Tatry.
Uredo poae sudeticae West. ad folia *Poae Chaiivii* in summo montis Král. Sněžník.

Hymenomycetes

- Achroomyces tiliae* (Lasch.) v. H. ad ramos *Tiliae cordatae* ad Bilek pr. Chotěboř.
Gyrocephalus rufus (Jacq.) Bref. humi in ripa rivi Babin potok in mont. Bielské Tatry.
Exobasidium vaccinii uliginosi Boud. ad folia *Vaccinii vitis idaeae* in sphagneto Hutě in convalli Ostravice fl. a Staré Hamry ad septentr.
Typhula filiformis (Bull.) Fr. ad folia deiceta in colle Hády ad Brno.

Fungi imperfecti

- Phyllosticta atriplicis* Desm. ad folia *Atriplicis roseae* in Prosek ad Praha (Z);
Chenopodii boni Henrici in vico Maršovice ad Mor. Krumlov.
Phyllosticta chenopodii Saec. ad folia *Chenopodii bonus Henricus* in Radňovice pr. Nové Město na Mor.
Phyllosticta typhae (Pas.) Allesch. ad folia *Typhae latifoliae* in uliginosis ad Dřevohostice ad orient. (Z).
Phyllosticta populina Saec. ad folia *Populi tremulae* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
**Phyllosticta ranunculacearum* Saec. et Speg. ad folia *Ranunculi lanuginosi* in ripa rivi ad Slavkov in collibus Hostýnské kopce (Z).
Phyllosticta apetala Allesch. ad folia *Aceris campestris* supra laterum ductum in vico Předmostí ad Přerov (Z).

Phyllosticta filipendulina Sacc. et Speg. var. *ulmariae* Sacc. ad folia *Spireae ulmariae* in margine silvae ad Dřevohostice (Z).

**Phyllosticta variabilis* Peck. ad folia *Rubi ambifarii* P. J. Müller in confinio fruticoso Brečtany dicto a Dřevohostice ad merid. (Z).

Phyllosticta argillacea Bres. ad folia *Rubi caesii* ad marginem silvae Kozrál ad Lišná pr. Přerov (Z).

**Phyllosticta grandimaculans* Bub. et Krieg. ad folia *Fragariae vescae* in margine silvae in colle Stolečný in mont. Javorníky (Z).

**Phyllosticta cathartici* Sacc. ad folia *Rhamni cathartici* in declivitate supra Dol. Lípová ad merid. (Z). E Moravia ignota, in Slovenia advenit ad Bratislava.

**Phyllosticta mahoniana* (Sacc.) Allesch. ad folia *Mahoniae aquifolii* in Dřevohostice (Z).

Phyllosticta adventa Pass. ad folia *Robiniae pseudacaciae* in ripa Bečvae fl. a Přerov ad orient. (Z).

Phyllosticta viciae (Lib.) Cook. ad folia *Viciae sepium* in hortis Michalov in Přerov (Z); *Viciae villosae* in agro in declivitate Kamenice a Turovice ad merid. (Z).

Phyllosticta cytisi Desm. ad folia *Genistae tinctoriae* in silva ad Dřevohostice (Z).

**Phyllosticta cytisella* Sacc. ad folia *Cytisi capitati* in margine silvae Kostelecký les ad Pacetluky pr. Holešov (Z).

**Phyllosticta epilobii* Brun. ad folia *Epilobii montani* in silva ad Dřevohostice rare (Z).

**Phyllosticta calystegiae* Sacc. ad folia *Calystegiae sepium* in margine silvae Kostelecký les ad Lišná pr. Bystrice p. Host. (Z).

**Phyllosticta ovalifolii* Brun. ad folia *Ligustri vulgaris* in declivitate Polomsko supra Rajnochovice (Z).

Phyllosticta syringae West. ad folia *Syringae vulgaris* in horto in Dřevohostice (Z).

**Phyllosticta eleagni* Sacc. ad folia *Eleagni angustifoliae* in horto Podzámecká zahrada in Kroměříž (Z).

Phyllosticta Kriegeriana Bres. ad folia *Melampyri nemorosi* in silva Žebračka ad Přerov (Z).

**Phyllosticta verbasci* Sacc. ad folia *Verbasci phlomidis* ad fodinam Gabrielae in Karvinná (Z).

**Phyllosticta orbicularis* Ell. et Ev. ad folia *Cucurbitae peponis* in horto in Dřevohostice (Z).

**Phyllosticta campanulae* Sacc. et Speg. ad folia *Campanulae trachelium* in convalli Suchý žleb ad Macocham, locum praeruptum. Sporis $77 \times 2.6-3 \mu$.

Phyllosticta sonchii Sacc. ad folia *Sonchii arvensis* in agro in Gruň-Staré Hamry (Z).

Phoma urticae (Pers.) Berk. ad caules *Urticae dioicae* in ripa fl. Bystříčka a Dřevohostice ad merid. (Z), ad Bílek pr. Chotěboř. Sporis unicellularibus 7.7×3 , bicellularibus $11.5 \times 3.8 \mu$

Phoma oblonga Desm. = *Ph. eres* Sacc. ad ramos *Ulni montanae* in silvula ad Dřevohostice (Z).

Phoma nebulosa (Pers.) Mont. ad caules *Solani tuberosi* in agro ad Dřevohostice (Z).

**Phoma sambucina* Sacc. ad ramulos *Sambuci nigrae* in declivi Kamenice ad Turovice et in silvula a Blažice ad septentr. (Z).

**Phoma solidaginis* Cooke ad caules *Solidaginis serotinae* in ripa Bečvae fl. ad Val. Meziríčí (Z).

Phoma acuta Fück. ad caules *Scrophulariae nodosae* in ripa Moštěnka fl. ad Turovice (Z).

Phoma melaena (Fr.) Mont et Dur. ad caules *Silenis nutantis* in clivo Kamenice ad Turovice (Z);

Turritis glabrae in silva ad Dřevohostice (Z);

Medicaginis falcatae in confinio a Dřevohostice ad merid. (Z);

Chenopodii albi in ripa Moštěnka fl. ad Dřevohostice (Z);

Viciae silvaticae in silva ad Dřevohostice (Z);

Silenis vulgaris Garcke. in clivo Kamenice ad Turovice (Z). Sporis maioribus $8 \times 3 \mu$.

Phoma ramealis Desm. ad ramulos *Evonymi vulgaris* in fruticeto a Turovice ad merid. (Z) Sporis $9 \times 3 \mu$.

**Phoma epilobii* Preuss. ad caules *Epilobii hirsuti* ad paludem in silva ad Dřevohostice (Z). Sporis ovatis $8 \times 4 \mu$.

Phoma herbarum West. f. *dianthi* Fragoso ad caules *Dianthi superbi* in margine boreali silvae Ochozy a Dřevohostice ad merid. (Z).

Phoma polygramma (Fr.) Sacc. var. *plantaginis* Sacc. ad scapos *Plantaginis lanceolatae* ad Turovice (Z).

Phoma herbarum West. ad caules *Convolvuli sepium* in silva ad Dřevohostice (Z).

Phoma Zopfiana Allesch. ad caules *Ononidis spinosae* ad Dřevohostice (Z).

- **Phoma Durandiana* Sacc. et Roum. ad caules *Rubi obtusifolii* in ripa rivi a Žákovic pr. Bystřice p. Host. ad septentr. (Z).
- Phoma rosae* Schulz. et Sacc. ad ramos *Rosae polyanthae* in Dřevohostice (Z).
- **Phoma barbarae* Cooke ad ramulus *Lycii barbarum* ad castelum in Jaroslavice ad Znojmo.
- **Phoma betonicae* Sacc. ad caules *Betonicae officinalis* in margine silvae Ochozy supra pagum Lípov (Z).
- Phoma polygramma* (Fr.) Sacc. ad caules *Ballotae nigrae* in Lípová (Z).
- Phoma achilleae* Sacc. ad caules *Achilleae millefolium* in declivitate Kamenice ad Turovice (Z).
- Phoma podagrariae* Bres. ad caules *Aegopodii podagrariae* in declivitate Kamenice ad Turovice (Z).
- **Phoma torilis* Syd. ad caules *Torilis anthriscus* in silva ad Dřevohostice (Z).
- **Phoma laserpitii* Fautr. ad caules *Laserpitii archangelicae* in colle Ožínák in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Phoma glandicola* Lé v. ad glandes *Quercus sessilis* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Dothiorella Berengiana* Sacc. ad ramos *Tiliae cordatae* ad Havlíčkův Brod.
- Cytospora cincta* Sacc. ad ramos siccos *Pruni armeniaca* in Dřevohostice (Z).
- Cytospora coenobiotica* Sacc. ad corticem *Abni incanae* in ripa Bystřické fl. ad Lípová (Z).
- Cytospora carphosperma* Fr. ad ramos *Tiliae cordatae* in silvula ad Blazice (Z).
- Cytospora pinastri* Fr. ad acus *Taxi baccatae* in horto in Všechnovice pr. Bystřice p. Host. (Z).
- Sporonema campanulae* (DC.) Petr. ad folia *Campanulae trachelium* in convalli Zadielská dolina ad Turna n. B.
- **Placosphaeria coronillae* Sacc. ad folia *Coronillae variae* ad Chromeč pr. Šumperk (Baudyš).
- Asteroma padi* Grev. ad folia *Pruni padi* in declivi supra Lípová ad septentr. (Z).
- Ascochyta graminicola* Sacc. ad folia *Echinochloae crus galli* in ripa Moštěnkae fl. ad Turovice (Z).
- Ascochyta humuli* Kab. et Bub. ad folia *Humuli lupuli* in margine silvae ad Dřevohostice (Z).
- Ascochyta aquilegiae* (Rbh.) v. H. ad folia *Aquilegiae vulgaris* in hortis castellanis in Vsetín (Z).
- **Ascochyta violae* Sacc. et Speg. ad folia *Viola mirabilis* in silva ad Dřevohostice (Z).
- **Ascochyta viciae* Lib. ad folia *Viciae cracca* in hortis Michalov in Přerov (Z).
- Ascochyta viciae pisiformis* Bub. ad folia *Viciae pisiformis* in silva in ruina arcis Křídla in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Ascochyta impatientis* Bres. ad folia *Impatientis parviflorae* in Petřín in Praha (Z).
- **Ascochyta diplodina* Berl. et Bres. ad folia *Hederae helix* ad Rajnochovice (Z).
- **Ascochyta staphyleae* Syd. ad folia *Staphyleae pinnatae* in hortis Podzámecká zahrada in Krončříž (Z).
- Ascochyta telepii* Vesterg. ad folia *Sedi maximi* in clivo Kamenice a Turovice ad merid. (Z).
- Ascochyta imperfecta* Peck. ad folia *Medicaginis sativae* in agro ad Dřevohostice (Z).
- Ascochyta medicaginis* Bres. ad folia *Medicaginis falcatae* in occidentali declivitate collis Hostýn (Z).
- Ascochyta altheina* Sacc. et Bizz. ad folia *Althaeae officinalis* in ripa Radkovic fl. ad Dřevohostice (Z).
- Ascochyta evonymicola* Allesch. ad ramos *Evonymi europaeae* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
- **Ascochyta heraclei* Bres. ad folia *Heraclei sphondylii* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
- **Ascochyta Feuilleuboissiana* Sacc. et Roum. ad folia *Rubi saxatilis* ad rivum Golias potok in mont. Bielské Tatry.
- **Ascochyta viburni* (Roum.) Sacc. ad folia *Viburni lantanae* in silva ad Radějov pr. Strážnice ad merid. (Z).
- **Ascochyta lamiorum* Sacc. ad folia *Lamii albi* in horto in Dřevohostice (Z).
- **Ascochyta valerianae* Smith et Ramsb. ad folia *Valerianae sambucifoliae* in silva ad Rejvíz Silesiae (Z).
- Ascochyta sambuci* Sacc. ad folia *Sambuci nigrae* in horto in Dřevohostice (Z).
- **Ascochyta hieracii* Lasch. ad folia *Hieracii pilosellae* in declivitate Skalný in collibus Hostýnské kopce (Z).
- **Ascochyta cirsii* Died. ad folia *Cirsii cani* in prato humido in Kamenice ad Turovice (Z).
- Cirsii oleracei* in pratis ad Lhota Radkova (Z).

- Diplodina medicaginis* O u d. ad caules *Medicaginis sativae* in ripa Radkovkae fl. a Dřevohostice ad orient. (Z).
- Diplodina pimpinellae* H o l l ó s ad caules *Pimpinellae magnae* in silvula Kamenice a Turovice ad merid. (Z).
- Diplodina anthrisci* B a u d y š ad caules *Torilis anthrisci* in ripa rivi a Žákovice ad septentr. (Z).
- **Diplodina erigerontis* (O p i z) K u p k a ad caules *Erigerontis canadensis* in silva ad Dřevohostice (Z).
- **Diplodia ribis* S a c c. ad ramos *Ribis rubri* in Dřevohostice (Z).
- **Diplodia morina* S y d. ad ramos *Mori nigrae* in horto in Dřevohostice (Z).
- Septoria caricis* P a s s. ad folia *Caricis pibuliferae* in pratis Vojšické louky ad Radějov pr. Strážnice (Z);
- Caricis pendulinae* in silva ad Radějov pr. Strážnice (Z). Spor. 20—27 × 1.9 μ.
- **Septoria agropyri* E l. et E v. ad folia *Agropyri repentis* in declivitate supra laterum ductum in Předmostí ad Přerov (Z).
- **Septoria molinia* S y d. ad folia *Moliniae serotinae* in sphagneto in monte Keprník in mont. Jeseniky (Z).
- Septoria salicicola* (F r.) S a c c. ad folia *Salicis fragilis* in elivo Kamenice a Turovice ad merid. (Z).
- Septoria dubia* S a c c. et S y d. ad folia *Quercus roboris* in silvula Na Pálenici dicta a Bystrice p. Host. ad septentr. (Z).
- Septoria gladioli* P a s s. ad folia *Gladioli communis* in hortis Michalov in Přerov (Z).
- Septoria melandryi* P a s s. ad folia *Melandryi silvestris* in summo montis Králický Sněžník, in ripa rivi ad Sulov in mont. Beskydy (Z).
- **Septoria arabidis* S a c c. ad folia *Arabidis sp.* in montibus Bielské Tatry. In montibus Tatrensibus a Rouppert in finibus Poloniae lecta.
- Septoria alni* S a c c. ad folia *Alni rotundifoliae* in ripa Moštěnkae fl. ad Přerov (Z).
- Septoria staphyleae* P a s s. ad folia *Staphyleae pinnatae* in hortis Podzámecká zahrada in Kroměříž (Z).
- Septoria hyperici* D e s m. ad folia *Hyperici acuti* M n e c h. in fonte infra Pulčanské skály a Vsetín ad merid. (Z).
- Septoria expansa* N i e s s l ad folia *Geranii sanguinei* in declivitate Polomsko supra Rajnochovice (Z).
- Septoria geranii* R o b e r t. ad folia *Geranii pusilli* in ripa Říka ad Lhota Chvalčova (Z).
- Septoria ficariae* D e s m. ad folia *Ranunculi ficariae* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Septoria menyanthis* D e s m. ad folia *Menyanthis trifoliatae* in sphagneto Hutě in convalli Ostravice fl. ad Staré Hamry (Z).
- Septoria anthyllidis* S a c c. ad folia *Anthyllidis vulnerariae* ad speluncam ad Tatranská Kotlina.
- Septoria curvata* S a c c. ad folia *Robiniae pseudacaciae* in silva ad Dřevohostice (Z).
- **Septoria lupinicola* D e a r n e s s ad folia *Lupini polyphylli* in margine silvae in cole Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Septoria hederæ* D e s m. ad folia *Hederæ helicis* in horto in Dřevohostice (Z).
- **Septoria silvestris* P a s s. ad folia *Lathyri silvestris* in declivitate supra Dol. Lípová (Z).
- Septoria aegopodina* S a c c. ad folia *Pimpinellae saxifragae* in margine silvae in convalli rivi Břestový potok ad Staré Hamry (Z).
- Septoria ribis* D e s m. ad folia *Ribis grossulariae* in convalli rivi Babin potok in mont. Bielské Tatry.
- **Septoria asperulae* B ä u m l. ad folia *Asperulae odoratae* in margine silvae in elivo Stolečný (Postaši) (Z). Nota solum a Přenčov, ubi Kmet legit.
- Septoria agrimoniae eupatoriae* B o m m. et R o u s s. ad folia *Agrimoniae eupatoriae* in declivitate boreali elivis Kyčera in mont. Javorníky (Z).
- **Septoria Toševi* B u b. ad folia *Gentiana sp.* in prato ad Švajgrovka in declivitate collis Hostýn (Z). A Bubák ex Bulgaria descripta.
- **Septoria menthicola* S a c c. et L e t e n d r e ad folia *Menthae aquatica* ad ripam rivuli in silva ad Dřevohostice (Z).
- Septoria stachydis* R o b. et D e s m. ad folia *Stachydis silvaticae* in silva Kančí obora ad Břeclav.
- Septoria lamii* P a s s. ad folia *Lamii albi* in silva Dolina rivi Břestový potok ad Staré Hamry (Z).
- Septoria cruciatae* R o b. et D e s m. ad folia *Galii Schultesii* in silva Polomsko ad Rajnochovice (Z).
- Septoria Brissaceana* S a c c. et L e t e n d r e ad folia *Lythri salicariae* ad Rychlov (Z).

- Septoria cirsii* Niessl ad folia *Cirsii arvensis* in silva ad Dřevohostice (Z).
Cirsii eriophori in declivitate montis Javorník in mont. Javorníky (Z).
Cirsii erythralis ad Tatranská Kotlina et in mont. Bielské Tatry.
 **Septoria Muraei* Trotter = *S. taraxaci* Syd. ad folia *Taraxaci officinalis* in ripa rivi ad Dol. Lípová (Z).
 **Septoria virgaureae* Desm. ad folia *Solidaginis serotinae* in ripa Bečvae fl. a Přerov ad orient. (Z).
Septoria senecionis West. ad folia *Senecionis Fuchsii* in monte Král. Sněžník (Z).
Senecionis fluviatilis in ripa Rusavae fl. in silva Zámeček a Kroměříž ad orient. (Z).
Septoria borealis Bub. et Kab. ad folia *Galii borealis* in prato in declivitate orientali collis Hostýn (Z).
Septoria tinctoriae Brun. ad folia *Seratulae tinctoriae* in merid. declivi Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
Phlyctaena lappae (Karst.) Sacc. ad caules *Lappae* sp. in clivo Kamenice a Turovice ad merid. (Z).
 **Stagonospora Jaapii* Die. ad folia *Caricis leporinae* in via silvatica Pálenice versus a Bystřice p. Host. ad septentr. (Z).
Stagonospora gigaspora (Niessl) Sacc. ad folia *Caricis leporinae* in silva in Clivo a Sulov ad orient.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc. ad folia *Moliniae coeruleae* in prato humido ad Dol. Lípová (Z).
Stagonospora carpathica Bauml. ad folia *Meliloti officinalis* in ripa Moštěnkae fl. ad Turovice (Z).
Rhabdospora betonicae Sacc. et Briard ad caules *Betonicae officinalis* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
Rhabdospora pachyderma Kab. et Bub. ad scapos *Plantaginis lanceolatae* ad viam pr. Rychlov ad Bystřice p. Host. (Z).
 **Rhabdospora coriacea* Bub. ad caules *Centaureae oxylepis* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
Rhabdospora pleosporoides Sacc. ad caules *Rumicis obtusifolii* ad rivum ad Břečtany a Dřevohostice ad merid. (Z);
 var. *Bosciana* Sacc. ad caules *Eupatorii cannabii* ad Dřevohostice (Z).
 **Rhabdospora campanulae cervicariae* Vesterg. = *Jahniella c. c.* Petr. ad caules *Campanulae rotundifoliae* ad Mor. Knínice pr. Tišnov.
 **Camarosporium laburnicum* Sacc. ad ramos *Cytisi laburni* in publico sepulcrorum loco in Kroměříž (Z).
Camarosporium laburni (West.) Sacc. ad ramos *Cytisi laburni* in Kruhy ad Tučapy (Z).
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc. ad folia *Alni glutinosae* in ripa Juhyně fl. ad Podhradní Lhota in collibus Hostýnské kopce (Z).
 **Leptostroma eupatorii* Altesch. ad caules *Eupatorii cannabii* in silva ad Dřevohostice (Z).
 **Discella carbonacea* (Fr.) B. et Br. ad ramos *Salicis capreae* in clivo Kamenice ad Turovice (Z). Adhuc a Levoča solum nota.
 **Gleosporium Fuckelii* Sacc. ad folia *Fagi silvaticae* in silva Na Bukovině in collibus Hostýnské kopce (Z).
Gleosporium betulinum West. ad folia *Betulae pubescentis* in silva ad Dřevohostice (Z).
Gleosporium tremulae Pass. ad folia *Populi tremulae* in declivitate meridionali clivis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
Gleosporium platani (Mont.) Oud. = *Gleosporidium* p. v. H. ad folia *Platani orientalis* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (Z).
 **Gleosporium fragariae* (Lib.) Mont. ad folia *Potentillae argenteae* in declivitate meridionali clivis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z);
Fragariae collinae in margine silvae ad Radějov pr. Strážnice (Z).
Gleosporium caulivorum Kirch. ad folia caulesque *Trifolii medii* in cole Skalný in collibus Hostýnské kopce (Z).
Marssonía iuglandis Lib. Sacc. ad folia *Juglandis nigrae* in silva Zámeček ad Kroměříž (Z).
Marssonía Sennenii Gonnz. Frag. ad folia *Sanguisorbae officinalis* in ripa Radkovic fl. a Dřevohostice ad orient. (Z).
Marssonía Delastreii (DeLacr.) Sacc. ad folia *Silenis armeriae* in horto in Dol. Lípová (Z);
Melandryi albi ad stationem viae ferreae Kúty infra Praděd (Z);
Cucubali bacciferi in margine silvae ad Dřevohostice (Z).

- **Naemospora tiliae* De la c r. in ramo *Tiliae cordatae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (Z).
- **Naemospora microspora* Des m. ad ramos *Carpini betuli* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (Z).
- Septogloeum fragariae* v. H. ad folia *Fragariae vescae* in declivitate orientali collis Hostýn (Z);
- Fragariae collinae* in declivitate occidentali collis Hostýn (Z).
- Septogloeum laserpütii* (B res.) Magn. ad folia *Laserpütii latifolii* in pratis Vojčické louky ad Radějov pr. Strážnice (Z et Pbr).
- Scolecoporium typhae* (O u d.) v. H. ad folia *Typhae latifoliae* in paludi ad Turovice (Z).
- **Libertella syringae* O u d. ad ramos *Syringae vulgaris* in Dřevohostice (Z).
- Kabatia mirabilis* B u b. ad folia *Lonicerae xylostei* in margine silvae supra Dol. Lípová (Z).
- Cylindrosporium ficariae* B e r k. ad folia *Ranunculi ficariae* ad molas Devět mlýnů ad Znojmo.
- **Cylindrosporium niveum* B. et B r. ad folia *Calthae palustris* in pratis inter Drnovice et Val. Klobouky.
- Ovularia bistortae* (F u c k.) S a c c. ad folia *Polygoni bistortae* in monte Vozka in montibus Jeseníky (Z).
- Ovularia haplospora* S p e g. ad folia *Alchemillae vulgaris* in silvula Břečtany a Dřevohostice ad merid. (Z).
- Ovularia Schröteri* (K ü h n) S a c c. ad folia *Alchemillae vulgaris* in declivitate collis Benešek in Hor. Bečva (Z).
- **Ovularia caduca* V o s s. ad folia *Circaeae lutetianae* in silva ad Dřevohostice (Z).
- **Ovularia stellariae* (R b h.) S a c c. ad folia *Stellariae nemorum* in declivitate occidentali montis Kěhyně in mont. Beskydy (Z).
- **Ovularia sphaeroidea* S a c c. ad folia *Loti uliginosi* in sphagneto in convali rivi Břestový potok ad Staré Hamry (Z).
- **Ovularia ovata* F u c k. ad folia *Salviae pratensis* in declivitate olim munita supra Předmostí ad Přerov (Z).
- **Ovularia carneola* S a c c. ad folia *Scrophulariae alatae* in fossa a Hor. Újezd ad septentr. (Z).
- Ovularia gnaphalii* S y d. ad folia *Gnaphalii norvegiici* in declivitate orientali montis Šerák in mont. Jeseníky (Z);
- Gnaphalii uliginosi* et *silvatici* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Ovularia Vossiana* (T h ü m.) S a c c. ad folia *Cirsii lanceolati* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Botrytis parasitica* C a v. var. *colchici* V o g l. ad folia *Colchici autumnalis* in prato a Osíčko ad orient. pr. Bystřice p. Host. (Z).
- **Fusoma Feurichii* H. et P. S y d o w ad folia caulesque *Lathyrus silvestris* in declivitate orient. collis Hostýn et montis Smrk (Hubertka) in mont. Beskydy (Z).
- Ramularia macularis* (S c h r ö t.) S a c c. ad folia *Chenopodii boni Henrici* in Radňovice pr. Nové Město na Mor.
- **Ramularia decipiens* E l. et E v. ad folia *Rumicis obtusifoliae* in declivitate collis Hostýn (Z).
- Ramularia pratensis* S a c c. ad folia *Rumicis arifolii* in margine silvae collis Stolečný in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Ramularia lychnicola* C o o k e ad folia *Melandryi albi* in Dol. Lípová (Z).
- Ramularia monticola* S p e g. ad folia *Aconiti sp.* in mont. Bielské Tatry.
- **Ramularia biflorae* M a g n. ad folia *Violae biflorae* in declivitate infra Vřesová studánka in mont. Jeseníky (Z).
- Ramularia calthae* L i n d r. ad folia *Calthae palustris* ad Turovice (Z).
- Ramularia erodii* B r e s. ad folia *Erodii cicutarii* in ripa Moštěnkae fl. ad Turovice (Z).
- Ramularia lactea* (D e s m.) S a c c. ad folia *Violae odoratae* in hortis castellanis in Vsetín (Z).
- Ramularia agrestis* S a c c. ad folia *Violae tricoloris* in Dřevohostice (Z).
- Ramularia arcensis* S a c c. ad folia *Potentillae anserinae* in Dol. Lípová (Z).
- **Ramularia ulmariae* C o o k e ad folia *Filipendulae ulmariae* ad silvam Ochozy propius Lípová (Z).
- Filipendulae vulgaris* in ripa Radkovkae fl. a Dřevohostice ad orient. (Z).
- **Ramularia malvae* F u c k. ad folia *Malvae neglectae* in vico Lišná (Z).
- Ramularia geranii* (F u c k.) W e s t. ad folia *Geranii silvatici* in silvae margine collis Stolečný Portáš in mont. Javorníky (Z).
- Ramularia punctiformis* (S c h l e c h t.) v. H. ad folia *Epilobii palustris* infra Vřesová studánka in mont. Jeseníky (Z).

- Ramularia loticola* M a s s. ad folia *Loti uliginosi* in fossa in silva Podolanky a Staré Hamry ad occident. (Z).
- **Ramularia levistici* O u d. ad folia *Levistici officinalis* in horto in Sulov et in Dol. Lípová (Z).
- Ramularia cortusae* P e t r. ad folia *Cortusae Mathioli* in convalli Babin potok et in aliis convallibus montium Bielské Tatry disseminata. Semper in forma *Ovularia cortusa* P b r.
- Ramularia primulae* T h ü m. ad folia *Primulae hybridae* in horto in Dřevohostice (Z).
- Ramularia evanida* S a c c. ad folia *Gentianae asclepiadeae* in mont. Bielské Tatry.
- **Ramularia Harioti* S a c c. ad folia *Brunellae vulgaris* in silva Kozrál a Líšná ad merid. (Z).
- **Ramularia lamicola* M a s s. ad folia *Lamii maculati* in summo collis Hostýn (Z).
- Ramularia scrophulariae* F a u t r. et R o u m e g. ad folia *Scrophulariae alatae* in ripa Kozrál fl. a Líšná ad merid. (Z).
- **Ramularia melampyryna* M a s s. ad folia *Melampyri arvensis* in silvula collis Kamenice ad Turovice (Z).
- Ramularia exilis* H. et P. S y d. ad folia *Lamii lutei* in silva Kozrál a Líšná ad merid. (Z).
- Ramularia menthicola* S a c c. ad folia *Menthae longifoliae* in ripa Bystřičkae fl. ad Lípová ad Bystřice p. Host. et ad Dřevohostice (Z).
- Ramularia valerianae* (S p e g.) S a c c. ad folia *Valerianae tripteris* in convalli Divoká dolina infra montem Praděd (Z).
- Ramularia macrospora* F r e s. ad folia *Campanulae trachelii* in silvula Kamenice a Turovice ad merid. (Z);
- Campanulae persicifoliae* in silva ad Bzenec (Z);
- Campanulae rapunculoidis* in colle Hoblík ad Louny, ad Pajstún pr. Stupava;
- Campanulae* sp. in collibus Kováčovské kopce Sloveniae merid.
- var. *trachelii* S a c c. ad folia *Campanulae trachelii* ad pedes collis Kobyla ad Děvín.
- **Ramularia eximia* B u b. ad folia *Crepidis tectorum* in agro ad Dřevohostice (Z);
- Crepidis* sp. in mont. Bielské Tatry.
- Ramularia picridis* F a u t r. et R o u m. ad folia *Picridis hieraciifoliae* in ripa rivi Kozrál a Líšná ad merid. pr. Přerov (Z).
- Ramularia hypochoeridis* M a g n. ad folia *Hypochoeridis radicatae* ad Dol. Lípová (Z).
- Ramularia lamsanae* D e s m. ad folia *Lamsanae communis* in silva supra Dětrichov in mont. Jeseníky (Z).
- Ramularia conspicua* S y d. ad folia *Hieracii nigriti* in monte Vozka in mont. Jeseníky (Z).
- Ramularia corcontica* K a b. et B u b. ad folia *Hieracii vulgati* in margine silvae ad Sulov (Bílý kříž) (Z). Sporis 50 × 3 μ.
- Ramularia hamburgensis* L i n d a u ad folia *Hieracii vulgati* eodem loco (Z).
- Ramularia variegata* E l l. et H o l w. var. *petasitis officinalis* A l l e s c h. ad folia *Petasitis officinalis* ad rivum Babin potok in mont. Bielské Tatry.
- Ramularia filaris* F r e s. var. *hieracii* B ä u m l. ad folia *Hieracii laevigati* in declivitate meridionali collis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Ramularia senecionis* (B. et B r.) S a c c. ad folia *Senecionis subalpini* ad rivum Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
- Senecionis rivularis* in fonte infra summum montis Praděd in mont. Jeseníky (Z).
- Senecionis fluviatilis* ad ripam Rusavae fl. in silva Zámeček ad Kromčíž (Z).
- Ramularia centaureae* L i n d r. ad folia *Centaureae rhenanae* ad Heroltice pr. Tišnov (Z);
- Centaureae cyanus* ad Dřevohostice (Z).
- Ramularia cirsii* A l l e s c h. ad folia *Cirsii palustris* in declivitate boreali collis Hostýn (Z).
- Ramularia cardui* K a r s t. ad folia *Cardui crispi* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
- Ramularia knautiae* (M a s s.) B u b. ad folia *Knautiae arvensis* in silvula Kamenice ad Turovice (Z).
- Ramularia tricherae* L i n d r. ad folia *Knautiae arvensis* in declivitate merid. collis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Septocylindrium ranunculi* P e c k. ad folia *Ranunculi acris* in paludosis ad Rychlov (Z).
- **Cercospora veratri* P e c k. ad folia *Veratri albi* in margine silvae a Rožnov ad merid. (Z).
- **Cercospora Magnusiana* A l l e s c h. ad folia *Geranii silvatici* in mont. Bielské Tatry.
- **Cercospora rhaetica* S a c c. et W i n t. ad folia *Laserpitii pruthenici* in silvula Na Páleníci dicta a Bystřice p. Host. ad septentr. (Z).
- **Cercospora septorioides* S a c c. ad folia *Adenostylis alliariae* in devitate loci depressioris Vel. Kotlina in mont. Jeseníky (Z).
- Cercospora virgaureae* (T h ü m.) A l l e s c h. ad folia *Solidaginis alpestris* infra Ždiarská Vidla.
- Coniosporium arundinis* (C o r d a) S a c c. ad culmos *Phragmitis communis* ad Rychlov (Z).

- Coniosporium punctiforme* Maire et Sacc. ad folia vetera *Scirpi silvatici* in ripa Bečva fl. a Val. Meziříčí ad septentr. (Z).
- Coniosporium amentaceum* Corda ad corticem *Salicis auritae* ad Bilek pr. Chotěboř.
- Campotium curvatum* (Kunze) Lk. ad folia *Scirpi lacustris* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Fusicladium depressum* (B. et Br.) Sacc. ad folia *Angelicae silvestris* in silva Roztoky ad Rusava (Z).
- Fusicladium radiosum* Lib. ad folia *Populi albae* in ripa Bečvae fl. ad Přerov (Z).
- Fusicladium saliciperdatum* (Alb. et Schw.) Lind. ad folia *Salicis capreae* in declivitate occidentali collis Hostýn (Z).
- Fusicladium orbiculatum* Thüm. ad folia *Sorbi aucupariae* in silva ad Dřevohostice (Z).
- **Fusicladium praecox* Rbh. ad folia *Tragopogonis* orientalis in prato ad rivum ad Lhota Radkova (Z).
- Fusicladium aronici* Sacc. ad folia *Doronici austriaci* ad rivum Reglany potok ad Ždiář, infra montem Vidla, in prato Široké pole in mont. Bielské Tatry.
- Passalora bacilligera* Mont. et Fr. ad folia *Alni glutinosae* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Scolicotrichum graminis* Fueck. ad folia *Anthoxanthi odorati* ad marginem silvae in monte Šerák in mont. Jeseniky (Z).
- **Cladosporium macrocarpum* Preuss. ad *Brassicam oleraceam* capitatam in Drahoňín ad Tišnov.
- Cladosporium aecidiicola* Thüm. ad *Coleosporium senecionis* ad folia *Senecionis Fuchsi* in colle Holý kopec in collibus Hostýnské kopce (Z);
ad aecidia ad folia *Tragopogonis orientalis* ad Radkov (Z);
ad aecidia *Tussilaginis farfarae* in silva Roztoky ad Rusava (Z).
- Heterosporium echinulatum* Cooke ad folia caulesque *Dianthi Carthusianorum* in declivitate merid. collis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Heterosporium alli* El. et Mart. ad folia *Allii sibirici* in Vel. Kötлина in montibus Jeseniky (Z).
- **Heterosporium graminum* Rostr. ad folia *Dactylis glomeratae* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
- Macrosporium cladosporioides* Desm. ad caules *Arctii lappae* in Lípov (Z).
- Alternaria brassicae* Berk. (Sacc. ad folia *Amaranthi retroflexi* in ripa Bečvae fl. in Přerov (Z).
- Roripae amphibiae* in ripa Radkovkae fl. a Dřevohostice ad orientem (Z).
- Alternaria tenuis* Nees. ad folia *Thalictri angustifolii* in fossa ad Turovice (Z).
- Cercospora dubia* (Ries) ad folia *Atriplicis nitentis* in Radňovice ad Nové Město na Mor.;
Chenopodii albi in Jaroslavice ad Znojmo.
- Cercospora nasturtii* Pass. ad folia *Roripae amphibiae* in ripa Radkovka fl. ad Dřevohostice (Z).
- Cercospora violae* Sacc. ad folia *Violae sp.* in saxis Pulčinské skály ad Vsetín (Z).
- **Cercospora violae tricoloris* Briosi et Cavara ad folia *Violae tricoloris* in horto in Dřevohostice (Z).
- Cercospora cerasella* Sacc. ad folia *Pruni fruticosae* in declivitate Hradisko supra Předmostí ad Přerov (Z).
- **Cercospora loti* Hollós ad folia *Loti uliginosi* ad Sulov (Bílý kříž) in mont. Beskydy (Z).
- Cercospora zebrina* Pass. ad folia *Trifolii medii* ad Líšná pr. Přerov (Z).
- **Cercospora Davisii* Ell. et Ev. ad folia *Meliloti officinalis* et *albi* in ripa Moštěnka fl. ad Turovice (Z).
- Cercospora lythri* West. (Nessl) ad folia *Lythri salicifolii* in margine silvae Kozrál a Líšná ad merid. (Z).
- Cercospora campisili* Speg. ad folia *Impatientis nollii tangere* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Cercospora chaerophylli* v. H. ad folia *Charophylli aromatici* in margine silvae Kostelecký les ad Kozrál pr. Holešov (Z).
- **Cercospora echii* Syd. ad folia *Echii vulgaris* in Hradisko supra Předmostí ad Přerov (Z).
- **Cercospora olivacea* Oth. ad folia *Artemisiae absinthii* in clivo ad Heroltice pr. Tišnov (Z).
- **Cercospora streptopi* Dearn. et Barth. ad folia *Streptopi amplexifolii* in silva in declivitate meridionali montis Král. Sněžník (Z).
- Graphium pallescens* (Fueck.) Magn. ad folia *Stellariae nemorum* in margine silvae Sulov (Bílý kříž) in mont. Beskydy (Z).
- Tubercularia mutabilis* Nees. ad ramos *Mori albae* in Dřevohostice (Z).
- Tubercularia granulata* Pers. ad ramos *Aceris pseudoplatani* in silva ad Dřevohostice (Z);
Tiliae cordatae in silva ad Dřevohostice (Z).
- Tubercularia confluens* Pers. ad ramos *Carpini betuli* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
- **Thyrsidinea carneominiata* v. H. ad corticem *Aceris pseudoplatani* ad Bilek pr. Chotěboř.

- Tuberculina persicina* (Ditm.) Sacc. in *aecidiis Petasitidis* in mont. Bielské Tatry.
Exosporium tiliae Lk. ad ramos *Tiliae cordatae* ad Havlíčkův Brod.
Vermicularia heterochaeta Pers. ad folia Muscari comosi in silvula Kamenice ad Turovice (Z).
Vermicularia telephii Karst. ad folia *Sedi maximi* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
Vermicularia saponariae Allesch. ad caules *Saponariae officinalis* in ripa Moštěnkae fl. ad Turovice (Z).
Vermicularia dematium (Pers) Fr. var. *fennica* Karst. ad caules *Aegopodii podagrae* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
Vermicularia dematium (Pers.) Fr. ad folia *Iridis pseudoacori* in margine silvae ad Dřevohostice (Z).
Vermicularia oligochaeta Bub. et Kab. ad ramos emortuos in silvula Kamenice ad Turovice (Z).
Sclerotium rhizodes A u e r s w. ad folia *Poaе Chaixi* in declivitate occident. montis Radhošť (Z);
Holci lanati in silva Ochozy ad Dřevohostice (Z);
Glyceriae plicatae ad Švajgrovka in declivitate orient. collis Hostýn (Z).
Sclerotium leiodermum Rob. ad caules *Fagopyri dumetorum* in ripa Bystřické fl. ad Lípová (Z).

Nové knihy:

- Guttenberg, H.: Lehrbuch der allgemeinen Botanik. 4 rev. A. — 1955, 637 Abb., 7 Taf., 708 stran, cena 25 DM.
- Vogel, S.: Blütenbiologische Typen als Elemente der Sipplengliederung. — Fischer, Jena 1954, 177 Abb., 338 stran, cena 40 DM.
- Christiansen, W.: Pflanzenkunde von Schleswig-Holstein. 2 rev. A. — 1955, 122 Abb., 180 stran, cena 14,80 DM.
- Lüdi, W. u. And.: (Ed.): Probleme (Aktuelle) der Pflanzensoziologie. — Bern 1954, 104 stran, cena 10,70 DM.
- Runge, F.: Die Flora Westfalens. — 1955, stran 574, cena 22 DM.
- Ainsworth, G. and Bisby, G.: A Dictionary of the Fungi. 4th ed. — 1954, 139 Fig. 455 stran, cena 16,40 DM.
- Hylander, N.: Vascular Plants of the Scandinavian Countries. — 1954, illus., 392 stran, cena 55 DM.
- Bailey, I. W.: Contributions to Plant Anatomy. — Chron. Bot. 15, 1/6, 1954, 28 illus., 262 stran, cena 7,50 \$.
- Erdtman, G.: Introduction to Pollen Analysis. Second impression. — N. S. Pl. Sci. Books 12, 1954, 46 pl., 239 stran, cena 6 \$.
- Goodspeed, T. H.: The Genus Nicotiana. — Chron. Bot. 16, 1/6, 1954, 536 stran, cena 12,50 \$.
- Funder, S.: Practical Mycology. Manual for identification of fungi. — Broggers Boktr. Forlag, Oslo 1954, I. vol., 146 stran.
- Wardlaw, C. W.: Embryogenesis in Plants. — Methuen & Co. Ltd, London 1955, 83 fig., stran I—XI + I + 381.
- Wright, R. C. M. - Hort, N. D.: Plant Propagation. — Ward Lock & Co. Ltd., London 1955, 22 tab., 192 stran.