

V. album s. str., Vilčinskij (Flora URSS, 1950) se vyjadřuje podobně, ovšem v lesním pásmu je prý nahrazováno *V.* lobelianum*. Oproti tomu Zapałowicz (Conspectus fl. Galic. I. 1906) a monograf Loesener (Verh. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, 1926) připouštějí pro Karpaty pouze *V.* lobelianum*. Pax (Grundz. d. Pfl. i. d. Karp. II. 1908) poznamenává, že v Lesních Karpatech probíhá hranice mezi oběma typy. Wołoszczak (l. c. 1882) uvádí *V. album* s. str. z pohorí nad Lomnicí a Oporem od údolí až po nejvyšší štíty. Hückel (l. c. 1865) a Wołoszczak (l. c. 1893) ho publikovali z Karpat Stryjských (až po Pikuj) a Samborských. Wołoszczak (l. c. 1892, 1893) píše, že v Karpatech počínaje od Čeremoše až do oblasti Stryje a Lomnice *V.* lobelianum* neviděl, jenom v nížinách od Lvova po Dněstr. Na horských loukách v Užockém průsmyku ho nalezl Nevole (l. c.). V polské části Nízkých Polonin zjistili výskyt *V. album* s. str. Knapp (l. c. 1869), Kotula (Spraw. kom. fiz., 1883) i Wołoszczak (l. c. 1894) na několika lokalitách, na př. polonina Wetliška, Caryńska, Halicz, Krziemien, Tarnica, Čeremcha, Beskyd a j. V poslední době ověřili výskyt *V. album* s. str. v polských Poloninách Jasiewicz a Zarzycki (l. c.). V našich Poloninách bylo dosud uváděno pouze *V.* lobelianum*. *V. album* ssp. *albicans* roste v alpské oblasti, zasahuje až do Bosny a na Černou Horu, v Apenninách a ve Východních Karpatech. Areál ssp. *lobelianum* je obrovský, počíná v severním Portugalsku a končí v severní Číně. Při této příležitosti chci upozornit, že znak „listeny kratší než stopky květní“, připisovaný pro *V. album* ssp. *albicans* v Dostálově Květeně a Klíči, pro naše rostliny nevyhovuje. Zpravidla také neplatí ani pro alpské *V. album*, i když je zřejmé, že ssp. *lobelianum* má listeny obvykle delší než ssp. *albicans*.

Jaroslav G a z d a :

Príspevek ke květeně jižních Čech.

Ve svém příspěvku uvádím výsledky floristických exkursí, které jsem konal v roce 1956 a v letech předcházejících v jihočeské oblasti. Některé nálezy jsou ze Šumavy, z míst ne dosti dobře přístupných, kam jsem se dostal na služební cestě. Nomenklatura je uvedena podle J. Dostála (Klíč k úplné květeně ČSR, Praha 1954).

- Aconitum napellus* ssp. *firmum* — Kaplice: Frymburk, ojedinele u potoka.
Actaea spicata — Č. Krumlov: Kluk 737 m sv. od Křemže.
Agriemonia eupatoria ssp. *officinalis* — Č. Budějovice: Litvínovice, na hrázích rybníků a v polních úvozech ojedinele. Šindlový Dvory, na hrázi rybníka ojedinele. Holubovská Bašta, na hrázích rybníků ojedinele.
Achillea ptarmica — Č. Budějovice: Litvínovice, ojedinele u rybníků. Mokré, ve vlhkém příkopu u silnice.
Ajuuga genevensis — Č. Budějovice: údolí Vltavy u Němč strouhy. Vrábče, les u železniční zastávky.
Alliaria officinalis — Č. Budějovice: Sokolský ostrov, u Mlýnské stoky. U Vltavy za tužkárnu.
Alnus viridis — Č. Budějovice: Dobrá Voda, v údolí potoka. Jívno, rybník Mrhal. Rudolfov, les u Samot.
Anthemis tinctoria — Č. Budějovice: výslunné skály v údolí Vltavy u Rybáka v porostu trnek (1955).
Arnica montana — Č. Budějovice: v Homolských lesích vzácně. Č. Krumlov: Chrástanský les, častá na východním úpatí.
Arunco vulgaris — Č. Budějovice: v údolí potůčku na jihovýchod od Dobré Vody. Libnič, v lese v údolí potůčku. Č. Krumlov: Blanský les, na sev. úpatí v údolí potůčku, tekoucího směrem na Lhotku, nadmoř. v. 680 m.
Asplenium ruta-muraria — Tábor: ojedinele na vysoké kamenné zdi zahrady u Jordánu (1956).
Atriplex nitens — Č. Budějovice: u nákladového nádraží a přilehlých ulicích, u železničních zastávek na obvodu města a na jiných místech (Vráto; 1956).
Atropa belladonna — Č. Krumlov: Kluk 737 m severových. od Křemže.
Batrachium fluitans — Č. Krumlov: ojedinele v Křemžském potoce u Dívěho Kamene.
Berteroa incana — Č. Budějovice: častá na železničním náspu u nádraží (1956), ojedinele na pěšině na levém břehu Vltavy proti plovárně (1955).
Bolboschoenus maritimus ssp. *eumaritimus* — Č. Budějovice: Dehtář, bohaté porosty na jižním pobřeží; Šindlový Dvory, ojedinele při břehu rybníka.
Botrychium matricariaefolium — Č. Krumlov: Chrástanský les, ojedinele na vých. svahu.

- Bromus inermis* ssp. *eu-inermis* — Č. Budějovice: Šindlový Dvory, u plotu zahrady (1956).
- Calystegia sepium* — Č. Budějovice: ojedíněle na hrázích rybníků u Čejkovic.
- Campanula glomerata* ssp. *euglomerata* — Č. Budějovice: Zábोří, Dobšice, častý na suchých travnatých místech. Č. Krumlov: Turkovice, travnatá stráň.
- Carex Buxbaumii* ssp. *hartmannii* — Č. Budějovice: nehojně na březích rybníků.
- Carex silvatica* — Č. Krumlov: Chrástanský les, nehojně na lesní cestě na vých. svahu.
- Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia* — Č. Budějovice: Dlouhá louka u sodovkárny, v olšových křovinách na břehu Vltavy. Litvínovice, vlhká louka. Rožnov, louky ke Štechrovu mlýnu a k Plané. Louka mezi papírnou a nemocnicí (1955—56). Prachatic: louka na svahu Černé hory (1955).
- Centaurea scabiosa* ssp. *euscabiosa* — Č. Budějovice: hojná na krystalickém hřbetu (Rudolfov, Dobrá Voda, Doubravice a j.) Č. Krumlov: Křemže, Chlumeček, na hadcovém podkladě.
- Centaurea stoebe* ssp. *rhenana* — Č. Budějovice: na železničním náspu mezi nádražím a viaduktem (1956).
- Centaurea minus* ssp. *typicum* — Č. Budějovice: Šindlový Dvory, Mokré, roztroušeně na okraji lesa; Kvítkovice, travnatá místa v lese.
- Coleanthus subtilis* — Č. Budějovice: Šindlový Dvory, hojně s *Trifolium hybridum* a *Juncus bufonius* na obnaženém písčitém břehu rybníka (1956).
- Colchicum autumnale* — Č. Budějovice: Litvínovice a Šindlový Dvory, ojedíněle na lukách (1956).
- Comarum palustre* — Č. Budějovice: Litvínovice, Třebín, u rybníků nehojně.
- Cymbalaria muralis* — Č. Budějovice: kamenný břeh slepého ramene Malše u jedenáctiletky (1955). Tábor: vysoká kamenná zeď zahrady u Jordánu (1956).
- Cynanchum vincetoxicum* — Č. Budějovice: Heřmaň, v údolí Malše; na výslunných skalách v údolí Vltavy jižně od Poříčí.
- Daphne mezereum* — Č. Budějovice: častý v lese západně od Kvítkovic; Chrástanský les, ojedíněle.
- Dianthus carthusianorum* ssp. *vulgaris* — Č. Budějovice: Rožnov, jediný exemplář na louce u dřevěného mostu přes Vltavu (1956); hojný v oblasti Boršova a odtud proti proudu Vltavy provází výslunné skály.
- Dianthus superbus* ssp. *typicus* — Č. Budějovice: při silnici z Roudného do Plava v silničním příkopu při okraji Rožnovského lesa (nadm. v. 400 m). Hvozdk se vyskytuje se *Serratula tinctoria*, *Cytisus nigricans*, *Genista germanica*.
- Drosera rotundifolia* — Č. Krumlov: rašelina u rybníka Olšiny.
- Echinocloa crus-galli* — Č. Budějovice: Litvínovice, v brambořišti; Šindlový Dvory, v zahradě a ojedíněle na obnaženém rybníčním dně (1956).
- Erigeron acre* ssp. *typicum* — Č. Budějovice: ojedíněle, na př. na úhoru v Mokřem, u polní cesty mezi Rožnovem a Planou, u Jivna. Jediný exemplář u polní cesty na východním úpatí Chrástanského lesa. Č. Krumlov: hojně na úhoru sev. od Kovářovic na Šumavě v oblasti kóty 738.
- Erysimum cheiranthoides* — Č. Budějovice: hojně se vyskytuje všude kolem nákladového nádraží, zastávek a přilehlých ulicích. U školního statku ve Čtyřech Dvorech. Ojedíněle u rybníka v Šindlových Dvorech (1956).
- Euphorbia cyparissias* — Č. Budějovice: u silnice mezi Čakovem a Záborem u kóty 433.
- Euphorbia dulcis* — Č. Krumlov: u Dívčího Kamene.
- Gentianella austriaca* ssp. *carpatica* — Č. Krumlov: Chlumeček, na louce pod kótou 611 ojedíněle.
- Gnaphalium luteo-album* — Č. Budějovice: častá na jv. břehu Dehtáře (1956).
- Gymnadenia conopsea* — Č. Krumlov: vzácně na lesních loukách vých. Chrástanského lesa, nadmořská výška 550 m.
- Hordeum murinum* ssp. *emurinum* — Č. Budějovice: hojně na chodnicích. Čtyři Dvory, u školního statku (1956).
- Chrysanthemum parthenium* — Č. Budějovice: Šindlový Dvory, zplaněle u rybníka (1956).
- Impatiens parviflora* — Č. Budějovice: velmi hojná na Krumlovských alejích a na Sokolském ostrově (1956).
- Iris sibirica* — Č. Krumlov: rašelinná louka u rybníka Olšina, nehojně (1952).
- Isolepis setacea* — Č. Budějovice: ojedíněle na břehu nově založeného rybníka na Dlouhé louce (1956). Dehtář, na obnaženém dně spolu s *Juncus tenageia* (1956). Č. Krumlov: vzácně v příkopu lesní cesty na vých. svahu Chrástanského lesa.
- Jasione montana* — Č. Budějovice: často na krystaliniku v oblasti Hradce, Habří, Kvítkovice, Čakov, Žabovřesky.
- Juncus compressus* — Č. Budějovice: Litvínovice, na okraji louky; Šindlový Dvory, u silnice; Chrástany, na návsi.
- Juncus filiformis* — Č. Budějovice: často u rybníků, na př. Litvínovice, Třebín, Lipí.

- Juncus tenageia* — Č. Budějovice: Dehtář, hojně na obnaženém dně s *Eleocharis ovata* a *Carex cyperoides*.
- Koeleria pyramidata* — Č. Budějovice: často na výslunných travnatých místech, na př. Litvínovce, Kaliště, Holubov. Bašta, Čakov, Záboří, Dobšice. Č. Krumlov: lesní louky na vých. úpatí Chráštského lesa.
- Lactuca serriola* — Č. Budějovice: častý plevel při chodnicích, též ve Čtyřech Dvorech u školního statku (1956).
- Ledum palustre* — Č. Krumlov: jediný odumírající exemplář na rašeliništi u rybníka Olšina (1952).
- Lycopodium clavatum* — Č. Budějovice: Šindlový Dvory, ojedíněle v borovém lese; Kvítkovice, ojedíněle.
- Lysimachia nemorum* — Č. Krumlov: vzácně na vých. svahu Chráštského lesa.
- Mercurialis annua* — Č. Budějovice: plevel na chodníku a v zahradě vyšší pedagogické školy (1956).
- Mercurialis perennis* — Č. Krumlov: Křemžský potok u Dívčího Kamene ojedíněle. Prachatice: Buglata 800 m, rozsáhlé porosty v bučinách.
- Myosurus minimus* — Č. Budějovice: Šindlový Dvory, na úhoru u hájovny a na obnaženém dně rybníka (1955). Třeboň: na obnaženém dně Kaňova (1956).
- Neottia nidus-avis* — Č. Krumlov: ojedíněle na vých. svahu Chráštského lesa.
- Nymphoides peltata* — Č. Budějovice: rozsáhlý porost na rybníku v Šindlových Dvorech.
- Orchis maculata* — Č. Krumlov: hojně na lesních lukách na vých. úpatí Chráštského lesa, 550 m.
- Origanum vulgare* ssp. *genuinum* — Č. Budějovice: Vidov, na výslunném svahu na okraji lesa.
- Oxyccoccus quadripetalus* ssp. *vulgaris* — Č. Krumlov: rašelina u rybníka Olšina na Šumavě.
- Petasites albus* — Č. Budějovice: Kvítkovice, malá lokalita v lesní strži.
- Petasites hybridus* — Č. Budějovice: na břehu Vltavy proti plovárně.
- Phyllitis scolopendrium* — Kaplice: Reiterschlag u Přední Výtoně, jeden exemplář v kamením sroubené studni na jižním okraji obce (1954).
- Potentilla supina* — Č. Budějovice: hojná na obnažených dnech rybníků, na př. Šindlový Dvory, Dehtář. Dubné, na návsí; Čtyři Dvory, plochá dráha (1956).
- Ranunculus sardous* — Č. Budějovice: Jednota u Dubného, na úhoru u rybníka Nouzov.
- Ranunculus sceleratus* — častý na obnažených dnech rybníků. Č. Budějovice: obnažená dna rybníků v Šindlových Dvorech, na Dlouhé louce u Č. B. a na Dehtáři.
- Reseda lutea* — Č. Budějovice: na železničním náspu u nádraží (1956).
- Salvia glutinosa* — Č. Krumlov: nehojně na okraji lesa mezi Němou strouhou a Dívčím Kamenem.
- Sambucus ebulus* — Č. Krumlov: nehojně na pasece na Kluku 737 m.
- Sanguisorba minor* ssp. *dictyocarpa* — Č. Krumlov: Křemže, na hadcovém svahu.
- Sanicula europaea* — Č. Krumlov: vzácně v bučině na vých. svahu Chráštského lesa.
- Serratula tinctoria* ssp. *eutinctoria* Č. Budějovice: mezi Roudným a Plavem, několik exemplářů u silnice na okraji lesa.
- Sisymbrium altissimum* — Č. Budějovice: u nákladového nádraží a přilehlých ulicích, na náspu mezi nádražím a viaduktem, u železničních zastávek na obvodu města, v pšenici v Mladém (1955—56).
- Soldanella montana* ssp. *eumontana* — Č. Budějovice: nehojně u potůčku v lese jv. od Libníče.
- Spiraea salicifolia* — Č. Krumlov: na rašeliništi u rybníka Olšina.
- Stellaria holostea* — Č. Krumlov: hojně na břehu Křemžského potoka.
- Thalictrum aquilegifolium* — Č. Krumlov: vzácně na okraji rašeliniště u rybníka Olšina.
- Thalictrum flavum* ssp. *lucidum* — Č. Budějovice: Litvínovce, na vlhčí louce kdysi hojná, v poslední době vlivem špatného odvodnění vzácná. Nehojně na louce u Nových Homol (1956).
- Trientalis europaea* — Č. Krumlov: ojedíněle na rašeliništi u rybníka Olšina.
- Vaccinium uliginosum* — Č. Krumlov: hojně na rašelině u rybníka Olšina.
- Verbena officinalis* — Č. Budějovice: na návsí v Plané a Mokrém.
- Vicia silvatica* — Č. Krumlov: vzácně v bučině v Chráštském lese.
- Vinca minor* — Č. Budějovice: v lese u Libníče. Prachatice: Buglata, vzácně ve smrkovém porostu.
- Viola palustris* — Č. Budějovice: olšina v Šindlových Dvorech, na rašelínku v silničním příkopu u Mokrého. Č. Krumlov: u Adolfova v údolí Křemžského potoka.